ISSN No. 2455 - 300X

వ్యవసాయ పంచాంగం
2025-2026

ANGRAU

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్.

మొదటి ముద్రణ :
ప్రతులు : 2500
మార్చి, 2025

ISSN No. 2455 - 300X

వెల : రూ. 310/-

నిర్వహణ సంపాదకులు :

డా॥ ఓ. శారద

ప్రధాన వ్యవసాయ సమాచార అధికారి

సంపాదకులు :

డా॥ కె.ఎస్. పూర్ణిమ

సీనియర్ శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ)

వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం,
ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, లాం, గుంటూరు.

ప్రచురణ :

వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగము, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసు,
ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం,
లాం, గుంటూరు – 522 034

వ్యవసాయ పంచాంగాల కొరకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన వ్యవసాయ సమాచార అధికారి,
వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం,
ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం,
వసంత బిల్డింగ్, ఐ.ఎ.బి. బిల్డింగ్ ప్రక్కన,
లాం, గుంటూరు – 522 034, ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఫోన్ : 91005 00223, ఇ-మెయిల్ : paio@angrau.ac.in

ఈ ప్రచురణలో పొందుపరచడానికి వివిధ అంశాలను అందించడంలో సహకరించిన శాస్త్రవేత్తలు

1.	డా॥ యం. గిరిజారాణి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వరి)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు.
2.	డా॥ ఎ. అశోక్ కుమార్	శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.
3.	డా॥ సి.వి. చంద్రమోహన్ రెడ్డి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతకధాన్యాలు & మొక్కజొన్న)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
4.	డా॥ డి. మోహన్ రెడ్డి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
5.	డా॥ ఎస్. నీలిమ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మొక్కల ప్రజనన శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నంద్యాల.
6.	డా॥ ఓ. వెంకటేశ్వర్లు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (నూనె గింజలు)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి.
7.	డా॥ ఎ.బి.యం. శిరీష	శాస్త్రవేత్త (మొక్కల ప్రజనన శాస్త్రం)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, యలమంచిలి.
8.	డా॥ డి. ఆదిలక్ష్మీ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (చెఱకు)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి.
9.	డా॥ వై. సతీష్	సంచాలకులు	ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్తన దృవీకరణ అధారిటీ
10.	డా॥ ఎస్. రాజమణి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ప్రత్తి)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం.
11.	డా॥ ఎస్. హేమలత	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం)	యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి.
12.	డా॥ డి.డి. స్మిత్	అసోసియేట్ డీన్	డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.
13.	డా॥ డి. విజయ్ శంకర్‌బాబు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మెట్ట వ్యవసాయం)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనంతపురం.
14.	డా॥ ఎస్. విష్ణువర్ధన్	ఆచార్యులు (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.
15.	డా॥ యం.వి. రమణ	అసోసియేట్ డీన్	యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి.
16.	డా॥ జి. రవిబాబు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.
17.	డా॥ కె.వి. నాగమాధురి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి.
18.	డా॥ ఎ. మణి	డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ	పరిపాలనా భవనం, లాం, గుంటూరు.
19.	డా॥ సి.హెచ్. శ్రీనివాస్	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు.
20.	డా॥ పి. మధువాణి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం)	ఉప్పునీటి పరిశోధనా స్థానం, బాపట్ల.

21.	డా॥ హెచ్.వి. హేమకుమార్	ఆచార్యులు & హెడ్	వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.
22.	డా॥ యం. రాజశ్రీ	ఆచార్యులు (కీటక శాస్త్రం) & అధిపతి	యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి.
23.	డా॥ ఎ. విజయ గోపాల్	యూనివర్శిటీ హెడ్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మైక్రోబయోలజీ)	ఎ.పి.జి.సి., లాం, గుంటూరు.
24.	డా॥ సి. రమణ	యూనివర్శిటీ హెడ్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి.
25.	డా॥ ఎ. సాంబయ్య	సీనియర్ శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
26.	డా॥ ఎస్.కె. కలీముల్ల	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఎఫ్.పి.టి.)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి.
27.	డా॥ కె.ఎన్. రాజకుమార్	శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
28.	డా॥ కె. కృపావతి	సహ ఆచార్యులు (అగ్రి ఇంజనీరింగ్)	డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్‌కళాశాల బాపట్ల.
29.	డా॥ యం. భరతలక్ష్మీ	అసోసియేట్ డీన్ & యూనివర్శిటీ హెడ్ (సేద్య శాస్త్రం)	వ్యవసాయ కళాశాల, నైరా.
30.	డా॥ కె.వి. రమణ మూర్తి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి.
31.	డా॥ యం. విశాలాక్షి	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి.
32.	డా॥ పి. కిషోర్ వర్మ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మొక్కల తెగుళ్ళ శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
33.	డా॥ సి.హెచ్. శ్రీనివాసరావు	డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
34.	డా॥ కె. మోహన్ రావు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, విజయరాయి.
35.	డా॥ కె. సునీల్ కుమార్	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఊటుకూరు.
36.	డా॥ టి. ప్రతిమ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,తిరుపతి.
37.	డా॥ యం. రత్నం	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం.
38.	డా॥ ఎస్. ప్రతిభశ్రీ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
39.	డా॥ టి. మురళీకృష్ణ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,తిరుపతి.
40.	డా॥ కె. వేమన	ఆచార్యులు & హెడ్	యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి.
41.	డా॥ పి. ప్రసూణరాణి	అసోసియేట్ డీన్	వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల.
42.	డా॥ పి. అనిల్ కుమార్	స్పెషల్ ఆఫీసర్	ఎ.పి.జి.సి., లాం, గుంటూరు.
43.	డా॥ వి. శైలజ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
44.	డా॥ జి.వి. సునీల్ కుమార్	సీనియర్ శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.

45. డా॥ ఎన్. శ్రీనివాసరావు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు.
46. డా॥ ఆర్. శారద జయలక్ష్మీదేవి	ఉపకులపతి	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
47. డా॥ పి.వి.కె. జగన్నాధరావు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్) & యూనివర్శిటీ హెడ్	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి.
48. డా॥ యం. సర్ధార్ బేగ్	అసోసియేట్ డీన్ & ఆచార్యులు (ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్)	ఆహార శాస్త్ర సాంకేతిక కళాశాల, బాపట్ల.
49. డా॥ జి. శివనారాయణ	విస్తరణ సంచాలకులు	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
50. డా॥ యం.సి. ఓబయ్య	యూనివర్శిటీ హెడ్ (వ్యవసాయ విస్తరణ)	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నెల్లూరు.
51. డా॥ బి. ముకుందరావు	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ)	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
52. డా॥ వి. విశాలక్ష్మీ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం)	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు.
53. డా॥ ఓ. శారద	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ)	వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం, లాం, గుంటూరు.
54. డా॥ యం. సతీష్ రాహుల్	శాస్త్రవేత్త ఎన్.ఇ.పి. కోఆర్డినేటర్	పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు. లాం, గుంటూరు.
55. డా॥ ఎ. మనోజ్	శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ)	వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం, లాం, గుంటూరు.
56. డా॥ఎన్.వి.వి.ఎస్.దుర్గాప్రసాద్	సహ పరిశోధనా సంచాలకులు	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం.
57. డా॥ వై. రాధ	ప్రధాన శాస్త్రవేత్త & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఆర్థిక శాస్త్రం)	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం.
58. డా॥ కె. లక్ష్మీ	సహ ఆచార్యులు (ఎఫ్.ఎస్.&ఎన్.టి.)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
59. డా॥ యం.శిరీష	సహ ఆచార్యులు (ఆర్.ఎమ్.&సి.ఎస్.)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
60. డా॥ జి. నిర్మలదేవి	సహ ఆచార్యులు (ఎఫ్.ఎస్.&ఎన్.టి.)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
61. డా॥ వై. బిందియా	సహ ఆచార్యులు (ఉద్యాన శాస్త్రం)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
62. డా॥ బిల్కిస్	ఆచార్యులు (హెచ్.డి.ఎఫ్.ఎస్.)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
63. డా॥ ఎమ్.ఎస్.చైతన్యకుమారి	అసోసియేట్ డీన్	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.
64. డా॥ కె. ధనశ్రీ	సహ ఆచార్యులు (ఇ.ఇ.& సి.ఎమ్.)	సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.

విషయ సూచిక

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం

పుటల సంఖ్య

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం ix
వివిధ కార్తెల్లో చేయవలసిన వ్యవసాయ పనులు xxi
ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధన మరియు విస్తరణ కేంద్రాలు xxv
వాతావరణం – పంటల ఉత్పత్తి – ధరల విశ్లేషణ xxix

ఆహార ధాన్యాలు

పుటల సంఖ్య

వరి 1
ఆరుతడి వరి (ఏరోబిక్ రైస్) 45
యంత్రాలతో వరి నాట్లు–యాజమాన్యము 48
మొక్కజొన్న 53
జొన్న 64
సజ్జ 69
రాగి / తైదలు 74
కొర్ర 78
సామ 82
ఊద 83

పప్పు ధాన్యాలు

కంది 84
పెసర 90
మినుము 96
శనగ 103
సోయాచిక్కుడు 110
ఉలవలు 114
రాజ్మా 116

నూనె గింజలు

పుటల సంఖ్య

వేరుశనగ 120
నువ్వులు 136
ప్రొద్దుతిరుగుడు 140
ఆముదం 147
వలిశెలు 157
వివిధ పంటలలో విత్తనోత్పత్తి 160

వాణిజ్య పంటలు

చెఱకు 189
ప్రత్తి 215
గోగు 231

కలప పంటలు

కలప వృక్షాలు – వాటి పెంపకం 237
టేకు 237
యూకలిప్టస్ (నీలగిరి) 239
సుబాబుల్ 242
వెదురు 243
చింత 247
వేప 248

బంజరు భూముల్లో సామాజిక అడవుల పెంపకం 249
జట్రోఫా (అడవి ఆముదం) 251
కానుగ 254
సర్కారీ తుమ్మ 256
సీమరుబా (సర్కారీ తంగేడు) 259
ఇప్ప 260
మలబారు వేప 261
ఎర్ర చందనం 263
మహాగని 264
శ్రీగంధం 266
అటవీ వ్యవసాయం 269

ఇతర వివరాలు

వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నిల్వ పద్ధతులు మరియు నిల్వలో నష్ట నివారణ చర్యలు 271
మెట్ట వ్యవసాయంలో మెళకువలు 280
వ్యవసాయ రంగంలో ప్లాస్టిక్స్ వినియోగము 293
సూక్ష్మసాగు నీటి సాగు (మైక్రో ఇరిగేషన్) 307
బిందు సేద్యం ద్వారా ఎరువుల యాజమాన్యం 314
భూసారం, సాగునీరు మరియు పంట మొక్కల పరీక్షల విధానం – ఆవశ్యకత 321
తీర ప్రాంత నేలల్లో నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు మరియు భూగర్భ నీటి వాడకంలో పాటించవలసిన మెళకువలు 327
సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు – సవరణ 330
సమస్యాత్మక భూములు – వాటి యాజమాన్యం 337
ఉప్పు చౌడు మరియు ఉరక భూముల పునరుద్ధరణకు భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మాలన పద్ధతులు 346
వర్మి కంపోస్టు తయారీలో మెళకువలు 350
జీవన ఎరువులు – వ్యవసాయంలో వాటి ప్రాముఖ్యత 357
ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలు 368
వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల సాంకేతికత వినియోగం మరియు ప్రామాణిక నిర్దేశకాలు 401
చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ జోడింపు యంత్రాలు 415
వ్యవసాయంలో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగం 419
హైడ్రోపోనిక్స్ విధానంలో పంటల సాగు 423
వివిధ సాగు పరిస్థితులలో వైవిధ్యమైన పంటల ఎంపిక 429
రబీలో వరి కన్నా మెరుగైన ఆరుతడి పంటలు 438
జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల ద్వారా హానికారక పురుగుల నివారణ 443
జీవ రసాయనాలు–చీడ పీడల నివారణలో వాటి ప్రాముఖ్యత 450
ఆహార ఉత్పత్తుల్లో సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాలు భాద్యతాయుతంగా సస్యరక్షణ మందుల వాడకం 454

తేనెటీగల పెంపకంలో మెళకువలు 460

చెదలు నివారణ పద్ధతులు 473

రైతులకు మేలు చేసే వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సలహాలు మరియు పంటల్లో చీడపీడలపై వాతావరణ ప్రభావం 475

వివిధ పంటలలో వాడదగిన కలుపు మందులు 486

క్రిమి సంహారక, శిలీంధ్రనాశక మందులు మరియు జీవ నియంత్రణ కారకాల కలయిక వివరాలు 498

క్రిమి సంహారక మందుల కలయిక వివరాలు 500

క్రిమిసంహారక, శిలీంధ్రనాశక మందుల కలయిక వివరాలు 502

క్రిమి సంహారక మందుల, రసాయనిక ఎరువుల కలయిక వివరాలు 505

వివిధ రసాయనిక ఎరువుల కలయిక వివరాలు 508

భారతదేశంలో నిషేధించబడిన క్రిమిసంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందుల వివరాలు 511

వివిధ రసాయనిక ఎరువుల్లో లభించే పోషక విలువలు 513

కొలమానాలు 521

వివిధ పంటలలో ఎలుకల సమగ్ర యాజమాన్యం 523

పంటలలో సకశేరుకాల (కోతులు, అడవి పందులు & పక్షులు) సమస్య – యాజమాన్యం 528

పుట్టగొడుగుల పెంపకము 539

సుస్థిర వ్యవసాయం – మెళకువలు – ప్రాముఖ్యత 551

సేంద్రీయ వ్యవసాయం 556

చెఱకు విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ 568

పాల ఉత్పత్తుల తయారీ మరియు నిల్వ పద్ధతులు 578

రైతుల పరిజ్ఞాన సాధికారత దిశగా ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క విస్తరణ సేవలు 580

సాంకేతికతల ద్వారా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విస్తరణ సేవలు 585

సామాజిక విజ్ఞానం

ఆహారం–ఆరోగ్యం 592

ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీని గుర్తించుట 603

వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుండి ఇంధనం తయారీ 610

చిరుధాన్యాలు–విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు 612

పండ్లు – నిల్వ చేయు పద్ధతులు 620

పిల్లలలో పరిపూర్ణ అభివృద్ధి కొరకు పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ 630

పోషకాహార పెరటి తోటల పెంపకం 634

కుటీర పరిశ్రమలు–మహిళా సాధికారతకు సోపానం' 641

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – చైత్ర మాసము

(మార్చి 30, 2025 మొదలు, ఏప్రిల్ 27, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
30	ఆది	శు.పాడ్యమి ప. 2-44	రేవతి సా. 6-43	ఉ.వ. 7-30 ల 9-00	ఉగాది
31	సోమ	విదియ ప. 12-20	అశ్విని సా. 5-04	ప.వ. 10-21 ల 11-51, రా.వ. 2-00 ల 3-29	రంజాన్
1	మంగళ	శు.తదియ ఉ. 9-54	భరణి ప. 3-24	రా.వ. 2-37 ల 4-07	
2	బుధ	చవితి ఉ. 7-33, పంచమి తె. 5-25	కృత్తిక ప. 1-50	తె.వ. 4-55 ల	
3	గురు	షష్ఠి తె. 3-28	రోహిణి ప. 12-26	ఉ.శే.వ. 6-25 వ, సా.వ. 5-46 ల 7-17	
4	శుక్ర	సప్తమి రా. 1-49	మృగశిర ఉ. 11-17	రా.వ. 7-24 ల 8-57	
5	శని	అష్టమి రా. 12-31	ఆర్ద్ర ఉ. 10-27	రా.వ. 10-14 ల 11-48	బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి
6	ఆది	నవమి రా. 11-38	పునర్వసు ఉ. 10-00	సా.వ. 6-00 ల 7-36	శ్రీరామ నవమి
7	సోమ	దశమి రా. 11-14	పుష్యమి ఉ. 10-00	రా.వ. 11-04 ల 12-42	
8	మంగళ	ఏకాదశి రా. 11-20	ఆశ్లేష ఉ. 10-30	రా.వ. 11-00 ల 12-40	
9	బుధ	ద్వాదశి రా. 11-56	మఘ ఉ. 11-29	రా.వ. 7-59 ల 9-41	
10	గురు	త్రయోదశి రా. 1-01	పుబ్బ ప. 12-58	రా.వ. 8-44 ల 10-28	
11	శుక్ర	చతుర్దశి రా. 2-32	ఉత్తర ప. 2-53	రా.వ. 12-05 ల 1-50	
12	శని	○ పూర్ణిమ తె. 4-22	హస్త సా. 5-10	రా.వ. 2-00 ల 3-46	
13	ఆది	బ.పాడ్యమి పూర్తి	చిత్త రా. 7-41	రా.వ. 1-54 ల 3-40	
14	సోమ	పాడ్యమి ఉ. 6-25	స్వాతి రా. 10-18	తె.వ. 4-29 ల	డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి
15	మంగళ	విదియ ఉ. 8-30	విశాఖ రా. 12-49	ఉ.శే.వ. 6-15 వ, తె.వ. 5-11 ల	
16	బుధ	తదియ ఉ. 10-24	అనూరాధ తె. 3-06	ఉ.శే.వ. 6-57 వ	
17	గురు	చవితి ప. 12-00	జ్యేష్ఠ తె. 5-02	ఉ.వ. 9-08 ల 10-52	
18	శుక్ర	పంచమి ప. 1-11	మూల పూర్తి	ప.వ. 1-13 ల 2-51, తె.వ. 4-50 ల	గుడ్ ఫ్రై డే
19	శని	షష్ఠి ప. 1-55	మూల ఉ. 6-37	ఉ.శే.వ. 6-37, సా.వ. 4-37 ల 6-17	
20	ఆది	సప్తమి ప. 2-06	పూర్వాషాఢ ఉ. 7-36	ప.వ. 3-46 ల 5-24	
21	సోమ	అష్టమి ప. 1-49	ఉత్తరాషాఢ ఉ. 8-05	ప.వ. 12-06 ల 1-42	
22	మంగళ	నవమి ప. 1-03	శ్రవణం ఉ. 8-08	ప.వ. 12-04 ల 1-38	
23	బుధ	దశమి ప. 11-50	ధనిష్ఠ ఉ. 7-42	ప.వ. 2-40 ల 4-13	
24	గురు	ఏకాదశి ఉ. 10-14	శతభిషం ఉ. 6-53, పూర్వాభాద్ర తె. 5-42	ప.వ. 12-58 ల 2-29	
25	శుక్ర	ద్వాదశి ఉ. 8-21	ఉత్తరాభాద్ర తె. 4-19	ప.వ. 2-45 ల 4-15	
26	శని	త్రయోదశి ఉ. 6-11,	రేవతి రా. 2-46	ప.వ. 3-32 ల 5-02	
27	ఆది	● అమావాస్య రా. 1-22	అశ్విని రా. 1-07	రా.వ. 9-23 ల 10-53	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – వైశాఖ మాసము

(ఏప్రిల్ 28, 2025 మొదలు, మే 27, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
28	సోమ	శు.పాడ్యమి రా. 10-57	భరణి రా. 11-28	ఉ.వ. 10-03 ల 11-32	
29	మంగళ	విదియ రా. 8-36	కృత్తిక రా. 9-53	ఉ.వ. 10-40 ల 12-10	
30	బుధ	తదియ సా. 6-23	రోహిణి రా. 8-27	ప.వ. 12-56 ల 2-26, రా.వ. 1-47 ల 3-18	
1	గురు	శు. చవితి సా. 4-24	మృగశిర రా. 7-16	తె.వ 3-21 ల 4-54	
2	శుక్ర	పంచమి ప. 2-41	ఆర్ద్ర సా. 6-22	వర్జ్యము లేదు	
3	శని	షష్ఠి ప. 1-20	పునర్వసు సా. 5-50	ఉ.వ. 6-05 ల 7-39, రా.వ. 1-48 ల 3-23	
4	ఆది	సప్తమి ప. 12-25	పుష్యమి సా. 5-44	వర్జ్యము లేదు	
5	సోమ	అష్టమి ప. 11-59	ఆశ్లేష సా. 6-07	ఉ.వ. 6-44 ల 8-21	
6	మంగళ	నవమి ప. 12-03	మఘ సా. 6-59	ఉ.వ. 6-33 ల 8-12, తె.వ. 3-27 ల 5-08	
7	బుధ	దశమి ప. 12-38	పుబ్బ రా. 8-21	తె.వ. 4-06 ల	
8	గురు	ఏకాదశి ప. 1-42	ఉత్తర రా. 10-10	ఉ.శే.వ. 5-49 వ	
9	గురు	ద్వాదశి ప. 3-10	హస్త రా. 12-22	ఉ.వ. 7-19 ల 9-04	
10	శుక్ర	త్రయోదశి సా. 4-59	చిత్త రా. 2-51	ఉ.వ. 9-11 ల 10-57	
11	శని	చతుర్దశి రా. 7-00	స్వాతి తె. 5-27	ఉ.వ. 9-03 ల 10-49	
12	ఆది	○ పూర్ణిమ రా. 9-01	విశాఖ పూర్తి	ప.వ. 11-39 ల 1-26	
13	సోమ	బ.పాడ్యమి రా. 10-53	విశాఖ ఉ. 8-02	ప.వ. 12-25 ల 2-10	
14	మంగళ	విదియ రా. 12-27	అనూరాధ ఉ. 10-23	సా.వ. 4-27 ల 6-11	
15	బుధ	తదియ రా. 1-38	జ్యేష్ఠ ప. 12-24	రా.వ. 8-56 ల 10-39	
16	గురు	చవితి రా. 2-21	మూల ప. 2-01	ప.వ. 12-18 ల 2-01, రా.వ. 12-03 ల 1-44	
17	శుక్ర	పంచమి రా. 2-33	పూర్వాషాఢ ప. 3-07	రా.వ. 11-19 ల 12-58	
18	శని	షష్ఠి రా. 2-15	ఉత్తరాషాఢ ప. 3-44	రా.వ. 7-45 ల 9-22	
19	ఆది	సప్తమి రా. 1-28	శ్రవణం ప. 3-52	రా.వ. 7-49 ల 9-24	
20	సోమ	అష్టమి రా. 12-14	ధనిష్ఠ ప. 3-33	రా.వ. 10-33 ల 12-06	
21	మంగళ	నవమి రా. 10-38	శతభిషం ప. 2-51	రా.వ. 8-58 ల 10-30	
22	బుధ	దశమి రా. 8-43	పూర్వాభాద్ర ప. 1-48	రా.వ. 10-52 ల 12-23	
23	గురు	ఏకాదశి సా. 6-34	ఉత్తరాభాద్ర ప. 12-29	రా.వ. 11-43 ల 1-13	
24	శుక్ర	ద్వాదశి సా. 4-14	రేవతి ఉ. 10-58	తె.వ. 5-36 ల	
25	శని	త్రయోదశి ప. 1-48	అశ్విని ఉ. 9-20	ఉ.శే.వ. 7-05 వ, సా.వ. 6-15 ల 7-44	
26	ఆది	చతుర్దశి ప. 11-19	భరణి ఉ. 7-38	సా.వ. 6-49 ల 8-18	
27	సోమ	● అమావాస్య ఉ. 8-55	కృత్తిక ఉ.6-00, రోహిణి తె.4-36	రా.వ. 9-04 ల 10-34	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – జ్యేష్ఠ మాసము

(మే 28, 2025 మొదలు, జూన్ 25, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
28	బుధ	శు.పాడ్యమి ఉ. 6-40, విదియ తె. 4-43	మృగశిర తె. 3-21	ఉ.వ. 9-54 ల 11-25	
29	గురు	తదియ రా. 2-59	ఆర్ద్ర రా. 2-23	ఉ.వ. 11-25 ల 12-57	
30	శుక్ర	చవితి రా. 1-47	పునర్వసు రా. 1-47	ప.వ. 2-05 ల 3-38	
31	శని	పంచమి రా. 12-40	పుష్యమి రా. 1-35	ఉ.వ. 9-43 ల 11-18	
1	ఆది	శు.షష్ఠి	ఆశ్లేష రా. 12-12	ప.వ. 2-31 ల 4-09	
2	సోమ	సప్తమి రా. 12-13	మఘ రా. 2-37	ప.వ. 2-14 ల 3-53	
3	మంగళ	అష్టమి రా. 12-44	పుబ్బ తె. 3-52	ఉ.వ. 11-02 ల 12-43	
4	బుధ	నవమి రా. 1-44	ఉత్తర తె. 5-34	ప.వ. 11-34 ల 1-17	
5	గురు	దశమి తె. 3-09	హస్త పూర్తి	ప.వ. 2-42 ల 4-26	
6	శుక్ర	ఏకాదశి తె. 4-55	హస్త ఉ. 7-39	సా.వ. 4-28 ల 6-14	
7	శని	ద్వాదశి పూర్తి	చిత్త ఉ. 10-07	సా.వ. 4-20 ల 6-06	బక్రీద్
8	ఆది	ద్వాదశి ఉ. 6-54	స్వాతి ప. 12-44	సా.వ. 6-56 ల 8-42	
9	సోమ	త్రయోదశి ఉ. 8-55	విశాఖ ప. 3-19	రా.వ. 7-43 ల 9-29	
10	మంగళ	చతుర్దశి ఉ. 10-47	అనూరాధ సా. 5-44	రా.వ. 11-49 ల 1-34	
11	బుధ	○ పూర్ణిమ ప. 12-22	జ్యేష్ఠ రా. 7-50	తె.వ. 4-24 ల	
12	గురు	బ.పాడ్యమి ప. 1-32	మూల రా. 9-32	ఉ.శే.వ. 6-07 వ, రా.వ. 7-50 ల 9-32	
13	శుక్ర	విదియ ప. 2-17	పూర్వాషాఢ రా. 10-47	ఉ.వ. 7-38 ల 9-19	
14	శని	తదియ ప. 2-30	ఉత్తరాషాఢ రా. 11-31	ఉ.వ. 7-20 ల 8-41, తె.వ.3-34 ల 5-10	
15	ఆది	చవితి ప. 2-12	శ్రవణం రా. 11-46	తె.వ. 3-43 ల 5-19	
16	సోమ	పంచమి ప. 1-26	ధనిష్ఠ రా. 11-33	వర్జ్యము లేదు	
17	మంగళ	షష్ఠి ప. 12-14	శతభిషం రా. 10-56	ఉ.వ. 6-35 ల 8-08, తె.వ.5-04 ల	
18	బుధ	సప్తమి ఉ. 10-39	పూర్వాభాద్ర రా. 9-58	ఉ.శే.వ. 6-36 వ	
19	గురు	అష్టమి ఉ. 8-44	ఉత్తరాభాద్ర రా. 8-42	ఉ.వ. 7-03 ల 8-34	
20	శుక్ర	నవమి ఉ. 6-34, దశమి తె. 4-10	రేవతి రా. 7-13	ఉ.వ. 7-13	
21	శని	ఏకాదశి రా. 1-39	అశ్విని సా. 5-36	ప.వ. 1-52 ల 3-21, రా.వ.2-30 ల 3-59	
22	ఆది	ద్వాదశి రా. 11-11	భరణి ప. 3-51	తె.వ. 3-05 ల 4-35	
23	సోమ	త్రయోదశి రా. 8-52	కృత్తిక ప. 2-20	తె.వ. 5-19 ల	
24	మంగళ	చతుర్దశి సా. 6-36	రోహిణి ప. 12-49	ఉ.శే.వ. 6-49 వ, సా.వ. 6-07 ల 7-37	
25	బుధ	● అమావాస్య సా. 4-34	మృగశిర ఉ. 11-31	రా.వ. 7-32 ల 9-04	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – ఆషాఢ మాసము

(జూన్ 26, 2025 మొదలు, జులై 24, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
26	గురు	శు.పాడ్యమి ప. 2-47	ఆర్ద్ర ఉ. 10-27	రా.వ. 10-06 ల 11-39	
27	శుక్ర	విదియ ప. 1-22	పునర్వసు ఉ. 9-44	సా.వ. 5-38 ల 7-13	
28	శని	తదియ ప. 12-22	పుష్యమి ఉ. 9-26	రా.వ. 10-19 ల 11-56	
29	ఆది	చవితి ప. 11-50	ఆశ్లేష ఉ. 9-36	రా.వ. 9-56 ల 11-34	
30	సోమ	పంచమి ప. 11-48	మఘ ఉ. 10-16	సా.వ. 6-38 ల 8-19	
1	మంగళ	శు.షష్ఠి ప. 12-17	పుబ్బ ఉ. 11-25	రా.వ. 7-06 ల 8-49	
2	బుధ	సప్తమి ప. 1-16	ఉత్తర ప. 1-04	రా.వ. 10-11 ల 11-55	
3	గురు	అష్టమి ప. 2-40	హస్త ప. 3-08	రా.వ. 11-55 ల 1-41	
4	శుక్ర	నవమి సా. 4-25	చిత్త సా. 5-30	రా.వ. 11-42 ల 1-28	
5	శని	దశమి సా. 6-20	స్వాతి రా. 8-05	రా.వ. 2-17 ల 4-03	
6	ఆది	ఏకాదశి రా. 8-15	విశాఖ రా. 10-40	తె.వ. 3-05 ల 4-51	మొహర్రం
7	సోమ	ద్వాదశి రా. 10-14	అనూరాధ రా. 1-09	వర్జ్యము లేదు	
8	మంగళ	త్రయోదశి రా. 11-50	జ్యేష్ఠ తె. 3-21	ఉ.వ. 7-16 ల 9-01	
9	బుధ	చతుర్దశి రా. 1-02	మూల తె. 5-09	ప.వ. 11-57 ల 1-40, తె.వ. 3-26 ల 5-09	
10	గురు	○ పూర్ణిమ రా. 1-47	పూర్వాషాఢ పూర్తి	ప.వ. 3-20 ల 5-02	
11	శుక్ర	బ.పాడ్యమి రా. 2-02	పూర్వాషాఢ ఉ. 6-37	ప.వ. 2-53 ల 4-33	
12	శని	విదియ రా. 1-47	ఉత్తరాషాఢ ఉ. 7-28	ప.వ. 11-31 ల 1-08	
13	ఆది	తదియ రా. 1-02	శ్రవణం ఉ. 7-02	ప.వ. 11-47 ల 1-22	
14	సోమ	చవితి రా. 11-51	ధనిష్ఠ ఉ. 7-40	సా.వ. 2-42 ల 4-16	
15	మంగళ	పంచమి రా. 10-17	శతభిషం ఉ. 7-08	ప.వ. 1-17 ల 2-49	
16	బుధ	షష్ఠి రా. 8-24	పూర్వాభాద్ర ఉ. 6-13, ఉత్తరాభాద్ర తె. 4-57	ప.వ. 3-18 ల 4-49	
17	గురు	సప్తమి సా. 6-15	రేవతి తె. 3-30	సా.వ. 4-13 ల 5-43	
18	శుక్ర	అష్టమి ప. 3-56	అశ్విని రా. 1-56	రా.వ. 10-11 ల 11-41	
19	శని	నవమి ప. 1-29	భరణి రా. 12-14	ఉ.వ. 10-51 ల 12-20	
20	ఆది	దశమి రా. 10-55	కృత్తిక రా. 10-36	ఉ.వ. 11-25 ల 12-55	
21	సోమ	ఏకాదశి ఉ. 8-34	రోహిణి రా. 9-05	ప.వ. 1-35 ల 3-05, రా.వ. 2-22 ల 3-53	
22	మంగళ	ద్వాదశి ఉ. 6-15,	మృగశిర రా. 7-44	తె.వ. 3-45 ల 5-16	
23	బుధ	చతుర్దశి రా. 2-30	ఆర్ద్ర సా. 6-38	వర్జ్యము లేదు	
24	గురు	● అమావాస్య రా. 1-03	పునర్వసు సా. 5-50	ఉ.వ. 6-14 ల 7-46, రా.వ. 1-42 ల 3-16	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – శ్రావణమాసము

(జులై 25, 2025 మొదలు, ఆగస్టు 23, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
25	శుక్ర	శు.పాడ్యమి రా. 12-02	పుష్యమి సా. 5-27	వర్జ్యము లేదు	
26	శని	విదియ రా. 11-29	ఆశ్లేష సా. 5-30	ఉ.వ. 6-16 ల 7-52, తె.వ. 5-46 ల	
27	ఆది	తదియ రా. 11-25	మఘ సా. 6-02	ఉ.శే.వ. 7-24 వ, రా.వ 2-22 ల 4-03	
28	సోమ	చవితి రా. 11-52	పుబ్బ రా. 7-04	రా.వ. 2-43 ల 4-25	
29	మంగళ	పంచమి రా. 12-48	ఉత్తర రా. 8-35	ఉ.వ. 5-41 ల	
30	బుధ	షష్ఠి రా. 2-10	హస్త రా. 10-32	ఉ.శే.వ. 7-24 వ	
31	గురు	సప్తమి తె. 3-53	చిత్త రా. 12-51	ఉ.వ. 7-19 ల 9-04	
1	శుక్ర	శు.అష్టమి తె. 5-49	స్వాతి తె. 3-23	ఉ.వ. 7-02 8-48	
2	శని	నవమి పూర్తి	విశాఖ తె. 5-59	ఉ.వ. 9-35 ల 11-22	
3	ఆది	నవమి ఉ. 7-52	అనూరాధ పూర్తి	ఉ.వ. 10-25 ల 12-11	
4	సోమ	దశమి ఉ. 9-46	అనూరాధ ఉ. 8-32	ప.వ. 2-39 ల 4-24	
5	మంగళ	ఏకాదశి ప. 11-24	జ్యేష్ఠ ఉ. 10-47	రా.వ. 7-24 ల 9-08	
6	బుధ	ద్వాదశి ప. 12-39	మూల ప. 12-40	ప.వ. 10-57 ల 12-40, రా.వ. 10-51 ల 12-32	
7	గురు	త్రయోదశి ప. 1-27	పూర్వాషాఢ ప. 2-08	రా.వ. 10-27 ల 12-06	
8	శుక్ర	చతుర్దశి ప. 1-44	ఉత్తరాషాఢ ప. 3-05	రా.వ. 7-09 ల 8-47	వరలక్ష్మీ వ్రతం
9	శని	○ పూర్ణిమ ప. 1-31	శ్రవణం ప. 3-32	రా.వ. 7-32 ల 9-08	
10	ఆది	బ.పాడ్యమి ప. 12-49	ధనిష్ఠ ప. 3-31	రా.వ. 10-35 ల 12-09	
11	సోమ	విదియ ప. 11-42	శతభిషం ప. 3-05	రా.వ. 9-16 ల 10-48	
12	మంగళ	తదియ ఉ. 10-10	పూర్వాభాద్ర ప. 2-15	రా.వ. 11-23 ల 12-54	
13	బుధ	చవితి ఉ. 8-16	ఉత్తరాభాద్ర ప. 1-05	రా.వ. 12-23 ల 1-54	
14	గురు	పంచమి ఉ. 6-10, షష్ఠి తె. 3-48	రేవతి ఉ. 11-42	వర్జ్యము లేదు	
15	శుక్ర	సప్తమి రా. 1-22	అశ్విని ఉ. 10-08	ఉ.వ. 6-23 ల 7-53, రా.వ. 7-03 ల 8-32	స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
16	శని	అష్టమి రా. 10-55	భరణి ఉ. 8-28	రా.వ. 7-37 ల 9-06	శ్రీ కృష్ణాష్టమి
17	ఆది	నవమి రా. 8-31	కృత్తిక ఉ. 6-46, రోహిణి తె. 5-15	రా.వ. 9-45 ల 11-15	
18	సోమ	దశమి సా. 6-14	మృగశిర తె. 3-50	ఉ.వ. 10-31 ల 12-01	
19	మంగళ	ఏకాదశి సా. 4-10	ఆర్ద్ర రా. 2-40	ప.వ. 11-49 ల 1-20	
20	బుధ	ద్వాదశి ప. 2-22	పునర్వసు రా. 1-48	ప.వ. 2-14 ల 3-46	
21	గురు	త్రయోదశి ప. 12-54	పుష్యమి రా. 1-19	ఉ.వ. 9-38 ల 11-12	
22	శుక్ర	చతుర్దశి ప. 11-53	ఆశ్లేష రా. 1-16	ప.వ. 2-05 ల 3-41	
23	శని	● అమావాస్య ఉ. 11-17	మఘ రా. 1-40	ప.వ. 1-28 ల 3-06	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – భాద్రపద మాసము

(ఆగస్టు 24, 2025 మొదలు, సెప్టెంబరు 21, 2025 వరకు))

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
24	ఆది	శు.పాడ్యమి ఉ. 11-12	పుబ్బ రా. 2-34	ఉ.వ. 9-58 ల 11-38	
25	సోమ	విదియ ప. 11-38	ఉత్తర తె. 3-59	ప.వ. 10-12 ల 11-54	
26	మంగళ	తదియ ప. 12-36	హస్త తె. 5-46	ప.వ. 1-00 ల 2-43	
27	బుధ	చవితి ప. 2-00	చిత్త పూర్తి	ప.వ. 2-31 ల 4-16	వినాయక చవితి
28	గురు	పంచమి ప. 3-44	చిత్త ఉ. 8-01	ప.వ. 2-12 ల 3-58	
29	శుక్ర	షష్ఠి సా. 5-41	స్వాతి ఉ. 10-32	సా.వ. 4-44 ల 6-31	
30	శని	సప్తమి రా. 7-43	విశాఖ ప. 1-09	సా.వ. 5-34 ల 7-20	
31	ఆది	అష్టమి రా. 9-38	అనూరాధ ప. 3-41	రా.వ. 9-49 ల 11-34	
1	సోమ	శు.నవమి రా. 11-18	జ్యేష్ఠ సా. 6-01	రా.వ. 2-40 ల 4-24	
2	మంగళ	దశమి రా. 12-36	మూల రా. 7-59	సా.వ. 6-15 ల 7-59	
3	బుధ	ఏకాదశి రా. 1-26	పూర్వాషాఢ రా. 9-32	ఉ.వ. 6-12 ల 7-54, తె.వ.5-53ల	
4	గురు	ద్వాదశి రా. 1-47	ఉత్తరాషాఢ రా. 10-36	ఉ.శే.వ. 7-33 వ, రా.వ. 2-42 ల 4-20	
5	శుక్ర	త్రయోదశి రా. 1-37	శ్రవణం రా. 11-10	తె.వ. 3-11 ల 4-47	ఈద్ మిలదన్ నబీ
6	శని	చతుర్దశి రా. 12-57	ధనిష్ఠ రా. 11-15	వర్జ్యము లేదు	
7	ఆది	○ పూర్ణిమ రా. 11-50	శతభిషం రా. 10-53	ఉ.వ. 6-21 ల 7-55, తె.వ. 5-05 ల	
8	సోమ	బ.పాడ్యమి రా. 10-21	పూర్వాభాద్ర రా. 10-09	ఉ.శే.వ. 6-38 వ	
9	మంగళ	విదియ రా. 8-31	ఉత్తరాభాద్ర రా. 9-04	ఉ.వ. 7-19 ల 8-50	
10	బుధ	తదియ సా. 6-25	రేవతి రా. 7-43	ఉ.వ. 8-23 ల 9-54	
11	గురు	చవితి సా. 4-08	అశ్విని సా. 6-11	ప.వ. 2-26 ల 3-56, తె.వ. 3-08 ల 4-37	
12	శుక్ర	పంచమి ప. 1-45	భరణి సా. 4-33	తె.వ. 3-42 ల 5-12	
13	శని	షష్ఠి ప. 11-17	కృత్తిక ప. 2-52	తె.వ. 5-48 ల	
14	ఆది	సప్తమి ఉ. 8-53	రోహిణి ప. 1-16	ఉ.శే.వ. 7-18 వ, సా.వ. 6-31 ల 8-02	
15	సోమ	అష్టమి ఉ. 6-36, నవమి తె. 4-38	మృగశిర ఉ. 11-48	రా.వ. 7-46 ల 9-17	
16	మంగళ	దశమి రా. 2-51	ఆర్ద్ర ఉ. 10-33	రా.వ. 10-04 ల 11-36	
17	బుధ	ఏకాదశి రా. 1-25	పునర్వసు ఉ. 9-35	సా.వ. 5-23 ల 6-56	
18	గురు	ద్వాదశి రా. 12-25	పుష్యమి ఉ. 8-59	రా.వ. 9-42 ల 11-17	
19	శుక్ర	త్రయోదశి రా. 11-51	ఆశ్లేష ఉ. 8-49	రా.వ. 8-58 ల 10-35	
20	శని	చతుర్దశి రా. 11-47	మఘ ఉ. 9-07	సా.వ. 5-23 ల 7-02	
21	ఆది	● అమావాస్య రా. 12-14	పుబ్బ ఉ. 9-56	సా.వ. 5-21 ల 7-12	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం - ఆశ్వయుజమాసము

(సెప్టెంబరు 22, 2025 మొదలు, అక్టోబరు 21, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
22	సోమ	శు.పాడ్యమి రా. 1-10	ఉత్తర ఉ. 11-14	రా.వ. 8-15 ల 9-58	
23	మంగళ	విదియ రా. 2-34	హస్త ప. 1-01	రా.వ. 9-44 ల 11-28	
24	బుధ	తదియ తె. 4-19	చిత్త ప. 3-11	రా.వ. 9-20 ల 11-06	
25	గురు	చవితి పూర్తి	స్వాతి సా. 5-37	రా.వ. 11-50 ల 1-36	
26	శుక్ర	చవితి ఉ. 6-19	విశాఖ రా. 8-13	రా.వ. 12-38 ల 2-25	
27	శని	పంచమి ఉ. 8-24	అనూరాధ రా. 10-47	తె.వ. 4-56 ల	
28	ఆది	షష్ఠి ఉ. 10-22	జ్యేష్ఠ రా. 1-09	ఉ.శే.వ. 6-41 వ	
29	సోమ	సప్తమి ప. 12-05	మూల తె. 3-13	ఉ.వ. 9-50 ల 11-35, రా.వ. 1-29 ల 3-13	
30	మంగళ	అష్టమి ప. 1-25	పూర్వాషాఢ తె. 4-53	ప.వ. 1-29 ల 3-11	దుర్గాష్టమి
1	బుధ	శు.నవమి ప. 2-23	ఉత్తరాషాఢ పూర్తి	ప.వ. 1-18 ల 3-00	
2	గురు	దశమి ప. 2-41	ఉత్తరాషాఢ ఉ. 6-11	ఉ.వ. 10-17 ల 11-56	మహాత్మ గాంధీ జయంతి & విజయ దశమి
3	శుక్ర	ఏకాదశి ప. 2-33	శ్రవణం ఉ. 6-51	ప.వ. 10-53 ల 12-29	
4	శని	ద్వాదశి ప. 1-56	ధనిష్ఠ ఉ. 7-02	ప.వ. 2-10 ల 3-44	
5	ఆది	త్రయోదశి రా. 12-52	శతభిషం ఉ. 6-46, పూర్వాభాద్ర తె. 6-02	ప.వ. 12-58 ల 2-31	
6	సోమ	చతుర్దశి ప. 11-24	ఉత్తరాభాద్ర తె. 4-59	ప.వ. 3-13 ల 4-44	
7	మంగళ	○ పూర్ణిమ ఉ. 9-35	రేవతి తె. 3-42	సా.వ. 4-20 ల 5-51	
8	బుధ	బ.పాడ్యమి ఉ. 7-31, విదియ తె. 5-13	అశ్విని రా. 2-12	రా.వ. 10-27 ల 11-57	
9	గురు	తదియ రా. 2-51	భరణి రా. 12-35	ఉ.వ. 11-09 ల 12-38	
10	శుక్ర	చవితి రా. 12-26	కృత్తిక రా. 10-55	ప.వ. 11-45 ల 1-14	
11	శని	పంచమి రా. 10-04	రోహిణి రా. 9-16	ప.వ. 1-49 ల 3-18, రా.వ. 2-31 ల 4-01	
12	ఆది	షష్ఠి రా. 7-50	మృగశిర రా. 7-46	తె.వ. 3-43 ల 5-14	
13	సోమ	సప్తమి సా. 5-49	ఆర్ద్ర సా. 6-29	ఉ.వ. 5-59 ల	
14	మంగళ	అష్టమి సా. 4-05	పునర్వసు సా. 5-28	ఉ.శే.వ. 7-30 వ, రా.వ. 1-15 ల 2-48	
15	బుధ	నవమి ప. 2-40	పుష్యమి సా. 4-47	తె.వ. 5-26 ల	
16	గురు	దశమి ప. 1-40	ఆశ్లేష సా. 4-31	ఉ.శే.వ. 7-01 వ, తె.వ. 4-37 ల	
17	శుక్ర	ఏకాదశి ప. 1-08	మఘ సా. 4-42	ఉ.శే.వ. 6-13 వ, రా.వ. 12-56 ల 2-34	
18	శని	ద్వాదశి ప. 1-06	పుబ్బ సా. 5-23	రా.వ. 12-56 ల 2-37	
19	ఆది	త్రయోదశి ప. 1-37	ఉత్తర సా. 6-35	తె.వ. 3-34 ల 5-16	
20	సోమ	చతుర్దశి ప. 1-37	హస్త రా. 8-15	తె.వ. 4-56 ల	దీపావళి
21	మంగళ	● అమావాస్య సా. 4-03	చిత్త రా. 10-18	ఉ.శే.వ. 6-40 వ, తె.వ.4-27 ల	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – కార్తీక మాసము

(అక్టోబరు 22, 2025 మొదలు, నవంబరు 20, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
22	బుధ	శు.పాడ్యమి సా. 5-52	స్వాతి రా. 12-41	ఉ.శే.వ. 6-13 వ	
23	గురు	విదియ రా. 7-55	విశాఖ తె. 3-16	ఉ.వ. 6-53 ల 8-39	
24	శుక్ర	తదియ రా. 10-01	అనూరాధ తె. 5-51	ఉ.వ. 7-42 ల 9-28	
25	శని	చవితి రా. 12-01	జ్యేష్ఠ పూర్తి	ప.వ. 12-02 ల 1-48	
26	ఆది	పంచమి రా. 1-46	జ్యేష్ఠ ఉ. 8-20	సా.వ. 5-03 ల 6-47	
27	సోమ	షష్ఠి తె. 3-07	మూల ఉ. 10-29	ఉ.వ. 8-44 ల 10-29, రా.వ. 8-46 ల 10-29	
28	మంగళ	సప్తమి తె. 4-02	పూర్వాషాఢ ప. 12-13	రా.వ. 8-39 ల 10-20	
29	బుధ	అష్టమి తె. 4-26	ఉత్తరాషాఢ ప. 1-31	సా.వ. 5-39 ల 7-18	
30	గురు	నవమి తె. 4-20	శ్రవణం ప. 2-19	సా.వ. 6-22 ల 7-59	
31	శుక్ర	దశమి తె. 3-42	ధనిష్ఠ ప. 2-37	రా.వ. 9-46 ల 11-21	
1	శని	శు.ఏకాదశి రా. 2-41	శతభిషం ప. 2-26	రా.వ. 8-41 ల 10-15	
2	ఆది	ద్వాదశి రా. 1-15	పూర్వాభాద్ర ప. 1-54	రా.వ. 11-08 ల 12-40	
3	సోమ	త్రయోదశి రా. 11-39	ఉత్తరాభాద్ర ప. 12-59	రా.వ. 12-30 ల 2-02	
4	మంగళ	చతుర్దశి రా. 9-38	రేవతి ప. 12-03	వర్జ్యము లేదు	
5	బుధ	○ పూర్ణిమ రా. 7-12	అశ్విని ఉ. 10-16	ఉ.వ. 6-34 ల 8-03, రా.వ. 7-13 ల 8-43	
6	గురు	బ.పాడ్యమి సా. 4-51	భరణి ఉ. 8-40	రా.వ. 7-49 ల 9-18	
7	శుక్ర	విదియ ప. 2-28	కృత్తిక ఉ. 6-59, రోహిణి తె. 5-21	రా.వ. 9-53 ల 11-22	
8	శని	తదియ ప. 12-08	మృగశిర తె. 3-49	ఉ.వ. 10-36 ల 12-05	
9	ఆది	చవితి ఉ. 9-54	ఆర్ద్ర రా. 2-29	ప.వ. 11-46 ల 1-16	
10	సోమ	పంచమి ఉ. 7-55, షష్ఠి తె. 6-10	పునర్వసు రా. 1-24	ప.వ. 1-56 ల 3-28	
11	మంగళ	సప్తమి తె. 4-55	పుష్యమి రా. 12-39	ఉ.వ. 9-09 ల 10-42	
12	బుధ	అష్టమి తె. 3-58	ఆశ్లేష రా. 12-16	ప.వ. 1-14 ల 2-49	
13	గురు	నవమి తె. 3-31	మఘ రా. 12-22	ప.వ. 12-20 ల 1-56	
14	శుక్ర	దశమి తె. 3-34	పుబ్బ రా. 12-57	ఉ.వ. 8-34 ల 10-13	
15	శని	ఏకాదశి తె. 4-06	ఉత్తర రా. 2-01	ఉ.వ. 8-28 ల 10-09	
16	ఆది	ద్వాదశి తె. 5-09	హస్త తె. 3-34	ఉ.వ. 10-58 ల 12-40	
17	సోమ	త్రయోదశి పూర్తి	చిత్త తె. 5-32	ప.వ. 12-13 ల 1-57	
18	మంగళ	త్రయోదశి ఉ. 6-35	స్వాతి పూర్తి	ఉ.వ. 11-41 ల 1-26	
19	బుధ	చతుర్దశి ఉ. 8-29	స్వాతి ఉ. 7-50	ప.వ. 2-03 ల 3-49	
20	గురు	● అమావాస్య ఉ. 10-35	విశాఖ ఉ. 10-24	ప.వ. 2-50 ల 4-36	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – మార్గశిర మాసము

(నవంబరు 21, 2025 మొదలు, డిసెంబరు 19, 2025 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
21	శుక్ర	శు.పాడ్యమి ప. 12-45	అనూరాధ ప. 1-02	రా.వ. 7-32 ల 8-58	
22	శని	విదియ ప. 2-47	జ్యేష్ఠ ప. 3-31	రా.వ. 12-15 ల 2-00	
23	ఆది	తదియ సా. 4-32	మూల సా. 5-44	ప.వ. 3-59 ల 5-44, తె.వ. 4-04 ల 5-48	
24	సోమ	చవితి సా. 5-55	పూర్వాషాఢ రా. 7-36	తె.వ. 4-04 ల 5-45	
25	మంగళ	పంచమి సా. 6-49	ఉత్తరాషాఢ రా. 9-00	రా.వ. 1-09 ల 2-49	
26	బుధ	షష్ఠి రా. 7-14	శ్రవణం రా. 9-56	రా.వ. 2-00 ల 3-37	
27	గురు	సప్తమి రా. 7-08	ధనిష్ఠ రా. 10-22	తె.వ. 5-32 ల	
28	శుక్ర	అష్టమి సా. 6-33	శతభిషం రా. 10-19	ఉ.శే.వ. 7-08 వ, తె.వ. 4-35 ల 6-10	
29	శని	నవమి సా. 5-31	పూర్వాభాద్ర రా. 9-51	వర్జ్యము లేదు	
30	ఆది	దశమి సా. 4-04	ఉత్తరాభాద్ర రా. 8-59	ఉ.వ. 7-06 ల 8-38	
1	సోమ	శు.ఏకాదశి ప. 2-18	రేవతి రా. 7-49	ఉ.వ. 8-24 ల 9-55	
2	మంగళ	ద్వాదశి ప. 12-15	అశ్విని సా. 6-25	ప.వ. 2-38 ల 4-09, తె.వ. 3-23 ల 4-52	
3	బుధ	త్రయోదశి ఉ. 10-02	భరణి సా. 4-51	తె.వ. 4-01 ల 5-31	
4	గురు	చతుర్దశి ఉ. 7-42, ○ పూర్ణిమ తె. 5-21	కృత్తిక ప. 3-12	తె.వ. 6-06 ల	
5	శుక్ర	బ.పాడ్యమి తె. 3-04	రోహిణి ప. 1-34	ఉ.శే.వ. 7-35 వ, రా.వ. 6-47 ల 8-17	
6	శని	విదియ రా. 12-54	మృగశిర ప. 11-59	రా.వ. 7-52 ల 9-23	
7	ఆది	తదియ రా. 10-58	ఆర్ద్ర ఉ. 10-34	రా.వ. 10-00 ల 11-31	
8	సోమ	చవితి రా. 9-20	పునర్వసు ఉ. 9-25	సా.వ. 5-08 ల 6-40	
9	మంగళ	పంచమి రా. 8-01	పుష్యమి ఉ. 8-34	రా.వ. 9-06 ల 10-40	
10	బుధ	షష్ఠి రా. 7-08	ఆశ్లేష ఉ. 8-06	రా.వ. 8-05 ల 9-41	
11	గురు	సప్తమి సా. 6-44	మఘ ఉ. 8-05	సా.వ. 4-14 ల 5-51	
12	శుక్ర	అష్టమి సా. 6-50	పుబ్బ ఉ. 8-33	సా.వ. 4-02 ల 5-42	
13	శని	నవమి రా. 7-27	ఉత్తర ఉ. 9-32	సా.వ. 6-26 ల 8-08	
14	ఆది	దశమి రా. 8-34	హస్త ఉ. 10-59	రా.వ. 7-37 ల 9-21	
15	సోమ	ఏకాదశి రా. 10-08	చిత్త ప. 12-54	రా.వ. 7-02 ల 8-47	
16	మంగళ	ద్వాదశి రా. 12-01	స్వాతి ప. 3-11	రా.వ. 9-22 ల 11-08	
17	బుధ	త్రయోదశి రా. 2-09	విశాఖ సా. 5-42	రా.వ. 10-08 ల 11-54	
18	గురు	చతుర్దశి తె. 4-26	అనూరాధ రా. 8-19	రా.వ. 2-30 ల 4-16	
19	శుక్ర	●అమావాస్య తె. 6-23	జ్యేష్ఠ రా. 10-51	వర్జ్యము లేదు	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – పుష్య మాసము

(డిసెంబరు 20, 2025 మొదలు, జనవరి 18, 2026 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
20	శని	● అమావాస్య ఉ. 7.13	మూల రా. 1.21	మ. 12.21 – 2.07	
21	ఆది	శు.పాడ్యమి ఉ. 9.10	పూర్వాషాఢ రా. 3.38	మ. 12.14–1.57	
22	సోమ	విదియ ఉ. 11.50	ఉత్తరాషాఢ తె. 5.21	ఉ. 9.47 – 11.30	
23	మంగళ	తదియ మ. 12.11	శ్రవణ పూర్తి	ఉ. 9.48 – 11.30	
24	బుధ	చవితి మ. 1.08	శ్రవణ ఉ. 7.07	ఉ. 11.19 – 12.59	
25	గురు	పంచమి మ. 1.39	ధనిష్ఠ ఉ. 8.17	మ. 3.41 – 5.20	క్రిస్టమస్
26	శుక్ర	షష్ఠి మ. 1.40	శతభిష ఉ. 8.58	మ. 2.43 – 4.09	
27	శని	సప్తమి మ. 1.10	పూర్వాభాద్ర ఉ. 9.09	సా. 4.58 – 6.43	
28	ఆది	అష్టమి ఉ. 11.56	ఉత్తరాభాద్ర ఉ. 8.41 రేవతి ఉ. 7.41	రా. 8.11 – 9.42	
29	సోమ	నవమి ఉ. 10.10	అశ్వని తె. 6.04	రా. 2.20 – రా. 3.50	
30	మంగళ	దశమి ఉ. 7.50 ఏకాదశి తె. 5.01	భరణి రా. 3.56	మ. 2.42 – 4.08	
31	బుధ	ద్వాదశి రా. 1.46	కృత్తిక రా. 1.28	మ. 3.41 – సా. 5.06	
1	గురు	త్రయోదశి రా. 10.22	రోహిణి రా. 10.47	రా. 3.45 – తె. 5.11	
2	శుక్ర	చతుర్దశి సా. 6.55	మృగశిర రా. 8.05	రా. 3.35 – తె. 5.00	
3	శని	○ పౌర్ణమి మ. 3.35	ఆరుద్ర సా. 5.30	తె. 4.22 – తె. 5.50	
4	ఆది	కృ.పాడ్యమి మ. 12.34	పునర్వసు మ. 3.15	మ. 10.12–12.07	
5	సోమ	విదియ ఉ. 9.59	పుష్యమి మ. 1.29	రా. 1.41 – 3.13	
6	మంగళ	తదియ ఉ. 8.03	ఆశ్లేష మ. 12.22	రా. 12.11 – 1.46	
7	బుధ	చవితి ఉ. 6.53 పంచమి తె. 6.22	మఖ మ. 12.00	రా. 8.09 – 9.47	
8	గురు	షష్ఠి పూర్తి	పూర్వఫల్గుణి మ. 12.28	రా. 8.03 – 9.44	
9	శుక్ర	షష్ఠి ఉ. 7.06	ఉత్తరఫల్గుణి మ. 1.44	రా. 10.49 – 12.33	
10	శని	సప్తమి ఉ. 8.25	హస్త మ. 3.42	రా. 12.33 – 2.19	
11	ఆది	అష్టమి ఉ. 10.21	చిత్త సా. 6.14	రా. 12.30 – 2.17	
12	సోమ	నవమి మ. 12.43	స్వాతి రా. 9.06	రా. 3.24 – 5.12	
13	మంగళ	దశమి మ. 3.18	విశాఖ రా. 12.06	తె. 4.35 – 6.23	భోగి
14	బుధ	ఏకాదశి సా. 5.52	అనూరాధ రా. 3.03	ఉ. 9.17 – 11.04	మకర సంక్రాంతి
15	గురు	ద్వాదశి రా. 8.15	జ్యేష్ఠ తె. 5.47	రా. 7.16 – 9.01	కనుమ
16	శుక్ర	త్రయోదశి రా. 10.19	మూల పూర్తి	ఉ. 6.26 – 8.12	
17	శని	చతుర్దశి రా. 12.02	మూల	సా. 6.36 – 8.20	
18	ఆది	● అమావాస్య రా. 1.20	పూర్వాషాఢ ఉ. 10.12	సా. 6.45 – 8.27	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – మాఘ మాసము

(జనవరి 19, 2026 మొదలు, ఫిబ్రవరి 17, 2026 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
19	సోమ	శు.పాద్యమి రా. 2.12	ఉత్తరాషాఢ ఉ. 11.50	సా. 4.02 – 5.43	
20	మంగళ	విదియ రా. 2.41	శ్రవణ మ. 1.04	సా. 5.13 – 6.52	
21	బుధ	తదియ రా. 2.46	ధనిష్ఠ మ. 1.55	రా. 9.16 – 10.54	
22	గురు	చవితి రా. 2.27	శతభిష మ. 2.24	సా. 6.39 – 7.43	
23	శుక్ర	పంచమి తె. 5.59	పూర్వాభాద్ర మ. 2.33	రా. 7.06 – 9.14	
24	శని	షష్ఠి రా. 12.37	ఉత్తరాభాద్ర మ. 2.13	రా. 1.53 – 3.26	
25	ఆది	సప్తమి రా. 11.07	రేవతి మ. 1.33	ఉ. 8.41 – 10.12	
26	సోమ	అష్టమి రా. 9.15	అశ్వని మ. 12.30	రా. 9.33 – 11.03	రిపబ్లిక్ డే
27	మంగళ	నవమి రా. 7.03	భరణి ఉ. 11.07	రా. 10.16 – 11.46	
28	బుధ	దశమి సా. 4.34	కృత్తిక ఉ. 9.26	రా. 12.09 – 1.38	
29	గురు	ఏకాదశి మ. 1.55	రోహిణి ఉ. 7.30 మృగశిర తె. 5.17	రా. 10.54 – 1.50	
30	శుక్ర	ద్వాదశి ఉ. 11.10	ఆరుద్ర రా. 3.27	మ. 2.31 – 4.00	
31	శని	త్రయోదశి ఉ. 8.26 చతుర్దశి తె. 5.41	పునర్వసు రా. 1.35	ఉ. 9.03 – 10.33	
1	ఆది	○ పౌర్ణమి రా. 3.40	పుష్యమి రా. 12.00	మ. 12.11 – 1.43	
2	సోమ	కృ.పాద్యమి రా. 1.55	ఆశ్లేష రా. 10.51	ఉ. 10.33 – 12.06	
3	మంగళ	విదియ రా. 12.45	మఖ రా. 10.15	ఉ. 6.15 – 7.52	
4	బుధ	తదియ రా. 12.14	పూర్వఫల్గుణి రా. 10.17	తె. 5.42 – 7.21	
5	గురు	చవితి రా. 12.26	ఉత్తరఫల్గుణి రా. 11.01	ఉ. 7.55 – 9.37	
6	శుక్ర	పంచమి రా. 1.22	హస్త రా. 12.27	ఉ. 9.08 – 10.52	
7	శని	షష్ఠి రా. 2.56	చిత్త రా. 2.30	ఉ. 8.41 – 10.28	
8	ఆది	సప్తమి తె. 5.02	స్వాతి తె. 5.03	ఉ. 11.19 – 1.06	
9	సోమ	అష్టమి పూర్తి	విశాఖ పూర్తి	ఉ. 11.19 – 1.06	
10	మంగళ	అష్టమి ఉ. 7.27	విశాఖ	మ. 12.24 – 2.12	
11	బుధ	నవమి ఉ. 9.58	అనూరాధ ఉ. 10.52	సా. 5.07 – 6.54	
12	గురు	దశమి మ. 12.20	జ్యేష్ఠ మ. 1.40	రా. 3.11 – 4.57	
13	శుక్ర	ఏకాదశి మ. 2.23	మూల సా. 4.09	రా. 2.35 – 4.19	
14	శని	ద్వాదశి మ. 3.58	పూర్వాషాఢ సా. 6.12	రా. 2.43 – 4.25	
15	ఆది	త్రయోదశి సా. 5.01	ఉత్తరాషాఢ రా. 7.44	రా. 11.54 – 1.34	మహాశివరాత్రి
16	సోమ	చతుర్దశి సా. 5.30	శ్రవణ రా. 8.44	రా. 12.48 – 2.26	
17	మంగళ	● అమావాస్య సా. 5.27	ధనిష్ఠ రా. 9.12	తె. 4.24 – 6.00	

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం – ఫాల్గుణ మాసము

(ఫిబ్రవరి 18, 2026 మొదలు, మార్చి 19, 2026 వరకు)

తేది	వారము	తిది	నక్షత్రం	వర్జ్యం	పండుగలు/కార్తెలు
18	బుధ	శు.పాడ్యమి సా. 4.54	శతభిష రా. 9.13	రా. 11.33 – 12.08	
19	గురు	విదియ మ. 3.58	పూర్వాభాద్ర రా. 8.52	రా. 9.13 – 11.46	
20	శుక్ర	తదియ మ. 2.36	ఉత్తరాభాద్ర రా. 8.05	ఉ. 7.35 – 9.07	
21	శని	చవితి ప. 12.59	రేవతి రా. 7.05	మ. 2.05 – 3.36	
22	ఆది	పంచమి ఉ. 11.09	అశ్వని సా. 5.53	రా. 2.57 – 4.27	
23	సోమ	షష్ఠి ఉ. 9.09	భరణి సా. 4.32	రా. 3.49 – 5.20	
24	మంగళ	సప్తమి ఉ. 7.02 అష్టమి తె. 4.52	కృత్తిక మ. 3.06	ఉ. 6.08 – 7.35	
25	బుధ	నవమి రా. 2.41	రోహిణి మ. 1.38	సా. 6.54 – 8.24	
26	గురు	దశమి రా. 12.34	మృగశిర మ. 12.11	రా. 8.07 – 9.37	
27	శుక్ర	ఏకాదశి రా. 10.34	ఆరుద్ర ఉ. 10.49	రా. 10.12 – 11.43	
28	శని	ద్వాదశి రా. 8.45	పునర్వసు ఉ. 9.35	సా. 5.15 – 6.47	
1	ఆది	త్రయోదశి రా. 7.12	పుష్యమి ఉ. 8.35	రా. 9.00 – 10.33	
2	సోమ	చతుర్దశి సా. 5.59	ఆశ్లేష ఉ. 7.52	రా. 7.42 – 9.16	హోళి
3	మంగళ	○ పౌర్ణమి సా. 5.11	మఖ ఉ. 7.32	మ. 3.34 – 5.10	
4	బుధ	కృ.పాడ్యమి సా. 4.53	పూర్వఫల్గుణి ఉ. 7.39	మ. 3.03 – 4.42	
5	గురు	విదియ సా. 5.08	ఉత్తరఫల్గుణి ఉ. 8.18	సా. 5.08 – 6.49	
6	శుక్ర	తదియ సా. 5.57	హస్త ఉ. 9.31	సా. 6.06 – 7.49	
7	శని	చవితి రా. 7.20	చిత్త ఉ. 11.17	సా. 5.25 – 7.10	
8	ఆది	పంచమి రా. 9.13	స్వాతి మ. 1.33	రా. 7.46 – 9.33	
9	సోమ	షష్ఠి రా. 11.28	విశాఖ సా. 4.12	రా. 8.41 – 10.29	
10	మంగళ	సప్తమి రా. 1.54	అనూరాధ రా. 7.05	రా. 1.21 – 3.09	
11	బుధ	అష్టమి తె. 4.19	జ్యేష్ఠ రా. 9.59	ఉ. 11.36 – 1.23	
12	గురు	నవమి పూర్తి	మూల రా. 12.42	ఉ. 11.13 – 12.59	
13	శుక్ర	నవమి ఉ. 6.29	పూర్వాషాఢ రా. 3.01	ఉ. 11.37 – 1.20	
14	శని	దశమి ఉ. 8.10	ఉత్తరాషాఢ తె. 4.48	ఉ. 8.59 – 10.40	
15	ఆది	ఏకాదశి ఉ. 9.14	శ్రవణ తె. 5.55	ఉ. 10.00 – 11.38	
16	సోమ	ద్వాదశి ఉ. 9.38	ధనిష్ఠ పూర్తి	ఉ. 10.00 – 11.38	
17	మంగళ	త్రయోదశి ఉ. 9.21	ధనిష్ఠ ఉ. 6.12	సా. 6.53 – 10.01	
18	బుధ	చతుర్దశి ఉ. 8.24	పూర్వాభాద్ర తె. 5.20	–	
19	గురు	● అమావాస్య పాడ్యమి తె. 4.40	ఉత్తరాభాద్ర తె. 5.20	తె. 3.53 – ఉ. 6.54	

వివిధ కార్తెల్లో చేయవలసిన వ్యవసాయ పనులు

అశ్విని కార్తె (14.04.2025 నుండి 26.04.2025)

వరి	:	కోతలు కత్తెరకు (కృత్తిక) వరినారు పోయుట, వేసవి దుక్కులు
సజ్జ	:	వేసవి పైరు కోతలు
జొన్న	:	వేసవి జొన్న పంట సాగు, సస్యరక్షణ
మొక్కజొన్న	:	వేసవి పంటలో సస్యరక్షణ
వేరుశనగ	:	త్రవ్వకాలు
చెఱకు	:	ఎరువులు వేయుట

భరణి కార్తె(27.04.25 నుండి 10.05.25) వేసవిపనులు
కృత్తిక కార్తె (11.05.25 నుండి 24.05.25) వేసవిపనులు
రోహిణి-మృగశిర కార్తెలు (25.05.25 నుండి 21.06.25)

వరి	:	సార్వా వరి నారు పోయుట, మెట్ట వరి సాగు విత్తుట, వరి వేయబోయే పొలాల్లో పశువుల ఎరువులు వేయుట, ప్రధాన పొలం తయారీ పనులు
జొన్న	:	వేసవి జొన్న పంటకోత
మొక్కజొన్న	:	దమ్ములు చేయుట, ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట, ఖరీఫ్ పంటలను విత్తుట
కాయధాన్యాలు	:	తక్కువ పంట కాలపు పెసర, మినుము, కంది విత్తుట. అంతర కృషి చేయుట.
గోగు	:	రసాయనిక ఎరువులు వేయుట
సజ్జ	:	ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట, విత్తనం వేయుట
ఆముదం	:	ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట
ప్రత్తి	:	ఎరువులు వేసి దుక్కులు దున్నుట, విత్తనం వేయుట
వేరుశనగ	:	రసాయనిక ఎరువులు వేసి విత్తుట
చెఱకు	:	నీటి యాజమాన్యం, అంతరకృషి
రాగి	:	నారు మడి

ఆరుద్ర కార్తె (22.06.25 నుండి 05.07.25)

వరి	:	నారు మళ్ళలో అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, మెట్ట వరి సాగులో అంతర కృషి, ఎరువులు వేయుట
జొన్న	:	దుక్కులు దున్నుట, రసాయనిక ఎరువులు వేయుట విత్తనం వేయుట
మొక్కజొన్న	:	సస్యరక్షణ – విత్తనం వేయుట
ప్రత్తి	:	అంతరకృషి, మొక్కలను పలుచన చేయుట
గోగు	:	అంతర కృషి, మొక్కలను పలుచన చేయుట
పప్పుధాన్యాలు	:	వర్షాలు ఆలస్యం అయినచో కంది విత్తుటకు భూమిని తయారుచేయుట – విత్తుట
చెఱకు	:	కాలువలు త్రవ్వి మట్టిని ఎగద్రోయుట
రాగి	:	విత్తడం

పునర్వసు కార్తె (06.07.2025 నుండి 19.07.2025)

వరి	:	సార్వా వరినాట్లు, ముందుగా నాటిన వరిలో అంతరకృషి, సస్యరక్షణ
సజ్జ	:	రసాయనిక ఎరువులు వేసి పునాస లేక ఖరీఫ్‌పైరు విత్తుట
వేరుశనగ	:	అంతరకృషి, సస్యరక్షణ
ఆముదం	:	రసాయనిక ఎరువులు వేసి విత్తుట
జొన్న	:	పునాస లేక ఖరీఫ్ జొన్న విత్తుట. విత్తిన పంటకు ఎరువులు వేయుట. సస్యరక్షణ
మొక్కజొన్న	:	అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట
ప్రత్తి	:	వర్షాధారపు పంట విత్తడం. ముందుగా నాటిన ప్రత్తిలో అంతర కృషి. ఎరువులు వేయుట
కొర్ర	:	ఎరువులు వేయుట, దుక్కి తయారు చేయుట
వేరుశనగ	:	అంతరకృషి, సస్యరక్షణ
ఆముదం	:	కలుపు తీయుట, సస్యరక్షణ
చెఱకు	:	జడచుట్లు వేయుట
రాగి	:	నారు నాటడం, ఎరువులు వేయుట, అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

పుష్యమి కార్తె (20.07.2025 నుండి 02.08.2025)

వరి	:	సస్యరక్షణ, రసాయనిక ఎరువులు వేయుట
జొన్న	:	అంతర కృషి, మొక్కలు పలుచన చేయుట, సస్యరక్షణ
మొక్క జొన్న	:	అంతర కృషి, సస్యరక్షణ
కొర్ర	:	విత్తనం వేయుట

వనమహోత్సవం: చెట్ల నాట్లకు తయారి, పొలాల గట్లపై చెట్ల నాట్లకు తయారి.

సజ్జ / రాగి : సస్యరక్షణ, అంతరకృషి

అశ్లేష కార్తె (03.08.2025 నుండి 16.08.2025)

వరి : అంతర కృషి, సస్యరక్షణ

జొన్న : అంతర కృషి, రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

సజ్జ : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

వేరుశనగ : సస్యరక్షణ

ఆముదం : రసాయనిక ఎరువులు వేయుట, అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

పొగాకు : నారుపోయుట, తర్వాత సస్యరక్షణ

మొక్కజొన్న : రసాయనిక ఎరువులు వేయుట

కొర్ర : ఆలస్యంగా వర్షాలు పడినచో వెంటనే విత్తనం వేయుట

రాగి : మే నెలలో విత్తిన రాగి కోతలు

కాయధాన్యాలు : తక్కువ పంట కాలపు పెసర, మినుము కోతలు, కంది పంటకు కలుపు తీయుట

ప్రత్తి : అంతర కృషి, రసాయన ఎరువులు వేయుట

చెఱకు : జడచుట్లు వేయుట

మఖ కార్తె (17.08.2025 నుండి 30.08.2025)

జొన్న : మాఘీ జొన్నకు నేల తయారి

సజ్జ : సస్యరక్షణ, కోతలు

మొక్కజొన్న : సస్యరక్షణ

కొర్ర : రసాయనిక ఎరువులు వేసి అంతరకృషి చేయుట

ఆముదం : అంతర కృషి, సస్యరక్షణ, దాసరి పురుగు నివారణ

పొగాకు : నారుమళ్ళలో సస్యరక్షణ

వరి : సస్యరక్షణ, కలుపు తీయుట, రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట

కాయధాన్యాలు : తక్కువ పంట కాలపు మినుము కోతకు వస్తుంది.

వేరుశనగ : సస్యరక్షణ

ప్రత్తి : సస్యరక్షణ

చెఱకు : జడచుట్లు వేయుట

రాగి : సస్యరక్షణ

పుబ్బ కార్తె (31.08.2025 నుండి 12.09.2025)

వరి : రసాయనిక ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, కలుపు తీయుట,

జొన్న : రబీ జొన్న వేయుటకు దుక్కులు తయారు చేయుట మరియు మాఘీ జొన్న

వేరుశనగ : సస్యరక్షణ, కలుపు తీయుట

ఆముదం : సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట

ఉత్తర కార్తె (13.09.2025 నుండి 26.09.2025)

వరి : సస్యరక్షణ, కేళీల ఏరివేత, మెట్ట వరి సాగు కోత పనులు

వేరుశనగ : సస్యరక్షణ

ఆముదం : సస్యరక్షణ

పొగాకు : నారుమడిలో సస్యరక్షణ, పొగాకు వేయబోయే చేలలో దుక్కులు దున్నుట

నువ్వులు : జూన్ నెలలో వేసిన పైరు కోతలు

ప్రత్తి : సస్యరక్షణ, రసాయనిక ఎరువులు వేయుట

పొగాకు : పొగాకు వేయు చేలలో దుక్కులు దున్నటం కొనసాగించుట

చెఱకు : జడచుట్లు వేయుట

మొక్కజొన్న : కోతలు

రాగి / సజ్జ : కోతలు

హస్త-చిత్త కార్తెలు (27.09.2025 నుండి 26.10.2025)

వరి : సస్యరక్షణ

జొన్న : జూలై నెలలో విత్తిన పైరులో సస్యరక్షణ. రబీ జొన్నవిత్తుట, సస్యరక్షణ.

కాయధాన్యాలు : కోతలు, దీర్ఘకాలపు కందికి సస్యరక్షణ, ఉలవ, శనగ, విత్తుట

వేరుశనగ : గుత్తి రకం కాయ తీయుట

మొక్కజొన్న : కోతలు

ప్రత్తి : సస్యరక్షణ, సమగ్ర పోషణ

ఆముదం : పైరులో కాయ తీయుట ప్రారంభించుట

పొగాకు : నాట్లు, మూడవ వారంలో ఖాళీలను పూరించడం

కొర్ర : కోతలు

కుసుము : విత్తుట

స్వాతి కార్తె (27.10.2025 నుండి 15.11.2025)

వరి : తక్కువ పంట కాలపు రకాల కోతలు, రబీ వెదజల్లే వరి సాగుకు నేల తయారీ.

జొన్న : రబీ జొన్నలో సస్యరక్షణ, ఖరీఫ్‌లో వేసిన తక్కువ పంట కాలపు రకాలు కోతకు వచ్చుట

వేరుశనగ : తీగ రకం కాయ తీయుట

గోగు : కోతలు

పొగాకు : అంతరకృషి

విశాఖ కార్తె (16.11.2025 నుండి 19.11.2025)

జొన్న : రబీ జొన్నలో అంతరకృషి, తొందరగా విత్తిన వాటికి సస్యరక్షణ, రసాయనిక ఎరువులు వేయుట

మొక్కజొన్న : రబీ పంటకు విత్తనం వేయుట

ప్రత్తి : సస్యరక్షణ, ప్రత్తితీతలు

గోగు : కోసిన గోగు మొక్కలను నీటిలో ఊరవేయుట

పొగాకు : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ

కాయధాన్యాలు : తక్కువ పంట కాలపు పెసర, మినుము, వరి పండిన పొలాల్లో చల్లుట, కందికి సస్యరక్షణ

రాగి : విత్తుట

అనూరాధ కార్తె (20.11.2025 నుండి 02.12.2025)

వరి : మధ్యకాలిక రకాల కోతలు, రబీ పైర్లకు నారుపోయుట, నేరుగా వెదజల్లి వరి సాగు చేయుట

మొక్కజొన్న : సస్యరక్షణ

చెఱకు : చెఱకు తోటలు కొట్టడం ప్రారంభం. కార్శి తోటల పెంపకం, బెల్లం తయారీ

జొన్న : రబీ పైరులో సస్యరక్షణ

గోగు : నార తీయుట

కాయధాన్యాలు : కంది విత్తడం

రాగి : సస్యరక్షణ

జ్యేష్ఠ కార్తె (03.12.2025 నుండి 15.12.2025)

వరి : దీర్ఘకాలిక రకాల కోతలు, రబీ నారుమళ్ళకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, రబీ వరి సాగుకు నేలలు

మొక్కజొన్న : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, రసాయనిక ఎరువులు వేయుట

కాయధాన్యాలు : దీర్ఘకాలిక కంది రకాలు కోతకు వచ్చుట

పొగాకు : తలలు త్రుంచుట, సస్యరక్షణ

చెఱకు : తోటలు నరుకుట, బెల్లం తయారీ

ప్రత్తి : ప్రత్తితీతలు / సస్యరక్షణ

ఆముదం : దీర్ఘకాలిక రకాల కాయ తీయుట ప్రారంభించుట

మూల కార్తె (16.12.2025 నుండి 28.12.2025)

వరి : నారుమడికి ఎరువులు వేయుట, దాళ్వా లేక రబీ వరి నాట్లకు పొలం తయారు చేయుట

మొక్కజొన్న : అంతరకృషి, సస్యరక్షణ, ఎరువులు వేయుట.

రాగి : విత్తుట

కాయధాన్యాలు : పెసర, మినుములను వరి పండించిన భూముల్లో విత్తుట, కంది కోతలు

వేరుశనగ : వరి పండించిన చేలలో విత్తుట

చెఱకు : నీటితడులు పెట్టుట, నరుకుట, బెల్లం తయారీ ఫ్యాక్టరీకి సరఫరా చేయుట

పూర్వాషాఢ-ఉత్తరాషాఢ కార్తెలు(29.12.25 నుండి 23.01.26)

వరి : రబీ లేక దాళ్వా వరి నాట్లు, డిసెంబర్‌లో వరికి కలుపు తీయుట, సస్యరక్షణ

జొన్న : నేలను తయారు చేయుట, విత్తనం వేయుట

సజ్జ : వేసవి పంటకు నేల తయారీ-విత్తనం వేయుట

ప్రత్తి : ప్రత్తితీతలు / ష్రెడ్డర్ నడుపుట

మొక్కజొన్న : ఎరువులు వేయుట. అంతర కృషి

వేరుశనగ : డిసెంబరులో విత్తిన వేరుశనగకు అంతర కృషి

ఆముదం : విత్తుట

చెఱకు : తోటలను నరకుట, కార్శి చేయుట, కోస్తా, రాయల సీమల్లో క్రొత్త తోటలను నాటుట,

పప్పు దినుసులు : వరి పొలాలందు (మాగాణిలో) నవంబరులో వేసిన మినుము, పెసర కోతలు

పశుగ్రాసాలు : లూసర్న్, బర్సీము కోతలు, వేసవి పశుగ్రాసాల సాగు

శ్రవణ కార్తె (24.01.26 నుండి 05.02.26)

వరి : ముందు నాటిన వరికి ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

జొన్న : రబీ జొన్న కోతలు – వేసవి రకాలను విత్తుట

పప్పుదినుసులు : ఉలవ కోతలు

వేరుశనగ : డిశంబరులో విత్తిన పంటకు సస్యరక్షణ

ధాన్య నిల్వలు : విత్తనాలు, నిల్వ చేసుకొనుటలో జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట, నిల్వ ఉంచిన ధాన్యానికి పురుగు పట్టకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతులను పాటించుట

చెఱకు : తోటలను నరకుట, కార్శి చేయుట, మొక్కలో తోటలను నాటుట

రాగి/ సజ్జ / రాగి : విత్తుట

ధనిష్ఠా కార్తె (06.02.26 నుండి 18.02.26)

వరి : డిసెంబర్–జనవరి మాసాల్లో నాటిన వరికి రెండవ దఫా ఎరువులు వేయుట, కలుపు తీయుట

జొన్న : రబీ జొన్న కోతలు, వేసవి పంటకు ఎరువులు వేయుట, అంతర కృషి

సజ్జ/రాగి/కొర్ర : వేసవి పంట విత్తుట, ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

చెఱకు : తోటలను నరకుట, డిసెంబర్‌లో నాటిన పంటకు, కార్శి తోటలకు ఎరువులు వేయుట

వేరుశనగ : వరి పొలాల్లో వేసిన పంటకు సస్యరక్షణ

కుసుమ : కోతల అనంతరం దిగుబడి మార్కెట్‌కు పంపుట

ఆముదం : డిసెంబరు, జనవరి నెలలో విత్తిన పంటకు సస్యరక్షణ

శతభిషా కార్తె (19.02.26 నుండి 03.03.26)

మినుము : వరి మాగాణుల్లో వేసిన మినుము కోతలు

వేరుశనగ : వేసవి పంటకు సస్యరక్షణ

ఆముదం : సస్యరక్షణ

చెఱకు : కార్శి తోటలకు ఎరువులు వేయుట

మొక్కజొన్న : కోతలు కోయుట

పూర్వాభాద్ర – ఉత్తరభాద్ర కార్తెలు (04.03.26 నుండి 30.03.26)

వరి : రెండవ పంటకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ

జొన్న : వేసవి పంటకు సస్యరక్షణ, రబీ జొన్న కోతలు

రాగి : రబీ రాగి కోతలు

సజ్జ : సస్యరక్షణ

వేరుశనగ : ఎరువులు – సస్యరక్షణ

చెఱకు : జనవరిలో నాటిన పైరుకు మరియు కార్శి తోటలకు ఎరువులు వేయుట, సస్యరక్షణ, కలుపు నివారణ

పప్పుదినుసులు : మాగాణిలో విత్తిన పెసర, మినుము పంటకు వచ్చుట

రేవతి కార్తె (31.03.26 నుండి 12.04.26)

ఆముదం : సస్యరక్షణ

వేరుశనగ : డిసెంబరులో విత్తిన పంట నుండి కాయ త్రవ్వుట

పప్పుదినుసులు : పెసర, మినుము కోతలు

చెఱకు : సస్యరక్షణ, కలుపు నివారణ

సజ్జ/రాగి/కొర్ర : వేసవి పంట కోతలు

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
పరిశోధన కేంద్రాలు

క్ర.సం.	వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు మరియు పరిశోధనా స్థానాలు	పరిశోధనాంశాలు
I	**ఉత్తరకోస్తా మండలం**	
1.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి – 531 001. అనకాపల్లి జిల్లా, ఫోన్ – 08924-223370, 99081 50600	చెఱకు, చెఱకు ఆధారిత పంటల సరళి, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు
2.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఎలమంచిలి – 531 005, అనకాపల్లి జిల్లా, ఫోన్ – 94409 77352	నువ్వులు, నువ్వు ఆధారిత పంటల సరళి
3.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఆమదాలవలస – 532 185, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఫోన్ – 08942-286270, 80088 82991	గోగు, గోగు ఆధారిత పంటల సరళి, అపరాలు కోత అనంతర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
4.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, రాగోలు – 532 484 శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఫోన్ – 08942-279836, 91216 77827	వరి, వరి ఆధారిత పంటల సరళి, వరి మాగాణులలో అపరాలు
5.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, విజయనగరం – 535 001 విజయనగరం జిల్లా, ఫోన్ : 97010 23194, 85002 04565	రాగి, రాగి ఆధారిత పంటల సరళి చిరుధాన్యాలు (వరిగెలు, అరికెలు, కొర్ర, ఊదలు)
II	**గోదావరి మండలం**	
6.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు – 534 122 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఫోన్ –08819-246283, 93968 48380	వరి, వేసవి అపరాలు, నీటి మరియు నేల యాజమాన్యం, మిశ్రమ వ్యవసాయం, కోతానంతర పంట యాజమాన్యం
7.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, విజయరాయి-534475 ఏలూరు జిల్లా, ఫోన్ – 08812-224689, 94933 04643	తేనెటీగలు, మొక్కజొన్న, మొక్కజొన్న ఆధారిత పంటల సరళి
8.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పెద్దాపురం – 533 437 కాకినాడ జిల్లా, ఫోన్ – 08852-295853, 94408 80258	రాగి, అపరాలు, నూనెగింజలు (వేరుశనగ, నువ్వులు), మొక్కజొన్న
III	**కృష్ణా మండలం**	
9.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు – 522 034, ఫోన్ – 99896 25210	అపరాలు, ప్రత్తి, చిరుధాన్యాలు, నూనెగింజలు
10.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, వ్యవసాయ కళాశాల ఫామ్, బాపట్ల- 522101, బాపట్ల జిల్లా, ఫోన్-08643-225901, 93981 06307	వరి
11.	పోస్ట్ హార్వెస్ట్ టెక్నాలజీ సెంటర్, బాపట్ల -522 101, బాపట్ల జిల్లా, ఫోన్ – 08643-225180, 94913 51261	వరి, అపరాలు, వేరుశనగ వ్యవసాయోత్పత్తుల సద్వినియోగం, వ్యవసాయ పనిముట్లు
12.	ఉప్పునీటి పరిశోధనా పధకం, బాపట్ల -522 101, ఫోన్ – 08643-225098, 94946 37759	ఉప్పునీటి వినియోగం
13.	అఖిల భారతీయ సమన్వయ వ్యవసాయ పరికరాలు మరియు యంత్ర పరిశోధనా పధకం, బాపట్ల -522 101, బాపట్ల జిల్లా, ఫోన్ – 98481 86842	వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలు
14.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అమరావతి-522 020 పల్నాడు జిల్లా, ఫోన్ -90305 51865, 97044 56893	జీవన ఎరువులు
15.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, జంగమహేశ్వరపురం – 522 415, గురజాల, పల్నాడు జిల్లా, ఫోన్-94907 84669, 81069 56111	వరి, విత్తనోత్పత్తి

16.	చెఱకు పరిశోధనా స్థానం, ఉయ్యూరు – 521 165, కృష్ణా జిల్లా, ఫోన్ – 08676-233236, 92488 38628	చెఱకు
17.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మచిలీపట్నం – 521 002, కృష్ణా జిల్లా, ఫోన్ – 94408 53096	ఉప్పునీటి భూముల్లో వరి
18.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఘంటసాల – 521 133 కృష్ణా జిల్లా, ఫోన్ – 08671-254499, 92488 38628	నీటి యాజమాన్యం
19.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, గరికపాడు-521 175 ఎన్.టి.ఆర్. జిల్లా, ఫోన్ – 08654-288245, 94902 93418	వరి మాగాణుల్లో అపరాలు
20.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, దర్శి – 523 247, ప్రకాశం జిల్లా, ఫోన్ – 96667 60980, 98486 76209	చిరుధాన్యాలు, అగ్రోఫారెస్ట్రీ, నీటి యాజమాన్యం వర్షాధార పంటలు
IV	**దక్షిణ మండలం**	
21.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి – 517 502, తిరుపతి జిల్లా, ఫోన్ – 0877-2248704, 99896 25209	వేరుశనగ, నీటి యాజమాన్యం, అపరాలు, వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలు
22.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పెరుమాళ్ళపల్లె – 517 505 తిరుపతి జిల్లా, ఫోన్ – 0877-2276240, 99896 25227	చెఱకు, చిరుధాన్యాలు, మొక్కజొన్న, జొన్న
23.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నెల్లూరు-524 003, శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, ఫోన్ – 0861-2327803, 94903 27424	వరి
24.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కావలి – 524 201 శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, ఫోన్ – 98851 38021	అగ్రో ఫారెస్ట్రీ
25.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పొదలకూరు-524 345 శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, ఫోన్ – 94405 66582	అపరాలు, జొన్న
26.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, చిన్నపావని – 523 115, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, ఫోన్ – 98851 38021	చిరుధాన్యాలు, అపరాలు
27.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఊటుకూరు – 516 003. వై.ఎస్.ఆర్. జిల్లా, ఫోన్ : 94418 71379	వరి, వరి పంటల సరళి, నీటి యాజమాన్యం
V	**తక్కువ వర్షపాత మండలం**	
28.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నంద్యాల – 518 502, నంద్యాల జిల్లా, ఫోన్ : 99896 25208	ప్రత్తి, వరి, జొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, శనగ, పొగాకు
29.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనంతపురము-515 001 అనంతపురము జిల్లా, ఫోన్ : 99896 25222	మెట్టసేద్యం, వేరుశనగ, సజ్జలు, వాతావరణ ఆధారిత సేవలు
30.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, రెడ్డిపల్లి – 515 701, అనంతపురము జిల్లా, ఫోన్: 94901 21319	నూనెగింజల ఆధారిత పంటల సరళి
31.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి -515 591 శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, ఫోన్ : 99896 25217	వేరుశనగ
VI	**ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంత మండలం**	
32.	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, చింతపల్లి – 531 111 అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, ఫోన్ :94411 80043	గిరిజనుల అభివృద్ధి కొరకు, వాటర్ షెడ్ ఆధారంగా వివిధ పంటల రకాలను/హైబ్రిడ్‌లను అభివృద్ధి/ గుర్తించుట
33.	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, సీతం పేట – 532 443 పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, ఫోన్ : 73821 10830	గిరిజనుల సాంఘిక, ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు వివిధ పంటల రకాలను/హైబ్రిడ్‌లను గుర్తించుట

వ్యవసాయ విస్తరణ కేంద్రాలు

కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు

1. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **అమదాలవలస -532 185**
శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఫోన్ నెం : 08942-286210
సెల్ నెం : 99896 23822

2. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **రస్తాకుంటుబాయి-535 523**
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా
సెల్ నెం : 89781 14299

3. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం,
కొండెంపూడి (గ్రామం)-531 026
బుచ్చయ్యపేట (మండలం), అనకాపల్లి జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23984

4. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **ఉండి-534 199**
భీమవరం రోడ్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.
సెల్ నెం : 99896 23823

5. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
డా॥ కె.ఎల్. రావు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం,
గరికపాడు -521 175, ఎన్.టి.ఆర్. జిల్లా,
టోల్ ఫ్రీ నెం : 1800 425 8334
ఫోన్ నెం : 08654-288238
సెల్ నెం : 99896 23824

6. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం
ఘంటశాల- 521 133, కృష్ణా జిల్లా
సెల్ నెం : 80082 01253

7. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం,
దర్శి - 523 247, ప్రకాశం జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23827

8. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం
మిని బైపాస్ రోడ్, **ఎ.కె.నగర్ (పోస్ట్)**
బి.వి. నగర్, నెల్లూరు-524 004
ఎస్.పి.ఎస్.ఆర్. నెల్లూరు జిల్లా.
ఫోన్ నెం : 0861-2349356
సెల్ నెం : 99896 23828

9. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **కలికిరి-517 234**
అన్నమయ్య జిల్లా
ఫోన్ నెం : 08586-294024
సెల్ నెం : 80085 00320

10. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **ఊటుకూరు, కడప -516 003**
డా॥ వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23826

11. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, **రెడ్డిపల్లి - 515 701**
బుక్కరాయ సముద్రం (మం), **అనంతపురము జిల్లా**
సెల్ నెం : 99896 23825

12. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
శ్రీమతి లక్ష్మీదేవి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం
బెంగళూర్ రోడ్, **కళ్యాణదుర్గం - 515 761,**
అనంతపురము జిల్లా
సెల్ నెం : 77025 44492

13. ప్రోగ్రాం కో ఆర్డినేటర్
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, బనవాసి,
జి.ఎల్.ఎస్. ఫారం దగ్గర
ఎమ్మిగనూరు-518 360, కర్నూలు జిల్లా
ఫోన్ నెం. 08512-296111
సెల్ నెం : 77023 66115

ఏరువాక కేంద్రాలు

1. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ఆవరణ
గాజులరేగ-535 001, విజయనగరం జిల్లా
ఫోన్ నెం : 99896 23801
సెల్ నెం : 94410 13693

2. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం, సెరికల్చర్ ఆఫీస్ ఆవరణ,
ఐ.టి.డి.ఎ. ప్రక్కన, పాడేరు - 531 024,
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా
సెల్ నెం : 95505 06498

3. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ఆవరణ
పెద్దాపురం-533 437, కాకినాడ జిల్లా
ఫోన్ నెం : 08852-244780
సెల్ నెం : 99896 23803

4. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
అమలాపురం - 533 216
ఎయిమ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆవరణ,
డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా
సెల్ నెం : 94402 86682

5. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం, ఆర్.బి.కె.2, దివాన్‌చెరువు,
నీలంతోట, **రాజమహేంద్రవరం - 533 296**
తూర్పు గోదావరి జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23805

6. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
వ్యవసాయ అధికారుల కమిటీ భవనం, ఆం.ప్ర.
రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ ఎదురు, ఎస్.బి.ఐ.మైన్‌బ్రాంచ్ రోడ్,
నరసింహారావు పేట, **ఏలూరు - 534 006,**
ఏలూరు జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23804

7. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ఆవరణ
గుంటూరు, లాం - 522 034, గుంటూరు జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23806

8. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
వ్యవసాయ కళాశాల ఫామ్ ఆవరణ, బాపట్ల,
బాపట్ల జిల్లా - 522 101
సెల్ నెం : 99896 23808

9. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
ఆర్.బి.కె. 1, రావిపాడు (పోస్ట్)
నరసరావు పేట - 522 603
పల్నాడు జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23807

10. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
పాత కలెక్టరేట్ ఆఫీస్ ఆవరణ, **గ్రీమ్స్‌పేట్**
చిత్తూరు - 517 002, చిత్తూరు జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23809

11. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆవరణ
కొత్త బస్టాండ్ ఎదురు, కర్నూలు - 518 503,
కర్నూలు జిల్లా
ఫోన్ నెం : 08518-251813
సెల్ నెం : 94403 12367

12. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆవరణ
ఊటుకూరు, కడప - 516 003,
వై.ఎస్.ఆర్. జిల్లా
సెల్ నెం : 94400 42411, 99896 23811

13. కో ఆర్డినేటర్
ఏరువాక కేంద్రం
బిల్డింగ్ నెం : 24, దీనా జనోద్ధరణ బిల్డింగ్స్,
పుట్టపర్తి - 515 134
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా
సెల్ నెం : 99896 23812

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరము
వాతావరణం – పంటల ఉత్పత్తి – ధరల విశ్లేషణ

వాతావరణం :

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రం. రాష్ట్రంలోని పంటల విస్తీర్ణం, పంటల సరళి మరియు పంటల దిగుబడి ముఖ్యంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రవేశం, విస్తరణ, పంట కాలంలో వీటి ద్వారా లభించే వర్షపాతం తదితర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో జూన్ నుండి సెప్టెంబరు వరకు నైరుతి మరియు అక్టోబరు నుండి డిసెంబరు వరకు ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం వలన వర్షాలు కురుస్తాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావం ఉండగా దక్షిణ కోస్తా మరియు రాయలసీమ ప్రాంతాలలో మాత్రం నైరుతి ఋతుపవనాలతో పాటు ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంవత్సర సాధారణ వర్షపాతం 895 మి.మీ. కాగా, నైరుతి ఋతుపవనాల ద్వారా కోస్తా జిల్లాలలో 64 శాతం, రాయలసీమలో 42 శాతం చొప్పున మరియు ఈశాన్య ఋతుపవనాల ద్వారా కోస్తా ప్రాంతంలో 33 శాతం మరియు రాయలసీమలో 25 శాతం చొప్పున వర్షపాతం నమోదు అవుతున్నది.

సాధారణంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ మొదటి వారంలో రాష్ట్రంలో ప్రవేశించి, జూన్ మూడవ వారం లోపల రాష్ట్రమంతటా విస్తరిస్తాయి. గడచిన ఐదు సంవత్సరాలలో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రవేశం, వర్షపాత విస్తరణ వివరాలు పరిశీలించినట్లైతే, ఋతుపవనాలు జూన్ 6–11 తేదీల మధ్య రాష్ట్రంలో ప్రవేశించి, జూన్ మూడవ వారంలో అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించాయి.

2024 వ సంవత్సరంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు మే 30 వ తేదీన కేరళలో మొదలై, జూన్ 2 న రాష్ట్రంలోని రాయలసీమ ప్రాంతంలోను, జూన్ 4 న కోస్తా ప్రాంతంలోను ప్రవేశించి, ఆ తరువాత రాష్ట్రమంతటా విస్తరించాయి. అదే విధంగా అక్టోబరు 15 వ తేదీన నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రం నుంచి నిష్క్రమించగా, అదేరోజున ఈశాన్య ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించాయి. 2024 వ సం॥లో నైరుతి మరియు ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో సంభవించిన అల్పపీడనాలు మరియు రెమాల్, అస్నా, డానా తుఫానుల ప్రభావంతో కొంత వర్షపాతం నమోదయినప్పటికీ, జూన్, జులైలో కొంత అధిక వర్షపాతం నమోదు కావడం వలన రాష్ట్రంలో 86 శాతం మాత్రమే వివిధ పంటలు సాగు చేయబడ్డాయి.

2024 వ సంవత్సరం దీర్ఘకాలిక వాతావరణ సూచనలు – పరిశీలన :

2024 వ సంవత్సరంలో భారత వాతావరణ విభాగం, న్యూ ఢిల్లీ వారు, నైరుతి ఋతుపవనాల సమయంలో (జూన్–సెప్టెంబర్) సాధారణ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని దీర్ఘకాలిక ముందస్తు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగినది. 2024 జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు కురిసిన వర్షపాత వివరాలను గమనించినట్లైతే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సాధారణ వర్షపాతమే నమోదైనది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నైరుతి ఋతుపవన కాలానికి (జూన్–సెప్టెంబరు, 2024) 574.7 మి.మీ. సాధారణ వర్షపాతానికి గాను, 681.5 మి.మీ. (18.6%) వర్షపాతం నమోదయినది. ప్రాంతాల వారీగా విశ్లేషించి చూసినట్లయితే, నైరుతి ఋతుపవన కాలంలో, ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా (27.4% & 33.6%) మరియు రాయలసీమ (13.7%) లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదుకాబడినది (పట్టిక.1). ఆయా జిల్లాల వారీగా విశ్లేషించి చూసినట్లైతే

నైరుతి ఋతుపవన కాలంలో ఉత్తర కోస్తాలోని శ్రీకాకుళం (12.0%), పార్వతిపురం మన్యం (10.9%) జిల్లాలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదుకాగా విజయనగరం (32.2%), అల్లూరి సీతారామరాజు (39.6%), విశాఖపట్నం (40.2%) మరియు అనకాపల్లి (30.1%) జిల్లాలలో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. దక్షిణ కోస్తాలో ప్రకాశం (6.2%), నెల్లూరు (-3.1%) జిల్లాలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా కాకినాడ (38.3%), డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ (25.8%), తూర్పుగోదావరి (31.7%), పశ్చిమ గోదావరి (29.4%), ఏలూరు (48.4%), కృష్ణా (43.4%), ఎన్.టి.ఆర్ (52.7%), బాపట్ల (22.5%), గుంటూరు (52.1%), పల్నాడు (19.5%) జిల్లాలలో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైనది.

రాయలసీమలో వై.యస్.ఆర్ (-7.0%), అన్నమయ్య (-3.3%), చిత్తూరు (8.3%), తిరుపతి (14.1%) జిల్లాలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా, నంద్యాల (22.5%), కర్నూలు (20.0%), అనంతపురము (34.9%), శ్రీ సత్యసాయి (23.5%) జిల్లాలలో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైనది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈశాన్య ఋతుపవనాల సమయంలో (అక్టోబరు-డిసెంబరు, 2024) 285.3 మి.మీ.ల సాధారణ వర్షపాతానికి గాను 278.7 మి.మీ. అనగా 2.3 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదయినది. ప్రాంతాల వారీగా విశ్లేషించి చూసినట్లయితే ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఉత్తరకోస్తా (-28.7%), దక్షిణ కోస్తా (-23.6%) లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం మరియు రాయలసీమ (26.8%) లో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైనది (పట్టిక 1). జిల్లాల వారీగా చూసినట్లయితే ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఉత్తరకోస్తాలోని ఒక్క పార్వతీపురం మన్యం (1.5%) జిల్లా తప్ప అన్ని జిల్లాలలోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయినది. ఈ లోటు శ్రీకాకుళం (-48.0%), విజయనగరం (-23.0%), అల్లూరి సీతారామరాజు (-24.6%), విశాఖపట్నం (-26.3%) మరియు అనకాపల్లి (-39.9%) జిల్లాలలో గమనించబడింది. అదేవిధంగా దక్షిణకోస్తాలో బాపట్ల (-16.0%), ప్రకాశం (-2.4%), నెల్లూరు (8.5%) జిల్లాలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదుకాగా, కాకినాడ (-40.7%), డా॥ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ (-34.4%), తూర్పు గోదావరి (-52.8%), పశ్చిమ గోదావరి (-39.4%), ఏలూరు (-29.8%), కృష్ణా (-41.8%), ఎన్.టి.ఆర్ (-46.6%), గుంటూరు (-19.9%), పల్నాడు (-23.3%) జిల్లాలలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనది.

రాయలసీమలో ఒక్క కర్నూలు (-37.8%) జిల్లాలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం గమనించబడినది. నంద్యాల (-2.9%), వై.ఎస్.ఆర్. (8.2%) జిల్లాలలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదుకాగా, అనంతపురము (22.5%), శ్రీ సత్యసాయి (93.1%), అన్నమయ్య (37.3%), చిత్తూరు (31.8%) మరియు తిరుపతి (31.3%) జిల్లాలలో సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైనది.

రాష్ట్రంలో గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలలో నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో నాలుగు సంవత్సరాలు (2021, 2022, 2023, 2024) సాధారణ వర్షపాతం, ఒక సంవత్సరం (2020) సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైనది. ఈశాన్య ఋతుపవనాల సమయంలో రెండు సంవత్సరాలు (2022 మరియు 2024) సాధారణ వర్షపాతం, రెండు సంవత్సరాలు (2020 & 2021) సాధారణం కంటే ఎక్కువ మరియు ఒక సంవత్సరము (2023) సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం చొప్పున నమోదైనది. మొత్తంగా ఈ ఏడాది (2024) సాధారణ వర్షపాతం నమోదుకాబడి రాష్ట్రంలోని పంటల ఉత్పత్తి మరియు ధరల విశ్లేషణలో తనదైన ముద్ర వేయబడినది.

పట్టిక 1 : రాష్ట్రంలోని వివిధ వాతావరణ మండలాల్లో వర్షపాత (మి.మీ.) వివరములు (2020-24)

ప్రాంతం	సాధారణ వర్షపాతం		2020				2021				2022			
	నై.	ఈ.	నై.	వ్యత్యాసం (%)	ఈ.	వ్యత్యాసం (%)	నై.	వ్యత్యాసం (%)	ఈ.	వ్యత్యాసం (%)	నై.	వ్యత్యాసం (%)	ఈ.	వ్యత్యాసం (%)
ఉత్తర కోస్తా	731.2	272.8	760.7	3.6	373.2	36.8	853.4	16.2	259.6	-4.8	801.9	9.7	270.8	-5.8
దక్షిణ కోస్తా	482.7	383.4	641.7	32.9	424.8	10.8	498.7	3.3	416.9	8.8	558.1	1.7	337.9	9.9
రాయలసీమ	406.6	237.8	672.3	65.3	309.2	30.1	456.3	12.2	436.6	83.6	443.1	9.4	296.6	13.5
రాష్ట్రం	556.0	296.0	704.8	26.8	370.3	25.1	607.3	9.2	368.3	24.4	583.2	1.5	310.4	8.7

ప్రాంతం	సాధారణ వర్షపాతం		2023				2024			
	నై.	ఈ.	నై.	వ్యత్యాసం (%)	ఈ.	వ్యత్యాసం (%)	నై.	వ్యత్యాసం (%)	ఈ.	వ్యత్యాసం (%)
ఉత్తర కోస్తా	715.5	272.0	714.0	-0.4	178.4	-32.1	911.8	27.4	194.0	-28.7
దక్షిణ కోస్తా	617.5	308.0	527.0	-14.2	289.8	-0.8	825.1	33.6	235.1	-23.6
రాయలసీమ	405.0	261.3	355.4	-13.1	170.1	-50.3	460.5	13.7	331.4	26.8
రాష్ట్రం	574.7	285.3	532.1	-9.3	212.8	-27.7	681.5	18.6	278.7	-2.3

నై : నైరుతి ఋతుపవన కాలం, **ఈ :** ఈశాన్య ఋతుపవన కాలం

* సాధారణ వర్షపాతం (కొత్తగా ఏర్పాటైన జిల్లాల వారీగా)

మూలం : ఆర్థిక మరియు గణాంక సంచాలయము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, విజయవాడ.

పట్టిక 2 : జిల్లా వారీగా నైరుతి మరియు ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో నమోదయిన వర్షపాత (మి.మీ.) వివరములు (2024)

క్ర. సంఖ్య	జిల్లా	నైరుతి ఋతుపవన కాలము			ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము		
		*సాధారణ వర్షపాతం	2024	వ్యత్యాసం (%)	*సాధారణ వర్షపాతం	2024	వ్యత్యాసం (%)
1	శ్రీకాకుళం	696.4	780.1	12.0	294.3	152.9	-48.0
2	విజయనగరం	666.9	881.9	32.2	262.0	201.8	-23.0
3	పార్వతీపురం మన్యం	764.3	847.5	10.9	196.3	199.3	1.5
4	అల్లూరి సీతారామరాజు	895.0	1249.6	39.6	208.2	156.9	-24.6
5	విశాఖపట్నం	588.4	824.8	40.2	365.3	269.3	-26.3
6.	అనకాపల్లి	681.9	887.0	30.1	306.0	183.8	-39.9
7.	కాకినాడ	670.2	927.0	38.3	300.5	178.1	-40.7
8.	డా॥ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ	778.9	979.8	25.8	396.1	259.7	-34.4
9.	తూర్పు గోదావరి	775.9	1022.0	31.7	232.6	109.7	-52.8
10.	పశ్చిమ గోదావరి	791.9	1024.7	29.4	309.8	187.6	-39.4
11.	ఏలూరు	765.7	1136.1	48.4	181.6	127.5	-29.8
12.	కృష్ణా	645.4	925.3	43.4	303.5	176.6	-41.8
13.	ఎన్.టి.ఆర్.	732.2	1118.2	52.7	198.2	105.9	-46.6
14.	గుంటూరు	571.9	869.8	52.1	221.7	177.6	-19.9
15.	బాపట్ల	504.5	618.2	22.5	322.5	270.8	-16.0
16.	పల్నాడు	486.2	581.1	19.5	198.2	152.0	-23.3
17.	ప్రకాశం	366.2	388.9	6.2	384.8	375.6	-2.4
18.	శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు	320.4	310.4	-3.1	645.9	700.5	8.5
19.	కర్నూలు	401.1	481.5	20.0	147.2	91.6	-37.8
20.	నంద్యాల	504.3	617.7	22.5	152.0	147.6	-2.9
21.	అనంతపురం	319.6	431.3	34.9	139.3	170.6	22.5
22.	శ్రీసత్యసాయి	356.5	440.4	23.5	170.7	329.6	93.1
23.	వై.ఎస్.ఆర్.	405.1	376.6	-7.0	225.9	244.5	8.2
24.	అన్నమయ్య	380.1	367.4	-3.3	288.1	395.5	37.3
25.	చిత్తూరు	458.7	496.9	8.3	352.2	464.2	31.8
26.	తిరుపతి	414.2	472.5	14.1	615.1	807.7	31.3
	ఆంధ్రప్రదేశ్	**574.7**	**681.5**	**18.6**	**285.3**	**278.7**	**-2.3**

*** సాధారణ వర్షపాతం (సూతనంగా ఏర్పాటైన జిల్లాల వారీగా)**

మూలం : ఆర్థిక మరియు గణాంక సంచాలయము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, విజయవాడ.

2025 వ సంవత్సరానికి (శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం) దీర్ఘకాలిక ముందస్తు వాతావరణ సూచనలు :

అంతర్జాతీయ వాతావరణ ప్రభావితాంశలైన ఎల్ నినో, లా నినో మరియు హిందూ మహాసముద్ర ద్విధృవ విశ్లేషణ మరియు జాతీయ వాతావరణ అంచనా అయినా దీర్ఘకాలిక సగటు వర్షపాత (ఎల్.పి.ఎ.) విశ్లేషణ అంచనా ఆధారంగా ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ మాసంలో దీర్ఘకాలిక ముందస్తు వాతావరణ సూచనలను భారత వాతావరణ విభాగం (ఐ.యం.డి.) తెలియజేస్తుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వివిధ ప్రధాన పంటల విస్తీర్ణం, ఉత్పత్తి మరియు దిగుబడి వివరాలు (2023-24) :

క్ర. సంఖ్య	పంట పేరు	ఖరీఫ్, 2023			రబీ, 2023-24			మొత్తం 2023-24		
		విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)	విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)	విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)
1.	వరి	1347	7125	5288	574	4132	7207	1921	11257	5861
2.	గోధుమలు									
3.	జొన్నలు	6	8	1416	97	320	3306	103	328	3191
4.	సజ్జలు	23	48	2096	3	6	2108	26	54	2097
5.	మొక్కజొన్న	139	556	4007	153	1263	8229	292	1819	6225
6.	రాగి	22	24	1071	5	10	2142	27	34	1261
ప్రధాన చిరుధాన్యాల మొత్తం		**190**	**636**		**258**	**1599**		**448**	**2235**	
7.	మొత్తం చిరుధాన్యాలు	9	7	811	4	7	1567	13	14	1000
మొత్తం తృణధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు		**1546**	**7768**		**836**	**5738**		**2382**	**13506**	
8.	కందులు	223	91	408	10	5	520	233	96	413
9.	మినుములు	33	34	1016	274	311	1139	307	345	1126
10.	పెసలు	4	3	811	55	55	986	59	58	973
11.	ఉలవలు	6	2	331	17	10	565	23	12	506
12.	శనగలు				302	300	994	302	300	994
13.	అలసందలు	1	2	1862	7	5	790	8	7	912
14.	ఇతర పప్పుధాన్యాలు				10	7	661	10	7	727
మొత్తం పప్పుధాన్యాలు		**267**	**132**		**675**	**693**		**942**	**825**	
మొత్తం ఆహార ధాన్యాలు		**1813**	**7900**		**1511**	**6431**		**3324**	**14331**	

క్ర. సంఖ్య	పంట పేరు	ఖరీఫ్, 2023			రబీ, 2023-24			మొత్తం 2023-24		
		విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)	విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)	విస్తీర్ణం ('000' హె.)	ఉత్పత్తి ('000' ట.)	దిగుబడి (కి/హె.)
15.	వేరుశనగ	242	159	660	70	164	2351	312	323	1038
16.	ఆముదం	65	25	385	1		316	66	25	384
17.	నువ్వులు	6	1	170	25	11	425	31	12	376
18.	వలిసెలు (నైజర్ సీడ్)				1		376	1	0	376
19.	సోయాబీన్	10	13	1364				10	13	1364
20.	ప్రొద్దుతిరుగుడు	2	2	670	2	2	1177	4	4	886
21.	రేప్ సీడ్ & ఆవాలు				1	1	545	1	1	545
22.	కుసుమలు				2	1	478	2	1	478
23.	పామ్ ఆయిల్	98	2284	23283				98	2284	23283
మొత్తం నూనె గింజలు		**423**	**2484**		**102**	**179**		**525**	**2663**	
24.	*ప్రత్తి	420	723	293	2	14	1064	422	737	297
25.	**గోంగూర	1	8	2151				1	8	2151
26.	చెఱకు	27	2214	80533				27	2214	80533
27.	బంగాళదుంప				1	8	16856	1	8	16856
28.	ఎండు మిరపకాయలు	241	1106	4594	29	107	3688	270	1213	4496
29.	పొగాకు	4	8	2133	80	192	2396	84	200	2383

***ప్రత్తి దూది ఉత్పత్తి ప్రతి బేలు 170 కిలోలు '000' బేల్స్ ** గోగు ఉత్పత్తి 180 కిలోల '000' బేల్స్**

గమనిక : భారతదేశ గణాంకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శాతం బ్రాకెట్లలో ఇవ్వబడింది.

మూలం : ఆర్థిక మరియు గణాంకాల సచివాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, విజయవాడ.

వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రం :

మన స్వతంత్ర భారతావని వ్యవసాయ అభివృద్ధి చరిత్రను పరిశీలిస్తే, లోటు ఉత్పత్తి మరియు దిగుమతుల స్థాయి నుండి మిగులు ఉత్పత్తిగా వ్యయసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందినది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత గత 75 సంవత్సరాలుగా ఉత్పత్తి ఆధారిత వ్యవసాయమును చేయటం జరుగుచున్నది. పెరుగుతున్న జనాభాకనుగుణంగా ఆహార భద్రతను కల్పించటంలో వ్యవసాయ రంగం ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా, పెరుగుతున్న సాగు వ్యయం వ్యవసాయదారుల నికర ఆదాయంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సరైన సాగు మరియు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ విధానాలు రైతులకు చేరకపోవడమే ముఖ్య కారణంగా చెప్పవచ్చు. రైతుల ఆర్థిక స్థితి పురోగాభివృద్ధికి ఖచ్చితమైన మార్కెట్ సమాచారం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

వ్వవసాయ మార్కెట్ పరిశోధనల ఆవశ్యకతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయములో వ్యవసాయ ఆర్థిక శాస్త్ర విభాగం, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరులో ప్రధాన వ్యవసాయ పంటల ముందస్తు ధరలను అంచనా వేయుటకు రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన వారి ఆర్థిక సహాయంతో వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రం ఒక పరిశోధనా పథకంగా స్థాపించబడి, 2018–19 సంవత్సరం నుండి కార్యకలాపాలను సాగించుచున్నది.

కేంద్ర ముఖ్య ఉద్దేశ్యాలు :

- రాష్ట్రంలోని ప్రధాన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ ధరలను వివిధ దశలలో నిరంతరం అంచనా వేయటం.
- రైతులకు మరియు మార్కెట్ భాగస్వాములకు విస్తారంగా ముందస్తు ధరల సమాచారం చేరవేయుట.
- రాష్ట్ర మరియు ప్రాంతాల వారీగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల, వ్యాపార మరియు వర్తక సమాచారాన్ని విశ్లేషించి నివేదికలు తయారు చేయుట.
- పంటల వారీగా క్రయ విక్రయ సూచికలు మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరల ధోరణి ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించుట.
- పంటల వారీగా విశ్లేషాత్మకమైన నివేదికలను తయారు చేసి ఎప్పటికప్పుడు విశ్వవిద్యాలయం వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరచటం (www.angrau.ac.in).
- శాస్త్రీయంగా పరిశోధన వ్యాసాలను తయారు చేసి తగు సలహాలతో ప్రచురించటం.

వ్యవసాయ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్రం, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రస్తుతం 12 రకాల ప్రధాన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల (వరి, వేరుశనగ, ప్రత్తి, మిరప, పసుపు, మినుము, కంది, పెసర, శనగ, మొక్కజొన్న, బెల్లం, మరియు జొన్న) మార్కెట్ అంచనా ధరలను నిరంతరంగా, వివిధ ధఫాలలో అంచనాలను తయారు చేసి రైతులకు అందించడం జరుగుతున్నది.

విత్తే ముందు రైతులు వివిధ పంటల ధరలను తెలుసుకోవటం వలన ఏ పంటకు ఏ ధర వస్తుందో తెలుసుకొని పంటల సరళిని తదనుగుణంగా నిర్ణయించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. మార్కెట్ అంచనా ధరలు కోత ముందు తెలుసుకోవటం వలన రాబోయే నెల రెండు నెలల్లో ఏ ధర పలుకుతుందో తెలుసుకొని నిల్వ ఉంచుకోవాలా ? లేక అమ్ముకోవాలా ? అనే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తాయి.

శాస్త్రీయ పద్ధతులతో విశ్లేషించిన మార్కెట్ సమాచారాన్ని, వ్యవసాయ మరియు మార్కెటింగ్ శాఖలలో నమోదు కాబడిన వ్యవసాయదారుల ఫోన్ నంబర్లకి నిరంతరంగా వివిధ దశలలో ముద్రిత మరియు శ్రవణ సమాచారాన్ని తెలియజేయటంతో పాటు వివిధ మాస పత్రికలు (వ్యవసాయం, రైతు భరోసా మొదలగునవి),

సమావేశాలు మరియు ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా చేరవేయటం జరుగుచున్నది. ఈ సమాచారమును వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విస్తరణ విభాగాలకు, ప్రభుత్వ వ్యవసాయ (రైతు భరోసా కేంద్రాలు) మరియు మార్కెటింగ్ శాఖల వారికి అందించడం జరుగుచున్నది. గడిచిన సంవత్సరానికి గాను ఈ కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న ప్రధాన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ద్వారా రైతులకు నేరుగా సూచనలు ఇవ్వడం మరియు ముందస్తు మార్కెట్ ధరల సమాచార పత్రాలను ప్రచురించి వివిధ సంస్థలకు సమాచారం చేరవేయడం కూడా జరిగింది. ఈ సమాచార ఖచ్చితత్వాన్ని 84.14% నుండి 99.46% గా ధృవీకరించటం హర్షనీయం.

ఈ కేంద్రం 2025-26 సంవత్సరంలో సాగు చేసే వివిధ రకాలు పంటల ముందస్తు ధరలను పంట కోత సమయంలో ఏ విధంగా ఉండునో అంచనా వేయడం జరిగింది. ఈ ముందస్తు ధరలను అంచనా వేయుటకు 16 నుండి 28 సంవత్సరాల నెలవారీ మార్కెట్ ధరలను కంప్యూటర్ల ద్వారా విశ్లేషించి, రైతులు మరియు మార్కెట్ భాగస్వామ్యుల నుంచి సేకరించిన సమాచారంతో జోడించి, తుది అంచనా ధరలను నిర్ధారించడం జరుగుచున్నది. ఈ విశ్లేషణ ఫలితాలను మరియు మార్కెట్ సర్వేలను అనుసరించి ఖరీఫ్ 2025-26 పంట కోత సమయంలో ప్రధాన పంటలకు మార్కెట్ ధరలు ఏవిధంగా ఉండునో ఈక్రింది పట్టికలో ఇవ్వడం జరిగినది.

క్ర.సం.	పంటలు	కనీస మద్ధతు ధర (MSP 2024-25)	అంచనా ధరలు (క్వి./రూ.)	అంచనా ధరలు వర్తించు సమయం
1.	వరి (సాధారణ రకం)	2300	2,350-2,480	ఖరీఫ్ 2025-26 పంట కోత దశ
	వరి (ఎ - గ్రేడ్)	2320	2,440-2,625	
2.	ప్రత్తి	7121&7521	7,370-7810	
3.	మిరప (సాధారణ రకాలు)	-	11,890-13,700	
	మిరప (ప్రత్యేక రకాలు)	-	14,500-17,500	
4.	పసుపు (కాయలు)	-	12,070-15,400	
	పసుపు (కొమ్ములు)	-	13,725-16,800	
5.	మొక్కజొన్న	2225	2,310-2,650	
6.	జొన్న (హైబ్రిడ్)	3371	3,775-4,520	
7.	కందులు	7550	8,180-10,300	
8.	మినుములు	7400	7,710-9,520	
9.	పెసలు	8682	7,850-9,920	
10.	శనగ	5650	5,700-6,870	
11.	వేరుశనగ	6783	6,540-7,280	
12.	బెల్లం	-	3,900-5,100	

గమనిక : పైన తెలిపిన ధరలను వివిధ పంటల ముఖ్య మార్కెట్లలో గత 16 నుండి 28 సంవత్సరాల ధరలను విశ్లేషించి అంచనా వేయడం జరిగింది. పంట రకము, నాణ్యత, అంతర్జాతీయ ధరలు, ఎగుమతి లేదా దిగుమతి పరిమితుల మూలంగా లేదా ప్రసుత్త ప్రభుత్వ జోక్యం వల్ల రైతులకు శాశ్వత పంటల కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా గిట్టుబాటు / మద్దతు ధర లభించే అవకాశం ఉన్నందున అంచనా ధరలలో మార్పు ఉండవచ్చును. కావున, భవిష్యత్తులో పంట ధరల మార్పునకు ఈ కేంద్రం ఏ విధమైన బాధ్యత వహించదు.

ఖరీఫ్ 2024 పంటల ప్రణాళిక :

ఖరీఫ్‌లో సరైన సమయంలో ఋతుపవనాలు ప్రవేశించినట్లయితే పట్టిక.3 లో నేల స్వభావాన్ని బట్టి ఏ ఏ పంటలు ఎప్పటివరకు విత్తుకొనవచ్చునో వివరించబడినది. ఋతుపవనాల రాక ఆలస్యమై ప్రధాన పంటలు విత్తుకొనలేని పరిస్థితులలో ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఎప్పట్టికప్పుడు విడుదల చేసే ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళికను పరిగణనలోనికి తీసుకొని పంటలను సాగు చేసుకోవాలి.

పట్టిక 3 : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో నేలల స్వభావం, పంటల సరళి మరియు విత్తు సమయం

రాయలసీమ				కోస్తా ఆంధ్ర			
తేలిక నేలలు		బరువు నేలలు		తేలిక నేలలు		బరువు నేలలు	
పంట	విత్తుటకు చివరి తేది	పంట	విత్తుటకు చివరి తేది	పంట	విత్తుటకు చివరి తేది	పంట	విత్తుటకు చివరి తేది
వేరుశనగ	జూలై 31	జొన్న	జూలై 31	చిరుధాన్యాలు	జూలై 15	పెసలు	జూన్ 30
పెసలు	జూన్ 30	మాఘీ జొన్న	సెప్టెం-బరు 30	సజ్జ	జూలై 15	మినుము	జూలై మొదటి పక్షం
చిరుధాన్యాలు	జూలై 31	ఆముదం	జూలై 31	కొర్ర	జూలై 15	సజ్జ, జొన్న, మొక్కజొన్న, రాగి	జూలై 31
జొన్న	జూలై 31	కంది	జూలై 31	జొన్న	జూలై 15	రాగి	జూలై 31
కంది	జూలై 31	కొర్ర, రాగి	ఆగష్టు 31				
ఆముదం	జూలై 31	సజ్జ	జూలై 31	రాగి	జూలై 31	ప్రత్తి	ఆగష్టు మొదటి పక్షం
వేరుశనగ + కంది	జూలై 31	ప్రత్తి	జూలై 31	కంది	జూలై 31	మినుము/పెసర/ సోయాచిక్కుడు+కంది	జూలై 31
వేరుశనగ + సజ్జ	జూలై 31	కొర్ర + సజ్జ	జూన్ 30	పెసలు	జూన్ 30	మినుము/పెసర/ సోయాచిక్కుడు+ప్రత్తి	జూలై 31
వేరుశనగ + ఆముదం	జూలై 31	పెసర, మినుము	జూలై 15	ప్రత్తి	జూలై 31	ప్రత్తి + కంది	ఆగష్టు మొదటి పక్షం

వరి

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ రంగం దేశ అభివృద్ధిలో ముఖ్య భూమిక పోషించుచున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సుమారు 57.44 లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సాగు చేయబడుచున్న వివిధ పంటలలో వరి ప్రధాన ఆహార పంట. వ్యవసాయ రంగంలో రెండంకెల వృద్ధిలో కీలక భూమిక పోషించుచున్న వరి పంట అధిక ఆదాయాన్ని సాధించుతూ రాష్ట్రంలో అధిక శాతం గ్రామీణ ప్రజలకు జీవనోపాధి అందిస్తున్నది. మన రాష్ట్రంలో 2023-24 సంవత్సరంలో వరి 19.21 లక్షల హెక్టార్లలో సాగుచేయబడి 112.57 లక్షల టన్నుల దిగుబడిని సాధించి, ఉత్పాదకత 5861 కిలోలు/హె. గా నమోదు చేయబడింది. అయితే ఉత్పాదకత సార్వాలో 5288 కిలోలు/హె. కాగా దాళ్వాలో 7207 కిలోలు/హె. నిరంతరం పెరుగుతున్న జనాభా ఆహార అవసరాలు తీర్చుతూ పటిష్ట ఆహార భద్రతకు వరి పంట ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుంది. కాబట్టి, రాబోవు రోజులలో తక్కువ విస్తీర్ణం, నీరు, పెట్టుబడులతో అధిక దిగుబడి సాధించుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ లక్ష్య సాధనకు వరి సాగులో నాణ్యమైన విత్తన ఎంపిక నుండి పంట ఇంటికి చేరే వరకు సరైన యాజమాన్య మెళకువలు పాటించిన యెడల సాగు ఖర్చు తగ్గి మంచి దిగుబడులు సాధించడం ద్వారా నికర ఆదాయాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

వరి పంట గురించి పూర్తి వివరాలు క్రింద తెలియజేయడమైనది.

పట్టిక 1 : వివిధ పంట కాలాలు

ప్రాంతం	మొదటి పంట	రెండవ పంట	మూడవ పంట
కోస్తా ఆంధ్ర	సార్వా (జూన్-నవంబరు)	దాళ్వా (నవంబరు-మార్చి)	వేసవి (మార్చి-మే) (అపరాల సాగు)
రాయలసీమ	వానకారు (జూన్-డిసెంబరు)	ఎండకారు (నవంబరు-మార్చి)	ఎడగారు (మే-ఆగష్టు)

వరి వంగడాల ఎంపిక : వివిధ ప్రాంతాలకు అనువైన వరి వంగడాల వివరాలు పట్టిక 2 మరియు 3 లో పొందుపరచటమైనది. రకాల ఎంపిక ఆయాప్రాంతాలలో ఉన్న సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంపిక చేసుకోవాలి.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి మూడు గ్రాముల కార్బండెజిమ్ 50 శాతం మందును కలిపి 24 గంటల తరువాత నారుమడిలో చల్లుకోవాలి. దంప నారుమళ్ళకయితే లీటరు నీటికి ఒక గ్రాము కార్బండెజిమ్ 50 శాతం మందును కలిపి, ఆ ద్రావణంలో విత్తనాలను 24 గంటలు నానబెట్టి, 24 గంటలు మండెకట్టి మొలకెత్తిన విత్తనాన్ని దంప నారుమడిలో చల్లుకోవాలి. కిలో విత్తనాలు నానబెట్టడానికి లీటరు మందు నీరు సరిపోతుంది. కార్బండెజిమ్ 25 శాతం మరియు మాంకోజెబ్ 50 శాతం మిశ్రమ శిలీంధ్రనాశనిని వాడితే 2 గ్రా. లు కిలో విత్తనానికి, లీటరు నీటికి వంతున వాడాలి.

వరి విత్తనాల్లో నిద్రావస్థను తొలగించటం : కోత కోసిన వెంటనే విత్తనాలను వాడుకోవాలంటే వరి గింజల్లోని నిద్రావస్థను తొలగించి అధిక మొలకశాతం రాబట్టటానికి, లీటరు నీటికి తక్కువ నిద్రావస్థ వున్న విత్తనాలకైతే 6.3 మి.లీ. లేదా విజేత లాంటి ఎక్కువ నిద్రావస్థ వున్న విత్తనాలకైతే 10 మి.లీ. గాఢ నత్రికామ్లం కలిపి ఆ ద్రావణంలో 24 గంటలు నానబెట్టి మరో 24 గంటలపాటు మండెకట్టాలి.

విత్తన మోతాదు (ఎకరానికి) : నాటే పద్ధతికి : 20-25 కిలోలు, పొడి విత్తనం వెదజల్లటానికి : 24-30 కిలోలు, యాంత్రిక వరి సాగు విధానం, గొర్రుతో విత్తుట, బెంగాలు నాటు మరియు తడి విత్తనం వెదజల్లటానికి: 12-15 కిలోలు, డ్రమ్ సీడర్ (8 సాళ్ళ పరికరం) : 10-12 కిలోలు, శ్రీ పద్ధతిలో : 2 కిలోలు అవసరమవుతుంది.

పట్టిక 2 – వివిధ ప్రాంతాలకు సిఫారసు చేయబడిన సార్వా (ఖరీఫ్) వరి రకాలు

పంట కాలం/ పరిస్థితి	కృష్ణా మండలం	గోదావరి మండలం	ఉత్తర కోస్తా మండలం	దక్షిణ మండలం	అల్పవర్ష ప్రాంత మండలం	ఉన్నత శ్రేణి మండలం
1	2	3	4	5	6	7
1.ఎడగారు, ముందుగా నాట్లు వేయడానికి	–	–	పుష్కల, శ్రీసత్య, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	శ్వేత, భరణి, సోమశిల నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, నెల్లూరు సుగంధ, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర	–	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, పుష్కల, శ్రీ సత్య, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్. 3238
2. సార్వా, సాధారణ పరిస్థితుల్లో	స్వర్ణ, ఇంద్ర, అమర, కృష్ణవేణి, వరం, యం.టి.యు. రైస్ 1318, యం.టి.యు. రైస్. 1232, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103, సాంబమషూరి, అక్షయ, భావపురి సన్నాలు, బాపట్ల మషూరి, నెల్లూరు సిరి, తేజ, భవతి, సస్య, బి.పి.టి. రైస్ 2841, బి.పి.టి. రైస్ 2846,	స్వర్ణ, ఇంద్ర, అమర, భీమ, పుష్యమి, క్షీర, శ్రావణి, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1212, యం.టి.యు. రైస్ 1280, యం.టి.యు. రైస్ 1281, యం.టి.యు. రైస్ 1293, యం.టి.యు. రైస్ 1310, యం.టి.యు. రైస్ 1321,	శ్రీకాకుళం సన్నాలు, వసుంధర, శ్రీకూర్మ, వంశధార, స్వర్ణ, ఇంద్ర, అమర, శ్రీధృతి, పుష్యమి, విజేత, వరం, క్షీర, శ్రావణి, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, సుజాత, యం.టి.యు. రైస్ 1310	క్రొత్త మొలగొలుకులు, పార్థివ, నెల్లూరు సోన, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, నెల్లూరు సిరి, సోమశిల, భరణి, శ్వేత, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, సాంబమషూరి, బాపట్ల మషూరి, తేజ, భవతి, సస్య, బి.పి.టి. రైస్ 2841, బి.పి.టి. రైస్ 2846, వరం, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1232, యం.టి.యు. రైస్ 1271, యం.సి.యం. రైస్ 103, నంద్యాల సోన	నెల్లూరు సోన, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238, సాంబమషూరి, భవతి, సస్య, బి.పి.టి. రైస్ 2841, బి.పి.టి. రైస్ 2846, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, వరం,	కాటన్ దొరసన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, వరం, సుజాత, మారుటేరు సాంబ, యం.టి.యు. రైస్ 1293, యం.టి.యు. రైస్ 1232, యం.టి.యు. రైస్ 1271, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు సుగంధ, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238, సస్య,

	మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1271,యం.టి.యు. రైస్ 1275, ప్రకాశం జిల్లాకు క్రొత్త మొలగొలుకులు, పార్ధివ, స్వర్ణముఖి, నెల్లూరు సోన, నెల్లూరి సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. 3238	యం.టి.యు. రైస్ 1318, యం.టి.యు. రైస్ 1232, యం.టి.యు. రైస్ 1271, యం.టి.యు. రైస్ 1275, సాంబమషూరి, తేజ, భవతి, బాపట్ల మషూరి, బి.పి.టి. రైస్ 2841, యం.సి.యం. రైస్ 103	యం.టి.యు. రైస్ 1318, యం.టి.యు. రైస్ 1232, యం.టి.యు. రైస్ 1271, యం.టి.యు. రైస్ 1275, సోనామషూరి, బాపట్ల మషూరి, సస్య, తేజ, బి.పి.టి. రైస్ 2841, బి.పి.టి. రైస్. 2846, యం.సి.యం. రైస్ 103		యం.టి.యు. రైస్ 1271, నంద్యాల సన్నాలు, నంద్యాల సోన, యం.సి.యం. రైస్ 103	బి.పి.టి. రైస్ 2846, నంద్యాల సోన
3. సార్వాలో నారు మడిలో ఆలస్యమై ముదురు నారు నాటటానికి అనువైన రకాలు	స్వర్ణ, ఇంద్ర, అమర, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1318, బాపట్ల మషూరి, భావపురి సన్నాలు, తేజ, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103	స్వర్ణ, ఇంద్ర, అమర, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1318, శ్రీకాకుళం సన్నాలు	శ్రీకాకుళం సన్నాలు, వసుంధర, స్వర్ణ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1318	పార్ధివ, బాపట్ల మషూరి, తేజ, భావపురి సన్నాలు, మారుటేరు మషూరి	సాంబ మషూరి, భావపురి సన్నాలు, మారుటేరు మషూరి	సోనా మషూరి మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1318
4. దోమ పోటు ఆశించే ప్రాంతాలకు	కృష్ణవేణి, ఇంద్ర, అమర, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1271, భావపురి, సన్నాలు, తేజ, సస్య, బి.పి.టి. రైస్ 2846, నెల్లూరు సిరి	ఇంద్ర, అమర, కృష్ణవేణి, పుష్యమి, మారుటేరు సాంబ, యం.టి.యు. రైన్ 1271, నన్య, బి.పి.టి. రైస్ 2846	విజేత, అమర, ఇంద్ర, సుజాత, పుష్యమి, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1271, సస్య, తేజ, బాపట్ల మషూరి, బి.పి.టి. రైస్ 2846, నెల్లూరు సిరి	మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1271, సస్య, తేజ, బాపట్ల మషూరి, బి.పి.టి. రైస్ 2846, పార్ధివ	పార్ధివ, నెల్లూరు సిరి, మారుటేరు సాంబ, మారుటేరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1271, నంద్యాల సోన, బి.పి.టి. రైస్ 2846	విజేత, సుజాత, మారుటేరు సాంబ, చంద్ర, తరంగిణి, యం.టి.యు. రైస్ 1271

5. ముంపు ప్రాంతాలకు	అమర, ఇంద్ర, భీమ, క్షీర, యం.టి.యు. రైస్ 1232, యం.టి.యు. రైస్ 1318	బాడవ మహూరి, ఇంద్ర, స్వర్ణ, భీమ, అమర, క్షీర, యం.టి.యు.రైస్1318, యం.టి.యు. రైస్ 12 32	శ్రీకాకుళం సన్నాలు, ఇంద్ర, బాడవ మహూరి, భీమ, అమర, క్షీర, యం.టి.యు. రైస్ 1318, యం.టి.యు. రైస్ 1232	-	-	స్వర్ణ, భీమ, క్షీర, యం.టి.యు. రైస్ 1232
6. చౌడు భూములకు	ఇంద్ర, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103	ఇంద్ర, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103.	ఇంద్ర, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103	స్వర్ణముఖి, సోమశిల, నెల్లూరు మషూరి, పాండురంగ, యం.సి.యం. రైస్ 103	-	-
7. సార్వాలో ఆలస్యంగా నాటటానికి	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు సోన, నెల్లూరు మహూరి, నెల్లూరు సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	వసుంధర, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	స్వర్ణముఖి, నెల్లూరు సోన, నెల్లూరు సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, నెల్లూరు మహూరి, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293	సాంబ మహూరి, నంద్యాల సన్నాలు, నెల్లూరు మహూరి, నెల్లూరు సిరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, మారుటేరు సాంబ, యం.టి.యు. రైస్ 1293	-
8.ఆరుతడి ప్రాంతాలకు	కాటన్ దొర సన్నాలు, విజేత, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	కాటన్ దొర సన్నాలు, విజేత, చంద్ర, తరంగిణి, మారుటేరు సాంబ, యం.టి.యు. రైస్ 1293, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	సోనా మహూరి, స్వర్ణ, కాటన్ దొర సన్నాలు, విజేత, చంద్ర, తరంగిణి, సుజాత, మారుటేరు సాంబ, యం.టి.యు. రైస్ 1293, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	-	-	-

పట్టిక 3 – దాళ్వా (రబీ) సాగుకు అనువైన రకాలు

పంట కాలం/ పరిస్థితి	కృష్ణా మండలం	గోదావరి మండలం	ఉత్తర కోస్తా మండలం	దక్షిణ మండలం	అల్పవర్ష ప్రాంత మండలం	ఉన్నత శ్రేణి గిరిజన మండలం
1	2	3	4	5	6	7
1. సాధారణ పరిస్థితుల్లో	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, శ్వేత, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	కాటన్ దొర సన్నాలు, ప్రభాత్, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, సుజాత, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, శ్వేత, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	పుష్కల, శ్రీసత్య, కాటన్ దొర సన్నాలు, శ్రీధృతి, చంద్ర, సుజాత, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, సస్య	స్వర్ణముఖి, నెల్లూరు మషూరి, శ్వేత, నెల్లూరు సిరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, నెల్లూరు సుగంధ, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, కాటన్ దొర సన్నాలు, యం.టి.యు. రైస్ 1293, తరంగిణి, సంద్యాల సోన	నంద్యాల సన్నాలు, నంద్యాల సోన, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, శ్వేత, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238	పుష్కల, శ్రీసత్య, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, శ్రీధృతి, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు సుగంధ, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238
2.ఆలస్యంగా వేయటానికి	కాటన్‌దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, శ్వేత, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238	కాటన్‌దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్.రైస్ 3238	కాటన్‌దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	సోమశిల, శ్వేత, నెల్లూరి మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238, కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293, నెల్లూరు మషూరి, ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	శ్రీ సత్య, చంద్ర, తరంగిణి, యం.టి.యు. రైస్ 1293

పంట కాలం/ పరిస్థితి	కృష్ణా మండలం	గోదావరి మండలం	ఉత్తర కోస్తా మండలం	దక్షిణ మండలం	అల్పవర్ష ప్రాంత మండలం	ఉన్నత శ్రేణి గిరిజన మండలం
1	2	3	4	5	6	7
3. దోమ పొటు ఆశించే ప్రాంతాలకు	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, సుజాత, యం.టి.యు. రైస్ 1293	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, సుజాత, యం.టి.యు. రైస్ 1293	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293	-	కాటన్ దొర సన్నాలు, తరంగిణి, శ్రీధృతి, చంద్ర, యం.టి.యు. రైస్ 1293
4. చౌడు పొలాలకు	నెల్లూరు మషూరి, యం.టి.యు. రైస్ 1293	నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, యం.టి.యు. రైస్ 1293	నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, యం.టి.యు. రైస్ 1293	సోమశిల, నెల్లూరు మషూరి, నెల్లూరు ధాన్యరాశి, యం.టి.యు. రైస్ 1293	-	-

పట్టిక 4 – వరి రకాల పంట కాలం, దిగుబడి మరియు ఇతర గుణగణాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజులలో)	దిగుబడి (ఎకరానికి టన్నులలో)	గింజ నిద్రావస్థ (వారాలు)	పురుగులు, తెగుళ్ళను తట్టుకునే శక్తి	గుణగణాలు
1	2	3	4	5	6	7	8
ప్రభాత్ (యం.టి.యు. 3626)	1976	ఖరీఫ్ రబీ	135 130	2.5 3.2	3.0	అగ్గి తెగులు	గోదావరి జిల్లాల్లో దాళ్వాకు అనువైనది, చేను మీద పడిపోదు, ముతక బియ్యం. కేరళ మార్కెట్‌కు అనుకూలం.
క్రొత్త మొలగొలుకలు (ఎన్.ఎల్.ఆర్.–9674)	1977	ఖరీఫ్	165–170	2.5	–	అగ్గి తెగులు కొంత వరకు	గింజ వెన్నుపై మొలకెత్తదు. గింజలు మధ్యస్థ సన్నం కలిగి భోజనానికి బాగా అనువైనది.
స్వర్ణ (యం.టి.యు. 7029)	1982	ఖరీఫ్	150	3.0	3.0	ఎండాకు తెగులు	వివిధ రకాల భూముల్లోను, వాతావరణ పరిస్థితుల్లోను, రెండు పంటలు పండించు ప్రాంతాలకు స్థిరమైన దిగుబడినిచ్చే సన్నని గింజ గల రకం. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిస్తుంది.
బాడవ మషూరి (పి.యల్.ఎ. 1100)	1982	ఖరీఫ్	160	2.5	–	–	నీరు నిల్వ ఉండు పల్లపు ప్రాంతాలకు అనువైన రకం. గింజలు సన్నగా మషూరి రకాన్ని పోలి ఉంటాయి. గింజ సులువుగా రాలే స్వభావం ఉంది. కోత సమయంలో వర్షం వస్తే గింజ మొలకెత్తుతుంది. పచ్చి బియ్యానికి అనుకూలం.
సోనామషూరి (బి.పి.టి. 3291)	1982	ఖరీఫ్	135–140	2.5	2.0	అగ్గి తెగులు	గింజ సన్నం, అన్నానికి బాగుంటుంది.

సాంబమషూరి (బి.పి.టి. 5204)	1986	ఖరీఫ్ రబీ	145-150 135	2.5	4	-	సన్నబియ్యం, అన్నం మృదువుగా రుచిగా ఉండి మెతుకులు ఒకదానికొకటి అతుక్కోవు. అన్నం ఎక్కువగా ఒదుగుతుంది. ముదురు నారు నాటుటకు అనువైన రకం కాదు.
కృష్ణవేణి (యం.టి.యు. 2077)	1989	ఖరీఫ్	150	2.5	4.0	సుడిదోమ	సన్నబియ్యం, గింజ చేనుమీద రాలే స్వభావం ఉంది. అందువల్ల కర్ర పచ్చిమీద కోయటం మంచిది. చేనుపై పడిపోదు. ఎండాకు తెగులును తట్టుకోలేదు.
స్వర్ణముఖి (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 145)	1991	ఎర్లీ రబీ	135	3.2	-	అగ్గి తెగులు	నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొంటుంది. సన్న బియ్యం చౌడును తట్టుకొంటుంది.
విజేత (యం.టి.యు. 1001)	1995	ఖరీఫ్ రబీ	135 125	2.5 3.2	6.0	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు	చేనుపై పడిపోదు, జింకు ధాతు లోపాన్ని తట్టుకొనలేదు.
శ్రీకాకుళం సన్నాలు (ఆర్.జి.ఎల్. 2537)	1996	ఖరీఫ్	165	3.0	-	ఉల్లికోడు	మిక్కిలి సన్నబియ్యం, 60 రోజులు వరకు నాటుకొనవచ్చును, చేనుపై పడిపోదు.
భరణి (ఎస్.ఎల్.ఆర్.-30491)	1997	ఎడగారు	125	2.5	-	టుంగ్రో వైరస్	సన్న బియ్యం, నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఎడగారు పంట కాలానికి అనుకూలమైనది.

కాటన్ దొర సన్నాలు (యం.టి.యు.1010)	1999	దాళ్వా ఎడగారు	120	3.2 2.5	3.0	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు కొంత వరకు	గింజ సన్నము, పొడవుగా ఉండును. ఎగుమతులకు అనుకూలం. గింజ చేనుపై రాలే స్వభావం కలదు. అందువలన కర్ర పచ్చి మీద కోయడం మంచిది. ముదురు నారు నాటుటకు మరియు అక్టోబరు మాసంలో విత్తుటకు అనువైన రకం కాదు.
సోమశిల (ఎన్.ఎల్.ఆర్.33358)	1999	అన్ని కాలాలకు	105-110	2.5	-	అగ్గి తెగులు	బియ్యం అతి సన్నం, ఎగుమతికి అనువైనది, చౌడు భూములలో కూడ సాగుకు అనుకూలం.
నంద్యాల సన్నాలు (యన్.డి.యల్.ఆర్.8)	2001	సార్వా దాళ్వా	135 125	3.0	-	దోమకు కొంత వరకు	నీటి ఎద్దడిని తట్టుకునే సన్న గింజ రకం, గింజ సాంబ మషూరిని పోలి ఉంటుంది.
ఇంద్ర (యం.టి.యు. 1061)	2006	సార్వా	150	3.0	2-3	సుడిదోమ	సన్నగింజ, తెలుపు, చేనుమీద పడిపోదు, 10 రోజుల వరకు ముంపును, కొద్దిపాటి చౌడును తట్టుకొనును. అన్నానికి అనుకూలం.
పార్థివ (ఎన్.ఎల్.ఆర్.33892)	2006	సార్వా	155	2.2	-	అగ్గి తెగులును తట్టుకొనును, దోమ పోటును కొంత వరకు తట్టుకొనును.	సన్నబియ్యం, మొలగొలుకులు రకం, అక్టోబరు ఆఖరు వరకు నాట్లు వేసుకోవచ్చును.
శ్రీకూర్మ (ఆర్.జి.యల్.2332)	2006	సార్వా	150-155	2.1	-	ఉల్లికోడు, అగ్గి తెగులు, ముంపుని తట్టుకొనును.	సన్న బియ్యం.
పుష్యమి (యం.టి.యు. 1075)	2008	సార్వా	135	2.5	-	అగ్గి తెగులును, దోమ పోటును తట్టుకొనును	సన్న బియ్యం, చేనుపై పడిపోదు.
అమర (యం.టి.యు. 1064)	2008	సార్వా	150	2.5	3	దోమ పోటు	చేను మీద పడిపోదు. గింజ రాలదు. సన్న బియ్యం. ముంపును బాగా తట్టుకొనును.
నెల్లూరు మషూరి (ఎన్.ఎల్.ఆర్.34449)	2009	అన్ని కాలాలకు	125	3.2	-	అగ్గి తెగులును పూర్తిగా తట్టుకుంటుంది	చేను మీద పడిపోదు. పొట్టి రకం. గింజ నాణ్యత కలిగి, అగ్గి తెగులును తట్టుకొనును.
శ్రీసత్య (ఆర్.జి.యల్. 1880)	2009	దాళ్వా	110	2.0	-	ఉల్లికోడు	సన్న బియ్యం అధిక దిగుబడినిచ్చే వర్షాధారపు పంటకి అనువైన రకం.

వంశధార (ఆర్.జి.ఎల్. 11414)	2010	సార్వా	150	2.5	–	అగ్గి తెగులు, ఉల్లికోడు	బియ్యం మధ్యస్థ సన్న రకం. చేను మీద పడిపోదు. స్వర్ణ రకానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సాగు చేసుకొనవచ్చును.
భావపురి సన్నాలు (బి.పి.టి. 2270)	2010	సార్వా	160-165	2.8	–	ఎండాకు తెగులు, దోమ	చేను మీద పడిపోదు. సన్న బియ్యం. అన్నానికి బాగుంటుంది. ఒకే పంట పండించు ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
అక్షయ (బి.పి.టి. 2231)	2010	సార్వా	150	2.6	–	ఎండాకు తెగులు, దోమ	చేను మీద పడిపోదు. బియ్యం మధ్యస్థ సన్న రకం. డెల్టాలో రెండు పంటలు పండించు ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
నెల్లూరు సోన (ఎన్.ఎల్.ఆర్.3041)	2012	సార్వా	140	3	–	అగ్గి తెగులు	అతి సన్నబియ్యం. అన్నానికి బాగుంటుంది. తక్కువ నత్రజనితో ఎక్కువ దిగుబడినిస్తుంది.
శ్వేత (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 40024)	2012	దాళ్వా ఎడగారు	120	2.9	–	అగ్గి తెగులు	బియ్యం మధ్యస్థం, అధిక ఉష్ణోగ్రత తట్టుకొని దక్షిణ మండలంలో ఎడగారు కాలానికి అనువైన రకం.
శ్రీధృతి (యం.టి.యు. 1121)	2015	దాళ్వా	120-125	2.41	–	అగ్గి తెగులు, దోమ	కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. మధ్యస్థ సన్నరకం. అన్నానికి బాగుంటుంది. నేరుగా విత్తే విధానంలో సాగుకి కూడా అనుకూలమైనది. ఎండాకు తెగులు మరియు కాండం కుళ్ళు తెగులును తట్టుకోదు.
చంద్ర (యం.టి.యు. 1153)	2015	దాళ్వా	120	2.8-3.0	2	దోమపోటు, అగ్గి తెగులు	కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. గింజ రాలిక బాగా తక్కువ. గింజ చేనుపై మొలకెత్తదు. గింజలు పొడవుగా, లావుగా ఉండి ధాన్యము మరియు బియ్యం తెలుపు రంగులో ఉండును. బియ్యం పొట్ట తెలుపు లేకుండా పారదర్శకంగా ఉండును. ఈ రకం 8 రాష్ట్రాలలో సాగుకి కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో విడుదల చేయబడినది. ఎగుమతులకు అనుకూలం.
నంద్యాల సోన (ఎన్.డి.ఎల్.ఆర్.7)	2016	సార్వా, దాళ్వా	140 135	2.6-2.8	–	ఆకుముడత, దోమ, అగ్గి తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొనును.	మిక్కిలి సన్నబియ్యం, అన్నం మృదువుగా రుచిగా ఉండి, సాంబ మషూరి మాదిరిగా ఉంటుంది. మార్కెట్‌లో మంచి రేటు లభిస్తుంది.

భీమ (యం.టి.యు. 1140)	2016	సార్వా	145	2.5	2	దోమ	ముంపు ప్రాంతాలలో సాగుకి అనుకూలం. మొలక దశలో కూడా 10 రోజుల పాటు ముంపును తట్టుకుంటుంది. కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడదు. అడుగు అడుగున్నర మేర నీరు నిల్వ ఉండే పల్లపు ప్రాంతాలలో సాగుకు అనుకూలం.
తరంగిణి (యం.టి.యు. 1156)	2016	దాళ్వా	120	2.8-3.0	2	దోమ పోటు, అగ్గి తెగులు	కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడిపోకుండా ఉండుటచే నేరుగా విత్తే విధానంలో సాగుకి, యంత్రాలతో కోతకి అనుకూలం. గింజరాలిక తక్కువగా ఉండును. బియ్యం సన్నగా, పొడవుగా ఉండి ఎగుమతులకు అనుకూలంగా ఉండును.
క్షీర (యం.టి.యు. 1172)	2018	సార్వా	150	2.4	2	కొంత వరకు అగ్గి తెగులు, ఎండాకు తెగులు	జాతీయ స్థాయిలో ఒరిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో మధ్యస్థ ముంపు ప్రాంతాలలో సాగుకు విడుదల చేయబడింది. ఈ రకం మధ్యస్థ సన్న గింజ నాణ్యత కలిగి, ధాన్యం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. 10 రోజులు ముంపుతో పాటు, అడుగున్నర నీరు నిల్వ ఉండే పల్లపు ప్రాంతాలలో సాగు చేయవచ్చు.
వరం (యం.టి.యు. 1190)	2018	సార్వా	140	2.6	2	కొంత వరకు అగ్గి తెగులు, మెడ విరుపు, ఎండాకు తెగులు	జాతీయ స్థాయిలో 5 రాష్ట్రాలకు (చత్తీస్‌ఘడ్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు) విడుదల చేయబడిన మధ్యస్థ సన్నగింజ రకం. ఈ రకం సన్న బియ్యం నాణ్యత కలిగి, మిల్లులో ఎక్కువ బియ్యం దిగుబడినిస్తుంది. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిస్తుంది. అన్నం నాణ్యత కూడా బాగుంటుంది. 10 రోజుల పాటు తాత్కాలిక ముంపును తట్టుకుంటుంది. ధాన్యం తెలుపు రంగు.
పాండు రంగా (యం.సి.యం. 100)	2018	సార్వా	145	2.4	2-3	కొంత వరకు అగ్గి తెగులు, ఆకు మచ్చ తెగులు	చౌడును సమర్ధవంతంగా తట్టుకుని అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం. చేనుపై పడదు. గింజ రాలిక తక్కువ. మధ్యస్థ సన్న గింజ నాణ్యత కలిగి ధాన్యం తెలుపు రంగులో ఉండును. ముదురు నారు ఊడ్చినా పంట దిగుబడి బాగుంటుంది.

బాపట్ల మషూరి (బి.పి.టి. 2295)	2018	సార్వా	150-155	2.6	-	దోమపోటు, అగ్గి తెగులు	చేనుపై పడిపోదు. మధ్యస్థ సన్న గింజ నాణ్యత కలిగిన తెలుపు ధాన్యం. అన్నానికి అనుకూలం. ఒకే పంట వేసుకునే నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు మరియు పశ్చిమ డెల్టా ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
తేజ (బి.పి.టి. 2595)	2019	సార్వా	150-155	2.5	2.0	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు కొంత వరకు	ఒకే పంట పండించే ప్రాంతాలకు అనువైన సన్న గింజ రకము. చేనుపై పడిపోదు. అన్నానికి చాలా అనుకూలమైన రకం.
సుజాత (యం.టి.యు. 1210)	2019	సార్వా దాళ్వా	135 125	2.6-2.8 2.8-3.0	2	దోమపోటు, అగ్గి తెగులు	కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. గింజ రాలిక తక్కువ, నేరుగా విత్తే విధానంకి కూడా అనుకూలం.
మారుటేరు సాంబ (యం.టి.యు. 1224)	2019	సార్వా	135	2.6-2.8	2	దోమ పోటు	పంట చేనుపై పడిపోదు. బియ్యం పారదర్శకంగా ఉండి అన్నానికి అనుకూలం. ఎండాకు తెగులును తట్టుకోదు.
మారుటేరు మషూరి (యం.టి.యు. 1262)	2019	సార్వా	155	2.6-2.8	2	ఎండాకు తెగులు దోమపోటు	కాండం ధృడంగా ఉండి, చేనుపై పడిపోదు. గింజ రాలిక తక్కువ. ఎక్కువ నిండు, గింజల దిగుబడినిస్తుంది. ముందుగా వేసుకున్న, అత్యధిక ఎరువులు వేసినా కాల పరిమితి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది.
శ్రావణి (యం.టి.యు. 1239)	2019	సార్వా	140	2.6-2.8	2	దోమపోటు తట్టుకుంటుంది.	కాండం ధృడంగా ఉండి, చేనుపై పడిపోదు. ఈ రకం జాతీయ స్థాయిలో విడుదల చేయ బడింది.
నెల్లూరు ధాన్యరాశి (ఎన్ఎల్ఆర్-3354)	2019	ఎడగారు దాళ్వా	120-125	2.8-3.0	-	అగ్గి తెగులు తట్టుకొంటుంది	కాండం ధృడంగా ఉండి చేనుపై పడిపోని పొట్టి రకం. గింజ రాలిక తక్కువ, అధిక వేడిమిని తట్టుకొను గుణం కలిగి, ఎడగారు సాగుకు అనుకూలం. మంచి నాణ్యమైన సన్నబియ్యం రకం,

భవతి (బి.పి.టి. 2782)	2020	సార్వా	145	3.0	2.0	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు కొంత వరకు	సన్నగింజ రకము. చేనుపై పడిపోదు. కొద్దిపాటి చౌడును, నీటి ఎద్దడిని కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది.
సస్య (బి.పి.టి. 2411)	2020	సార్వా, దాళ్వా	140 130	3.0-3.2	1.0	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు, ఆకుమచ్చను కొంతమేర తట్టుకుంటుంది.	రెండు పంటలు పండించే ప్రాంతాలకు అనువైన అధిక దిగుబడి నిచ్చే రకం. కొద్దిపాటి చౌడును నీటి ఎద్దడిని తట్టుకుంటుంది.
నెల్లూరు సిరి (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 4001)	2020	సార్వా దాళ్వా (అక్టోబరు)	140-145	2.6-2.8	-	అగ్గి తెగులు, దోమ పోటు కొంతవరకు తట్టుకొనును.	తెల్ల పొట్టు కలిగిన సన్నబియ్యం రకం. తక్కువ నత్రజనితో ఎక్కువ దిగుబడినిస్తుంది.
నెల్లూరు సుగంధ (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 40054)	2020	అన్ని కాలాలకు అనుకూలం	ఎడగారు, ఖరీఫ్ 135 రోజులు, రబీలో 120-125 రోజులు	2.8-3.0	-	అగ్గి తెగులు, ఉల్లికోడు కొంతవరకు తట్టుకొనును	బాసుమతి వాసన కలిగిన సన్నగింజ రకం, తక్కువ నత్రజని వద్ద ఎక్కువ దిగుబడి నిచ్చు పడిపోని పొట్టి రకం.
యం.టి.యు. రైస్ 1212	2021	సార్వా	140	2.8	2	అగ్గి తెగులు, మెడవిరుపు తెగులు, ఆకుమచ్చ తెగులు, పాముపొడ తెగులు, మాగుడు తెగులు	చేనుపై పడిపోదు. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిచ్చును. చేను మీద గింజరాలదు.
యం.టి.యు. రైస్ 1280	2021	సార్వా	135	2.8	2	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, మెడ విరుపు తెగులు, టుంగ్రో వైరస్	చేనుపై పడిపోదు. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిచ్చును. చేను మీద గింజరాలదు. గింజ పొడవు మరియు లావుగా ఉంటుంది. బియ్యం పారదర్శకత కలిగి ఉంటుంది.

యం.టి.యు. రైస్ 1281	2021	సార్వా	140	2.8	2	సుడిదోమ, అగ్గి తెగులు, మెడవిరుపు తెగులు	సన్నగింజ రకం. చేనుపై పడిపోదు. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిచ్చును. చేను మీద గింజరాలదు.
యం.టి.యు. రైస్ 1318	2022	సార్వా	150	3.0	2	అగ్గి తెగులు, మెడవిరుపు మరియు పొట్టకుళ్ళు తెగులు	కాండం ధృడంగా ఉండి చేను పడిపోదు. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిచ్చే రకము. గింజ మధ్యస్థ సన్నంగా ఉండి, పచ్చి బియ్యానికి అనుకూలం. బియ్యం పారదర్శకంగా ఉండి ఎక్కువ నిండు గింజలు కలిగి ఉంటుంది. ముందుగా వేసుకున్నా, అత్యధిక ఎరువులు వేసినా కాలపరిమితి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది.
యం.టి.యు. రైస్ 1232	2022	సార్వా	సాధారణ పరిస్థితులు : 135-145; ముంపు పరిస్థితులు : 140-145	సాధారణ పరిస్థితులు : 2.4; ముంపు పరిస్థితులు : 1.5	1	దోమ పోటు, అగ్గి తెగులు, మాగుడు తెగులు	చేనుపై పడిపోదు. ముంపు ప్రాంతాలకు అత్యంత అనువైన రకం. నారుమడి నుండి పిలకలు కట్టే దశ వరకు సుమారు 10 రోజుల పాటు ముంపుకు తట్టుకుంటుంది. గింజ రాలిక తక్కువగా ఉండును.
యం.సి.యం. రైస్ 103	2022	సార్వా	140-145	2.4-2.5	2	దోమ పోటు, అగ్గి తెగులు	చౌడును సమర్ధవంతంగా తట్టుకొని అధిక దిగుబడినిచ్చే రకం. చేనుపై పడిపోదు. గింజ రాలిక తక్కువగా ఉండును. గింజ మధ్యస్థ సన్నం. ధాన్యం తెలుపు రంగులో ఉండును. ముదురు నారు ఊడ్చిన పంట దిగుబడి బాగుంటుంది.

యం.టి.యు. రైస్ 1293	2022	దాళ్వా	120	2.5-2.40	-	అగ్గి తెగులు, పొట్టకుళ్ళు, టుంగ్రో వైరస్ మరియు ఆకుమచ్చ తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొనును	జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సాగుకు విడుదల చేయబడింది. చౌడును సమర్థవంతంగా తట్టుకొని అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం. గింజలు పొడవుగా సన్నగా ఉండి, బియ్యం పొట్ట తెలుపు లేకుండా పారదర్శకంగా ఉండును. ఎగుమతికి అనువైన రకం.
యం.టి.యు. రైస్ 1310	2022	సార్వా	135-140	2.8-3.0	-	అగ్గి తెగులును మరియు మెడ విరుపు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొనును.	జాతీయ స్థాయిలో నాలుగు రాష్ట్రాలకు (ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక మరియు పుదుచ్చేరి) సాగు కొరకు విడుదల చేయబడింది.
యం.టి.యు. రైస్ 1321	2022	సార్వా	135-140	2.6-2.8	-	అగ్గి తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొనును.	జాతీయ స్థాయిలో నాలుగు రాష్ట్రాలకు (తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక మరియు పుదుచ్చేరి) సాగు కొరకు విడుదల చేయబడింది.
బి.పి.టి. రైస్ 2841	2023	సార్వా & దాళ్వా	130-135	2.2-2.4	1	కొంత వరకు అగ్గి తెగులు, మెడ విరుపు తెగులు, దోమపోటును తట్టుకొనును.	నల్ల బియ్యం, మధ్యస్థ సన్న రకం. అధిక ప్రోటీన్లు, ఐరన్, జింకు అధికంగా యాంటీ ఆక్సీడెంట్లు కలిగిన రకం. తక్కువ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి మధుమేహగ్రస్తులకు అనువైన రకం.

బి.పి.టి. రైస్ 2846	2023	సార్వా	145-150	2.6-2.8	2	అగ్గి తెగులు, పొట్టకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొనును.	కాండం ధృఢంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. మధ్యస్థ సన్న రకం. అతి సన్న బియ్యం, అన్నానికి బావుంటుంది. బియ్యం నాణ్యత కలిగి మిల్లులో ఎక్కువ బియ్యం దిగుబడినిస్తుంది.
ఎన్.ఎల్.ఆర్. రైస్ 3238	2023	సార్వా, దాళ్వా ఎడగారు	120-125	2.8	-	కొంత వరకు అగ్గి తెగులు, మెడ విరుపు తెగులును తట్టుకొనును.	కాండం ధృఢంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. మధ్యస్థ సన్న రకం. బియ్యం నాణ్యత కలిగి మిల్లులో ఎక్కువ బియ్యం దిగుబడినిస్తుంది. అన్నం రుచిగా ఉండును. పాలిష్ బియ్యంలో అధిక జింకు శాతం కలిగిన రకం (24.5 పి.పి.యం.)
యం.టి.యు. రైస్ 1271	2023	సార్వా	140	2.6-2.8	2	దోమపోటు, ఎండాకు తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొనును.	మధ్యస్థ సన్న గింజ రకం. ఈ రకం సన్న బియ్యం నాణ్యత కలిగి, మిల్లులో ఎక్కువ బియ్యం దిగుబడినిస్తుంది.
యం.టి.యు. రైస్ 1275	2023	సార్వా	140	2.6-2.8	2	అగ్గి తెగులు, మెడవిరుపు తెగులు, ఎండాకు తెగులు, గోధుమ రంగు మచ్చ తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొనును.	కాండం ధృఢంగా ఉండి చేనుపై పడిపోదు. మధ్యస్థ సన్న రకం, గింజ రాలిక తక్కువగా ఉండును. బియ్యం పారదర్శకంగా ఉండి ఎక్కువ నిండు గింజలు కలిగి ఉంటుంది. తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడినిచ్చే రకం. జాతీయ స్థాయిలో 5 రాష్ట్రాలకు (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక మరియు పుదుచ్చేరి) విడుదల చేయబడింది.

ఆరోగ్యవంతమైన నారు పెంచటానికి సూచనలు

- ❖ నారుమడిని 10–12 రోజుల వ్యవధిలో 3 దఫాలు దమ్ముచేసి చదును చేయాలి. నీరు పెట్టటానికి, తీయటానికి వీలుగా కాలువలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- ❖ 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్రజని (విత్తనం చల్లేముందు 1 కిలో, మరో కిలో విత్తిన 10–15 రోజులకు), 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి. చలి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో మరియు రబీ కాలంలో భాస్వరంను రెట్టింపు వేయాలి.
- ❖ శిలీంధ్రనాశనితో శుద్ధి చేసి మొలక కట్టిన విత్తనాన్ని సెంటుకు 5 కిలోల చొప్పున చల్లుకోవాలి.
- ❖ నారు, ఒక ఆకు పూర్తిగా పురివిచ్చుకునే వరకు ఆరుతడిగా నీరు ఇచ్చి తర్వాత పలుచగా నీరు నిల్వకట్టాలి.
- ❖ జింకు లోపాన్ని గమనిస్తే లీటరు నీటికి 2 గ్రా. జింకు సల్ఫేటు ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయాలి. చలి ఎక్కువగా ఉండే దాళ్వా వరి సాగులో జింకులోప లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి.
- ❖ విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోఫ్యూరాన్ 3జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి విత్తిన 10 రోజులకు మరియు 17 రోజులకు పిచికారీ చేయాలి లేదా నారు తీయటానికి 7 రోజుల ముందు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. కార్బోఫ్యూరాన్ గుళికలు ఇసుకలో కలిపి పలుచగా నీరు ఉంచి వేయాలి.
- ❖ మండె కట్టిన తర్వాత ముక్కు పగిలిన విత్తనాలను నారుమడిలో సమానముగా పలుచటి నీటి పొర ఉంచి విత్తుకోవాలి. మరుసటి రోజు నారు మడిలో నీటిని మొత్తము తీసివేయాలి.

నాట్లకు అనుకూల సమయం

ప్రాంతం	ఖరీఫ్ (సార్వా)	రబీ (దాళ్వా)	ఎడగారు
కృష్ణా–గోదావరి	జూలై–ఆగష్టు	డిసెంబరు	–
ఉత్తర కోస్తా	ఆగష్టు	నవంబరు	–
దక్షిణ మండలం	సెప్టెంబరు	నవంబరు	ఏప్రిల్–మే
అత్యల్ప వర్షపాత మండలం	జూలై–ఆగష్టు	డిసెంబరు	–
ఉన్నత శ్రేణి మండలం	మే 15 నుండి	డిసెంబరు	–

నాట్లు వేయటానికి పొలాన్ని తయారు చేయటం : నాట్లు వేయటానికి 15 రోజుల ముందే పొలాన్ని దమ్ము చేయుట ప్రారంభించి 2–3 దఫాలుగా మురగ దమ్ము చేయాలి. పొలమంతా సమానంగా దమ్ము చెక్కతో గాని, అడ్డతోగాని చదును చేయాలి. రేగడి భూముల్లో నాట్లు వేయటానికి 2 రోజుల ముందుగానే దమ్ము పూర్తి చేసి, ఆ తర్వాతనే నాట్లు వేస్తే మంచిది.

నాట్లు : నారు తీసేటప్పుడు మొక్కలు లేతాకుపచ్చగా వుంటేనే మూన త్వరగా తిరుగుతుంది. నాలుగు నుండి ఆరు ఆకులున్న నారును ఉపయోగించాలి. ముదురు ఆకును నాటితే దిగుబడి తగ్గుతుంది. నాటు పైపైన నాటితే పిలకలు ఎక్కువగా తొడిగే అవకాశముంది. నాట్లు వేసేటప్పుడు భూసారాన్ని అనుసరించి ఖరీఫ్‌లో చ।మీ।। కు 33 కుదుళ్ళు, రబీలో 44 కుదుళ్ళు, ఎడగారులో 66 కుదుళ్ళు ఉండేలా చూడాలి. అంతేకాకుండా ఆలస్యంగా ముదురు నారు వేసేటప్పుడు చ।। మీ।। కు 44 మూనలు తగ్గకుండా నాటుకోవాలి. బాగా మెత్తగా/బరువైన నేలల్లో దమ్ము చేసిన 2–10 రోజులలోపు నాట్లు వేయుట ముగించాలి. నాటిన తర్వాత ప్రతి రెండు మీటర్లకు 20 సెం.మీ. బాటలు తీయటం వలన పైరుకు గాలి, వెలుతురు బాగా సోకి చీడపీడల ఉధృతి కొంతవరకు అదుపు చేయవచ్చు. ఎరువులు, పురుగు మందులు, కలుపు మందులు వేయటానికి ఇంకా పైరు పరిస్థితిని గమనించటానికి ఈ బాటలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. వరి రకాల కాలపరిమితిని బట్టి కుదుళ్ళ సంఖ్యను నిర్ధారించాలి.

వరి రకాల కాల పరిమితిని బట్టి కుదుళ్ళ సంఖ్య

కాల పరిమితి	ఖరీఫ్		రబీ	
	నాటవలసిన దూరం	చ।। మీటరుకు ఉండవలసిన కుదుళ్ళు	నాటవలసిన దూరం	చ।। మీటరుకు ఉండవలసిన కుదుళ్ళు
దీర్ఘకాలిక రకాలు (140 రోజులు పైబడిన)	20×15 సెం.మీ.	33	–	–
మధ్యకాలిక రకాలు (125–140 రోజులు)	20×15 సెం.మీ.	33	15×15	44
స్వల్పకాలిక రకాలు (125 రోజుల లోపు)	20×15 సెం.మీ.	33	15×15	44
ఎడగారులో	15×10 సెం.మీ.	66	–	–
యాంత్రీకరణ వరిలో	30×10 సెం.మీ.	33	–	–

భూసారం ఎక్కువ ఉన్న పొలాల్లో తక్కువ కుదుళ్ళు, భూసారం తక్కువగా ఉన్న పొలాల్లో ఎక్కువ కుదుళ్ళు ఉండేట్లు నాటాలి. ముదురు నారు నాటినప్పుడు కుదుళ్ళ సంఖ్యను పెంచి, కుదురుకు 4, 5 మొక్కల చొప్పున నాటు వేయాలి.

సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం

- ❖ భూసార పరిరక్షణకు, ఉత్పత్తి స్థిరత్వతను అధిగమించడానికి రసాయనిక ఎరువులతోపాటు సేంద్రీయ లేదా జీవన ఎరువులను వాడి, పైరుకు సమతుల్యంగా పోషక పదార్థాలను అందజేయాలి.

- పశువుల ఎరువు, కంపోస్టు, కోళ్ళ ఎరువు వంటి సేంద్రీయ ఎరువులను వాటిలో ఉన్న నత్రజని శాతము ఆధారముగా లెక్క గట్టి సిఫారసు చేసిన ఎరువుల మోతాదులో 20-25 శాతము వరకు రసాయనిక ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేసుకోవచ్చును.
- వరి మాగాణుల్లో అపరాలు, జీలుగ, జనుము, పిల్లిపెసర వంటి పచ్చి రొట్ట పైరులను వాటిలో ఉన్న నత్రజని శాతము ఆధారముగా లెక్కగట్టి సిఫారసు చేసిన ఎరువుల మోతాదులో 20-25 శాతము వరకు రసాయనిక ఎరువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేసుకోవచ్చును.
- సజీవ ఎరువులైన నీలి పచ్చనాచు, అజోల్లా, అజోస్పైరిల్లమ్, ఫాస్ఫోబాక్టీరియా మొదలగు జీవన ఎరువులను వాడి నత్రజని, భాస్వర మోతాదులను 10-20 శాతం తగ్గించవచ్చు.
- నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు, నాచు - వీటిని వరి పొలంలో వేస్తే ఎకరాకు 10 కిలోల నత్రజని పైరుకు అందుతుంది. నాచు నేలలో కలిసి సేంద్రీయ ఎరువుగా పని చేస్తుంది. నాచును పొడిచేసి వరినాట్లు వేసిన 7-10 రోజుల మధ్య మడిలో పలచగా నీరు నిలువగట్టి ఎకరాకు 4 కిలోల నాచుపొడిని ఇసుకతో కలిపి మడి అంతా సమానంగా పడేటట్లు చల్లాలి.
- అజొల్లా : వరి పొలం దమ్ములో ఎకరాకు 50 కిలోల సింగిల్ సూపర్‌ఫాస్ఫేట్‌ను వేసి పలుచగా నీరు నిలువగట్టి 100-150 కిలోల అజొల్లా వేసి 2 నుంచి 3 వారాలు పెరగనిచ్చి నేలలో కలియదున్నాలి. అలా చేయడం వలన ఎకరాకు 3 టన్నుల పచ్చిరొట్ట మరియు 12 కిలోల నత్రజనిని నేలకు చేరవేస్తుంది.
- అజటోబాక్టర్ : ఎకరాకు సరిపడే విత్తనానికి 200-400 గ్రా.ల కల్చరును పట్టించాలి. లేదా 1 కిలో కల్చరును 20 కిలోల పశువుల ఎరువుతో కలిపి ఎకరం నేలపై చల్లాలి. దీని వలన ఎకరాకు 8-16 కిలోల నత్రజని పైరుకు అందుతుంది.
- అజోస్పైరిల్లమ్ : దీన్ని కూడా అజటోబాక్టర్ వలే వాడాలి.
- ఫాస్ఫోబాక్టీరియా : ఇది భాస్వరపు జీవన ఎరువు. భూమిలో లభ్యం కాని స్థితిలో ఉన్న భాస్వరాన్ని లభ్యమయ్యేలా చేస్తుంది. ఎకరాకు సరిపడే విత్తనంతో 200-400 గ్రా.ల కల్చర్‌ను పట్టించాలి లేదా 1 కిలో కల్చరును 20 కిలోల పశువుల ఎరువుతో కలిపి ఎకరం నేలలో వేయాలి.
- ద్రవ జీవన ఎరువులైన అజోస్పెరిల్లమ్ 500 మి.లీ. / ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియం 500 మి.లీ. / పొటాషియం సాల్యుబులైజింగ్ బ్యాక్టీరియా 500 మి.లీ. / సూడోమోనాస్ 500 మి.లీ. ను ఒక ఎకరానికి 20 కిలోల ఇసుక లేదా 100 కిలోల పశువుల ఎరువు లేదా 20 కిలోల వానపాముల ఎరువుతో దమ్ము చేసిన పొలంలో లేదా ఊడ్చిన 7-10 రోజులకు మరియు 30 రోజులకు వేసుకొనవచ్చు.

జీవన ఎరువులు దొరికే స్థలాల వివరాలు

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మైక్రో బయాలజీ), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అమరావతి – 522 020, గుంటూరు జిల్లా, ఫోన్ నెం. 08645 – 255345.

❖ భూసారాన్ని బట్టి రసాయనిక ఎరువుల మోతాదు నిర్ణయించి నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్, జింకు నిచ్చే ఎరువులను సమతుల్యంగా వాడాలి. వివిధ ప్రాంతాలకు సిఫారసు చేసిన ఎరువుల మోతాదు వివరాలు పట్టికలో సూచింపబడ్డాయి.

వివిధ వ్యవసాయ మండలాల్లో సిఫారసు చేసిన పోషకాల మోతాదు (కిలోలు / ఎకరాకు)

వ్యవసాయ వాతావరణ మండలం	ఖరీఫ్			రబీ		
	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్
గోదావరి (గోదావరి డెల్టా) మండలం	36	24	24	72	36	24
కృష్ణా డెల్టా మరియు తేలిక భూములకు	32–36	24	16–24	72	36	24
ఉత్తర కోస్తా మండలం	32	24	16–20	48	24	20
దక్షిణ మండలం	32	24	16	48	24	16
తక్కువ వర్షపాత మండలం	96	32	32	96	32	32
ఎత్తైన ప్రదేశాల మండలం	32	24	20	48	24	20

పై పట్టికలో సిఫారసు చేసిన పోషకాల మోతాదు, రకాల కాల పరిమితి, నేల స్వభావం, భూసారం, ఋతువు, మొక్కల సాంద్రత మరియు యాజమాన్య పద్ధతులను బట్టి మారుతుంది.

❖ నత్రజనిని కాంప్లెక్సు ఎరువుల రూపంలోగాని, యూరియా రూపంలో గాని వాడవచ్చు.

❖ నత్రజనిని మూడు సమభాగాలుగా చేసి నాటుకు ముందు దమ్ములోను, దుబ్బుచేసే దశలోను, అంకురం దశలోను బురదపదునులో మాత్రమే సమానంగా వెదజల్లి 36–48 గంటల తర్వాత పలుచగా నీరు పెట్టాలి.

❖ 50 కిలోల యూరియాకి 10 కిలోల వేపపిండి లేక 250 కిలోల తేమ కలిగిన మట్టిగాని కలిపి, 2 రోజులు నిల్వ ఉంచి వెదజల్లితే నత్రజని వినియోగం పెరుగుతుంది.

❖ మొత్తం భాస్వరం ఎరువును దమ్ములోనే వేయాలి.

- ❖ పొటాష్ ఎరువులను రేగడి నేలల్లో ఆఖరి దమ్ములో పూర్తిగా ఒకేసారి వేయాలి. చల్కా (తేలిక) భూముల్లో ఆఖరి దమ్ములో సగం, అంకురం ఏర్పడే దశలో మిగతా సగాన్ని వేయాలి.
- ❖ కాంప్లెక్సు ఎరువులను పైపాటుగా దుబ్బుచేసే సమయంలోగాని, అంకురం ఏర్పడే దశలోగాని వేయకూడదు. దమ్ములోనే వేయటం మంచిది.
- ❖ ముదురు నారు నాటుకునేటప్పుడు నత్రజని ఎరువును 25 శాతం పెంచటమేకాకుండా నత్రజనిని మూడు దఫాలుగా కాకుండా రెండు దఫాలుగా చేసి, 2/3 వంతు నాటుటకు ముందు దమ్ములోను మిగిలిన 1/3 వంతు అంకుర దశలో వేసుకోవాలి.
- ❖ ముదురు నారు వేసుకున్న ప్రాంతాలలో తల్లి కర్ర ముందుగా ఈని పిల్ల కర్రలు ఆలస్యం అవుతున్న నేపధ్యంలో ఎకరా పొలానికి యూరియా 20-25 కిలోలు మరియు మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ 15-20 కిలోలు బూస్టర్ డోస్‌గా వేసుకోవాలి.

జింకులోప లక్షణాలు : పై నుంచి 3 లేదా 4 ఆకుల్లో మధ్య ఈనె పాలి పోతుంది. నాటిన 2 నుంచి 4 లేదా 6 వారాల్లో ముదురాకు చివర్లలో, మధ్య ఈనెకు ఇరుప్రక్కల తుప్పు లేక ఇటుక రంగు మచ్చలు కనబడతాయి. ఆకులు చిన్నవిగా, పెళుసుగా ఉండి వంచగానే శబ్ధం చేస్తూ విరిగిపోతాయి. మొక్కలు గిడసబారి దుబ్బు చేయవు. నత్రజని ఎరువులు వేసినప్పటికి పైరు పచ్చబడదు. చలి విపరీతంగా ఉండే దాళ్వా వరిలో సార్వా వరి కంటే ఎక్కువ జింకు ధాతులోపం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

సవరణ : ఒకే వరి పంట పండించే భూముల్లో ప్రతి మూడు పైర్లకు ఒకసారి, రెండు పంటలు పండించేట్లయితే ప్రతి రబీ సీజన్‌లో, ఆఖరి దమ్ములో ఎకరాకు 20 కిలోల జింకు సల్ఫేటు వేయాలి లేదా పైరుపై జింకులోపం కన్పించగానే లీటరు నీటికి 2 గ్రా. జింకు సల్ఫేటు కలిపి 5 రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

గమనిక : భాస్వరం ఎరువుతో జింకు సల్ఫేటును కలిపి వేయరాదు. కనీసం 3 రోజుల వ్యవధి ఉండాలి. కలిపివేస్తే రసాయనిక చర్యవల్ల ఫలితం ఉండదు. జింకు సల్ఫేటు ద్రావణంలో పురుగు / తెగుళ్ళ మందులను కలుపరాదు.

ఇనుము లోప లక్షణాలు : లేత చిగురాకులు తెల్లగా మారి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇటుకరంగు మచ్చలు వచ్చి ఆకులు నిర్జీవమవుతాయి. పిలకలు తగ్గి, ఎత్తు పెరగదు. వర్షాధార నారుమళ్ళలో, మెట్ట వరిలో ఈ లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

సవరణ : దంప నారుమళ్ళు పోస్తే ఈ సమస్య రాదు. లీటరు నీటికి 20 గ్రా. అన్నభేది, 2 గ్రా. నిమ్మ ఉప్పు కలిపి పిచికారి చేయాలి. పగటి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ గాఢత కలిగిన ద్రావణాన్ని (0.5 – 1.0 శాతం) వాడాలి.

మాంగనీసు లోప లక్షణాలు : ఇది నారుమడి దశ నుండి కనిపిస్తుంది. లేత ఆకుల ఈనెల మధ్య భాగాలు

ఆకుపచ్చదనం కోల్పోయి, ఈనెలు మాత్రం ముదురు ఆకు పచ్చరంగులో ఉంటాయి. అందువలన ప్రక్క ప్రక్కన ఆకుపచ్చ– పసుపు పచ్చ చారలుగా కనబడతాయి.

సవరణ : లీటరు నీటికి 2 గ్రా॥ మాంగనీసు సల్ఫేటును కలిపి, 4–5 రోజుల వ్యవధిలో 2–3 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

కలుపు యాజమాన్యం : మెట్ట నారుమళ్ళలో విత్తిన 1–2 రోజులలోపు : పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి., 5 మి.లీ. / లీటరు (1000 మి.లీ. / ఎకరం) లేదా పెండిమిథాలిన్ 38.7% సి.ఎస్. 3.5 మి.లీ. / లీటరు (700 మి.లీ./ ఎకరం) లేదా ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. 2.0 మి.లీ./ లీటరు (400 మి.లీ. / ఎకరం).

దంప నారుమళ్ళలో విత్తిన 3–5 రోజులలోపు : పైరజోసల్ఫ్యురాన్–ఇథైల్ 10% డబ్ల్యు.పి. 80 గ్రా. / ఎకరం లేదా ప్రెటిలాక్లోర్ + సేఫ్‌నేర్ 400 మి.లీ. / ఎకరానికి 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో కలిపి చల్లాలి.

విత్తిన 15–20 రోజులకు గడ్డి మరియు వెడల్పాకు : బిస్పైరిబాక్ సోడియం 10% ఎస్.ఎల్. 100 మి.లీ. / ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మాగాణి వరిలో రసాయనాలతో కలుపు యాజమాన్యం :

నాట్లు వేసిన 3–5 రోజులలోపు పొలంలో పలుచగా నీరు పెట్టి 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో ఎకరాకు 80 గ్రా. పైరజోసల్ఫ్యురాన్ – ఇథైల్ 10% పొడి మందు లేదా 1.0–1.25 లీటర్ల బుటాక్లోర్ 50% ఇ.సి. లేదా 400 మి.లీ. ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. కలిపి పొలంలో సమానంగా వెదజల్లాలి. గడ్డి, తుంగ, వెడల్పాటి ఆకులున్న కలుపు మొక్కలు సమస్యగా ఉంటే నాటిన 3–5 రోజుల లోపు పొలంలో పలుచగా నీరు పెట్టి 20 కిలోల ఇసుకలో నాలుగు కిలోల బెన్‌సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ 0.6% + ప్రెటిలాక్లోర్ 6.0% గుళికలు ఎకరం పొలంలో సమానంగా పడేలా వెదజల్లుకోవాలి.

మాగాణి వరిలో నాటిన 20 రోజులకు వాడదగిన కలుపు మందులు : గడ్డిజాతి కలుపు నివారణకు సైహలోఫాప్ పి బుటైల్ 10% ద్రావకం 400 మి.లీ. / ఎకరాకి వెడల్పాకు మరియు గడ్డి జాతి కలుపు ఎక్కువగా ఉంటే బిస్పైరిబాక్ సోడియం 10% ఎస్.ఎల్. ద్రావకం 100 మి.లీ. చొప్పున లేదా ట్రైపోమోన్ + ఇథాక్సీ సల్ఫ్యురాన్ 30% డబ్ల్యు.జి. 90 గ్రా. / ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఊడ్చిన 20 రోజులకు పుల్ల విరుపు గడ్డి మరియు ఉర్రంకి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఫెనోక్సాప్రోప్ పి ఇథైల్ 6.9 ఇ.సి. 350 మి.లీ. / ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వరిలో వాడదగ్గ కలుపు మందులు, మోతాదు మరియు వాడవలసిన సమయము :

సం.	రసాయన నామము	మోతాదు / ఎకరాకు	వాడవలసిన సమయము
1.	పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి.	1000 మి.లీ.	విత్తిన వెంటనే (దుక్కి దున్ని వెదపద్ధతి)
2.	పెండిమిథాలిన్ 38.7% సి.యస్.	700 మి.లీ.	విత్తిన వెంటనే (దుక్కి దున్ని వెదపద్ధతి)
3.	బుటాక్లోర్ 50% ఇ.సి.	1-1.5 లీ.	నాటిన 3-5 రోజులకు
4.	ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి.	500 మి.లీ.	నాటిన / విత్తిన 3-5 రోజులకు
5.	బెన్‌సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + ప్రెటిలాక్లోర్	4 కిలోలు	నాటిన 3-5 రోజులకు
6.	పైరజోసల్ఫ్యురాన్ ఇథైల్ 10% డబ్ల్యు.పి.	80-100 గ్రా.	విత్తిన 3-7 రోజుల వరకు (దమ్ము చేసి వెదజల్లు పద్ధతి)
7.	సైహలోఫాప్ పి బుటైల్ 10% ఇ.సి.	250-300 మి.లీ.	నాటిన లేదా విత్తిన 20 రోజులకు
8.	ఫినాక్సీప్రాప్ పి ఇథైల్ 9% ఇ.సి.	200-250 మి.లీ.	నాటిన లేదా విత్తిన 20 రోజులకు
9.	బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% ఎస్.సి.	80-120 మి.లీ.	నాటిన లేదా విత్తిన 20 రోజులకు
10.	మెట్‌సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 20%	8 గ్రా.	నాటిన లేదా విత్తిన 20 రోజులకు
11.	2,4 డి సోడియం సాల్ట్ 80% డబ్ల్యు.పి.	400 గ్రా.	25-30 రోజులకు (వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలకు)
12.	2,4 డి అమైనోసాల్ట్ 58% యస్.యల్.	400 మి.లీ.	25-30 రోజులకు (వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలకు)

నాటిన 25-30 రోజుల మధ్య వాడదగిన కలుపు మందులు : మాగాణి వరిలో వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలున్నట్లయితే నాటిన 25-30 రోజులలోపు ఎకరానికి 400 గ్రా. 2,4 డి సోడియం సాల్ట్ 80% పొడి లేదా 2,4 డి అమైన్ సాల్ట్ 58% ఇ.సి. 400 మి.లీ. లేదా ఇథాక్సీసల్ఫ్యురాన్ 15% డబ్ల్యు.పి. 50 గ్రా. లేదా మెట్‌సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + క్లోరోమ్యురాన్ ఇథైల్ 8.0 గ్రా. మందును ఒక ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

నీటియాజమాన్యం : నాట్లు వేసేటప్పుడు నీరు పలుచగా ఉండాలి. ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటే ఊడ్చిన వెంటనే 5 సెం.మీ. వరకు నీరు నిలవగట్టాలి. మూన తిరిగిన రోజు నుండి పైరు దుబ్బు చేయటం పూర్తి అయ్యేవరకు పొలంలో పలుచగా అంటే 2-3 సెం.మీ. నీరుండాలి. నీరు ఎక్కువగా ఉంటే పైరు బాగా దుబ్బు చేయదు. చిరుపొట్ట దశనుండి గింజ గట్టి పడేవరకు 5 సెం.మీ. లోతు వరకు నీరుండాలి. కోతకు 10 రోజుల ముందుగా నీటిని నెమ్మదిగా తగ్గించి ఆరబెట్టాలి. కలుపు మందు గాని, ఎరువులు గాని వేసేటప్పుడు నీరు పలుచగా ఉండాలి. ఎరువులు వేసిన తర్వాత నీరు బయటకు పోకుండా 24 గంటలు నిలువరించినచో ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

పిలకల దశలో ఒకసారి చేను ఆరకడితే వేరు వ్యవస్థకు గాలి సోకి దిగుబడి పెరగడమే కాక గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారం తగ్గడం ద్వారా కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించవచ్చును.

వరికోత : వెన్నులోని 80 శాతం గింజలు పక్వానికి వచ్చిన తర్వాత, కాండం పచ్చగా ఉన్నప్పుడే కోత కోయటం మంచిది. కోతకు పూత దశ నుండి సుమారు 28–32 రోజుల వ్యవధి తీసుకొంటుంది. ఈ దశలో గింజల్లో సుమారు 18–24 శాతం తేమ ఉంటుంది.

ముఖ్య గమనిక : దాళ్వా / రబీ పంటగా కాటన్‌దొర సన్నాలు (యం.టి.యు. 1010) ఎంపిక చేసినచో, తప్పనిసరిగా 20–25 రోజుల నారుతోనే వరినాట్లు పూర్తి చేయాలి. ఆలస్యంగా 35–40 రోజుల నారుతో నాట్లు వేసినచో, నాటిన 20–25 రోజులకే తల్లి కర్ర (పిలకలు వేయకుండానే) పుష్పించి వెన్నులు చిన్నవిగా వచ్చి దిగుబడులు తగ్గుతాయి. అలాగే సకాలంలో అన్ని చర్యలు పాటించినను వరి కోత దశలో ఈ రకం పొలంలో గింజ రాలుట ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గింజ కట్టే దశలో రాత్రిపూట చలి, మంచు ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఇలా జరుగుతుంది. అందువలన వరి కోతకు ఒక వారం ముందుగానే చేనును (నేల తడి) ఆరగట్టుట మరియు చేనుపై మంచు కూడా పూర్తిగా ఆరనిచ్చినచో వరికోత సమయంలో గింజ రాలుట కొంతవరకు అరికట్టవచ్చు లేదా వరి కోతకు వరికోత యంత్రాన్ని వాడిన యెడల కూడ గింజరాలటాన్ని అరికట్టవచ్చును.

దమ్ము చేసిన పొలంలో వరిని నేరుగా విత్తే పద్ధతి : ఇటీవల కాలంలో వరి సాగు ఖర్చు బాగా పెరిగింది. కూలీలపై ఖర్చు పెరగడం, కూలీలు సకాలంలో లభ్యం కావడం కష్టంగా మారింది. తరచుగా వచ్చే వర్షాభావ పరిస్థితుల వలన సకాలంలో వరి నాట్లు వేయలేకపోతున్నారు. కొన్ని పరిస్థితులలో సకాలంలో నీరందక ముదురు నారు నాటుట లేదా నారు దెబ్బతినడం వల్ల నాట్లు సకాలంలో పడక దిగుబడులు తగ్గడం గమనిస్తున్నాం. ఇలాంటి పరిస్థితులలో సాగు ఖర్చు తగ్గించుకొని, కూలీల సమస్యను అధిగమిస్తూ సాంప్రదాయకంగా నారు పెంచి నాటేదానికి ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతిని ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం క్షేత్ర స్థాయిలో రైతుల పొలాలలో ఆచరణలోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ సాగు వలన కలుగు ఉపయోగములు క్రింద వివరించడమైనది.

1. విత్తనం ఎకరానికి 15–18 కిలోలు ఆదా అవుతుంది.
2. పంట 7–10 రోజుల ముందుగా కోతకు వస్తుంది.
3. నారు పెంపకం, నారు పీకడం, నాట్లు వేసే పని ఉండదు కాబట్టి సాగు ఖర్చు ఎకరానికి రూ. 2500/– నుండి రూ. 3000/– వరకు తగ్గుతుంది.
4. మొక్కల సాంద్రత సరిపడా వుండటం వలన దిగుబడి 10–15 శాతం వరకు పెరుగుతుంది.
5. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణం విత్తుకోవచ్చు.
6. కూలీల కొరతను అధిగమించవచ్చు. కూలీలపై ఆధారపడడం తగ్గుతుంది.
7. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో పంటకాలం కోల్పోకుండా నీరు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే వరి సాగు చేసుకునే అవకాశముంది.
8. ఈ పద్ధతి సార్వా కంటే దాళ్వాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

నేరుగా విత్తే పద్ధతిలో మెళకువలు

1. **నేలలు :** సమస్యాత్మక నేలలు (చౌడు / క్షారము / ఆమ్లము) తప్ప సాధారణంగా వరిని సాగుచేసే అన్ని నేలలు అనుకూలం. ముంపుకు గురయ్యే భూములు సాగుకు అనుకూలం కాదు.
2. **విత్తన మోతాదు :** రకాన్ని బట్టి ఎకరాకు 12–15 కిలోలు అవసరమవుతాయి. కాండం గట్టిగా వుండి వేరు వ్యవస్థ దృఢంగా వుండి పడిపోని రకాలు మిక్కిలి అనుకూలం. ఆయా ప్రాంతానికి అనువైన, రైతుకు ఇష్టమైన ఏ రకమైనా ఈ పద్ధతిలో సాగు చేసుకోవచ్చును.

3. **విత్తనాన్ని మండె కట్టడం :** విత్తనాలను 24 గంటలు నానబెట్టి, నానిన విత్తనాలను గోనె సంచిలో వేసి కాని లేదా గోనె సంచి కప్పిగానీ 24 గంటల పాటు వుంచాలి. 24 గంటల తర్వాత చూస్తే విత్తనాల ముక్కు పగిలి తెల్లగా మోసు వస్తుంది. రబీ పంట కాలంలో ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి 36 గంటలు మండె కట్టాలి. డ్రమ్ సీడర్ పద్ధతిలో గింజలకు ముక్కు పగిలి తెల్లపూస వస్తే సరిపోతుంది. మొలక పొడుగ్గా రాకుండా రైతులు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

4. **ప్రధాన పొలం తయారీ :** సాధారణ పద్ధతిలో వరి నాటేటప్పుడు భూమిని తయారు చేసినట్లుగానే ఈ పద్ధతిలో కూడా తయారు చేయాలి. పొలంలో నీరు నిలువ ఉండకూడదు కాబట్టి నీరు ఎక్కువైతే బయటికి పోవటానికి ఏర్పాట్లు చేయాలి. వీలైనంత బాగా చదును చేసుకోవాలి. పెద్దగా వున్న పొలాలను చిన్న మడులుగా విభజించుకుంటే చదును చేయడానికి, నీరు పెట్టడానికి విత్తనం చల్లడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంక నేలల్లో చివరి దమ్ము చేసి, చదును చేసిన మరుసటి రోజు విత్తుకోవచ్చు. విత్తే సమయానికి నీరు లేకుండా బురదగా వుంటే చాలు. ఇసుక శాతం ఎక్కువ వున్న నేలలో విత్తాలనుకున్న రోజే ఆఖరి దమ్ముచేసి, చదునుచేసి పలుచటి నీటి పొర వుండేటట్లు చూసుకోవాలి. మండెకట్టి మొలకవచ్చిన విత్తనాలను వెదజల్లిగాని, డ్రమ్ సీడర్‌తోగాని విత్తుకోవాలి.

5. **వెదజల్లే పద్ధతి :** దమ్ము చేసి చదును చేసిన పొలంలో మండె కట్టిన విత్తనాన్ని పొలమంతా సమంగా పల్చటి నీటి పొరనుంచి వెదజల్లాలి. డ్రమ్ సీడర్ పరికరానికి 4 ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములుంటాయి. ప్రతి డ్రమ్ముకు 20 సెం.మీ. దూరంలో రెండు చివర్ల వరుసకు 18 రంధ్రాలు వుంటాయి. ఈ డ్రమ్ములో మొలకెత్తిన విత్తనాలను నింపి మూత బిగించాలి. గింజలు రాలడానికి వీలుగా ప్రతి డ్రమ్‌లో కేవలం 3/4 వంతు మాత్రమే గింజలను నింపాలి. గింజలు నింపిన డ్రమ్‌సీడర్ లాగితే 8 వరుసల్లో వరుసకు వరుసకు మధ్య 20 సెం.మీ. దూరంలో గింజలు పడతాయి. వరుసల్లో కుదురుకు కుదురుకు మధ్య దూరం 5–8 సెం.మీ. వుంటుంది. ఒక్కో కుదురులో 5–8 గింజలు రాలడం జరుగుతుంది. కొన్ని అనివార్య కారణాలవల్ల (మొలక సరిగ్గా లేకనో లేక పక్షులు తినివేయడంవల్లో) కుదురులోని గింజలు 50 శాతం దెబ్బతిన్నా మిగిలిన 50 శాతం గింజల నుండి వచ్చిన మొక్కల సాంద్రత సరిపోతుంది. రకాన్ని బట్టి గింజలు రాలడాన్ని బట్టి రంధ్రాలను స్టాపర్స్‌తో మూసుకోవాలి. సన్నగింజ రకాలకు రంధ్రం వదిలి రంధ్రం మూసేయాలి. ప్రతి 16 వరుసలకు అడుగు వెడల్పు కాలిబాటలు ఉంచుకోవాలి. తాడు వాడి డ్రమ్ లాగితే వరుసలు బాగా వస్తాయి. కోనోవీడర్ తిప్పడానికి వీలుగా ఉంటుంది.

6. **విత్తడానికి అవసరమయ్యే కూలీలు :** ఈ పద్ధతిలో ఒక ఎకరా విత్తడానికి కేవలం ఇద్దరు కూలీలు సరిపోతారు. డ్రమ్ సీడర్ లాగడానికి ఒక మనిషి, గింజలు నింపడానికి, తాడు మార్చడానికి ఇంకొక మనిషి అవసరమవుతారు.

7. **విత్తడానికి పట్టే సమయం :** ఒక ఎకరా విత్తడానికి సాధారణంగా 120 నిమిషాలు (2 గంటలు) సరిపోతుంది. ఒకరోజులో ఒక యూనిట్‌తో 3 ఎకరాల వరకు విత్తుకోవచ్చు.

8. **ఎరువుల యాజమాన్యం :** ఈ పద్ధతిలో కూడా సాధారణ పద్ధతిలో సిఫారసు చేసిన ఎరువుల మోతాదు సరిపోతుంది. కాకపోతే దమ్ములో నత్రజని ఎరువులు వేయకుండా కేవలం భాస్వరం ఎరువు (మొత్తం మోతాదు) మరియు పొటాష్ ఎరువు (సిఫారసు చేసిన మోతాదులో సగం) మాత్రమే వేయాలి. దమ్ములో కానీ, విత్తేటప్పుడు కానీ నత్రజనిని వేస్తే కలుపు ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో నత్రజనినిచ్చే ఎరువులను వేయకూడదు. నత్రజని ఎరువులను 3 భాగాలుగా చేసి 1/3 భాగం విత్తిన 15–20 రోజులకు,

1/3 భాగం విత్తిన 40–45 రోజులకు మరియు మిగిలిన 1/3 భాగం నత్రజని, సగం పొటాష్ విత్తిన 60–65 రోజులకు వేయాలి.

9. కలుపు యాజమాన్యం : పంట తొలి దశలో నీరు నిలగట్టక ఆరుతడిగా సాగు చేయడం వలన కలుపు సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ పద్ధతిలో కలుపు మందును తప్పనిసరిగా వాడాలి.

దమ్ము చేసి నేరుగా విత్తిన వరిలో వాడదగిన కలుపు మందులు :

- పైరజో సల్ఫ్యురాన్ ఇథైల్ 10% పొడి మందు 100 గ్రా. / ఎకరానికి లేదా ప్రెటిలాక్లోర్ + సేఫ్‌నర్ 50% ఇ.సి. 600 మి.లీ. / ఎకరానికి లేదా నాలుగు కిలోల బెన్ సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + ప్రెటిలాక్లోర్ 6.6% జి. గుళికలు 20 కిలోల ఇసుక కలిపి విత్తనం వెదచల్లిన లేదా డ్రమ్ సీడర్‌తో విత్తిన 3–7 రోజుల లోపల ఒక ఎకరం పొలంలో సమానంగా చల్లాలి.
- మాగాణి వరిలో 20 రోజులకు వాడే కలుపు మందులను దమ్ము చేసి నేరుగా విత్తిన వరిలో కూడా ఉపయోగించవచ్చును.

నేరుగా విత్తే వెద వరి సాగులో కలుపు నివారణ :

- ఈ పద్ధతిలో పంట మరియు కలుపు విత్తనాలు ఒకేసారి మొలకెత్తడం, ఆరుతడి పద్ధతిలో నీరు కడతాము కాబట్టి కలుపు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక తప్పని సరిగా రసాయన కలుపు మందులు వాడుకోవాలి. ఎద వరి విత్తుటకు 10–15 రోజులకు మందు పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ద్రావకాన్ని 5 మి.లీ. + 10 గ్రా. యూరియా లేదా 4 మి.లీ. గ్లూఫోసినేట్ అమ్మోనియం 13.5% యస్.యల్. లీటరు నీటికి కలిపి పంట వేయక ముందు కలుపు మొక్కలపై పిచికారి చేయడం వలన కలుపు మొక్కల ఉధృతి తగ్గించుకొనవచ్చు. వెద వరి విత్తిన వెంటనే పెండిమిథాలిన్ 38.7% సి.యస్. 700 మి.లీ. లేదా పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి. 1000 మి.లీ. / ఎకరానికి భూమిలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేయాలి.
- మాగాణి వరిలో 20 రోజులకు వాడే కలుపు మందులను వెద వరిలో కూడా ఉపయోగించవచ్చును. కలుపు మందుల పనితీరు బాగా ఉండాలంటే కలుపు మొక్కలు లేత దశలో ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేయాలి.

ఈవిధంగా రైతు సోదరులు సరైన సమయంలో సిఫారసు చేసిన రసాయన కలుపు మందును ఎంపిక చేసుకొని నివారణ చర్యలు చేపట్టడం వల్ల వరిలో మేలైన దిగుబడులు సాధించవచ్చు.

10. నీటి యాజమాన్యం : విత్తనం వేసినప్పటి నుండి పొట్ట దశ వరకు పొలంలో నీరు నిల్వ వుండకుండా కేవలం బురదగా మాత్రమే ఉంచాలి. ఎక్కువైన నీరు బయటకు పోవడానికి కాలువలు ఏర్పాటు చేయాలి. దీనివలన వేర్లు ఆరోగ్యవంతంగా పెరిగి మొక్కలు ఎక్కువ పిలకలు పెడతాయి. పైరు పొట్టదశ నుండి పంట కోసే వారం, పది రోజుల ముందు వరకు 2 సెం.మీ. నీరు నిల్వ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

11. పురుగుల మరియు తెగుళ్ళ యాజమాన్యం : సాధారణ వరి సాగుతో పోల్చుకుంటే డ్రమ్ సీడర్ పద్ధతిలో పురుగులు మరియు తెగుళ్ళ తాకిడి తక్కువగా ఉంటుంది. వరుసలలో నాటడం లేదా నాటే యంత్రం ఉపయోగించడం వలన మొక్కలకు గాలి, వెలుతురు బాగా ప్రసరించి మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. చీడపీడల నివారణకు సాధారణ వరిసాగు మాదిరిగానే సస్యరక్షణ చేపట్టాలి.

12. పంటకోత : సాధారణ పద్ధతిలో పోలిస్తే డ్రమ్‌సీడర్ పద్ధతిలో సాగు చేస్తే ఏ రకమైనా వారం నుండి పది రోజుల ముందే కోతకొస్తుంది. మామూలు పద్ధతిలో పోలిస్తే ఈ పద్ధతిలో 10 నుంచి 15 శాతం అధిక దిగుబడి వస్తుంది. రైతుకు సాధారణ దిగుబడి వచ్చినా రైతుకు ఈ పద్ధతిలో నారుమడి పెంపకం, నారు

పీకడం, నాట్లు వేసే పనులపై ఖర్చు తగ్గుతుంది. కాబట్టి అధిక నికర ఆదాయం వస్తుంది. కావున రైతులు డ్రమ్‌సీడర్ ద్వారా విత్తి, వరికోత యంత్రం ఉపయోగించి పంటను సాగు చేసినట్లయితే వరిసాగులో బాగా ఖర్చు తగ్గి అధిక నికర ఆదాయం పొందవచ్చును.

సమగ్ర సస్యరక్షణ

పురుగులు / తెగుళ్ళకు

- వేసవి దుక్కి చేయడం ద్వారా భూమి ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్ళను (పాము పొడ తెగులు, కాండంకుళ్ళు తెగులు), కీటకాలను నియంత్రించవచ్చు.
- నిరోధక శక్తి గల రకాలను (పట్టిక 4) ఎంచుకోవాలి.
- ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్న పంట నుండి విత్తనాన్ని సేకరించాలి.
- విత్తనశుద్ధి తప్పక పాటించాలి.
- మురగ దమ్ము చేసి గత పంట అవశేషాలను మరియు కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించాలి.
- నారుమడిలో సస్యరక్షణ తప్పక చేపట్టాలి.
- నారు కొనలను త్రుంచి నాట్లు వేయాలి.
- ప్రతి 2 మీటర్ల నాటుకు 20 సెం.మీ. కాలిబాటలు తీయాలి.
- లింగాకర్షక బుట్టలతో మొగిపురుగు / కాండం తొలుచు పురుగు ఉధృతిని గమనించాలి.
- హాని చేయు పురుగులు – మిత్రపురుగులు నిష్పత్తి (2:1) ఉన్నప్పుడు సస్యరక్షణ చర్యలను వాయిదా వేయవచ్చును.
- నీటి యాజమాన్యం తప్పక పాటించాలి.
- దుబ్బులను నేల మట్టానికి కోసి లోతు దుక్కి చేయాలి.
- ట్రైకోగ్రామా పరాన్నజీవులను ఎకరాకు 20,000 చొప్పున నాటిన 30–45 రోజులలో 3 దఫాలుగా పొలంలో వదలాలి.
- పొలం గట్లపై ఉండే గడ్డి / కలుపు మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు తీసి శుభ్రం చేయాలి.
- మురుగునీరు బయటకు తీయడం ద్వారా తెగుళ్ళ / పురుగుల అభివృద్ధిని అదుపులో ఉంచవచ్చు.
- నత్రజని ఎరువును సిఫారసుకు మించి వేయరాదు.
- పొలం గట్లపై, దిబ్బలపై గడ్డి ఛామంతి, బంతి, రేకబంతి, అలసందలు, నువ్వులు వంటి పూల మొక్కలను పెంచి, దోమ పరాన్న జీవులను సంరక్షించుకోవాలి.
- పైరు తొలిదశలో అవసరం మేరకే పురుగు మందుల పిచికారి చేయాలి.
- తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో క్రిమిసంహారక / శిలీంధ్రనాశినులను పిచికారి చేయాలి.
- పిచికారికి ముందే పొలంలోని నీటి మట్టాన్ని బాగా తగ్గించాలి.
- పైరు బాగా తడిచేలా మందు ద్రావణాన్ని ఉపయోగించాలి.
- విచక్షణారహితంగా పలురకాల శిలీంధ్రనాశక మరియు క్రిమిసంహారక మందులను కలిపి పిచికారి చేయరాదు.

పట్టిక 5 : పురుగుల ఉధృతి స్థాయి మరియు నివారణ చర్యలు

వరుస సంఖ్య	పురుగు	పురుగు ఆశించిన గుర్తులు	ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి	నివారణ
1	2	3	4	5
1	ఉల్లికోడు	నారుమడి దశ నుండి పిలక దశ వరకు నష్టపరుస్తుంది. అంకురం ఉల్లికాడ వలె పొడుగాటి గొట్టంగా మారి బయటకు వస్తుంది. కంకి వెయ్యదు.	నారు మడిలో : చ.మీ.కు 1.ఉల్లికోడు సోకిన పిలక పిలక దశలో: 5 శాతం ఉల్లిగొట్టాలు లేక దుబ్బుకి 1 కోడు సోకిన పిలక.	తట్టుకునే వంగడాల సాగు. ఒక సెంటు నారుమడిలో 160 గ్రా.ల కార్బోఫ్యురాన్ 3% సి.జి. గుళికలు విత్తనం మొలకెత్తిన 10 నుండి 15 రోజులు లోపల వేయాలి. నాటిన 10 నుంచి 15 రోజులకు ఎకరాకు కార్బోఫ్యురాన్ 3% సి.జి. 10 కిలోల గుళికలు వాడాలి లేదా ఎకరాకి ఫిప్రోనిల్ 0.3 జి. 10 కిలోలు వేసుకోవాలి. (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.-ఐ.ఐ.ఆర్.ఆర్., హైదరాబాద్ వారి సిఫారసు)
2	కాండం తొలిచే పురుగు	నారుమడి నుండి ఈనిక దశ వరకు ఆశిస్తుంది. పిలక దశలో మొవ్వు చనిపోతుంది. ఈనిక దశలో తెల్ల కంకులు వస్తాయి.	నారుమడి: చ.మీ.కు 1 తల్లి పురుగు లేదా 1 గుడ్ల సముదాయం. పిలక దశ : 5 శాతం చచ్చిన మొవ్వులు లేక 1 చ.మీ. కు ఒక తల్లి పురుగు లేక 1 గుడ్ల సముదాయం.	పిలకలు వేసే దశలో క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.పి 1.5 గ్రా.లు లేదా కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50 యస్.పి. 2.0 గ్రా.లు లేక క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5 యస్.సి. 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. చిరు పొట్ట దశలో ఎకరాకు కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4 జి 8 కిలోలు లేదా కార్బోఫ్యురాన్ 3% సి.జి. గుళికలు 10 కిలోలు లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.4% గుళికలు 4 కిలోలు 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి పొలంలో సమానంగా చల్లాలి
3	ఆకు ముడత / నాము / తెల్ల తెగులు	గొంగళి పురుగు ఆకుముడతలో ఉండి పత్రహరితాన్ని గోకి తినివేయటం వలన ఆకులు తెల్లబడతాయి. పోటాకు దశలో నష్టం ఎక్కువ.	దుబ్బుకి 1 లార్వా లేక 2 పురుగులు సోకిన ఆకులు	పిలకదశలో క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేక క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 20 యస్.సి. 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. చిరు పొట్ట దశలో కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50 ఎస్.పి. 2.0 గ్రా. లేదా ఎసిఫేట్ 75 యస్.పి. 1.5 గ్రా. లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5 యస్.సి. 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వరుస సంఖ్య	పురుగు	పురుగు ఆశించిన గుర్తులు	ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి	నివారణ
1	2	3	4	5
4	హిస్పా (తాటాకు తెగులు)	హిస్పా నారుమడిలో కూడా ఆశించవచ్చును. తల్లి పురుగు : పెంకు పురుగుల శరీరంపై ముళ్ళు కలిగి నల్లగా ఉంటాయి. పిల్ల పురుగులు ఆకు పొరల్లో ఉంటాయి. పిల్ల, పెద్ద పురుగులు ఆకులోని పత్రహరితాన్ని గోకి తిని వేయటం వలన తెల్లటి మచ్చలు, చారలు ఏర్పడి ఆకులు ఎండి పోతాయి.	దుబ్బుకు: 2 పెంకు పురుగులు లేదా 2 పురుగులు ఆశించిన ఆకులు	ఆకు కొనలను తుంచి నాటాలి. ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి. 2 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ 25 ఇ.సి. 2.0 మి.లీ. (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.-ఐ.ఐ.ఆర్.ఆర్., హైదరాబాద్ వారి సిఫారసు) లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
5	వరి ఈగ	పిల్ల పురుగులు ఆశించిన ఆకులపై చిన్న రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి. పురుగు ఆశించిన దగ్గర ఆకు తెల్లబడి గాలికి విరిగి పోవచ్చు.	-	తాటాకు తెగులుకి సిఫారసు చేసిన మందులు వాడి నివారించవచ్చు.
6	నుడి దోమ	గోధుమ వర్ణపు / తెల్ల వీపు మచ్చ దోమలు దుబ్బుల అడుగున నీటిమట్టంపై ఉండి దుబ్బుల నుండి రసాన్ని పీలుస్తాయి. పైరు నుడులు నుడులుగా ఎండిపోతుంది.	పిలక దశలో : దుబ్బుకి 10 నుంచి 15 పురుగులు ఈనిక దశలో: దుబ్బుకి 20 నుంచి 25 పురుగులు	తట్టుకునే రకాలు సాగు చేయాలి. పొలాన్ని అడపా దడపా ఆరబెట్టాలి. ప్రతి రెండు మీ. నాట్లకు 20 సెం.మీ. ల కాలి బాటలు వదలాలి. ఎసిఫేట్ 75 యస్.పి. 1.5 గ్రా. లేక ఇమిడాక్లోప్రిడ్ + ఎథిప్రోల్ 80 డబ్ల్యుజి 0.25 గ్రా. లేదా పైమెట్రోజైన్ 50 డబ్ల్యూ.జి. 0.6 గ్రా. లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 50 ఎస్.జి. 0.4 గ్రా. లేదా డైనోటెఫ్యురాన్ 20 ఎస్.జి. 0.4 గ్రా. లేదా ట్రైఫ్లుమిజోపైరిమ్ 10 యస్.సి. 0.48 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. దోమ ఉధృతికి దోహదపడే పురుగు మందులైన క్వినాల్ ఫాస్, ప్రొఫెనోఫాస్, మిథైల్ పరాథియాన్, ట్రైజోఫాస్, ఫోరేట్ 10 జి. గుళికలు మరియు సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ వర్గానికి చెందిన డెల్టామెత్రిన్ మరియు సైపర్‌మెత్రిన్ మొదలగు పురుగు మందులను వాడరాదు.

వరుస సంఖ్య	పురుగు	పురుగు ఆశించిన గుర్తులు	ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి	నివారణ
1	2	3	4	5
7	పచ్చదీపపు పురుగులు	పెద్ద, పిల్లపురుగులు ఆకుల నుండి రసం పీల్చుతాయి. క్రమేపి ఆకులు పసుపు రంగుకి మారతాయి. టుంగ్రో వైరస్‌ను వ్యాప్తి చేస్తాయి. పురుగులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో వుండి ముందు రెక్కల మీద మచ్చలు ఉంటాయి.	నారుమడి దశ: చ.మీ.కి 1 లేక 2 పురుగులు పిలక దశ: దుబ్బుకి 10పురుగులు. ఈనిక దశ : దుబ్బుకి 20 పురుగులు టుంగ్రోవైరస్ : దుబ్బుకి ఒక పురుగు ఆశించిన ఆకులు	దోమకు తెలిపిన నివారణా చర్యలు చేపట్టాలి.
8	రెల్లరాల్చు పురుగు	గొంగళి పురుగులు గింజ గట్టిపడే దశలో వెన్నులు కొరికి నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. రాత్రిపూట మాత్రమే పంటకు హాని చేస్తాయి.	ఈనిక దశ : చ.మీ. కి 4 నుంచి 5 పురుగులు	పొలానికి ముందుగా నీరు పెట్టి క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేయాలి లేదా ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ./లీటరు (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.-ఐ.ఐ.ఆర్.ఆర్., హైదరాబాద్ వారి సిఫారసు)
9	ఆకునల్లి	పిల్ల, పెద్దనల్లి పురుగులు ఆకుల అడుగు భాగాన ఆశించి రసాన్ని పీల్చి వేయడం వలన ఆకులు పసుపు రంగుకి మారి క్రమేపి పైరు ఎండిపోయినట్లు కనబడుతుంది. బెట్ట పరిస్థితుల్లో పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది.	-	నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడి 50 శాతం 3 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి. 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
10	కంకినల్లి (నల్లకంకి)	ఇవి కంటికి కనబడని సూక్ష్మ సాలీడు వర్గానికి చెందిన పురుగులు. ఇవి ఆశించిన ఆకులపై పసుపు వర్ణపు చారలు ఏర్పడి క్రమేపి ఆకు తొడిమల లోపల, ఆకు ఈనెలపై మరియు ఆకు తొడిమలపై నల్లటిమచ్చలు ఏర్పడతాయి. గింజలపై నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి పాలుపోసుకోక తాలు గింజలుగా అవుతాయి.	-	పురుగు నష్ట లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు ప్రొఫెనోఫాస్ 20 ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా స్పైరోమెసిఫెన్ 240 ఎస్.సి. 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.-ఐ.ఐ.ఆర్.ఆర్., హైదరాబాద్ వారిచే సిఫారసు చేయబడినది).

వరుస సంఖ్య	పురుగు	పురుగు ఆశించిన గుర్తులు	ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి	నివారణ
1	2	3	4	5
11	త్రిప్స్ లేక తామర పురుగులు	పిల్ల, పెద్ద పురుగులు ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకుల అంచులు పైకి చుట్టు కుంటాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఇవి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతాయి	-	ఫిప్రోనిల్ 5 యస్.సి. 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
12	పిండినల్లి (మట్టసుడి)	తెల్లటి మైనం లాంటి పూతతో కప్పబడిన సన్నని పురుగులు ఆకు ఒరలలో నుండి రసాన్ని పీల్చటం వలన ఆకులు పాలిపోతాయి. మొక్కలు గిడసబారతాయి. వెన్నులు ఏర్పడవు.	-	మిథైల్-ఓ-డెమటాన్ 25 ఇ.సి. 2 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 30 ఇ.సి. 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
13	వరి కంపు నల్లి	పిల్ల, పెద్ద పురుగులు గింజ పాలుపోసుకొనే దశలో రసాన్ని పీల్చడం వల్ల గింజలు తాలైపోతాయి. ఆశించిన పొలం నుండి చెడు వాసన వస్తుంది. తెలంగాణా, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఉధృతి ఎక్కువ.	దుబ్బుకి 1 లేక 2 పురుగులు	గింజ పాలు పోసుకునే దశలో క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేదా మలాథియాన్ 50 ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేయాలి. పిచికారి పొలం అంచు నుండి చుట్టూ తిరుగుతూ మధ్యకు చేయాలి.
14	వేరు నులి పురుగు	నారుమడి దశలోను, నేరుగా వెదజల్లే పద్ధతిలోను, మెట్ట వరిని ఆశిస్తుంది. నులి పురుగు లార్వాలు వేరులోనికి ప్రవేశించడం వలన, వేర్లు నీటిని మరియు పోషకాలను సక్రమంగా మొక్కకు అందించలేవు. దీని వలన మొక్కలు గిడసబారి, పసుపు రంగుకు మారిపోతాయి. ఇవి ఆశించిన మొక్కలలో ఎదుగుదల లేక కంకులు, వెన్నులు పరిమాణం తగ్గి, గింజ బరువు తగ్గిపోతుంది.	-	దీని నియంత్రణకు కార్బోఫ్యురాన్ 3% సి.జి. గుళికలు ఎకరానికి 13.2 కిలోలు (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.- ఐ.ఐ.ఆర్.ఆర్., హైదరాబాద్ వారిచే సిఫారసు చేయబడినది). ఇసుకలో కలిపి పొలంలో సమానంగా చల్లాలి.

పట్టిక 6: తెగుళ్ళ లక్షణాలు, అభివృద్ధికి అనుకూల పరిస్థితులు – నివారణ చర్యలు

వరుస సంఖ్య	తెగులు	తెగులు ఆశించినపుడు కనబడే లక్షణాలు	ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి	అభివృద్ధికి అనుకూల పరిస్థితులు	నివారణ
1	అగ్గి తెగులు / మెడ విరుపు తెగులు	ఆకులపై ముదురు గోధుమ రంగు అంచుతో మధ్యలో బూడిదరంగు గల నూలు కండె ఆకారపు మచ్చలు, ఆకులు ఎండిపోయి తగులబడినట్లు కనిపిస్తాయి. అందువల్ల ఈ తెగులును అగ్గి తెగులు అని అంటారు.పిలకల కణుపుల వద్ద ఆశిస్తే ఆ ప్రదేశం వద్ద విరిగి పిలక వాలిపోతుంది. మెడవిరుపు దశలో వెన్నుల మెడ భాగంలో తెగులు ఆశించటం వలన వెన్నులు విరిగి క్రిందకు వాలిపోతాయి. వెన్నులో తాలు లేక సగం నిండిన గింజలు ఏర్పడతాయి.	5 శాతం ఆకులు (అగ్గి తెగులు) / 2 శాతం ఆశించిన వెన్నులు (మెడ విరుపు)	ఒక వారం రోజుల పాటు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 18 – 20^0 సెల్సియస్ గాలిలో తేమ 90 శాతంతో, మంచు (లేదా) వర్షపు జల్లులు పడుట, నవంబర్ –ఫిబ్రవరి మాసాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. నత్రజని ఎక్కువైనప్పుడు తెగులు త్వరగా అభివృద్ధి చెంది ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తుంది.	తెగులును తట్టుకొను శక్తిగల రకాలైన యం.టి.యు. – 1121, 1153, 1156, 1210, 1172, 1190, 1273, 1293, బి.పి.టి. – 2595, 2782, 2411, 2295. ఎన్.ఎల్.ఆర్. 3041, 33358, 34449, 4001, 40054. ఎన్.డి.ఎల్.ఆర్. 7 లను సాగు చేయాలి. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బెండిజిమ్‌ని కలిపి పొడి విత్తనశుద్ధి లేదా 1 గ్రా. లీటరు నీటికి, కిలో విత్తనానికి కలిపి తడి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. ట్రైసైక్లోజోల్ 75 శాతం 0.6 గ్రా. లేదా ఐసోప్రోథయోలేన్ 40 శాతం 1.5 మి.లీ. (లేక) కాసుగామైసిన్ 3 శాతం యస్.ఎల్. 2.5 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి పైరు పై పిచికారి చేయాలి.టెబ్యుకొనజోల్ 50% + ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యు.జి. 0.4 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి బిర్రు పొట్ట నుంచి ఈనిక దశలో 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయటం వలన మెడవిరుపు తెగులు తగ్గును. చేనులోను, గట్లపైన కలుపును సకాలంలో నివారించాలి. సిఫార్సు చేసిన నత్రజని ఎరువును ఎక్కువ దఫాలుగా వాడాలి. పొలంలో నీరు లేకుండా ఆరగట్టరాదు.
2	పొడ తెగులు లేక మాగుడు తెగులు	దుబ్బు చేసే దశ నుండి కాండం/ మట్ట ఆకులపై మచ్చలు పెద్దవై పాముపొడ మచ్చలుగా ఏర్పడి మొక్కలు పూర్తిగా ఎండి పోవుట. తెగులు వెన్ను వరకు వ్యాపిస్తే రంగు మారిన లేక తాలు గింజలు ఏర్పడుట.	10 శాతం పిలకలు	ఉష్ణోగ్రత 28^0 – 32^0 సెల్సియస్, గాలిలో తేమ 90 శాతం, మబ్బులతో కూడిన వర్షం, మొక్కల సాంద్రత ఎక్కువైనప్పుడు, పైరు చేనుపై పడిపోయినప్పుడు, నత్రజని ఎరువులు ఎక్కువైనప్పుడు తెగులు త్వరగా అభివృద్ధి చెంది ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తుంది.	విత్తనశుద్ధి చేయాలి. సిఫారసు చేసిన దూరంలోనే నాట్లు వేసుకోవాలి. సిఫారసు చేసిన నత్రజనిని 3-4 సార్లు వేయాలి. గట్లపైన, చేనులో కలుపు లేకుండా చూడాలి. హెక్సాకొనజోల్ 5 ఎన్.సి. 2 మి.లీ. లేదా వాలిడామైసిన్ 3 ఎల్. 2 మి.లీ.లేదా ప్రొపికోనజోల్ 25 ఇ.సి. 1 మి.లీ. లేదా ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్+టెబుకొనజోల్ 75 డబ్ల్యుజి 0.4 గ్రా. లేదా అజోక్సీస్ట్రోబిన్ 23 ఎస్.సి. 1 మి.లీ.లేదా అజోక్సీస్ట్రోబిన్ 11% + టెబ్యుకొనజోల్ 18.3% ఎస్.సి. 1.5 మి.లీ. లేదా అజోక్సీస్ట్రోబిన్ 18.2% + డైఫెన్‌కొనజోల్ 11.4% ఎస్.సి. 1.25 మి.లీ. లేదా అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 5.6% + టెబ్యుకొనజోల్ 10% + ప్రోక్లోరజ్ 20% ఇ.సి. 3.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి 15 రోజులకొకసారి 2 పర్యాయాలు మందు మార్చి పిచికారి చేయాలి.

1	2	3	4	5	6
3	కాండం కుళ్ళు తెగులు లేదా దుబ్బు కుళ్ళు తెగులు	కాండం లోవల కణుపుల మధ్య భాగమంతా నల్లగా మారుట, ఆకులు పసుపు రంగుకి మారుట, పిలకలు క్రిందికి వాలిపోయి ఎండి పోవుట క్రమంగా దుబ్బు అంతా ఎండి పోవుట, వెన్నుల్లో తాలు గింజలు ఏర్పడుట, పూర్తిగా ఎండిన పిలకలను చీల్చి చూసిన లోపలి భాగంలో నల్లని చిన్న చిన్న శిలీంధ్ర బీజాలు కనిపించుట.	2 శాతం ఆశించిన మొక్కలు	పొలంలో వ్యాధి సోకిన మొక్కల భాగాల నుండి, సుడిదోమ, కాండం తొలుచు పురుగులు ఏర్పరచిన రంధ్రాల ద్వారా మరియు విత్తనం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. నీటి ద్వారా మిగిలిన పొలాలకు విస్తరిస్తుంది. మొక్క బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఆశించడానికి అనుకూలం. ఆయకట్టు చివర ఎక్కువ రోజులు నీటిని నిల్వ ఉంచిన భూములు అనుకూలం.	తెగులు సోకిన పొలంలో పరిశుభ్రత పాటించాలి. గత పంట మోళ్ళు, పంట అవశేషాలు తొలగించాలి. మురుగు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి. విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పైరు ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా పోషకాలు అందించాలి. కాండం కుళ్ళు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే పొలం నుండి నీటిని పూర్తిగా తొలగించి ఒకసారి ఆరగట్టాలి. ప్రారంభ దశలో తెగులు లక్షణాలను గుర్తించి హెక్సాకొనజోల్ 5 ఎస్.సి. 2 మి.లీ. లేదా వాలిడామైసిన్ 3 ఎల్. 2 మి.లీ. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 25 ఇ.సి. 1 మి.లీ. లేదా టెబ్యుకొనజోల్ 25.9 ఇ.సి 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలపిన ద్రావణాన్ని 15 రోజుల కొకసారి 2 సార్లు పిలకలు క్రింద వరకు తడిచేలా పిచికారి చేయాలి. కాండం కుళ్ళు తెగులు ఆశించిన పంటను కోసేటప్పుడు మొదళ్ళ వరకు కోయాలి. కంబైన్ హార్వెస్టర్ వంటి కోత యంత్రాలతో కోసేటప్పుడు మొదళ్ళ వరకు కోయడం ఆవశ్యకం.
4	ఆకు ఎండు తెగులు	బాక్టీరియా ఆకు లోపలికి ప్రవేశించడం వలన అంచుల నుండి పసుపురంగు నీటిడాగు మచ్చలుగా ఏర్పడుట, ఆకులు అంచుల నుండి ఎండి పోవుట, నారుమడి దశలో మొక్కలు కుళ్ళి ఎండి పోవుట (క్రెసెక్ దశ)	5 శాతం ఆశించిన మొక్కలు	ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంత కన్నా తక్కువ ఉండి, మంచు లేదా వర్షం ఉన్నప్పుడు లేక మొక్కల సాంద్రత పెరిగినప్పుడు నత్రజని ఎరువును అధికంగా వాడుట లేదా గాలి వాన వచ్చినచో అభివృద్ధి చెంది వ్యాపిస్తుంది. చెట్ల నీడలో తెగులు ఎక్కువగా గమనించవచ్చు.	తట్టుకొను శక్తి గల రకాలైన ఆర్.పి.బయో 226, యం.టి.యు. -7029, 1061, 1064, 1190, 1172, బి.పి.టి. 2231 లను సాగు చేయాలి. ఆరోగ్యవంతమైన పంట నుండి విత్తనాన్ని సేకరించాలి. నాట్లు వేసిన మొదటి దశలలో 30 రోజుల వరకు 'క్రెసెక్' దశ ఆశించినప్పుడు 'ఊజ్' పరీక్ష (తెగులు సోకిన ఆకుల నుండి పసుపు రంగు బాక్టీరియా స్రావం వెలువడుట) చేసుకొని నీటిని మార్చి బాక్టీరియా నాశినులను పిచికారి చేయుట ఉపయుక్తం. నత్రజని యాజమాన్యం (3-4 సార్లు వేయడం) తప్పక చేయాలి. తెగులు 5 శాతం కంటే ఎక్కువైతే నత్రజని వేయడం తాత్కాలికంగా నిలుపు చేయాలి. తెగులు ఆశించిన పొలంలోని నీటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచకుండా బయటికి మురుగు నీటి కాలువల ద్వారా పంపాలి. పొటాష్ ఎరువును నాటేముందు, అంకురం ఏర్పడే దశలో ఎకరానికి 15-20 కిలోల చొప్పున వాడాలి.
5	పొట్ట కుళ్ళు తెగులు	పోటాకు తొడిమలపై నిర్దిష్ట ఆకారం లేని నల్లటి లేదా ముదురు గోధుమ రంగు / చాక్లేట్ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి వెన్నులు పొట్టలో కుళ్ళిపోతాయి, వెన్ను పాక్షికంగా మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. వెన్నులో తాలు గింజలు ఏర్పడతాయి. గింజలు రంగు మారతాయి.	-	మొక్కలు దగ్గరగా నాటటం వలన, వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత లు 20^0 -28^0 సెంటిగ్రేడ్ మధ్యన ఉన్నప్పుడు తెగులు వృద్ధి చెందుతుంది.	సిఫారసు చేసిన విత్తన మోతాదు వాడాలి. ముందు జాగ్రత్తగా పొట్ట దశలో ఒక సారి, 10-15 రోజులు తరవాత రెండవ సారి కార్బండెజిమ్ 50 శాతం మందు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. లేదా కార్బండెజిమ్ 25 శాతం + మాంకోజెబ్ 50 శాతం మిశ్రమ శిలీంధ్ర నాశని 2 గ్రా. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 25 ఇ.సి. 1 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

1	2	3	4	5	6
6	మానిపండు తెగులు	పుష్పించే దశలో ఆశిస్తుంది. అండాశయంలో శిలీంధ్రం పెరుగుదల వల్ల పసుపుపచ్చరంగు ముద్దగా అభివృద్ధి చెంది, ఆకుపచ్చరంగు లోకి మారి చివరకు నల్లబడిపోతుంది. గింజ స్థానంలో శిలీంధ్ర బీజ సముదాయం ఏర్పడును.	-	పొట్ట దశ మరియు పూత దశలో గాలిలో ఎక్కువ తేమ శాతం ఉన్న, మంచు లేదా మబ్బులతో కూడిన వర్షపు జల్లులు తెగులు సోకడానికి అనుకూలం.	తెగులు సోకని పంట నుండి విత్తనాన్ని సేకరించాలి. ముందు జాగ్రత్తగా ప్రొపికొనజోల్ 25 ఇ.సి. 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పొట్ట దశలో మరియు వెన్నులు పైకి వచ్చు దశలో సాయం కాలపు సమయాల్లో మాత్రమే పిచికారి చేయాలి.
7	కంకర తెగులు	పొట్ట దశ నుండి పైరు పక్వానికి వచ్చే దశలో ఆశిస్తుంది. పోటాకు మరియు క్రింది ఆకులపై నారింజ లేదా ఇటుక రంగు మచ్చలు ఏర్పడి ఆకు అగ్ర భాగానికి వ్యాపిస్తాయి. ఆకులు పండు బారిపోతాయి. తెగులు లక్షణాలు పైరుపై గమనించిన 3-4 రోజులలోనే పంట అంతటా వ్యాపించును.	-	గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండి ఉష్ణోగ్రతల ు పెరిగినప్పుడు త్వరితంగా వ్యాపిస్తుంది.	లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే కార్బండెజిమ్ 50 శాతం మందును 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పైరు బాగా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి
8	టుంగ్రో వైరస్	వైరస్ పచ్చదీపపు పురుగుల వలన వ్యాపిస్తుంది. వైరస్ సోకిన మొక్కలు కురచగా, ఎదగక, పిలకలు తగ్గిపోతాయి. ఆకులు చివరల నుండి పసుపు లేక నారింజ రంగు లోకి మారుతాయి. ముదురు ఆకుల మీద తుప్పు మచ్చలు గమనించవచ్చును. వైరస్ ఆశించిన మొక్కల నుండి వెన్నులు రావు. వచ్చినా చిన్నవిగా, గింజలు గట్టిపడక తాలుగా మారతాయి.	-	వైరస్ ఆశించిన ప్రాంతాలలో పచ్చదీపపు పురుగులు ద్వారా తెగులు వ్యాపిస్తుంది.	ఈ వైరస్ ఆశించిన మొక్కలను గుర్తించిన వెంటనే తీసి నాశనం చెయ్యాలి. పచ్చదీపపు పురుగుల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. సుడిదోమ నివారణకు సూచించిన చర్యలతో పచ్చ దీపపు పురుగులను నివారించవచ్చు.

వరిలో వాడదగిన వివిధ పురుగు మందులు మరియు తెగులు మందుల కలయిక :

సుడిదోమ మరియు మాగుడు తెగులు ఆశించినట్లయితే : పైమెట్రోజైన్ 50 డబ్ల్యూ.జి. 0.6 గ్రా. మరియు అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 25 ఎస్.సి. 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా ట్రైఫ్లుమెజోపైరిమ్ 10 ఎస్.సి. 0.48 మి.లీ. మరియు అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 25 ఎస్.సి. 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా పైమెట్రోజైన్ 50 డబ్ల్యూ.జి. 0.6 గ్రా. మరియు అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 11% + టెబ్యుకొనజోల్ 18.3% ఎస్.సి. 1.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కాండం తొలుచు పురుగు మరియు మాగుడు తెగులు ఆశించినట్లయితే : క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 20 ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. మరియు అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 25 ఎస్.సి. 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.


సుడిదోమ మరియు అగ్గి తెగులు ఆశించినట్లయితే : పైమెట్రోజైన్ 50 డబ్ల్యూ.జి. 0.6 గ్రా. మరియు ట్రైసైక్లోజోల్ 75 డబ్ల్యూ.పి. 0.6 గ్రా. లేదా ఐసోప్రోథయోలిన్ 40 ఎస్.సి. 1.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా ట్రైఫ్లుమెజోపైరిమ్ 10 ఎస్.సి. 0.48 మి.లీ. మరియు ట్రైసైక్లోజోల్ 75 డబ్ల్యూ.పి. 0.6 గ్రా. లేదా ఐసోప్రోథయోలిన్ 40 ఎస్.సి. 1.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వరిలో ఎలుకల నియంత్రణ

వరి పైరు పెరుగుదల దశలను బట్టి ఎలుకల ఉత్పత్తి, ఉధృతి ఆధారపడి వుంటుంది. కావున పంట–ఎలుకల కాలానుగుణ పంచాగాన్ని రూపొందించుకొని తదనుగుణంగా నియంత్రణ చర్యలను చేపట్టాలి. పైరు ఏపుగా పెరిగే శాఖీయ దశలో ఉన్నప్పుడు ఎలుకలు కూడా సంతానోత్పత్తి చేయని దశలోనే ఉంటాయి. పంటలో అంకురం ఏర్పడి చిరుపొట్ట తగిలినప్పుడు పైరులోఉండే ప్రత్యేక రసాయనాలకు ఎలుకలు ఎక్కువగా ఆకర్షింపబడి పైరును విపరీతంగా నష్టపరుస్తాయి. ఇదే క్రమంలో అవి దుబ్బులను కత్తిరించగా వచ్చిన తీపిస్రావాలను ఆరగించి ప్రత్యుత్పత్తి దశలోకి ప్రవేశిస్తాయి.

ఇదేకాకుండా, వరి పైరులో ఎలుకల గమనాన్ని పరిశీలిస్తే పంటవేసిన మొదటి రోజుల్లో అవి వేరే ప్రాంతాల నుండి చేలల్లోకి వలసవస్తూ అక్కడక్కడా పైరును కొరికి కంటికి కన్పించని నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. పైరు ఎదుగుతున్నకొలదీ ఎలుకలు వరి పొలం గట్లపై స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకుని వాటి యొక్క కదలికల్ని స్థావరం చుట్టూ పరిమితం చేసుకొని, ఆ ప్రాంతంలోనే దుబ్బులను కొరికి వేయడం వల్ల పొలంలో అక్కడక్కడా ఖాళీలు ఏర్పడతాయి. ఈ సమయంలో ఎలుక కొట్టుడును చూసి రైతులు ఆందోళనకు గురి అవుతుంటారు.

కావున, పంట పెరుగుదల, ఎలుకల ఉధృతి సరళి మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధం ఆధారంగా పంట – ఎలుకల కాలానుగుణ క్యాలెండరును రూపొందించుకుని, తదనుగుణంగా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.



పటం 1. వరిలోఎలుకల నివారణకు వరి – ఎలుకల కాలానుగుణ క్యాలెండరు

ఎలుకల నివారణ పద్ధతులు :

ఎ) ఎలుకల నివారణకు ప్రభావవంతమైన దశ :

- ఎర – తెరను అమర్చుట
- ఎర బుట్టలను పెట్టడం
- విషపు ఎరలు వాడటం (బ్రోమోడయోలోన్ / జింక్ ఫాస్ఫైడ్)
- పొగ బారించే విధానం

బి) ఎలుకల నివారణకు సంక్లిష్టమైన దశ :

- ఎర – తెరను అమర్చుట
- పొగ బారించే విధానం
- కన్నాలలో గ్యాస్ బిళ్ళలు వేయుట

ఈ పటంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎలుకల నివారణకు ప్రభావవంతమైన కాలం అదేవిధంగా సంక్లిష్టమైన/కష్టతరమైన కాలాలను గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా ఎలుకల వృద్ధిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. వరి మాగాణుల్లో వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటే ఎలుకల ఉధృతి పెరిగి వాటి బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఎ) ఎలుకల నివారణకు ప్రభావవంతమైన దశ (పైరు శాఖీయ /ఏపుగా పెరిగే దశ) : నారు మడి నుండి పిలకలు వేసేవరకు గల దశలో సాధారణంగా ఎలుకలు సంతానోత్పత్తి చేయవు మరియు ఎలుకల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. కావున ఈ దశను ఎలుకల నివారణకు చాలా ప్రభావవంతమైన దశగా చెప్పవచ్చు. తదనుగుణంగా దుబ్బు చేయు సమయంలో సమగ్ర ఎలుకల నివారణ సామూహికంగా చేపట్టాలి.

- గట్ల సంఖ్యను మరియు పరిమాణాన్ని వీలైనంతవరకు తగ్గించుకొని వాటి నివాస స్థావరాలను తగ్గించాలి. గట్లపై గడ్డి కలుపు లేకుండా శుభ్రపరచుకోవాలి. గట్లను పదునైన పారతో చెక్కుకోవాలి.
- నారుమడి చుట్టూ ఎర-తెరను ఏర్పరచుకోవాలి. 2 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న 50 జి.యస్.యం. మందం గల ప్లాస్టిక్ షీట్‌ను నారుమడి చుట్టూ వెదురుబద్దలు మరియు ఇనుప తీగ సహాయంతో గోడ మాదిరిగా అమర్చుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ షీట్ 1/2 అడుగు భూమిలోనికి త్రొక్కి $1^{1}/_{2}$ అడుగు పైన ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. తెరకు ప్రతీ 20-30 మీటర్ల దూరంలో 3 అంగుళాల రంధ్రము ఏర్పరచి దానికి లోపలి వైపున తీగ బోనును అమర్చుకోవాలి. బోను ముఖద్వారం దగ్గర సన్నటి గట్టును ఎలుక సులువుగా ప్రవేశించడానికి ఏర్పరచుకోవాలి.
- ఎలుకల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే, ప్రధాన పొలంలో నారుమడిలో మాదిరిగా ఎర-తెరను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తెర చుట్టూ నీరు ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఒక ఎకరంలో ఎర-తెర ఏర్పాటు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారు రూ. 3000-3500/- (అదనపు సమాచారం కొరకు **వివిధ పంటలలో ఎలుకల సమగ్ర యాజమాన్యం** పరిశీలించండి).
- తాటాకు ఎర బుట్టలను ఎకరాకు 20 చొప్పున ఎలుకలు వచ్చే వలస మార్గాలను గమనించి వాటిలో ఏర్పరచుకోవాలి.
- విషపు ఎరలను ఉపయోగించి పైరు చిరుపొట్ట దశకు చేరక ముందే సామూహిక ఎలుకల నివారణ చేపట్టాలి. మార్కెట్లో లభ్యం అయ్యే బ్రోమోడయోలోన్/ జింక్ ఫాస్ఫైడ్ ఎలుకల మందును వంటనూనెను, వరి నూకలను 2:2:96 నిష్పత్తిలో కలిపి 10-15 గ్రా. చిన్నచిన్న పొట్లాలు కాగితంలోచుట్టి సజీవ ఎలుక బొరియలను గుర్తించి వాటిలో ఈ మందు పొట్లాలను ఉంచాలి. ఎలుకల మందు విషపు ఎరలతో రైతులందరూ సామూహిక ఎలుకల నిర్మూలనా కార్యక్రమం చేపట్టాలి. జింక్ ఫాస్ఫైడ్ మందును వాడుతున్నప్పుడు ఎలుకల మందు కలపని నూకలతో ముందుగా 1-2 రోజులు ఎలుకలను మచ్చిక చేసుకోవాలి.
- బ్రోమాడయోలోన్ విషపు ఎరలను ఎర స్థావరాల ద్వారా కూడా అందించి ఎలుకలను నివారించుకోవచ్చు. దీనికి 3 అంగుళాల వ్యాసం 1 1/2 అడుగు పొడవు వున్న పి.వి.సి. పైపులను ఎకరాకు 10 చొప్పున

పొలానికి నాలుగు మూలల గట్లపై అమర్చుకొని బ్రోమాడయోలోన్ ఎరను 30 గ్రా. చొప్పున వేసి, వారానికి రెండు సార్లు తాజాగా తయారు చేసిన మందును వుంచుకోవాలి. ఎర స్థావరాల్లో వుంచిన విషపు ఎర ఎండ, వానలకు పాడవకుండా ఉండటమే కాకుండా పెంపుడు జంతువులకు, పక్షులకు అందుబాటు కాదు కావున వాటికి ఏవిధమైన హాని జరగదు.

- సజీవ ఎలుక కన్నాలను గుర్తించి వాటిలోనికి బర్రోస్కోకర్ సహాయంతో 3-4 నిమిషాల పాటు పొగను బారించాలి. ఎలుకలు ఊపిరాడక చనిపోతాయి.

బి) ఎలుకల నివారణకు సంక్లిష్టమైన దశ (పైరు ప్రత్యుత్పత్తి దశ) : పైరు చిరుపొట్ట దశ నుండి వెన్ను అంకురార్పణ మరియు పక్వదశలో వున్నప్పుడు ఎలుకలు కూడా ప్రత్యుత్పత్తి దశలోకి వస్తాయి. కావున ఎలుకల సంఖ్య కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ దశలో ఎలుకల నివారణ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎలుకలు పునరుత్పత్తి చేయని సమయంలోనే వాటిని తగ్గించుకోవాలి.

- వరి పొలంలో ఏర్పరచిన ఎర-తెరను సరిగ్గా నిర్వహణ చేస్తే పైరు జీవిత కాలం పంటను ఎలుకల నుండి సమర్ధవంతంగా రక్షిస్తుంది.
- ఎలుకల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండే డెల్టా ప్రాంతాలలో వరి పొలాల్లో నీరు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. చేనుకు పొట్ట తగిలితే ఎలుకలు సులభంగా చేలల్లో తిరగ గలిగి ఎక్కువ నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి.
- సజీవ ఎలుక కన్నాలను గుర్తించి వాటిలోనికి బర్రోస్కోకర్ సహాయంతో 3-4 నిమిషాల పాటు పొగను బారించాలి. పంట ఈనిక దశలో పొగబారించడం ద్వారా ఒకే కన్నంలో వివిధ దశల్లో వున్న ఎలుకలను, చూడు ఎలుకలను నిర్మూలించి తదుపరి పంట కాలంలో వాటి ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు. బర్రో స్కోకర్ (పొగ బారించే యంత్రం) ధర రూ. 1200 నుండి 1500/- వరకు ఉంటుంది.
- పొలాల్లో ఎలుకలకు సహజ శత్రువులైన సర్పాలు, గుడ్ల గూబలు, గ్రద్దలు మరియు ముంగిసలు వంటి వాటిని సంరక్షించడం ద్వారా ఎలుకలను నియంత్రించవచ్చు. దీనికి గాను విచక్షణా రహితంగా వాడే పురుగు మందు గుళికల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. పొలం గట్లపై ఉండే చెట్లపై గుడ్లగూబ స్థావరాలకు గాను చెక్క పెట్టెలను ఏర్పరచి అవి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొనేట్లు సహకరించాలి.
- ఎలుకల ఉధృతి మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సజీవ ఎలుక కన్నాలలో మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే 6% అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడు 12 గ్రా. గ్యాస్ బిళ్లలను కన్నానికి ఒకటి చొప్పున ప్లాస్టిక్ గొట్టం సహాయంతో బొరియలో జారవిడిచి మట్టితో కప్పివేయాలి. ఈ గ్యాస్ బిళ్లలను తేమ ఎక్కువగా ఉన్న/వర్షం వచ్చే సమయంలో వాడరాదు. గ్యాస్ బిళ్లలను నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వాడాలి.
- కావున రైతులందరూ వరి పైరు వివిధ దశల్లో ఎలుకల యొక్క స్థితిని, వాటి ప్రవర్తనావళిని నిశితంగా గమనించి ప్రణాళికాబద్ధంగా పైన సూచించిన వివిధ నియంత్రణ పద్ధతులను అవలంబించినట్లయితే, ఖచ్చితంగా ఎలుకల బెడదను అధిగమించి ప్రతీఎకరాకు 3-4 క్వింటాళ్ళ అదనపు దిగుబడి సాధించవచ్చు.

గోదాముల్లో ధాన్యం నిలువలో తీసుకోవలసిన చర్యలు : గోదాములలో ధాన్యం నిల్వ చేయుటకు పాత గోనె సంచులను ఉపయోగించినట్లయితే, వాటికి చిరుగులు లేకుండా చేసి మలాథియాన్ 50 ఇ.సి. 2.0 మి.లీ./ లీటరు నీటికి కలిపిన ద్రావణంలో 10 నిమిషాలు ముంచి ఆరబెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలి. నిల్వ చేసే గోదాములను ముందుగా శుభ్రం చేసి గోదాముల పై కప్పు, గోడలు, నేలలో పగుళ్ళు, రంధ్రాలు లేకుండా సిమెంట్‌తో పూడ్చి వేయాలి. తర్వాత నేలపై, గోడలకు, పైకప్పుకు మరియు గోనె సంచులపై మలాథియాన్ 50 ఇ.సి. 10 మి.లీ. లేదా డెల్టామెత్రిన్ 2.5 డబ్ల్యూ.పి. 40 గ్రా. / లీటరు నీటికి కలిపి 100 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణానికి 3 లీటర్లు చొప్పున పిచికారి చేయాలి.

అకాల వర్షాలకు వివిధ దశలలో దెబ్బతిన్న వరి పంటలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

అకాల వర్షాలకు ప్రతి ఏటా వివిధ దశలలో వరి పంట దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. వివిధ దశలలో కొన్ని మెళకువలు పాటిస్తే నష్టంను కొంతవరకు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉన్నది. నారు మడి దశలో ఉన్న వరి పంట, విత్తనం చల్లిన 2 – 3 రోజుల వయసులో ఉన్నప్పుడు, మూడు రోజుల కన్నా ఎక్కువగా నీట మునిగితే మొలక శాతం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఈ దశలో వీలైనంత తొందరగా నీటిని పూర్తిగా బయటకు తీసివేయడం వల్ల విత్తనం కొంత గాలిపోసుకొని ఎటువంటి నష్టం జరగదు. అలా కాక నీరు తీయడానికి వీలు లేక మొలక దెబ్బతింటే తిరిగి విత్తనం చల్లుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. విత్తిన 7 నుండి 30 రోజుల మధ్యలో నారుమడి 5 రోజుల కన్నా ఎక్కువగా నీట మునిగితే నారు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి నారు నీట మునిగిన 5 రోజుల లోపు, నీటిని పూర్తిగా బయటకు తీసివేసి పంటకు గాలి తగిలేలా చేయాలి. నష్ట నివారణకు నీటిని తీసివేసిన తరువాత, 5 సెంట్ల నారు మడికి ఒక కిలో యూరియా మరియు ఒక కిలో మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేసుకోవడం వలన కొత్త ఆకు వచ్చి ఊడ్పులకు అందుతుంది. అంతేకాక అధిక వర్షాలకు నారు మడి దశలో పంట తెగుళ్ళ బారిన పడకుండా, నీరు పూర్తిగా తీసివేసి మొక్క నిలదొక్కు కున్న తరువాత లీటరు నీటికి ఒక గ్రాము కార్బండెజిమ్ లేదా రెండు గ్రాముల కార్బండెజిమ్ + మాంకోజెబ్ కలిసిన మిశ్రమ మందు గానీ కలిపి పిచికారి చేయాలి. పొలంలో నిలుచున్న నీరు మురుగు కాలువల ద్వారా బయటకు వెళ్ళేటట్లు బాటలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

పంట ఊడ్చిన వెంటనే మరియు పిలక దశలో ముంపుకు గురైనట్లైతే, నీటిని పూర్తిగా బయటకు తీసివేసి తరువాత పైపాటుగా ఎకరాకు 20 కిలోల యూరియా + 20 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ అదనంగా వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బూస్టర్ డోస్ వేసుకోవడం వలన మొక్క ముంపు ప్రభావం నుండి త్వరగా కోలుకుంటుంది. మొక్క కోలుకున్న తరువాత కుళ్ళు తెగుళ్ళు రాకుండా లీటరు నీటికి ఒక గ్రాము కార్బండెజిమ్ కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పిగులు పొట్ట మరియు పూత దశ శలో పైరు 1 నుండి 2 రోజుల కన్నా ఎక్కువ రోజులు నీట మునిగితే కంకి పూర్తిగా బయటకు రాకపోవడం, పుష్పాలలో నీరు చేరడం వలన ఫలదీకరణ శక్తి కోల్పోయి

తాలు గింజలు ఏర్పడతాయి. గింజ రంగు మారకుండా ఉండటానికి లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ + మాంకోజెబ్ లేదా 1 మి.లీ. ప్రొపికొనజోల్ మందును పిచికారి చేయాలి.

పాలు పోసుకునే దశ : ఈ దశలో 2 నుండి 3 రోజులకన్నా ఎక్కువగా పంట నీట మునిగితే పిండి పదార్థాలు గింజలలో చేరక గింజ బరువు తగ్గి తద్వారా దిగుబడి మరియు నాణ్యత తగ్గుతాయి. గింజ రంగు మారకుండా ఉండటానికి లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ + మాంకోజెబ్ లేదా 1 మి.లీ. ప్రొపికొనజోల్ మందును పిచికారి చేయాలి.

గింజ గట్టిపడే దశ నుండి కోత దశ చేను పడిపోకుండా ఉండి, నిద్రావస్థ కలిగిన రకాలలో నష్టం తక్కువగా ఉంటుంది. నిద్రావస్థ లేనటువంటి బి.పి.టి. 5204 వంటి రకాలు నీటమునిగితే గింజ మొలక వచ్చి నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిద్రావస్థ ఉన్న రకాలలో కూడా చేను పడిపోయి వారం రోజులకన్నా ఎక్కువగా నీట మునిగినట్లైతే గింజలలో నిద్రావస్థ తొలిగి చేనుపైనే మొలక వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. దీని నివారణకు 5% ఉప్పు ద్రావణాన్ని చేనుపై పిచికారి చేయాలి.

గింజ తోడుకునే లేదా గట్టిపడే దశలో వెన్ను యొక్క బరువువల్ల మొక్కలు కొద్దిపాటి గాలి, వర్షాలకే కణుపుల వద్ద విరిగి నేలకి వరుగుతాయి. ఈ విధంగా పడిపోవడం వల్ల పిండి పదార్థం గింజలకు సరిగా చేరక గింజ బరువు తగ్గడం లేదా తాలు గింజలు ఏర్పడటం జరిగి, తద్వారా దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉన్నది. దీనితోపాటూ పడిపోయిన చేల నుండి వచ్చే ధాన్యం మిల్లింగ్ సమయంలో విరిగిపోయి నూక ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. పడిపోయిన చేలలో యంత్రాలతో కోత కోయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం వల్ల కోతఖర్చు కూడా పెరిగిపోతుంది. పడిపోయిన చేలలో వీలైనంత తొందరగా దుబ్బులను లేపి నిలబెట్టి కట్టలుగా కట్టి, నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

కోత కోసి పొలంలో ఉన్న పనలు వర్షానికి తడిచినట్లైతే గింజ మొలకెత్తకుండా ఉండడానికి 5% ఉప్పు ద్రావణాన్ని పనలపై పడేవిధంగా పిచికారీ చేయాలి. వర్షాలు తగ్గి ఎండ రాగానే పనలను తిరగేసి ఎండబెట్టి నూర్చుకోవాలి. పొలంలో నీరు లేకపోయినట్లయితే మడిలోనే పనలపై ఉప్పు చల్లుకోవచ్చు. ఒక వేళ పొలంలో నీరు నిలిచి ఉన్నట్లయితే పనలను గట్ల పైకి తెచ్చుకొని విడగొట్టి ఉప్పు ద్రావణం చల్లుకోవాలి.

తుఫాను వాతావరణ నేపథ్యంలో పూర్తిగా ఆరని పనలను కుప్పలు వేసేటప్పుడు ఎకరాకు 25 కిలోల ఉప్పును పనలపై చల్లుకుంటూ కుప్ప వేసుకోవడం వల్ల నష్టాన్ని నివారించుకోవచ్చు.

నూర్చిన ధాన్యం 2 –3 రోజులు ఎండ బెట్టడానికి వీలు కాకపోతే కుప్పలలో గింజ మొలకెత్తడమే కాక రంగు మారి చెడు వాసన వస్తుంది. ఇటువంటి పరిస్థిల్లో నష్టాన్ని నివారించడానికి ఒక క్వింటాలు ధాన్యానికి ఒక కిలో ఉప్పు మరియు 20 కిలోల పొడి ఊక లేదా ఎండు వరి గడ్డి కలిపి ధాన్యం పోగు పెట్టడం వల్ల గింజ మొలకెత్తి చెడిపోకుండా నివారించుకోవచ్చు. ఎండ కాసిన తరువాత ధాన్యాన్ని ఎండబోసి, తూర్పారబట్టి నిలవ చేసుకోవాలి.

రంగు మారి, తడిచిన ధాన్యంను పచ్చి బియ్యం కంటే ఉప్పుడు బియ్యంగా అమ్ముకోవడం వల్ల నష్టాన్ని కొంత వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

వర్షాభావ పరిస్థితులలో వరిలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య చర్యలు

- వర్షాభావ పరిస్థితులలో చెరువులు మరియు పంటలు ఎండిపోతున్న తరుణంలో చెరువుల్లో ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని రైతాంగం జీవనీటి తడులను అవసరం మేరకు ఇవ్వాలి.
- పోషక మరియు సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. పొటాషియం నైట్రేట్ లేదా మల్టీ కె (13:0:45) 10 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 15 రోజుల వ్యవధిలో అవసరం మేరకు పిచికారి చేసుకోవాలి.

వరి – సేంద్రీయ వ్యవసాయం

సార్వా రకాలు : యం.టి.యు. 7029 (స్వర్ణ), యం.టి.యు. 1075 (పుష్యమి), బి.పి.టి.5204 (సాంబ మహూరి), యం.టి.యు. 1061 (ఇంద్ర), యం.టి.యు.1262 (మారుటేరు మహూరి), యం.టి.యు.1224 (మారుటేరు సాంబ), ఆర్. జి.ఎల్. 2332 (శ్రీకూర్మ), యం.టి.యు. 1121 (శ్రీధృతి), ఎన్.ఎల్.ఆర్. 33892 (పార్థీవ), ఎన్.ఎల్.ఆర్. 3041 (నెల్లూరు సోన), ఎన్.ఎల్.ఆర్. 4001 (నెల్లూరు సిరి), ఎన్.ఎల్.ఆర్. 40054 (నెల్లూరు సుగంధ), యం.టి.యు. 1156 (తరంగిణి).

నాట్లు వేసే సమయం : ఖరీఫ్ (జూన్– జులై) , రబీ (నవంబరు – డిసెంబరు)

విత్తన మోతాదు : నేరుగా వెదజల్లే పద్దతి– 12–15 కిలోలు ఎకరానికి

సాధారణ నాట్లు వేసే పద్దతి – 20 కిలోలు ఎకరానికి

విత్తన శుద్ధి : నేరుగా విత్తే విధానములో విత్తనాలను సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్సు 10 గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి కలిపి నీడలో ఆరబెట్టాలి. తరువాత అదే విత్తనానికి అజోస్పైరిల్లమ్ ను మరియు పి.ఎస్.బి. (10 గ్రా. లేదా 10 మి.లీ. ప్రతి కిలో విత్తనానికి) కలిపి నీడలో ఆరబెట్టాలి. విత్తనశుద్ధి చేసిన విత్తనాన్ని 6–8 గంటల సమయం లోపు విత్తుకోవాలి.

నారు పెంచి నాట్లు వేసే విధానములో విత్తనానికి సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్సు 10 గ్రా. తో పాటు జీవన ఎరువులైన అజోస్పైరిల్లమ్ మరియు పి.ఎస్.బి. (10 గ్రా. లేదా 10 మి.లీ. ప్రతి కిలో విత్తనానికి తీసుకోని) కిలో విత్తనాన్ని 1 లీటరు నీటిలో 12–16 గంటలు నానబెట్టిన తరువాత 24 గంటలు మండి కట్టినట్లయితే మొలక త్వరగా వస్తుంది.

ఎరువుల యాజమాన్యం :

- తొలకరిలో పచ్చి రొట్టనిచ్చే పంటలను ఎకరానికి 15 కిలోల చొప్పున వేసి 50 % పూత దశకి వచ్చే వరకు పెంచి కలియ దున్నాలి.

- బాగా చివికిన పశువుల ఎరువును 4 టన్నులు ఎకరానికి ఊడ్పు ముందు చల్లుకోవాలి.
- అజోస్పైరిల్లమ్, పి.ఎస్.బి. మరియు కె.ఆర్.బి. 2 కిలోలు ఎకరానికి, 100 కిలోల పశువుల పెంటతో కలిపి నాట్లు వేసేటప్పుడు చల్లుకోవాలి.
- పై పాటుగా వేప చెక్క 200 కిలోలు లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ 500 కిలోలు ఎకరానికి దుబ్బు చేసే సమయములో మరియు అంకురం ఏర్పడు దశలో వేసుకోవాలి.
- నీలి ఆకుపచ్చ ఆల్గే 4 కిలోలు ఎకరానికి లేదా అజోల్లా 100–150 కిలోలు ఎకరానికి నాటు వేసిన 7–10 రోజుల తరువాత వేయాలి దానిని 2–3 వారాలు పెంచి తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ద్రవ జీవామృతం (200 లీ. ఎకరానికి) నేలలో కలిసేటట్టుగా 3 సార్లు 15 లేదా 20 రోజుల వ్యవధిలో పిలకలు పెట్టే దశలో వేయాలి.
- నాటు వేసిన 30 రోజుల తరువాత ఆవు మూత్రము 5 శాతం లేదా పంచగవ్య 3 శాతంను పిచికారి చేసుకోవాలి.

కలుపు యాజమాన్యం

- అజోల్లాని పెంచడం వలన నాటు వేసిన తరువాత వచ్చే కలుపును సమర్ధవంతముగా నివారించవచ్చు
- నాట్లు వేసిన 25 రోజుల కొకసారి మరియు 50 రోజుల తరువాత కలుపు తీయుట వలన అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు.
- నేరుగా విత్తే పద్ధతిలో పచ్చిరొట్ట ఎరువులైన జీలుగను వరి పంట వరుసల మధ్య వేసి ఒక నెల తరువాత కోనో వీడర్ ను ఉపయోగించి భూమిలో కలియ దున్నటం వలన కలుపు నివారణతో పాటు పంటకు ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది.
- కోనో వీడర్ ను ఉపయోగించి పంట వరసల మధ్య దున్నటం వలన కలుపును వేర్లతో సహా తీసివేయవచ్చు.
- కోనో వీడర్ ను రెండు వైపులా ఉపయోగించినచో కలుపు సమర్ధవంతంగా నివారించవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యం

- సేంద్రియ వరి కోసం మంచి నీటినే ఉపయోగించాలి. మురికినీరు గాని, రసాయనాలతో కలుషితమైన నీటిని కాని వాడకూడదు.

సమగ్ర సస్య రక్షణ

కాండం తొలిచే పురుగు

- నాటే ముందు నారు కట్టలు చివరలు తెంపి నాటుట వలన కాండం తొలిచే పురుగు గుడ్ల సముదాయములను నిర్మూలించవచ్చు.
- ఎకరానికి 8 లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టి ఈ పురుగును నివారించవచ్చు
- ఈ పురుగు యొక్క గుడ్ల సముదాయాలను గమనించిన వెంటనే ట్రైకోగ్రామా జపానికమ్ పరాన్నజీవులు ఒక ఎకరానికి 40,000 చొప్పున నాట్లు వేసిన 30 రోజుల నుండి వారం రోజుల వ్యవధిలో 3 సార్లు విడుదల చేయాలి.

- పక్షి స్థావరాలను ఎకరానికి 15-20 చొప్పున అంకురం వృద్ధి చెందే దశ నుంచి గింజ తోడుకునే దశ వరకు పెట్టాలి.

సుడి దోమ మరియు తెల్ల వీపు మచ్చ దోమ

- దోమను తట్టుకునే వంగడములైన ఇంద్ర, అమర, కృష్ణవేణి, భావపురి సన్నాలు మరియు శ్రీ ధృతి వంటి రకాలను సాగు చేయాలి.
- పొలములో తప్పనిసరిగా కాలి బాటలు తీయాలి.
- పొలములో వెంట వెంటనే నీటిని తీసివేసి కొత్త నీరు పెట్టుకోవటం వలన కూడా ఈ పురుగుని నియంత్రించవచ్చు.
- మెటారైజియం ఎనైసోప్లియా (ఎన్.జి.ఎ.ఐ.ఆర్.ఎమ్.ఎ. 35) 5-10 గ్రా./లీ. లేదా బవేరియా బాసియాన (ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్.బి.బి.5ఎ) 5 గ్రా./ లీ. చొప్పున కలిపి పంటపై 2 సార్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేసుకోవడం వలన దోమ ఉధృతి తగ్గించవచ్చు .
- వరి నూకలను 5-10 కిలోలు మరియు వేప నూనెని 1 లీ. కలిపి ఉదయం సమయములో చల్లుకున్నట్లైతే ఈ పురుగును నివారించవచ్చు.

ఆకు ముడత పురుగు

- వేప పిండి లేదా వేప నూనె (1500 పి.పి.యం.) 5 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి నాటు వేసిన 20 రోజులు మరియు 30 రోజుల తరువాత పిచికారీ చేయుట వలన ఈ పురుగును నివారించవచ్చు.
- బాసిల్లస్ తురింజెనిసిస్ (బి.టి.) ను 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి
- ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్నజీవులు ఎకరానికి 40,000 చొప్పున 3 సార్లు నాటు వేసిన 30 రోజుల నుంచి వారం రోజుల వ్యవధిలో విడుదల చేయాలి.
- పైరుపై తాడు లాగుట వలన ఆకుముడుత యొక్క గొంగళి పురుగులు నీటిలో పడుటకు ఆస్కారం కలదు.

ఉల్లికోడు / ఆకుపచ్చ దోమలు / వరి కంపు నల్లి/ కంకి నల్లి

- అజాడిరిక్టిన్ 3000 పి.పి.యం. ను ఎకరానికి 600 మి.లీ. పిచికారి చేసినట్లైతే ఈ పురుగులను నివారించవచ్చు.
- ఉల్లికోడును తట్టుకునే రకములును వాడుకోవాలి.

అగ్గి తెగులు

- విత్తన శుద్ధి లేదా నారును సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్సు 10 గ్రా. లేదా పంచగవ్య (3 శాతం ద్రావణం) కిలో విత్తనానికి సరిపడ నీటిలో కలిపి 20 నిమిషాలు విత్తే ముందు లేదా నాటు వేసే ముందు నానపెట్టి నాటుకోవాలి.
- 10% ఆవు మూత్రమును 2 సార్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి
- తట్టుకునే వంగడములైన సోన మషూరి (బి.పి.టి. 3291), సోమశిల (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 33358), విజేత (యం.టి.యు. 1001), తరంగిణి (యం.టి.యు. 1156), చంద్ర (యం.టి.యు. 1153), శ్రీ ధృతి (యం.టి.యు. 1121), నెల్లూరు మషూరి (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 34449), శ్వేత (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 40024),

స్వర్ణముఖి (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 145) మరియు నెల్లూరు సోన (ఎన్.ఎల్.ఆర్. 3041) వంటి రకములను ఎంచుకోవాలి.

- కలుపును ఎప్పటికప్పుడు తీసివేసుకోవాలి.
- నత్రజనిని ఇచ్చే సేంద్రియ ఎరువులను సమతుల్యముగా వేసుకోవాలి.

పొడ తెగులు / ఆకు మచ్చ తెగులు

- విత్తనశుద్ధి (లేదా) నారును శుద్ధి చేయడానికి సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్సు 10 గ్రా. లేదా పంచగవ్య (3 శాతం) కిలో విత్తనానికి సరిపడ నీటిలో కలిపి 20 నిమిషాలు విత్తే ముందు లేదా నాటు వేసే ముందు నానబెట్టి నాటుకోవాలి.
- ఎకరాకు 2 కిలోల చొప్పున సుడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్సును నేలలో వేయాలి
- కలుపును ఎప్పటికప్పుడు తీసివేసుకోవాలి
- పచ్చిరొట్ట నిచ్చే పంటలను వేసుకొని కలియదున్నాలి

కాండం కుళ్ళు తెగులు

- ముందు పంట యొక్క అవశేషాలను పూర్తిగా తీసివేయాలి
- పొలములో ఉన్న నీటిని పూర్తిగా తీసివేయాలి
- సేంద్రీయ ఎరువులను అదనంగా వేయుట వలన ఈ తెగుళ్ళను తగ్గించుకోవచ్చు.

టుంగ్రో వైరస్ తెగులు

- తెగులు సోకిన మొక్కలను తీసివేసి నాశనం చేయాలి మరియు సేంద్రీయ ఎరువులను పైపాటుగా వేయాలి.
- 1 లీ. ఆవు మూత్రము, 1 లీ. మజ్జిగ మరియు 8 లీ. నీరు కలిపి పిచికారి చేయటం వలన ఈ వైరస్ తెగులుతో పాటు ఇతర బాక్టీరియ మరియు శిలింధ్ర తెగుళ్లను కూడ తగ్గించుకోవచ్చు.

బాక్టీరియా ఎండు తెగులు

- ఈ తెగుళ్ళను తట్టుకొనే రకములైన ఇంద్ర (యం.టి.యు. 1061), అమర (యం.టి.యు. 1064), పుష్యమి (యం.టి.యు. 1075), స్వర్ణ (యం.టి.యు. 7029), అక్షయ (బి.పి.టి. 2231), వంటి రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- తెగులు సోకిన పొలం నుండి నీటిని ప్రక్క చేలకు పోకుండా అదుపు చేయాలి.
- తెగుళ్ళు సొకిన మొక్కలను నాశనం చేయాలి మరియు కలుపు మొక్కలను తీసివేయాలి.
- పొలములో నీడ లేకుండా చూసుకోవాలి.
- 10 శాతం వర్మీ వాష్ మరియు 5 శాతం ఆవు మూత్రమును 10 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- సిఫారసు చేయబడిన నత్రజని ఎరువును సేంద్రీయ ఎరువుల ద్వారా అందించాలి. అలాగే తెగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే నత్రజని ఎరువును వేయరాదు.

ఆరుతడి వరి (ఏరోబిక్ రైస్)

ఏరోబిక్ వరి సాగు పద్ధతి 2002 సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధనా సంస్థ, ఫిలిప్పైన్స్‌లో విస్తృత పరిశోధనల అనంతరం ఫిలిప్పైన్స్, చైనా, భారతదేశం వంటి దేశాల్లో ప్రవేశపెట్టడమైనది. చైనా లాంటి దేశాలలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మారిన వాతావరణ పరిస్థితులలో తక్కువ నీటితో లాభదాయక దిగుబడులను పొందడం వరిలో ఏరోబిక్ సాగు విధానం ద్వారా సాధ్యం. ఈ పద్ధతిలో కూడ మన దేశంలో వరి సాగు చేసి మేలైన దిగుబడులు పొందడం జరుగుచున్నది. మన రాష్ట్రంలో రైతులు అవలంభించే ఆరుతడి వరి పద్ధతికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఏరోబిక్ వరి పద్ధతిలో వరిని మనం సాధారణంగా పండించే మొక్కజొన్న, జొన్న వంటి పంటలవలె ఆరుతడి పరిస్థితులలో పండించడం, పంట అవసరం మేరకు నీటిని పెట్టుట ద్వారా పండించే విధానాన్ని 'ఏరోబిక్ వరి' అని వ్యవహరిస్తారు. ఏరోబిక్ వరిని ముఖ్యంగా మాగాణి భూముల్లో సాధారణ పద్ధతిలో సాగు చేయడానికి నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో లేదా వర్షాధార పంటగా పండించే భూముల్లో అడపాదడపా నీరు అందించే సౌకర్యం కలిగిన ప్రాంతాల్లో చెరువులు క్రింద సాగుచేసే పరిస్థితుల్లో ఈ పద్ధతి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరుతడి వరిని పండించడానికి పొలంలో నీటిని నిల్వగట్టవలసిన అవసరం లేదు.

ఆరుతడి (ఏరోబిక్) పద్ధతిలో వరిసాగుకి ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు ఆచరించాలి

1. **రకాల ఎంపిక :** ఆరుతడి పంటల సాగుకు ఎంపిక చేసుకొనే రకాలకు ఉండవలసిన ముఖ్య లక్షణాలు –

- లోతైన వేరు వ్యవస్థ కలిగి ఉండి, బెట్టను తట్టుకోగలిగి ఉండాలి.
- స్వల్ప లేదా మధ్యకాలిక రకాలుగా ఉండాలి. (120–135 రోజులు)
- ప్రాథమిక దశలో మొక్క ఎదుగుదల వేగంగా ఉండే రకాల ఎంపిక వల్ల కలుపు సమస్యను పైరు ఎదిగే దశలో కొంతవరకు అధిగమించవచ్చు.
- పైరు సాధ్యమైనంత పొట్టిగా ఉండాలి. • కాండం ధృడంగా ఉండి పైరు పడిపోకుండా ఉండాలి.
- పిలకలు తొడిగే సామర్థ్యం మధ్యస్థంగా ఉండాలి (10–12)
- ఆయా ప్రాంతాలలో అధికంగా ఉన్న చీడపీడలను తట్టుకోగలిగిన సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి.
- ఆరుతడి వరి సాగుకు అనువైన రకాలుగా క్రింది వాటిని గుర్తించడం జరిగింది. ఎన్.ఎల్.ఆర్.34449 (నెల్లూరు మషూరి), ఎన్.ఎల్.ఆర్.145 (స్వర్ణముఖి), యం.టి.యు.1156, బి.పి.టి.5204, ఎన్.ఎల్.ఆర్. 33358 (సోమశిల), యం.టి.యు. 1121 (శ్రీధృతి), యం.టి.యు. 1210 (సుజాత) మరియు యం.టి.యు. 1224 (మారుటేరు మషూరి).

2. **భూమి తయారీ :** తొలకరి వర్షాలను సద్వినియోగం చేసుకుని పలుమార్లు దున్ని మెత్తని దుక్కి చేసినట్లయితే కలుపు సమస్యను కొంతవరకు అధిగమించవచ్చు. ఆఖరి దుక్కిలో సిఫారసు మేరకు భాస్వరము, పొటాష్ ఎరువులు వేసి కలియదున్ని బాగా చదును చేయాలి. నేల సమతలంగా / చదునుగా లేనట్లయితే తేమ సరిగా అందక మొలక సరిగా రాదు. పంట ఎదుగుదల కూడ సమానంగా ఉండదు.

3. **విత్తన మోతాదు :** ఎకరానికి 16 – 20 కిలోల విత్తనము ఉపయోగించాలి.

4. **విత్తనశుద్ధి :** విత్తేముందు కార్బెండజిమ్ మందుతో కిలో విత్తనానికి 3 గ్రాములు చొప్పున కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయాలి.

5. **నేరుగా విత్తుట :** శుద్ధి చేసిన విత్తనాన్ని నేరుగా చదును చేసిన పొలంలో వెదజల్లడం ద్వారా గాని 20 సెం.మీ. దూరంలో నాగటి సాలు వెనకగాని, గొర్రుతోగాని, ట్రాక్టరుతో నడిచే ఎరువులు మరియు విత్తనాన్ని ఒకేసారి వేసే గొర్రుతో (ఫర్టికమ్ సీడ్ డ్రిల్) గాని వేసుకోవచ్చు. విత్తనాన్ని ఎక్కువ లోతులో వేసినట్లయితే మొలకశాతం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కనుక పై పొరల్లో పడేటట్లుగా సుమారు (2.5 – 5 సెం.మీ.) లోతులో వేసుకోవాలి.

6. **ఎరువుల యాజమాన్యం :** ప్రధాన పోషకాలను సిఫారసు మేరకు వేయాలి. సిఫార్సు చేసిన భాస్వరం ఎరువు పూర్తి మోతాదును ఆఖరి దుక్కిలో వేసుకోవాలి. పొటాష్ ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో సగభాగం, మిగిలిన సగభాగం నత్రజని ఎరువుతోపాటు అంకురం ఏర్పడే దశలో వేసుకోవాలి. నత్రజని ఎరువును సాధారణంగా వేసే మాగాణి వరికంటే సుమారు 25 శాతం అధికంగా వేయాలి. నత్రజని ఎరువును మూడు దఫాలుగా విత్తిన 15 రోజులకు, పిలక దశలో, అంకురం దశలో వేయాలి.

ఏరోబిక్ వరిలో ఇనుపధాతు లోపం ఎక్కువగా వస్తుందని గమనించడమైనది. ఇనుపధాతు లోపించుట వలన ఆకులు తెల్లగా పాలిపోయినట్లు వుండి ఎదుగుదల కుంటుపడుతుంది. ఈ లోప లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే లీటరు నీటికి 20 గ్రా. అన్నభేదిని 2 గ్రా. నిమ్మ ఉప్పుతో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. అవసరమైతే వారం రోజులు తరువాత మరొకసారి పిచికారి చేయాలి.

ఏరోబిక్ వరిలో జింక్ ధాతు లోపం కూడా వస్తుంది. కావున విత్తిన 20–25 రోజుల తర్వాత లీటరు నీటికి 2 గ్రాముల జింక్ సల్ఫేట్‌ను వారం రోజుల వ్యవధిలో 2–3 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

7. **కలుపు యాజమాన్యం :** ఈ పద్ధతిలో నీరు నిల్వగట్టడం ఉండదు. కాబట్టి, కలుపు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కలుపు నివారణకు సమగ్ర నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. విత్తిన పిదప భూమిలో తగు మాత్రం తేమ ఉండే పరిస్థితులలో కలుపు మందు వాడాలి. ఒక ఎకరానికి 1 లీటరు పెండిమిథాలిన్ లేదా 500 మి.లీ. ప్రిటిలాక్లోర్ + సేఫనర్ లేదా 35 గ్రా. ఆక్సాడయార్జిల్ వంటి వాటిలో ఏదో ఒక మందును 200 లీటర్లు నీటిలో కలిపి భూమిపై విత్తిన 2–3 రోజుల్లోపల పిచికారీ చేయాలి. విత్తిన వెంటనే వర్షం పడే సూచనలున్నట్లైతే పెండిమిథాలిన్ పిచికారి చేయకూడదు. పెండిమిథాలిన్ పిచికారి చేసిన వెంటనే నీటి తడి పెట్టకూడదు. విత్తిన 15–20 రోజులకు కలుపు ఉధృతిని బట్టి బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం అనే మందును ఎకరాకు 120 మి.లీ. పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20–25 రోజులపుడు వెడల్పాటి ఆకు జాతి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే 2,4 డి సోడియం సాల్ట్ @ 2 గ్రా. /లీ. లేదా 2,4 డి అమైన్‌సాల్ట్ @ 2 మి.లీ./ లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. అయితే అన్ని రకాల కలుపు మొక్కలు ఉన్నప్పుడు 30 రోజులు తర్వాత ఒకసారి మనుషులతో కలుపు తీసి గొప్పు తవ్వించడం వలన కలుపు మొక్కలు నశించడమే

కాక భూమి గుల్లబారి ఎక్కువ తేమ భూమిలో నిలువ ఉంటుంది. తద్వారా పంట త్వరగా బెట్టకి గురికాకుండా చూడవచ్చు. పంట వరుసల్లో విత్తినట్లయితే వరుసల మధ్య అంతరకృషి చేసుకోవచ్చు. దీనివలన తక్కువ ఖర్చుతో కలుపును నివారించవచ్చు.

8. **నీటి యాజమాన్యం :** పంటకు ప్రతి 7–10 రోజులకొకసారి అవసరం మేరకు నీటి తడులు పెట్టాలి. ఎరోబిక్ వరికి పొలంలో ఎల్లప్పుడు నీరు నిలువ ఉంచవలసిన అవసరం లేదు. అయితే పంటకు కావలసిన తేమను అందించడం పంట కీలక దశల్లో బెట్టకు గురికాకుండా చూడడం ప్రధానమైన అంశం. అధిక వర్షాలు నమోదైనప్పుడు నీటి తడులు అవసరం ఉండదు. ఈ విధంగా ఖరీఫ్‌లో 3–4 తడులతో వరి సాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. నీటిని 30–40 శాతం మేర ఆదా చేసుకోవచ్చు.

9. **దిగుబడి :** ఆరుతడి వరిలో సాధారణంగా వేసే మాగాణి వరి దిగుబడులతో పోల్చినప్పుడు సుమారు 80–90 శాతం వరకు దిగుబడులు పొందవచ్చు.

ఆరుతడి పద్ధతిలో వరి సాగు చేయుట వలన లాభాలు

1. తొలకరి వర్షాలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
2. నారుమడి పెంపకం, నాట్లకు అయ్యే ఖర్చు తగ్గుతుంది.
3. చెరువుల క్రింద, కాలువల క్రింద సాగుచేసే పరిస్థితుల్లో నాట్లు ఆలస్యం కాకుండా సకాలంలో పంటను సాగు చేయవచ్చును.
4. పంట త్వరగా (వారం నుండి 10 రోజులు) కోతకు వస్తుంది.
5. పురుగులు, తెగుళ్ళ సమస్య కొంతవరకు తక్కువ.
6. నీటిని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
7. కోత యంత్రాలతో సులువుగా పంటకోత చేపట్టవచ్చు.

సమస్యలు

1. పంట తొలిదశలో దీర్ఘకాలిక వర్షాభావ పరిస్థితి సంభవించినట్లయితే పంట దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది.
2. కలుపు ఉధృతి ఎక్కువ.
3. విత్తిన 45–50 రోజులకు సమృద్ధిగ నీరుపెట్టి మాగాణి వరిలాగ సాగు చేయాలి లేని పక్షంలో దిగుబడి బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.

వరి పంట మరియు ఆరుతడి వరి సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వరి), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు – 534 122,

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఫోన్ నెం. 08819 – 246283, మొబైల్ – 94901 95904

యంత్రాలతో వరి నాట్లు - యాజమాన్యము

వరి సాగులో నీటి వినియోగంతో పాటు, కూలీల అవసరం కూడా చాలా ఎక్కువ. సుమారు ఒక ఎకరాకు పంటకాలంలో 50-70 రోజుల పని దినాలు అవసరం అవుతాయి. ముఖ్యంగా వరినాట్లు సకాలంలో వేసినపుడే అధిక దిగుబడులు సాధ్యమవుతాయి. కానీ కూలీలు సకాలంలో అందుబాటులో లేకపోవడము, ఇటీవల కాలంలో కూలీ రేట్లు అధికమవడము వలన వరినాట్లు యంత్రాలతో వేయవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడినది. వరిసాగు చేసే రైతాంగము వరి నారును నారుమడి నుండి తీసి తిరిగి ప్రధాన పొలంలో నాటడానికి కావలసిన వ్యవసాయ కూలీలు దొరకక సరైన సమయంలో నాట్లు వేయలేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దీనికి ముఖ్యకారణం వరినాట్లు వేయడం శ్రమతో కూడుకున్న పని మరియు బురదలో చేయవలసిన పని. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వరినాటు యంత్రాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. వరి పంటను పండించేందుకు అయ్యే ఖర్చు తగ్గించి, ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచి అధిక లాభాలు పొందాలంటే, రైతులు ఆధునిక వరి నాటు యంత్రాలను వినియోగించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ వరి నాటు యంత్రాలను వినియోగించేటప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రత్యేక ట్రేలలో గాని లేదా నిర్ధారించిన పద్ధతుల ద్వారా కాని పెంచిన వరి నారును మాత్రమే నాటేందుకు వీలవుతుంది.

వరినాటు యంత్రాలు :

ఎ) మనిషి వెనక నుండి నడిపే వరి నాటు యంత్రము

ఇది చైనా దేశంలో రూపొందించబడినది. ఇది 4 హెచ్.పి. పెట్రోలు ఇంజనుతో పని చేయును. దీని బరువు 305 కిలోలు. ఈ యంత్రముతో 4 నుండి 8 సాళ్ళలో వరి నాటవచ్చును. దీనికి నారును నారుమడిలో ప్లాస్టిక్ షీట్‌ను పరిచి, దానిపై మట్టిని పలుచగా వేసి దానిపై మొలకెత్తిన వరి విత్తనాలను చల్లి, పలుచగా నీటితో తడపడం వలన నారును పెంచవచ్చును. ఇలా పెంచిన 15-20 రోజుల నారును (12-15 సెం.మీ) ట్రే కొలతలకు అనుగుణంగా కత్తిరించాలి. యంత్రం ద్వారా నాటేందుకు ముందు పొలాన్ని బాగా దమ్ముచేసి, చదును చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అంతేగాక పొలాన్ని ఆరబెట్టాలి. నాటేముందు పలుచగా నీరు పెట్టడం వలన యంత్రం సులువుగా నాటేందుకు వీలవుతుంది. దీనితో సాళ్ళలో వరుసకు వరుసకు మధ్య 23.8 సెం.మీ. మరియు ఒకే వరుసలోని దుబ్బుకు, దుబ్బుకు మధ్య 14 సెం.మీ. లేదా 17 సెం.మీ. వేసుకొనుటకు వీలు కలదు. ఇది సుమారుగా 2 నుండి 3 వరి పిలకలను 4 నుండి 6 సెం.మీ. ల భూమి లోపల వరకు గుచ్చును. ఈ యంత్రమును ఉపయోగించి ఒక ఎకరం పొలంను 1 నుండి 2 గంటల లోపల నాటవచ్చును. రోజుకు 3-4 ఎకరాలు నాటడానికి వీలవుతుంది. దీని ఖరీదు రూ. 1,80,000/- నుండి 2,20,000/- వరకు ఉండును.

బి) స్వయం శక్తితో నడిచే వరి నాటు యంత్రము

ఈ యంత్రాలను జపాన్, కొరియా మరియు చైనా దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకొనుచున్నాము. ఇవి పెట్రోలు మరియు డీజిల్ సహాయంతో 15 నుండి 21 అశ్వసామర్థ్యంతో నడిచే యంత్రాలు. ఇంధన వినియోగం

2–3 లీటర్లు ఒక గంటకు ఉంటుంది. ఇందులో వరుసకు, వరుసకు మధ్య 30 సెం.మీ. (12 అంగుళాలు లేదా ఒక అడుగు), మొక్కల మధ్య 12–21 సెంటీ మీటర్లు వరకు (12, 14, 16, 18, 21 సెం.మీ.) వేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఒక కుదురుకు ఎన్ని మొక్కలు నాటాలి, ఎంత లోతులో నాటాలి మరియు ఎంత దూరంలో నాటాలి అనే నియంత్రణ ఉండడం వలన పొలంలో అవసరం మేరకు మొక్కల సాంద్రతను వేయవచ్చును. ఈ యంత్రంతో ఒక ఎకరా పొలాన్ని 1.5 నుండి 2.0 గంటలలో నాటవచ్చును. దీని ధర సుమారుగా రూ. 2.85 నుండి 3.5 లక్షల వరకు ఉండును.

యాజమాన్య పద్ధతులు :

1. పొలం తయారీ

ఎ) **చదును చేయడం :** లేజరు గైడెడ్ లెవలర్‌ను ఉపయోగించుట ద్వారా పొలము పూర్తిగా సమాంతరముగా చేయబడుతుంది. దీని వల్ల పంట ఒకేసారి కోతకు రావడమే కాకుండా దిగుబడులు పెరిగే అవకాశముంటుంది. ఈ పరికరమును వినియోగించుట ద్వారా గట్టుల విస్తీర్ణము తగ్గి తద్వారా పొలము విస్తీర్ణము 2–3 శాతము పెరుగుతుంది. అంతే కాకుండా పెద్ద పెద్ద మడులు నిర్మించుట ద్వారా ఇతర వ్యవసాయ పనులు తేలికగా చేయు వీలుంటుంది.

బి) **దమ్ము చేయడం :** దున్ని చదును చేసిన పొలాన్ని నీరు పెట్టి బాగా 2–3 సార్లు రోటోపడ్లర్ లేదా ఏదైనా దమ్ము చేయు పరికరం సహాయంతో దమ్ము చేయాలి. ఈవిధంగా చేయడం వలన 35–40 శాతము సాగునీటిని ఆదా చేయవచ్చును. పొలం స్వభావాన్ని బట్టి 2 నుండి 5 రోజులు నాటుటకు ముందుగా దమ్ముచేసి, చదును చేయాలి. దీని వలన మట్టి బాగా తేరుకొని, నాట్లు వేయడానికి అనువుగా మరియు సులువుగా ఉంటుంది.

2. నారు పెంచడం : యంత్రాల ద్వారా నాట్లు వేయదలచుకొన్నప్పుడు నారును ట్రేలలో పెంచాలి.

ఎ) **విత్తన మోతాదు :** ఎకరానికి రకాన్ని బట్టి 12–15 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది.

బి) **నారు వయస్సు :** ట్రేలలో పెంచిన నారును 14 నుండి 17 రోజుల వయస్సులో నాటాలి. 14 రోజుల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నపుడు నారును మిషన్ తీసుకోవడానికి కష్టము మరియు ముదురు నారును నాటాలంటే వేరు వ్యవస్థ బాగా అల్లుకొని నాట్లు వేయడం కష్టమవుతుంది. నారు పొడవు కూడా 15 సెం.మీ. మించినపుడు, నాట్లు వేస్తే నారు మడతపడి సరిగా నాటు పడదు.

సి) **ట్రేలలో నారు పెంచడము :** ముందుగా ఎకరాకు సరిపడే 12–15 కిలోల విత్తనాన్ని, 2 కిలోల ఉప్పు నీటిలో వేసి, తర్వాత మంచినీటిలో 4–5 సార్లు బాగా కడిగి, 24 గంటలు నీటిలో నానబెట్టి, 12 గంటలు మండె కట్టిన విత్తనాన్ని ట్రేలలో 'సీడింగ్ మెషిన్' ద్వారా వేయాలి. ట్రేలు 2 అడుగుల పొడవు, 1 అడుగు వెడల్పు కలిగి, ఒక అంగుళం ఎత్తు ఉండి, ఎకరాకు 70–80 ట్రేలు అవసరమవుతాయి. ఒక్కో ట్రేలో

3.5 నుండి 4.0 కిలోల మట్టి అవసరం అవుతుంది. ఒక ట్రేకి విత్తన పరిమాణాన్ని బట్టి 120-160 గ్రాముల సరిపోతుంది. ఈ ట్రేలను నింపడానికి "ఆటోమెటిక్ సీడింగ్ మిషన్"ని తయారు చేశారు. వీటిలో పొడి మట్టి అవసరం అవుతుంది. మట్టిని పొడి చేసే యంత్రాన్ని ఉపయోగించి మట్టిని బాగా మెత్తగా చేసుకొని, ఆటోమెటిక్ సీడింగ్ మెషిన్‌లో వేసినపుడు ట్రేలు కన్వేయర్ బెల్టు ద్వారా పంపినచో మొదట మట్టి, తర్వాత విత్తనం, తర్వాత పలుచగా మట్టిని వేయడం మరియు నీటిని కూడా పలుచగా చల్లడం జరుగుతుంది. తర్వాత ట్రేలను దమ్ము చేసిన వరి నారు మళ్ళలో పెట్టి, మొదటి రెండు రోజులు ఉదయం, సాయంత్రం నీటిని రోజ్‌క్యాన్‌తో గానీ, చేతితో గానీ చిలకరించాలి. ట్రేలపైన వరి గడ్డిని కప్పడం వలన విత్తనాన్ని ఎలుకలు, ఎండ, పక్షులు మరియు ఇతరుల నుండి రక్షించుకొనవచ్చును. విత్తనం మొలిచిన తర్వాత 7 లేక 8వ రోజునుండి, పొలంలో నీటిని పలుచగా పెట్టి, ఆవిధంగా తయారైన ట్రేలను రకాన్నిబట్టి 15 నుండి 20 రోజుల లోపు ప్రధాన పొలంలో నాట్లు వేసే యంత్రం ద్వారా నాటుకోవాలి. పొడిమట్టి అందుబాటులో లేనపుడు, నారు మడిలోనే బురద మట్టితో ట్రేలను నింపి, రాళ్ళను పూర్తిగా ఏరివేసి, మండెకట్టిన విత్తనమును ట్రేలపై చల్లి, వరి గడ్డిని కప్పి, నారును పెంచవచ్చును. ట్రేలలో నారు సరిగా పెరగనపుడు 1% యూరియాని లేదా 1% డి.ఎ.పి.ని పిచికారి చేయాలి.

3. నాట్లు వేయడం

ప్రస్తుతము రెడ్ ల్యాండ్స్, కుబోటా, యాన్‌మార్ కంపెనీల నాట్లు వేసే యంత్రాలు 18 - 22 HP. సామర్థ్యం కలిగి 4, 6, 8 వరుసలలో నాటుటకు వీలుగా తయారుచేయబడి ఉన్నాయి. వీటితో ఒక ఎకరాకు 45 నిమిషాల నుండి ఒక గంటకు నాట్లు వేయడానికి వీలవుతుంది. వీటి ద్వారా రోజుకు 6 నుండి 8 ఎకరాల వరకు నాట్లు వేసుకొనవచ్చును. ఇవి డీజిల్ మరియు పెట్రోల్ సహాయంతో 2.5 నుండి 6.0 లీ. /గంటకు సామర్థ్యంతో పనిచేయుచున్నవి. యంత్రంతో పొలంలో నాటడానికి పొలాన్ని, పొలం స్వభావాన్ని బట్టి 4 నుండి 6 రోజులు ముందుగా దమ్ము చేసి, బాగా చదును చేసి, నాటే ముందు రోజు పొలంలో నీటిని తీసివేయాలి. యంత్రాల ద్వారా ఎక్కువ లోతైన నల్లరేగడి నేలల్లో కూడా నాట్లు వేయవచ్చును. ఈ యంత్రాలతో నారు నాటవలసిన లోతు, మొక్కల మధ్య దూరము నియంత్రించడానికి వీలుగా ఉన్నందువలన, రైతులకు ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఈ యంత్రాల ఖరీదు నారు పెంచే పరికరంతో కలుపుకొని 9.5 లక్షల నుండి 11.00 లక్షలు (ఆరు వరుసలు, పెట్రోల్‌తో నడిచేవి, కుబోటా కంపెనీ), 16-18 లక్షలు (8 వరుసలు, డీజిల్‌తో నడిచేవి).

ఈ యంత్రాల ద్వారా నాట్లు వేసినపుడు వరుసల మధ్య దూరము ఒక అడుగు (30 సెం.మీ.), ఒక వరుసలోని మొక్కల మధ్య దూరము 12 సెం.మీ. నుండి 21 సెం.మీ. వరకు మార్చుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది. నాట్లు కుదురుకు ఎన్ని మొక్కలు నాటాలి మరియు ఎంత లోతులో నాటాలి అనే నియంత్రణ ఉంటుంది. పొలంలో నాట్లు వేసేటప్పుడు నీరు తీసివేయడం వలన మరియు నాటిన 2-3 రోజులు చాలా పలుచగా నీరు ఉండడం వలన కలుపు సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి నాటిన 3-5 రోజుల లోపల ప్రెటిలాక్లోర్ అనే కలుపు మందును 500 మి.లీ. / ఎకరాకు గానీ, ఆక్సాడయార్జిల్ అనే కలుపు మందును

35–50 గ్రా. / ఎకరాకు లేదా బెన్ సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ ఒ ప్రెటిలాక్లోర్ గుళికలను ఎకరాకు 4 కిలోల చొప్పున 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి, పొలంలో నీరు పలుచగా ఉన్నపుడు చల్లాలి.

నాట్లు వేసిన 15 నుండి 20 రోజులపుడు పొలంలో కేవలం గడ్డిజాతి కలుపు ఉన్నట్లయితే సైహలోఫాప్ బ్యూటైల్ అనే కలుపు మందును ఎకరాకు 400 మి.లీ. లేదా గడ్డి మరియు ఆకుజాతి కలుపు ఉన్నట్లయితే బిస్ పైరిబాక్ సోడియం అనే కలుపు మందును ఎకరాకు 100 మి.లీ. చొప్పున పొలంలో నీటిని తీసివేసి పిచికారి చేయాలి.

మోటారుతో నడిచే కలుపుతీత యంత్రముతో సాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న కలుపును నాటిన 15 రోజుల తర్వాత ప్రతి 10 రోజుల వ్యవధిలో 3–4 సార్లు కలుపు తీయడం వలన, వేర్లకి గాలి బాగా అందుబాటులో ఉండి, పిలకలు అధిక సంఖ్యలో మరియు ఒకేసారి రావడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని గమనించినట్లయితే మామూలు పద్ధతిలో మాదిరిగానే సిఫారసు చేసిన ఎరువుల మొతాదులో వేసుకోవాలి. లేత నారు నాటడం వలన నత్రజనిని 4 నుండి 5 దఫాలుగా, భాస్వరం మొత్తాన్ని దుక్కిలో మరియు పొటాష్‌ను దుక్కిలో మరియు కరుకు సమయంలో రెండు దఫాలుగా వేయాలి.

వరి నాటు యంత్రాలతో నాట్లు వేయడం వలన సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వరి సాగుకంటే ఖర్చు బాగా తగ్గి 10–25 శాతం అధిక దిగుబడులు వచ్చినట్లు పరిశోధనలలో తెలిసినది.

వరి నాటు యంత్రం వలన దిగుబడులు పెరగడానికి కారణాలు

- లేత నారు నాటుట (లేత నారు 15 నుండి 25 రోజులు) వలన పిలకల సంఖ్య పెరిగి అధిక దిగుబడి వస్తుంది.
- వరుసల మధ్య మరియు మొక్కల మధ్య దూరము సమానముగా ఉండుట వలన ఈనిక ఒకేసారి ఉండి తాలుశాతం తగ్గుతుంది.
- నాట్లు తక్కువ లోతులో (పైపైన) వేయడం వలన మరియు మొక్కల సాంద్రత సరిపడా ఉండి, దిగుబడి పెరుగుతుంది.
- యంత్రము ద్వారా కలుపు తీయడం వలన భూమిలో గాలి ప్రసరణ అందుబాటులో ఉండి, వేరు వ్యవస్థ దృఢంగా తయారై, అధిక పిలకలు రావడానికి అవకాశం ఉంది.

వరి విత్తనాలు సాళ్ళలో నాటు పరికరము (డ్రమ్ సీడర్) :

ఈ పరికరము ద్వారా 8 సాళ్ళలో మొలకెత్తుతూ ఉన్న వరి విత్తనమును నాటవచ్చును. దమ్ము చేసిన భూమిలో వరుసలలో మొలకెత్తుతూ ఉన్న విత్తనాలను వేయటానికి డ్రమ్ సీడరు ఉపయోగపడుతుంది. మొలకెత్తుతూ ఉన్న విత్తనములను డ్రమ్‌లో సగం వరకు నింపవలెను. ఆ తర్వాత ఈ పరికరాన్ని దమ్ము చేసి చదును చేసిన బురద నేలలో (నీళ్ళు లేకుండా) లేదా 1 సెం.మీ. నీళ్ళు ఉన్న నేలలో లాగినప్పుడు డ్రమ్ మీద ఉన్న రంధ్రాల

ద్వారా విత్తనాలు సాళ్ళలో పడతాయి. ఒక మనిషి ఈ పరికరము లాగుటకు మరియు ఒకరు వరి విత్తనాలు డ్రమ్‌లో నింపుటకు కావలెను. దీనితో గంటకు 0.25 ఎకరము వరకు వరి విత్తుకోవచ్చును. దీని ధర సుమారు రూ. 5,000/-.

విత్తనము విత్తే పరికరాలు (మెట్ట వరి) :

ఈ మధ్యకాలంలో కోస్తా ప్రాంతములో కాలువలలో నీరు ఆలస్యముగా విడుదల చేయుట వలన మరియు సకాలంలో వర్షాలు లేనందున వరి నాట్లు బాగా ఆలస్యమవుతున్నాయి. దీనిని నివారించుటకు మెట్ట వరి విత్తనాలను సకాలంలో విత్తి కాలువలో నీరు వచ్చిన వెంటనే మాగాణి వరిగా మార్చవచ్చును. ఈవిధమైన మెట్ట వరిని విత్తుటకు ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు రకాల విత్తనము విత్తే పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వరిని మెట్టలో ఎదపెట్టుట వలన దిగుబడిలో ఎటువంటి తేడా లేకుండా మరియు సుమారు రూ. 5,100/- వరకు ఖర్చును తగ్గించవచ్చును.

ఫ్లూటెడ్ రోలర్‌ఫీడ్ విత్తే పరికరాలు (విత్తన గొర్రు) :

ఈ పరికరములో విత్తన డబ్బా మరియు ఫ్లూటెడ్ చక్రాల విత్తన నిర్దేశించే వ్యవస్థను కల్టివేటరు మీద అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ విత్తే పరికరములో విత్తనం డబ్బా క్రింది భాగాన కర్రుల సంఖ్యను బట్టి విడివిడిగా ఫ్లూటెడ్ రోలర్ (గుండ్రటి స్తూపాకారపు చక్రాన్ని) ఉపరితలంలో గనుపులు కలిగి ఒక పొడవాటి కడ్డీపై అమర్చబడి ఉంటాయి. విత్తే పరికరము వెనుకభాగాన అమర్చిన భూచక్రం తిరగటం వలన వచ్చే శక్తితో ఈ కడ్డీని తిప్పే విధంగా ఇనుపచైన్ల ద్వారా కలపబడి ఉంటుంది. ఈ ఫ్లూటేడ్ రోలర్ విత్తనం డబ్బాలో తెరువబడిన సైజును బట్టి విత్తే విత్తనం మోతాదు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ యంత్రమును లాగుటకు సుమారు 35 అశ్వ శక్తి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ట్రాక్టరు కావలెను. ఈ పరికరముతో ఒక రోజులో సుమారు 4-5 హెక్టార్లలో వరిని ఎద పెట్టవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ. 45,000/-. ఈ యంత్రముతో ఒక హెక్టారుకి వరిని విత్తేందుకు సుమారు రూ. 1500/- వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ పరికరము ద్వారా కావలసిన సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని పొందవచ్చును కానీ గింజకు గింజకు మధ్య నిర్దేశించిన ఎడం పొందడానికి వీలులేదు. ఈ పరికరముతో ఒక ఎకరానికి సుమారు 15-20 కిలోల వరకు వరి విత్తనాలను ఎద పెట్టవచ్చును.

యంత్రాలతో వరి నాట్లు -యాజమాన్యంపై సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల,
బాపట్ల - మొబైల్ - 91775 22213

మొక్కజొన్న

మొక్కజొన్నను మనము ఆహారంగానే గాక, దాణా రూపంలోను, పశువులకు మేతగాను, వివిధ పరిశ్రమల్లో ముడి సరుకుగాను, పేలాలు, తీపికండె మరియు కాయగూర రకంగాను ఉపయోగించడం జరుగుతున్నది. మన రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న సాగు విస్తీర్ణం 3.54 లక్షల హెక్టార్లు, ఉత్పత్తి 24.98 లక్షల టన్నులు మరియు దిగుబడి హెక్టారుకు 7064 కిలోలుగా (ఖరీఫ్‌లో 5507 కిలోలు మరియు రబీలో 8113 కిలోలు) నమోదు చేయబడింది. నంద్యాల, బాపట్ల, విజయనగరం, ఏలూరు మరియు గుంటూరు జిల్లాలలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేయబడుతున్నది.

మొక్కజొన్నలో కాలపరిమితిని బట్టి దీర్ఘకాలిక (100–120 రోజులు), మధ్యకాలిక (90–100 రోజులు) మరియు స్వల్పకాలిక (<90 రోజులు) రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక మరియు మధ్యకాలిక రకాలు స్వల్పకాలిక రకాల కంటే అధిక దిగుబడినిస్తాయి.

రకం	పంట కాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
1	2	3	4
ఏక సంకర రకాలు			
డి.హెచ్.యం.– 111 (బి.హెచ్. 1576)	90–95	25–30	అధిక దిగుబడినిచ్చు మధ్యకాలిక రకం. ఇది ఆకు ఎండు, కాండము కుళ్ళు మరియు కంకి ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది. కోత సమయంలో కర్ర పచ్చిగా ఉండి మేలైన పశుగ్రాసంగా కూడా పనికొస్తుంది.
డి.హెచ్.యం. – 113 (బి.హెచ్. 1620)	105–120	28–30	అధిక దిగుబడినిచ్చు దీర్ఘకాలిక రకం. ఖరీఫ్‌కు అనువైనది. ఇది కొంత వరకు కాండం తొలుచు పురుగు మరియు పూత తరువాత వచ్చే కాండం కుళ్ళు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
డి.హెచ్.యం. – 115 (బి.హెచ్. 2187)	85–90	26–28	స్వల్పకాలిక హైబ్రిడ్. ఆకర్షణీయమైన నారింజ రంగు, గుండ్రని గింజలు కలిగి, ఆకు ఎండు, త్రుప్పు మరియు కాండం కుళ్ళు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

డి.హెచ్.యం. – 117 (బి.హెచ్. 40625)	95–100	30–35	అధిక దిగుబడినిచ్చు మధ్యకాలిక రకము. ఖరీఫ్ మరియు రబీకి అనువైనది. మంచి యాజమాన్య పద్ధతులలో 40 క్వింటాళ్ళ వరకు దిగుబడినిస్తుంది. ఇది కొంత వరకు కాండం తొలుచు పురుగును, ఆకు ఎండు తెగులును మరియు పూత తరువాత వచ్చే కాండం కుళ్ళు తెగుళ్ళును తట్టుకుంటుంది. కోత సమయంలో కర్ర పచ్చిగా ఉండి మేలైన పశుగ్రాసంగా పనికొస్తుంది.
డి.హెచ్.యం. – 119 (బి.హెచ్. 4062)	95–100	30–35	కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకు ఎండు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
డి.హెచ్.యం. – 121 (బి.హెచ్. 41009)	90–95	30–35	ఆకు ఎండు, పొడ మరియు పూత తర్వాత వచ్చు కాండం కుళ్ళు తెగుళ్ళను మరియు కాండం తొలుచు పురుగును తట్టుకొనును.
ఏక సంకర పేలాల రకం			
బి.పి.సి.హెచ్. – 6	90–95	14–16	ఆకు ఎండు, పొడ మరియు కాండం కుళ్ళు తెగుళ్ళను కొంతవరకు తట్టుకొనును.
కాంపోజిట్ ప్రత్యేక రకాలు			
అంబర్ పాప్‌కార్న్ (పేలాల రకం)	90–95	10–14	నాణ్యమైన పేలాలకు అనువైనది.
మాధురి (తీపి రకం)	75–80	30–32 వేల పచ్చి కండెలు	తీపి కండె రకం. 24 శాతం చక్కెర కలిగి ఉడికించి తినుటకు అనువైనది. ఎకరాకు 6–8 టన్నుల పచ్చి చొప్పను ఇస్తుంది.
ప్రియ (తీపి రకం)	78–85	30–32 వేల పచ్చి కండెలు	తీపి కండె రకం. 20–22 శాతం చక్కెర కలిగి, పొడవైన కండెలు గల రకం. ఉడికించి తినుటకు అనువైనది. ఎకరాకు 6–8 టన్నుల పచ్చి చొప్పను ఇస్తుంది.

సిఫారసు చేయబడిన ప్రైవేట్ సంకర రకములు : దీర్ఘకాలిక రకాలు : బయో 9681, ఎన్.కె. 6240, బిస్కో 97 గోల్డ్, బిస్కో 5129, పి. 3522, పి. 3580, పి. 3401, హెచ్.టి.యం.హెచ్. 5106, హెచ్.టి.యం.హెచ్. 5108, హెచ్.టి.యం.హెచ్. 5109, హెచ్.టి.యం.హెచ్. 5402, కె.యం.హెచ్. 2589, ఎ.డి.వి. 756, ఎమ్.ఎమ్. 9344, సి.పి. 838.

మధ్యకాలిక రకాలు : బయో 9544, పి. 3533, పి. 3544, ఎమ్.సి.హెచ్. 2, కె.హెచ్. 510, కె.హెచ్. 9541, కె.యం.హెచ్. 2589, 25 కె 60, ఎన్.ఎమ్.హెచ్. 1242, ఎన్.ఎస్.సి.హెచ్. 12, ఎస్. 6217, జె.కె.ఎమ్.హెచ్. 4848, ఎల్.జి. 3405, కె.ఎన్.ఎమ్.హెచ్. 4010141, హెచ్.టి.యం.హెచ్. 5402, ఆర్.ఎమ్.హెచ్. 4620.

స్వల్పకాలిక రకాలు : పి. 3342, కె.హెచ్. 5991, డి.కె.సి. 7074, జె.కె.ఎమ్.హెచ్. 1701, ఎమ్.ఎమ్.హెచ్. 133, బయో 605, పి. 1864, డి. 2244.

ప్రత్యేక రకాలు : మొక్కజొన్నలో ప్రత్యేక రకాలైన తీపి, బేబికార్న్, పేలాల మరియు క్వాలిటీ ప్రోటీను మొక్కజొన్న రకాలను అవసరాన్ని బట్టి సాగు చేయవచ్చు. పట్టణ పరిసర ప్రాంతాలలో ఈ ప్రత్యేక రకాలను నేరుగా కాని వివిధ రూపాలలో కాని వినియోగిస్తున్నారు. వీటికి మన దేశంలోనే కాక ఇతర దేశాలలో కూడా ఎక్కువ గిరాకి ఉన్నందున ఎగుమతికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రత్యేక రకాలను రైతులు మార్కెట్ మరియు ఎగుమతి అవకాశాలకు అనుగుణముగా సాగు చేసుకొని అధిక లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. వీటి సాగు వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా మొక్కజొన్న ఆధారిత పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.

ఎ) తీపి రకాలు : ఈ రకాలలో చక్కెర శాతం (పచ్చి కండె గింజలలో 20-24 శాతం) అధికముగా ఉండి తియ్యగ మరియు రుచిగ ఉంటాయి. వీటిలో హైబ్రిక్స్ 39, హైబ్రిక్స్ 53, అల్ మోరా, విన్ ఆరంజ్ లాంటి కాంపోజిట్ రకాలు మరియు షుగర్-75, హైబ్రిక్స్ 39-53 వంటి హైబ్రిడ్ రకాలు ముఖ్యమైనవి.

బి) పేలాల రకాలు : ఈ రకాలలో గింజలను పేలాలుగా చేసుకొనుటకు వీలు పడుతుంది. ఇందులో అంబర్ పాప్ కార్న్, వి.ఎల్. అల్ మోరా పాప్ కార్న్ మరియు పెర్ల్ పాప్ కార్న్ కాంపోజిట్ రకాలు ముఖ్యమైనవి.

సి) బేబీ కార్న్ రకాలు : పీచు తొలి దశలో ఉండి ఫలదీకరణం చెందని మొక్కజొన్న కండెను బేబికార్న్ అంటారు.

కాంపోజిట్ రకాలైన వి.ఎల్-42, హిమ్-123, హిమ్-129, వి.ఎల్. బేబీ కార్న్ 2, తీపి మొక్కజొన్న మరియు హైబ్రిడ్ రకాలైన హిమ్-128, ప్రకాశ్, హెచ్.ఎమ్.-4, పూసా ఎర్లీ హైబ్రిడ్ మొక్కజొన్న-1 మరియు పూసా ఎర్లీ హైబ్రిడ్ మొక్కజొన్న-2 వంటి రకాలు బేబికార్న్ సాగుకు అనుకూలమైనవి.

డి) క్వాలిటి ప్రోటీను మొక్కజొన్న రకాలు : మామూలు మొక్కజొన్న రకాలతో పోల్చినప్పుడు క్వాలిటి ప్రోటీను మొక్కజొన్న రకాలు రెట్టింపు లైసిన్ మరియు ట్రిప్టోఫిన్ అనబడే అమైనో ఆమ్లాలతో నాణ్యమైన ప్రోటీనులను కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో ఎ.క్యు.హెచ్. 8 మరియు వివేక్ క్యు.పి.ఎమ్.9 రకాలు ముఖ్యమైనవి.

ఇ) పశుగ్రాస రకాలు : ఈ రకాలను పూతదశ నుండి గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ఎప్పుడైనా కోసి పశువులకు మేతగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో ఆఫ్రికన్ టాల్, జె-1006, గంగా సఫేద్-2, వరుణ్ కాంపోజిట్, విజయ్ కాంపోజిట్, గంగ-5 మరియు ఎ.పి.ఎఫ్.యం.-8 రకాలు ముఖ్యమైనవి.

నేలలు : సారవంతమైన మరియు నీరు ఇంకే నల్లరేగడి నేలలు, ఎర్ర నేలలు మరియు ఒండ్రు కలిగిన ఇసుక నేలలు మొక్కజొన్న సాగుకు అనుకూలమైనవి. చౌడు భూములు మరియు నీరు నిలువ ఉండు భూములు పనికిరావు. ఉదజని సూచిక 6.5 నుండి 7.5 ఉన్న నేలలు అనుకూలం.

నేల తయారీ : విత్తుటకు ముందు మూడు, నాలుగు సార్లు నాగలితో దుక్కి దున్నాలి. ఎకరాకు దాదాపుగా 10 టన్నులు బాగా మాగిన పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి. తరువాత బోదె నాగలితో బోదెలు, కాలువలు చేసుకోవాలి.

విత్తే కాలము : సాధారణ పరిస్థితులలో వర్షాధారపు పంటను జూన్ 15 నుండి జూలై 15 వరకు విత్తుకోవాలి. రబీలో అక్టోబరు 15 నుండి నవంబరు 15 లోగా విత్తితే ఎక్కువ దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశముంది. కోస్తా జిల్లాల్లో వరి మాగాణి తదుపరి జిరో టిల్లేజ్ పద్ధతిలో జనవరి వరకు విత్తుకోవచ్చు.

విత్తన మోతాదు, విత్తే దూరము

	విత్తన మోతాదు (కిలోలు / ఎకరాకు)	విత్తే దూరం	
		సాళ్ళ మధ్య	మొక్కల మధ్య
సంకర రకాలు	8	60 సెం.మీ.	20 సెం.మీ.
తీపి మొక్కజొన్న	4	60 సెం.మీ.	20 సెం.మీ.
పేలాల మొక్కజొన్న	5	60 సెం.మీ.	20 సెం.మీ.
బేబీ కార్న్	10	45 సెం.మీ.	20 సెం.మీ.
పశుగ్రాస మొక్కజొన్న	16	45 సెం.మీ.	10 సెం.మీ.

విత్తే పద్ధతి : మొదట బోదె నాగలితో బోదెలు చేసుకోవాలి. తరువాత విత్తనాన్ని బోదెకు పై నుండి 1/3 వ వంతు ఎత్తులో విత్తినచో నీటిపారుదల సులభంగా ఉండడమే కాక, వర్షపాతం ఎక్కువైనప్పుడు నీరు బయటకు పోవడానికి కూడా వీలుంటుంది. మొలకెత్తిన పది రోజుల తరువాత ఒత్తుగా మొలచిన చోట ఒక్కొక్క మొక్కను మాత్రమే ఉంచి అదనంగా ఉన్న మొక్కలు తీసివేయాలి.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసుకున్నట్లైతే లేత దశలో మొక్కలను తెగుళ్ళ బారినుండి కాపాడుకోవచ్చు.

ఎరువుల యాజమాన్యము : వర్షాధారపు పంటకు 1/3 వ వంతు నత్రజనిని విత్తే సమయంలోను, 1/3 వ వంతు 30-35 రోజుల మధ్య, మిగిలిన 1/3 వ వంతును 50-55 రోజుల మధ్య వేయాలి. మొత్తం భాస్వరం ఎరువును విత్తే సమయంలో, సగం పొటాష్ ఎరువును విత్తే సమయం, మిగతా సగం పొటాష్ ఎరువును పూత దశలో వేసుకోవాలి. నీటి పారుదల పంటకు నత్రజనిని విత్తేటప్పుడు 1/4 వ వంతు, 25-30 రోజుల మధ్య 1/4 వ వంతు, 45-50 రోజుల మధ్య 1/4 వ వంతు, మిగిలిన 1/4 వ వంతు 60-65 రోజులమధ్య వేయాలి. ఎకరాకు 20 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్‌ని మూడు పంటల కొకసారి దుక్కిలో వేయాలి. మొక్కలలో జింకు లోపం (ఆకుల ఈనెల మధ్య భాగం పసుపుపచ్చ రంగులోకి మారడం మరియు లేత పైరు తెల్ల మొగ్గగా మారడం) కనిపిస్తే లీటరు నీటికి 2 గ్రా. చొప్పున జింకు సల్ఫేట్‌ను కలిపి పైరుపై పిచికారి చేయాలి. పై పాటు ఎరువులు వేసేటప్పుడు భూమిలో తగినంత తేమ ఉండాలి.

	పోషకాల మోతాదు (కిలోలు / ఎకరాకు)					
	ఖరీఫ్			రబీ		
	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్
సంకర రకాలు	80	25	20	100	35	35
తీపి మొక్కజొన్న	75	25	20	80	25	20
పేలాల మొక్కజొన్న	35	25	20	40	25	20
బేబి కార్న్	50	20	20	75	25	20

కలుపు యాజమాన్యము : పంట విత్తిన తరువాత రెండు, మూడు రోజులలోపు అట్రజిన్ కలుపు మందును తేలిక నేలలో ఎకరాకు 800 గ్రాములు, బరువు నేలలో అయితే ఎకరాకు 1200 గ్రాములను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన నేలపై తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేయడం వలన వెడల్పాటి మరియు కొన్ని గడ్డిజాతి కలుపు మొక్కలను దాదాపు ఒక నెల వరకు అదుపు చేయవచ్చు. మొక్కజొన్నను పప్పుజాతి పంటలతో అంతరపంటగా వేసినప్పుడు మాత్రం పెండిమిథాలిన్‌ను ఎకరాకు 1.0 లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నాటిన రెండు రోజులలో పిచికారి చేయాలి. 15–18 రోజుల పంట లేదా కలుపు 4 ఆకుల దశలో ఉన్న సాధారణ మరియు జీరో టిల్లేజి మొక్కజొన్న పంటలో వెడల్పాకు కలుపు మరియు గడ్డి జాతి కలుపును నివారించుటకు టెంబోట్రయోన్ 34.4% ఎస్.సి. 115 మి.లీ. + అట్రజిన్ 50% డబ్ల్యు.పి. 400 గ్రా. మందును లేదా టోప్రామిజోన్ 33.6% ఎస్.సి. 30 మి.లీ. + అట్రాజిన్ 50% డబ్ల్యూ.పి. 400 గ్రా. ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి లేదా తుంగ ఎక్కువ ఉంటే హాలోసల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ 40 గ్రా. / ఎకరానికి 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. విత్తిన నెల రోజులకు వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలు గమనిస్తే 2, 4–డి సోడియం సాల్ట్ ఎకరాకు 500 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

అంతరకృషి : విత్తిన 30–35 రోజులకు పశువులతో (దంతి లేక గొర్రు) లేదా ట్రాక్టరుతో (కల్టివేటరు/బ్లేడ్/రిడ్జర్) అంతరకృషి చేస్తే కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు. తరువాత నత్రజని ఎరువులను వేసి దాని వెంటనే బోదె నాగలిని నడిపినచో కలుపు మొక్కల నివారణతోపాటు వేసిన ఎరువు పంట పెరుగుదలకు సక్రమంగా వినియోగపడుతుంది. ఈ విధంగా బోదెనాగలి నడిపినచో మొక్కల కుదుళ్ళపై మట్టి చేర్చబడి మొక్కలు పడిపోకుండా ఉంటాయి.

అంతర మరియు వరుస క్రమ పంటలు : పొలంలో ఒకే పంటను వేయడానికి బదులు రెండు పంటలు వేయడం వలన వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదురైనపుడు ఒక పంట నష్టపోయినను ఇంకొక పంట నుండి ఆదాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండు మొక్కజొన్న సాళ్ళ మధ్య ఒక సాలు కంది పంటను లేదా 6 సాళ్ళ వేరుశనగను లేదా 7 సాళ్ళ పెసర / మినుము / బొబ్బర్లు / సోయా చిక్కుడు పంటలను వేసుకున్నచో రైతుకు లాభదాయకంగా

ఉంటుంది. వరుసక్రమ పంటగా పప్పుజాతికి చెందిన పంటలు ముఖ్యంగా వేరుశెనగను రబీలో విత్తుకోవడం వలన తదుపరి విత్తే ఖరీఫ్ మొక్కజొన్నకు భూమిలో స్థిరీకరించిన నత్రజని లభ్యమై రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గుతుంది.

నీటి యాజమాన్యము : మొక్కజొన్నకు సుమారు 500–800 మి.మీ. నీరు అవసరమవుతుంది. మొక్కజొన్నకు పూతకు ముందు, పూత దశ మరియు గింజ పాలు పోసుకునే దశలు నీటికి బాగా సున్నితం, 30–40 రోజులలోపు ఉన్న లేత పైరుకు అధిక నీరు హానికరం. విత్తిన తర్వాత చేలో నీరు నిలిస్తే విత్తనం మొలకెత్తదు. సాధారణంగా పంట కాలంలో 6–8 నీటి తడులు అవసరం. పంట విత్తేటప్పుడు, విత్తిన 15 రోజులకు, 30–35 రోజులకు, పూతదశలో, పూత వచ్చిన 15 రోజులకు మరియు గింజ పాలు పోసుకొనే దశలో నీటి తడులను తప్పకుండా ఇవ్వాలి. దీర్ఘకాలిక వంగడాలకు 1–2 తడులు అధికంగా అవసరమౌతాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం వేళలో ఆకులు చుట్ట చుట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తే నీటి ఆవశ్యకత ఉన్నట్లుగా గమనించి వెంటనే నీటి తడి ఇవ్వాలి. సాధారణంగా బోదెలు, కాలువలు పద్ధతిలో తడి కట్టినట్లయితే నీటి ఆదాతో పాటు కలుపు ఉధృతి తక్కువగా ఉంటుంది. సాగు నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేక జీవ తడులు ఇవ్వాల్సి వస్తే కాలువ విడిచి కాలువకు నీరు పెట్టినచో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటకు సాగు నీరు అందించవచ్చు. సూక్ష్మ నీటి సాగు పద్ధతులైన బిందు సేద్యంలో జంట సాళ్ళ పద్ధతిలో కనుక పంటను విత్తుకున్నట్లయితే ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా నీటి ఆదా మరియు అధిక దిగుబడులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

సస్యరక్షణ

కాండం తొలుచు పురుగులు : ఇవి రెండు రకాలు. మచ్చల లేక చారల కాండం తొలిచే పురుగు ఎక్కువగా ఖరీఫ్ పైరును ఆశిస్తుంది. గులాబి రంగు కాండం తొలుచు పురుగు ఎక్కువగా రబీ మొక్కజొన్నను ఆశిస్తుంది. ఇవి పైరు మొలకెత్తిన 10–20 రోజులకు ఆశిస్తాయి. పిల్ల పురుగులు మొదట ఆకులపైన పత్ర హరితాన్ని గోకి తింటాయి. తర్వాత ముడుచుకొని ఉన్న ఆకుద్వారా కాండం లోపలికి చేరతాయి. ఈ ఆకులు విచ్చుకున్న తర్వాత గుండు సూది మాదిరి రంధ్రాలు లేదా పొడవాటి చిల్లులు వరుస క్రమంలో కనిపిస్తాయి. లార్వాలు ఎదిగే అంకురాన్ని తినడం వలన మొవ్వు చనిపోయి, ఎండిపోతుంది. దీనినే 'డెడ్ హార్ట్' అంటారు. కాండం లోపల గుండ్రని లేదా 'S' ఆకారంలో సొరంగాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇవి పూతను మరియు కంకిని ఆశించడం వలన దిగుబడి తగ్గిపోతుంది.

నివారణ

- ❖ పొలంలో కలుపు మొక్కలు మరియు చెత్తా, చెదారం లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచడం
- ❖ పురుగు ఆశించిన మొక్కలను పీకి నాశనం చేయడం
- ❖ పొలం చుట్టూ 3–4 వరుసలలో జొన్నను ఎరపంటగా వేసి 45 రోజుల తర్వాత తీసివేయడం

- ❖ అంతరపంటలుగా అపరాలను (కంది, సోయాబీన్, బొబ్బర్లు) సాగు చేయడం వలన సహజ శత్రువుల సంఖ్య పెరుగుతుంది
- ❖ ట్రైకోగ్రామా కిలోనిస్ పరాన్న జీవి గుడ్లని ఎకరాకు 2–3 ట్రైకోకార్డ్స్ రూపంలో రెండు విడతలుగా 12 మరియు 22 రోజుల పైరు దశలలో విడుదల చేయడం
- ❖ ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్.జి. ఎకరానికి 80 గ్రా. లేదా క్లోరాంట్రినిలిప్రోల్ (కొరాజెన్, రైనాక్సిపర్ లాంటివి) ఎకరాకు 60 మి.లీ.ను 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి పైరు మొలకెత్తిన 10–12 రోజులకు పిచికారి చేయడం
- ❖ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను ఎకరాకు 3 కిలోలు చొప్పున పైరు మొలకెత్తిన 25–30 రోజులకు ఆకుల సుడులలో వేయడం

కత్తెర పురుగు :

గుర్తింపు చిహ్నాలు : గొంగళి పురుగు ముఖంపై తిరగబడిన 'Y' ఆకారంలో తెల్లని చారను కలిగి ఉండును. గొంగళి పురుగు ఉదర భాగంలో ఆఖరి ఖండితంపై నల్లటి 4 చుక్కలు చతురస్రాకారంలో (::) ఉండును.

నష్టపరచు విధానం : మొదటి దశ గొంగళి పురుగులు ఆకులపై పత్రహరితాన్ని గోకి తింటూ ఆకులపై రంధ్రాలను చేస్తుంది. ఇటువంటి రంధ్రాలు ఆకులపై నిలువుగా కనిపిస్తాయి. గొంగళి పురుగు పెరిగేకొద్ది ఆకుల చివరల నుండి తింటూ ఆకులను కత్తిరించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఆకులను పూర్తిగా తినివేయుట గమనించవచ్చు. ఆకు సుడులను మరియు కాండాన్ని కూడ తొలచి రంధ్రాలను చేసి పంటను నష్టపరుస్తుంది. మొక్కజొన్న కంకి మరియు లేత కండె భాగాన్ని కూడా తిని నష్టపరుస్తుంది.

సమగ్ర యాజమాన్యం : లోతు దుక్కులు దున్నుకోవడం వలన పురుగు యొక్క కోశస్థ దశలు నాశనం అవుతాయి. పంట చుట్టూ నాలుగు వరుసలు నేపియర్ గడ్డిని ఎర పంటగా వేసుకోవాలి. ఎకరానికి 4–5 లింగాకర్షక బుట్టలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గుడ్ల సముదాయాలను గుర్తించి ఏరివేసి నాశనం చేయాలి. కత్తెర పురుగు గుడ్లను ఆశించే ట్రైకోగ్రామ బదనికలను ఎకరానికి 20,000 చొప్పున పొలంలో విడుదల చేయాలి. గుడ్లను గమనించిన వెంటనే ఎకరానికి ఒక లీటరు వేపనూనెను లేదా 5% వేప గింజల కషాయాన్ని పిచికారీ చేయాలి. తొలిదశ గొంగళి పురుగులను నివారించుటకు ఎకరానికి 500 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేదా 400–500 గ్రా. థయోడికార్బ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. మందులను పిచికారి చేసుకోవాలి. గొంగళి పురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.డి. 80 గ్రా. లేదా స్పైనోశాడ్ 45% ఎస్.సి. 60 మి.లీ. ఎకరానికి సుడులు లేదా మొవ్వు లోపలి ఆకులు పూర్తిగా తడిచేటట్లు పిచికారీ చేయాలి. అవసరాన్ని బట్టి 2 నుండి 3 సార్లు మందును పిచికారీ చేయాలి. ఎదిగిన గొంగళి పురుగుల నివారణకు 10 కిలోల తవుడు + 2 కిలోల బెల్లం మరియు 2 లీటర్ల నీరు కలిపి 24 గంటల పాటు పులియబెట్టి, ఆ మిశ్రమానికి 100 గ్రా. థయోడికార్బ్

మందును జోడించి సాయంత్రం వేళల్లో సుడులు / పత్రగుచ్ఛం/ మొవ్వులో వేయాలి. ఈ పురుగు యొక్క ఉనికిని రైతులు ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, సరైన యాజమాన్య పద్ధతులను సరైన సమయంలో పాటించి, ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతిని మరియు పురుగు వలన కలిగే అపారమైన నష్టాన్ని నివారించవచ్చు.

రసం పీల్చు పురుగులు : ముప్పై రోజులు పైబడిన పైరును పేనుబంక మరియు చిగురు నల్లి ఆశించవచ్చు. పొడి వాతావరణంలో వీటి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తల్లి మరియు పిల్ల పురుగులు ఆకులు మరియు లేత కాండం నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు పసుపు రంగుకు మారిపోతాయి. మొక్క గిడసబారి పోతుంది. ఇవి విసర్జించే తేనె లాంటి జిగురు పదార్థానికి చీమలు చేరడమే కాకుండా శిలీంధ్రాలు ఏర్పడి మసి తెగులు ఆశించడం వలన కిరణజన్య సంయోగక్రియకు అంతరాయం ఏర్పడి దిగుబడి తగ్గుతుంది.

నివారణ : సహజంగా అక్షింతల పురుగులు, సిర్ఫిడ్స్ వంటి పరాన్నభుక్కులు మరియు పరాన్నజీవులు ఈ పురుగులను అదుపులో ఉంచుతాయి. రసం పీల్చు పురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్. ఎకరానికి 40-50 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 400 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

టర్సికమ్ ఆకు ఎండు తెగులు : ఆకులపై పొడవైన, కోలాకారపు బూడిద రంగుతో కూడిన ఆకుపచ్చ లేదా గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు కన్పిస్తాయి. ఈ మచ్చలు 2.5 నుండి 25 సెం.మీ. పొడవు మరియు 4 సెం.మీ. వెడల్పు ఉంటాయి. ఈ మచ్చలు మొదట మొక్క క్రింది ఆకులపై కనిపించి, పెద్దవై పై ఆకులకు కూడా వ్యాపిస్తాయి. అధిక తేమతో కూడిన వాతావరణంలో ఆకు అంతా ఎండి మొక్కలు చనిపోయినట్లుగా కనిపిస్తాయి. శిలీంధ్ర బీజాలు ఆకుల అడుగు భాగాన వలయాలుగా కనిపిస్తాయి. ఈ మచ్చలు కండెపై ఉన్న పొట్టుపై కూడా వ్యాపిస్తాయి.

త్రుప్పు తెగులు : ఆకులపై రెండువైపులా గుండ్రని లేక పొడవాటి గోధుమ వర్ణపు పొక్కుల మాదిరిగా తెగులు లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పంట పెరిగిన కొలది ఆకులపైన పొక్కులు గోధుమ వర్ణం నుండి నలుపు వర్ణానికి మారుతాయి. పూత సమయంలో తెగులు లక్షణాలు స్పష్టంగా అగుపిస్తాయి. అధిక తేమ గల చల్లని వాతావరణంలో తెగులు ఉధృతి మరియు వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పై రెండు రకాల తెగుళ్ళ నివారణకు మాంకోజెబ్ ఎకరాకు 500 గ్రా. లేదా ప్రొపికొనజోల్ ఎకరానికి 200 – 250 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి తెగులు తీవ్రతను బట్టి ఒకటి లేక రెండుసార్లు పిచికారి చేసి సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు. విత్తేముందు కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ శిలీంధ్రనాశినితో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

బొగ్గు కుళ్ళు తెగులు : పూత దశ తరువాత నేలలో తేమ శాతం తగ్గడం వలన, వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వలన ఈ తెగులు ఎక్కువ తీవ్రతతో సోకుతుంది. నేలలోని శిలీంధ్రం మొక్కల వేర్ల ద్వారా కాండం పైభాగానికి వ్యాపిస్తుంది. కాండంపై గోధుమ రంగు చారలు ఏర్పడతాయి. ఈ తెగులు వలన పంట

కోత దశకు రాకముందే కాండం భాగం విరిగి మొక్కలు నేలపై పడిపోతాయి. ఇటువంటి మొక్కలను చీల్చి చూసినపుడు లోపల బెండు భాగం కుళ్ళి, తెలుపు రంగు నుండి నలుపు రంగుకు మారడం గమనించవచ్చు.

తెగులు ఎక్కువగా సోకే ప్రాంతాలలో పంటవేసే ముందు పచ్చిరొట్ట పైరును సాగుచేసి నేలలో కలియదున్నాలి. ట్రైకోడెర్మా శిలీంధ్రాన్ని పశువుల ఎరువులో వృద్ధిచేసి 3–4 సంవత్సరాలు వరుసగా నేలలో కలుపుతూ పోవాలి. ఎకరాకు అదనంగా 30 కిలోల పొటాష్‌ను ఇచ్చు ఎరువులను వేయాలి. ఎండాకాలంలో నేలను లోతుగా దున్నాలి. పంట వేసిన తరువాత ముఖ్యంగా పూతదశ నుండి నేలలో తేమ తగ్గకుండా ఉండే విధంగా నీటి తడులు పెట్టాలి. పంటకోసిన తరువాత తెగులు సోకిన మొక్కల భాగాలను ఏరి కాల్చివేయాలి. పంటమార్పిడి పద్ధతి అవలంభించాలి.

పాము పొడ తెగులు : ఈ తెగులు ముందుగా నేలకు దగ్గరగా ఉండే మొక్కల క్రింది ఆకులపై సోకి, పై ఆకులకు మరియు కాండానికి వ్యాపిస్తుంది. బూడిద, గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు ఆకులు మరియు కాండంపై ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఏర్పడి చూడటానికి పాముపొడ మాదిరిగా కనిపిస్తాయి. కాండంపై ఏర్పడిన తెగులు లక్షణాల వలన కణుపుల వద్ద మొక్కలు విరిగి నేలపై పడిపోతాయి. తెగులును కలుగుజేసే శిలీంధ్రం మొక్కల అవశేషాలలో మరియు కలుపు మొక్కలపై జీవించి ఉంటుంది.

తెగులు నివారణకు నేలకు దగ్గరగా ఉన్న తెగులు సోకిన ఒకటి లేదా రెండు ఆకులను తీసివేయాలి. 200 గ్రా. కార్బెండెజిమ్ లేదా 200 మి.లీ. ప్రోపికొనజోల్ మందు 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ తెగులు ఆశించే ప్రాంతాలలో విత్తిన 40 రోజుల తర్వాత తెగులు సోకకముందే ఈ మందులు పిచికారి చేయాలి.

వరి మాగాణుల్లో మొక్కజొన్న సాగు :

ఈ పద్ధతిలో తొలకరి వరిచేను కోసిన తరువాత పొలంలో వరి కొయ్యకాల్లలో దుక్కి దున్నకుండానే పదును చూసుకొని మొక్కజొన్న విత్తనాలు నేరుగా విత్తుకోవాలి. ఈ విధానంలో రైతులకు దుక్కి దున్నే ఖర్చులు ఆదా అవుతాయి. నెలరోజుల పంటకాలం కలసి వస్తుంది. బరువైన మరియు తేమను నిలుపుకొను నేలల్లో మాత్రమే ఈ పద్ధతిని పాటించాలి.

- కోస్తా జిల్లాల్లో నవంబరు నుండి జనవరి మొదటి వారం వరకు వేసుకోవచ్చు. ఆ తరువాత విత్తితే దిగుబడి తగ్గుతుంది.
- వరికోసిన తరువాత నేలలో తగినంత తేమ లేనట్లయితే ఒక తేలికపాటి తడి ఇచ్చి పంటను విత్తుకోవాలి.
- తాడును ఉపయోగించి కాని లేదా విత్తనం వేసే యంత్రంతో గాని వరుసకు వరుసకు మధ్య 60 సెం.మీ. మరియు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 20 సెం.మీ. ఉండునట్లు విత్తుకోవాలి.

❖ వరి మాగాణులలో భూమిని దున్నడం ఉండదు కనుక కలుపు ఎక్కువగా వస్తుంది. దీని నివారణకు ఎకరాకు 1.0 కిలో అట్రజిన్ 50% పొడి మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 48 గంటల లోపు నేలంతా బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి. వరి దుబ్బులు చిగురు వేయకుండా పారాక్వాట్ 1.0 లీటరు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తే ముందు లేదా విత్తిన వెంటనే పిచికారీ చేయాలి. అట్రజిన్ + పారాక్వాట్ కలిపి కూడా పిచికారీ చేసుకోవచ్చును.

మిగతా యాజమాన్య పద్ధతులు ముఖ్యంగా ఎరువులు, సస్యరక్షణ మొదలగునవి సాధారణ రబీ మొక్కజొన్న పంటకు ఆచరించినట్లుగానే వరి మాగాణుల్లో సాగు చేసిన మొక్కజొన్నకు కూడా పాటించాలి.

పంటకోత : పంట కోతకు వచ్చినప్పుడు బుట్టల పై పొరలు ఎండినట్లు కనిపిస్తాయి. బాగా ఎండిన కండెలు మొక్కలపై క్రిందికి వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. మరియు కండెలలోని గింజలను వేలి గోరుతో నొక్కినప్పుడు చాలా గట్టిగా ఉండి నొక్కులు ఏర్పడవు. అంతేకాకుండా, బుట్టలోని గింజలను తీసి అడుగుభాగం పరీక్షించినచో నల్లని మచ్చలు ఉండడం గమనించవచ్చు. ఈ దశలో గింజలలో సుమారుగా 25–30 శాతం తేమ ఉంటుంది. కండెలను మొక్కల నుండి వేరుచేసి గింజలలో 15 శాతం తేమ వచ్చే వరకు 3–4 రోజులు ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి.

పేలాల రకం వేసినపుడు గింజలలో 30–35 శాతం తేమ ఉన్నప్పుడే కండెలు కోసి నీడలో ఆరబెట్టాలి. ఎండలో ఆరబెడితే సరియైన పేలాలుగా మారక గింజ పగిలి నాణ్యత తగ్గుతుంది. తీపి రకం వేసినప్పుడు గింజ పాలుపోసుకునే దశలోనే కండెలు కోసుకోవాలి. బేబీ కార్న్ కొరకు పీచు వచ్చిన 1 లేదా 2వ రోజున కోసుకోవాలి. ఆలస్యం చేసినట్లయితే బెండులో పీచు శాతం పెరిగి నాణ్యత తగ్గుతుంది. మొక్కజొన్నను పశువుల మేత కొరకు వేసినప్పుడు 50 శాతం పూతదశలో పైరును కోయాలి. కంకులను నూర్పిడి చేయుటకు (గింజలను బుట్ట నుండి వేరు చేయుట) ట్రాక్టరుతో లేదా కరెంటుతో నడుచు నూర్పిడి యంత్రాలను ఉపయోగించవచ్చు. నూర్పిడి తరువాత గింజలను 2–3 రోజులు 10–12 శాతం తేమ వచ్చేవరకు ఎండలో ఆరబెట్టి, శుద్ధి చేసి గోనె సంచులలో గాని లేదా పాలిథీన్ సంచులలో గాని భద్రపరచి చల్లని, తక్కువ తేమ గల ప్రాంతాలలో నిలువ చేయాలి. దీనితోబాటు నిల్వలో తేమగాని, ఎలుకలు, పురుగులు, శిలీంధ్రాలు మొదలగునవి రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

నాణ్యతా ప్రమాణాలు :

- మొక్కజొన్నకు మంచి మార్కెట్ ధర రావాలంటే కొన్ని నాణ్యతా ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
- గింజలో తేమ శాతం 14.0 కి మించకుండా ఉండాలి.
- దమ్ము/చెత్త, మట్టి పెళ్లలు, రాళ్ళు మొదలైనవి 1.0 శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు.
- పాడైన గింజలు 1.5 శాతంకు మించకూడదు.
- ఇతర ఆహార గింజలు 2.0 శాతంకి మించకుండా ఉండాలి. రంగు మారిన మరియు ముక్కలైన మొక్కజొన్న గింజలు 4.5 శాతంకి మించకుండా ఉండాలి. కీటకాలు ఆశించిన గింజలు 1.0 శాతంకి మించకూడదు.

పంట సాగులో జాగ్రత్త వహించవలిసిన ముఖ్యాంశాలు :

- ఖరీఫ్‌లో వర్షాధారం క్రింద మొక్కజొన్నను పదును వర్షం తరువాత మాత్రమే (50 మి.మీ. కన్నా ఎక్కువ) విత్తుకోవాలి.
- ఖరీఫ్‌లో వర్షదారం క్రింద మొక్కజొన్నలో అంతర పంటగా కంది /పెసర/మినుము/బొబ్బర్లు వేసుకోవాలి.
- ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోల విత్తనాన్ని 60 × 20 సెం.మీ. దూరంలో విత్తుకుని 33,333 మొక్కలు ఎకరానికి ఉండేలా చూడాలి.
- కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మీ.లీ. ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి పైరు మొలకెత్తిన 10–12 రోజులకే పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 40–45 రోజుల వరకు పంటలో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- పైపాటుగా ఎరువులు వేసినప్పుడు నేలలో తేమ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూడాలి.
- మొక్కజొన్న సున్నిత దశలైన పూత దశ మరియు గింజ పాలుపోసుకునే దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి.

మొక్కజొన్న సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతక ధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం – 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

జొన్న

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జొన్న పంట ఖరీఫ్‌లో 11 వేల ఎకరాల్లోను, రబీలో 1.10 లక్షల ఎకరాల్లోను సాగు చేయబడుతున్నది. హెక్టారుకు సరాసరి దిగుబడి ఖరీఫ్‌లో 1481 కిలోలు, రబీలో 3763 కిలోలు.

జొన్న పండించే ప్రాంతాలు

1. ఖరీఫ్‌లో తక్కువ వర్షపాతం ఉండి, ఎర్ర చెల్కా నేలలు గల కర్నూలు మరియు అనంతపురం జిల్లాలు.
2. మాఘీ ప్రాంతం – నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాలు.
3. ఆలస్యంగా జొన్న పండించే రబీ ప్రాంతాలు – ప్రకాశం జిల్లా, గుంటూరు జిల్లా.

విత్తే సమయం

ఖరీఫ్	మాఘీ	రబీ	లేట్‌రబీ	వేసవి
జూన్	సెప్టెంబర్	అక్టోబర్	నవంబర్	జనవరి

నేలలు : నల్లరేగడి మరియు తేలికైన ఎర్రనేలలు

విత్తనం : ఎకరాకు 3-4 కిలోలు

రకాలు

హైబ్రిడ్ / రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
హైబ్రిడ్‌లు					
సి.ఎస్.హెచ్.-16	1997	ఖరీఫ్, మరియు మాఘీ	105-110	15-17	బూజు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను తట్టుకుంటుంది.
సి.ఎస్.హెచ్.-15 ఆర్.	1995	రబీ	110-115	13-14	మొవ్వ చంపు ఈగను, కాండంకుళ్ళును తట్టుకుంటుంది.
సి.ఎస్.హెచ్.-14	1992	ఖరీఫ్	95-100	12-13	బూజు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళని తట్టుకుంటుంది. తక్కువ వర్షపాత ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
సి.ఎస్.హెచ్.-18	1999	ఖరీఫ్	110-115	16-17	గింజపై వచ్చే బూజు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

హైబ్రిడ్ / రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
రకాలు					
పి.ఎస్.వి. – 1	1996	ఖరీఫ్, రబీ	105–110	10–12	గింజ తెలుపు, చొప్ప పశువులు తినుటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సి.ఎస్.వి. – 15	1996	ఖరీఫ్	110	10–12	అన్ని లక్షణాలు సుమారు పి.ఎస్.వి. – 1 మాదిరిగానే ఉంటాయి.
నంద్యాల తెల్లజొన్న –1 (ఎన్.టి.జె. 1)	1998	మాఫీ, రబీ	105–110	10–12	బెట్టను తట్టుకొంటుంది. గింజ రాలుటలో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది.
నంద్యాల తెల్లజొన్న –2 (ఎన్.టి.జె. 2)	1989	మాఫీ, రబీ	95–110	12–14	పంట త్వరగా కోతకు వస్తుంది. గింజలు లావుగా, తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. గింజలు సులభంగా రాలుతాయి.
నంద్యాల తెల్లజొన్న –3 (ఎన్.టి.జె. 3)	1995	మాఫీ, రబీ	100–105	12–14	చొప్ప ఎక్కువగా ఇస్తుంది. బెట్టను, ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది.
యన్. – 13 (పచ్చ జొన్న)	1966	మాఫీ, రబీ	95–100	7–8	చొప్ప ఎక్కువగా వచ్చి నాణ్యంగా ఉంటుంది. జొన్న మల్లెను, బెట్టను తట్టుకొంటుంది.
యన్. – 14 (పచ్చ జొన్న)	1989	మాఫీ, రబీ	110–115	10–12	యన్. 13 కంటే గింజలు మరియు చొప్ప ఎక్కువగా ఇస్తుంది.
సి.ఎస్.వి. 216ఆర్	2000	రబీ	110–115	12–14	గింజ తెలుపు, చొప్ప ఎక్కువగా వచ్చి, నాణ్యంగా ఉంటుంది.
పాలెం – 2	2002	ఖరీఫ్	105–110	11–12	గింజ తెలుపు, అధిక చొప్ప దిగుబడినిస్తుంది. బూజు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది.
ఎన్.టి.జె. 4	2002	రబీ, మాఫీ	90–98	13–15	నల్లకాండం కుళ్ళు తెగులును కొంత వరకు, మొవ్వ చంపు ఈగ మరియు శనగ పచ్చ పురుగును కొంతమేర తట్టుకుంటుంది.

హైబ్రిడ్ / రకం	విడుదల సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
యమ్ 35-1	1969	రబీ, మాఘీ	115-120	10-12	గింజలు, చొప్ప నాణ్యంగా ఉంటాయి.
సి.ఎస్.వి. 14 ఆర్	1969	రబీ	115-120	10-12	బెట్టను, నల్ల కాండంకుళ్ళు తెగులును, మొవ్వ చంపు ఈగను కొంతమేర తట్టుకుంటుంది.
పి.ఎస్.వి.-56	2012	ఖరీఫ్,రబీ	110-115	10-12	గింజ బూజు తెగులును మరియు ఆకుమచ్చ తెగులును తట్టుకుంటుంది. చొప్ప నాణ్యంగా ఉండి అధిక చొప్ప దిగుబడినిస్తుంది.
ఎన్.-15 (పచ్చజొన్న)	2018	మాఘీ, రబీ	115-120	10-13	గింజ మరియు చొప్ప ఎక్కువగా ఇస్తుంది. బెట్టను తట్టుకుంటుంది.
ఎన్.టి.జె. - 5	2018	మాఘీ,	95-100	18-20	పొట్టి జొన్న రకం, అధిక దిగుబడిని ఇచ్చును. గింజ మరియు చొప్ప నాణ్యముగా ఉండును.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 1.5 గ్రా. టెబ్యుకొనజోల్ 2 శాతం మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. మొవ్వు ఈగ నివారణకు ఒక కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

విత్తే దూరం : వరుసల మధ్య 45 సెం.మీ. వరుసలో మొక్కల మధ్య 12-15 సెం.మీ. దూరంలో విత్తాలి. ఎకరాకు 58,000-72,000 మొక్కలు ఉండాలి. విత్తనం మొలకెత్తిన 8-14 రోజుల మధ్యలో ఒత్తుగా ఉన్న చోట మొక్కలను తీసివేయాలి.

ఎరువులు : పశువుల ఎరువు ఎకరానికి 4 టన్నులు వేసి ఆఖరి దుక్కిలో కలియదున్నాలి. ఎకరాకు నీటిపారుదల పంటకు 32-40 కిలోల నత్రజని, 24 కిలోల భాస్వరం, 16 కిలోల పొటాష్, వర్షాధార పంటకు 24-32 కిలోల నత్రజని, 16 కిలోల భాస్వరం, 12 కిలోల పొటాష్ నిచ్చే ఎరువుల్ని వేయాలి. నత్రజని ఎరువును రెండు సమ దఫాలుగా విత్తేప్పుడు మరియు మోకాలు ఎత్తు పైరు దశలో వేయాలి. భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులు విత్తే సమయంలో వేసుకోవాలి.

నీటి యాజమాన్యం : ఖరీఫ్‌లో జొన్నకు నీరు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నల్లరేగడి నేలల్లో రబీ జొన్నకు పూత మరియు గింజ పాలు పోసుకునే సమయంలో అవసరమైతే నీరు కట్టాలి. పైరుకు తేలిక నేలల్లో వారానికి ఒకసారి, నల్లరేగడి నేలల్లో 15 రోజులకొకసారి తడి ఇవ్వాలి.

అంతర పంటలు : ఖరీఫ్‌లో జొన్న : కంది - 2:1 నిష్పత్తిలో వేసుకోవాలి.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన 30 రోజులకు గుంటక లేదా దంతితో అంతరకృషి చేయడం వలన పొలంలో తేమ నిలిచి మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి. విత్తిన రెండు వారాల లోపుగా ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. కలుపును నివారించేందుకు అట్రజిన్ 50% పొడి మందుని ఎకరాకు 800 గ్రా. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన వెంటనే లేదా 2వ రోజు లోపల తడి నేలపై పిచికారీ చేయాలి. జొన్నమల్లె మొలకెత్తిన తర్వాత, లీటరు నీటికి 50 గ్రా. అమ్మోనియం సల్ఫేట్‌ను గాని, 200 గ్రా. యూరియానుగాని కలిపి మల్లెపై పిచికారీ చేసి నివారించవచ్చు. లేదా 2, 4-డి సోడియం సాల్ట్ 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసికూడ మల్లెను నివారించవచ్చు. జొన్న విత్తిన 35-40 రోజులకు జొన్నమల్లె మొలకెత్తుతుంది.

పంటకోత : కంకి క్రింద వరుసలో వున్న గింజలు ఆకుపచ్చ రంగు నుండి తెల్లగా మారి గింజలో ఉన్న పాలు ఎండిపోయి పిండిగా మారినపుడు, గింజ క్రింది భాగంలో నల్లటి చార ఏర్పడిన తర్వాత పంట కోయాలి.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

1.కత్తెరపురుగు : ఈ మధ్యకాలంలో కత్తెరపురుగు మొక్కజొన్నతో పాటు జొన్న పంటను కూడా ఆశించడం జరుగుతున్నది. దీని నివారణకు 20-30 రోజుల దశలో 5% వేపగింజల కాషాయాన్ని లేదా అజాడిరెక్టిన్ 1500 పి.పి.ఎం. అనే మందులను ఒక లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి. 40-50 రోజుల దశలో విషపు ఎర (10 కిలోల తవుడు మరియు 2 కిలోల బెల్లం ను 2-3 లీటర్ల నీటిలో 24 గంటలు నానబెట్టి దీనికి 100 గ్రా. థయోడికార్బ్ మందును 30 నిమిషాల ముందు కలుపుకోవాలి) లేదా స్పైనోసాడ్ అను మందును లీటరు నీటికి 0.3 మీ.లీ. లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.సి. లీటరు నీటికి 0.3 మి.లీ. కలిపి 10-15 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి.

మొవ్వు తొలుచు ఈగ : పురుగు ఆశించిన మొవ్వు ఎండిపోయి చనిపోతుంది. మొవ్వుని లాగినపుడు సులువుగా వచ్చి, కుళ్ళిపోయిన వాసనకల్గి ఉంటుంది. పిలకలు అధికంగా వస్తాయి. మొలకెత్తిన మొదటి 30 రోజుల వరకు మాత్రమే ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది. దీని నివారణకు ఖరీఫ్ జొన్నని జూలై 15వ తారీఖు లోపే విత్తాలి. ఆలస్యంగా విత్తనం వేయవలసివస్తే, విత్తన మోతాదును పెంచి, మొవ్వ ఈగ బారిన పడిన మొక్కలను తీసివేయాలి. కార్బోఫ్యురాన్ 3 జి. గుళికలను ఎకరాకు 4 కిలోల వంతున విత్తేటప్పుడు సాళ్ళలో వేయాలి లేదా సైపర్‌మిత్రిన్ 1 మి.లీ. లేదా ల్యాంబ్డా సైహాలోత్రీన్ 5 సి.ఎస్. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొలచిన 7, 14 మరియు 21 రోజుల్లో పిచికారీ చేయాలి. మొక్కకు 5 వారాల వయసు వచ్చే వరకు ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది.

కాండం తొలుచు పురుగు : ఈ పురుగు, పైరును 30 రోజుల తర్వాత నుండి పంట కోసేవరకు ఆశిస్తుంది. గుండ్రని వరుస రంధ్రాలు ఆకులపై ఏర్పడతాయి. మొవ్వు చనిపోయి తెల్ల కంకి ఏర్పడుతుంది. కాండాన్ని చీల్చి చూస్తే ఎర్రని కణజాలం కనపడుతుంది. కంకి మొవ్వులో నుండి బయటకు రాదు. నివారణకు క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా విత్తిన 35-40 రోజులలోపు ఎకరాకు 4 కిలోల కార్బోఫ్యురాన్ గుళికలను కాండపు సుడుల్లో వేయాలి.

కంకి నల్లి : పిల్ల, పెద్ద పురుగులు గింజలు పాలు పోసుకునే దశలో రసం పీల్చటం వలన గింజలు నొక్కులుగా మారి కంకిలో తక్కువ మంచి గింజలు వుంటాయి. గింజల మీద ఎరుపు మచ్చలు ఏర్పడి అవి క్రమంగా నల్లగా

మారుతాయి. గింజలు గట్టిపడిన తర్వాత ఈ పురుగు ఆశించదు. దీని నివారణకు తొలిదశలోనే కంకి నల్లిని గుర్తించి, సైపర్‌మెత్రిన్ 0.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పేను బంక : నివారణకు మిథైల్ డెమటాన్ లేదా డైమిథోయేట్ లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. వంతున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

గింజ బూజు : గింజలపై బూజు లక్షణాలు వర్షాకాలంలో అధికంగా కనిపిస్తాయి. పూత మరియు గింజ గట్టిపడే సమయంలో వర్షాలు పడితే నష్టం అధికంగా ఉంటుంది. గింజలపై పెరిగే శిలీంధ్ర రకాన్ని బట్టి వాటిపై గులాబి లేదా నల్లని బూజు పెరుగుదల గమనించవచ్చు. అలాంటి గింజలు నూర్పిడి సమయంలో దెబ్బ తింటాయి. దీని నివారణకు గింజ క్రింది భాగంలో నల్లని చార ఏర్పడినపుడు కంకులను కోయాలి. 10 లీటర్ల నీటికి 20 గ్రా. కాప్టాన్‌తో పాటు, 2 గ్రా.ల ఆరియోఫంగిన్‌ను గాని లేక లీటరు నీటికి 0.5 మి.లీ. ప్రోపికొనజోల్ గాని కలిపి గింజ ఏర్పడే దశలో ఒకసారి మరియు గింజ గట్టిపడే దశలో మరోసారి పిచికారీ చేయాలి. పంటకోత ఆలస్యం చేయకూడదు.

బంక కారు తెగులు : మొక్కలు పుష్పించే దశలో ఆకాశం మేఘావృతమై, చల్లని తేమతో కూడిన వాతావరణం ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం. తెగులు సోకిన కంకుల నుండి తెల్లని లేదా గులాబీ రంగుతో కూడిన తియ్యటి జిగురు వంటి ద్రవం కారటం గమనించవచ్చు. దీని నివారణకు 3 గ్రా. కాప్టాన్ లేదా థైరమ్ కిలో విత్తనానికి కలిపి శుద్ధి చేయాలి. లీటరు నీటికి మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. లేదా బెన్‌లేట్ 1 గ్రా. లేదా ప్రోపికొనజోల్ 0.5 మి.లీ. కలిపి వారం వ్యవధిలో 2 సార్లు పూతదశలో చల్లాలి.

నల్ల కాండము కుళ్ళు : లేత మొక్కలలో నేల దగ్గర ఉన్న కాండం రంగు కోల్పోయి కృశించి మొక్కలు వాడి ఎండుతాయి. తెగులు ఆశించిన మొక్కలలో తాలు గింజలతో కంకులు త్వరగా పక్వానికి వస్తాయి. కాండం లోపల డొల్లగా మారి విరిగి పడిపోతాయి. దీని నివారణకు 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా కాప్టాన్ 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి. పుష్పించే దశముందు పంట నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా చూసుకోవాలి. తెగులు తట్టుకొను రకాలను సాగు చేయాలి.

జొన్న పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతక ధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

లాం – 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

సజ్జ

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సజ్జ పంట సుమారు 75 వేల ఎకరాలలో సాగు చేయబడుతూ 69 వేల టన్నుల ఉత్పత్తినిస్తుంది. ఎకరానికి సరాసరి దిగుబడి 925 కిలోలు. సజ్జ పంట ప్రకాశం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు మరియు అనంతపురం జిల్లాల్లో అధికంగా సాగులో ఉన్నది.

విత్తే సమయం : ఖరీఫ్ : జూన్ – జూలై, వేసవి : జనవరి

నేలలు : తేలిక నుండి మధ్యరకం నేలలు. నీరు ఇంకే, మురుగు నీటి పారుదల గల నేలలు అనుకూలం.

రకాలు

రకం / (విడుదలైన సం॥)	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
హెచ్.హెచ్.బి. -67 (హైబ్రిడ్) (1990)	ఖరీఫ్, వేసవి	68-70	10-12	అతి తక్కువ కాలంలో కోతకు వచ్చే సంకర రకం. వెర్రి కంకి తెగులును తట్టుకొంటుంది.
ఐ.సి.యం.హెచ్. -356 (హైబ్రిడ్) (1993)	ఖరీఫ్, వేసవి	80-85	10-12	సంకర రకం, పైరు 185 సెం.మీ. ఎత్తు ఎదిగి, 2-3 పిలకలు వేస్తుంది. గింజలు మధ్యస్థ లావుగా బూడిద రంగులో ఉంటాయి. వెర్రి కంకి తెగులును తట్టు కొంటుంది.
రాజ్ – 171 (కాంపోజిట్) (1992)	ఖరీఫ్, వేసవి	80-85	9-12	వెర్రి కంకి తెగులును తట్టుకొంటుంది.
ఐ.సి.టి.పి.-8203 (కాంపోజిట్) (1988)	ఖరీఫ్, వేసవి	75-80	8-10	గింజలు లావుగా, తెల్లగా ఉంటాయి. వెర్రి కంకి తెగులును, బెట్టను తట్టుకొంటుంది.
ఐ.సి.యం.వి.-221 (కాంపోజిట్) (1993)	ఖరీఫ్, వేసవి	85-90	8-10	వెర్రికంకి తెగులును తట్టుకుంటుంది. అన్ని ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
ధనశక్తి (కాంపోజిట్) (2014)	ఖరీఫ్, వేసవి	80-85	8-10	వెర్రికంకి తెగులును తట్టుకుంటుంది. ఇనుము ధాతువు అధికంగా ఉంటుంది.
ఏ.బి.వి.-04 (కాంపోజిట్) (2019)	ఖరీఫ్, వేసవి	85-90	10-12	వెర్రికంకి తెగులును, బెట్టను, అగ్గి తెగులును మరియు గింజ కాటుక తెగులును తట్టుకొంటుంది. ఇనుము, జింక్ ధాతువులు అధికంగా ఉంటాయి.

విత్తనం : ఎకరాకు 1.6 కిలోలు. నారు రూపంలో మరియు 3 కిలోలు విత్తడం పద్ధతిలో వాడాలి.

విత్తనశుద్ధి : 2 శాతం (20 గ్రా./లీ.) ఉప్పునీటి ద్రావణంలో విత్తనాలను 10 ని॥లు ఉంచటం ద్వారా ఎర్గాట్ శిలీంధ్ర అవశేషాలను తేలేటట్లు చేసి తొలగించవచ్చు. ఆరిన కిలో విత్తనానికి 6 గ్రా. మెటాలాక్సిల్ 35 డబ్ల్యూ.ఎస్. మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

విత్తే దూరం : వరుసల మధ్య 45 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 12 నుండి 15 సెం.మీ. దూరం ఉండేట్లు గొర్రుతో విత్తుకోవాలి.

నాటటం : నారుపోసి, 15 రోజుల వయసుగల నారు మొక్కలను పైన తెల్పిన దూరంలో నాటవచ్చు. ఎకరాకు 58,000 – 72,000 మొక్కలు ఉంచాలి.

ఎరువులు : ఎకరానికి 4 టన్నుల పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి. ఎకరాకు నీటిపారుదల పంటకు 32 కి. + 16 కి. + 12 కి. వర్షాధార పంటకు 24 కి. + 12 కి. + 8 కి. వంతున నత్రజని + భాస్వరం + పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను వేయాలి. నత్రజనిని విత్తేటప్పుడు సగం, విత్తిన 30 రోజులకు మరో సగం వేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : మొక్కలకు 30 రోజుల వయసులో ఎకరాకు 2 టన్నుల వేరుశనగ పొట్టు నేల మీద పరచడం ద్వారా భూమిలోని తేమ ఆవిరి కాకుండా కాపాడవచ్చు. అంకురదశ, పూతదశ, గింజపాలు పోసుకొనే దశ, గింజ గట్టిపడే దశల్లో నీటి తడులివ్వాలి.

అంతర పంట : సజ్జ : కంది/పెసర/ వేరుశనగ/ ప్రొద్దుతిరుగుడు/ సోయాచిక్కుడు – 2:1 నిష్పత్తిలో వేసుకోవాలి.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన రెండు రోజులలోపు అట్రాజిన్ 50% డబ్ల్యూ.పి. కలుపు మందును 4 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి తడినేలపై పిచికారి చేయాలి. విత్తిన రెండు వారాలలోపు ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. 25–30 రోజులప్పుడు దంతితో అంతరకృషి చేయాలి.

సస్యరక్షణ

కత్తెర పురుగు : లద్దె పురుగు ఆకులను, కాండంను, కండెలను మరియు పత్రహరితాన్ని గోకి తినడం వలన ఆకులపై తెల్లటి పొర ఏర్పడుతుంది. రెండవ మరియు మూడవ దశ లద్దె పురుగులు ఆకు సుడిలో ఉండి రంధ్రాలు చేసుకుంటూ తినడం వలన విచ్చుకున్న ఆకులలో రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి. లద్దె పురుగు పెరుగుతున్న కొద్ది ఆకుల చివరలు నుండి తింటూ ఆకులు కత్తిరించిన విధంగా కన్పిస్తాయి. ఆకులను పూర్తిగా తినివేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో మొవ్వను పూర్తిగా తినివేయడం వలన మొక్క కురచగా ఉండి కంకి ఏర్పడదు. ఈ పురుగును నివారించడానికి గుడ్ల సముదాయాలను ఏరి నాశనం చేయాలి. పిల్ల పురుగులతో ఉన్న ఆకులను ఏరి నాశనం చేయాలి. ఎకరానికి 10 లింగాకర్షక బుట్టలను ఏర్పరచుకొని నివారించుకోవాలి. పురుగు గుడ్లను, మొదటి దశ పిల్ల పురుగులను నివారించుటకు మొదటిగా 5 శాతం (5 మి.లీ./లీ.) వేప నూనెను

(1500 పి.పి.యం.) పిచికారి చేయాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు ఎకరానికి ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.జి. 80 గ్రా. లేదా స్పైనోశాడ్ 45 ఎస్.ఇ. 60 మి.లీ. లను 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారి చేయాలి. మందులు పిచికారి చేసేటప్పుడు పైపైనే కాకుండా సుడులలో/మొవ్వలోనికి ఆకులు పూర్తిగా తడిచేవిధంగా పిచికారి చేయాలి.

మొవ్వు ఈగ : లద్దె పురుగు ఆకుల పైభాగంనకు ప్రాకి క్రమంగా లేత మొవ్వలోనికి చొచ్చుకొని పోతుంది. ఈ పురుగు విత్తినప్పటి నుండి 30 రోజుల వరకు మాత్రమే పైరును ఆశిస్తుంది. మొవ్వులోని భాగాన్ని గోకి తినటం వల్ల మొవ్వు వాడి చనిపోతుంది. ఎండిన మొవ్వుని పీకగానే సులువుగా పైకి వస్తుంది. మొవ్వు మొదలు కుళ్ళి ఉండటం వల్ల చెడు వాసన వస్తుంది. పురుగు ఆశించిన తల్లి మొక్క చనిపోయి దాని మొదలు వద్ద గుబురుగా పిలకలు వస్తాయి. పిలకలకు కంకులు రావు.

దీని నివారణకు పంటను ఖరీఫ్ సీజనులో జూలై 15 లోపు విత్తుకోవాలి. ఆలస్యంగా విత్తనం వేయవల్సి వస్తే విత్తన మోతాదును 4 నుండి 10 కిలోలకు పెంచి మొవ్వ ఈగ ఆశించిన మొక్కలను తీసివేయాలి. ఈ పురుగును నివారించుకోవడానికి విత్తేముందు 10 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70% డబ్ల్యు.యస్. మందును కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ఎకరాకు 4 కిలోల కార్బోఫ్యూరాన్ 3% సి.జి. గుళికలు విత్తేటప్పుడు సాళ్ళలో వేయాలి. మొక్క మొలిచిన 7, 14 మరియు 21 రోజులకు థయోడికార్బ్ 1.5 గ్రా. లేదా లామ్డా సైహలోత్రిన్ 5% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

కాండం తొలుచు పురుగు : ఈ పురుగు పంటను 30 రోజుల నుండి పంటకోత వరకు అన్ని దశలలో ఆశిస్తుంది. గుడ్ల నుండి బయటకు వచ్చిన పిల్ల పురుగులు మొవ్వ నుండి బయటకు వస్తున్న లేత ఆకులను తింటాయి. ఆకులపై రంధ్రాలు వరుసలలో పడతాయి. పిల్ల పురుగులు కాండంలోనికి తొలుచుకొని పోయి మొవ్వును కొరికి తిని వేయును. కంకులు ఏర్పడిన తర్వాత కంకి తొడిమెలను ఆశించడం వల్ల కంకులు విరిగిపోతాయి.

దీని నివారణకు ట్రైకోగ్రామా కిలోనిస్ పరాన్నజీవి గుడ్లను ఎకరానికి 1 ట్రైకోకార్డ్‌ను రెండు విడతలుగా విడుదల చేయాలి. విత్తిన 35-40 రోజులలోపు 4 కిలోల కార్బోఫ్యూరాన్ 3% సి.జి. గుళికలను కాండపు సుడుల్లో వేయాలి.

గులాబి రంగు పురుగు : ఈ పురుగు పిలకలు వేయు దశలో మరియు కంకి దశలో ఆశిస్తాయి. లద్దె పురుగులు పిలకలు వేయు దశలో పై భాగాలలో కాండానికి దగ్గరగా రంధ్రం చేసి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. కాండంలోపలి పదార్థాలను తిని మొవ్వును ఆశించటం వల్ల ఎదిగే మొవ్వు చనిపోతుంది. కంకి దశలో ఆశిస్తే కంకిలోని గింజలు గట్టి పడక తెల్ల కంకి ఏర్పడుతుంది. దీని నివారణకు ట్రైకోగ్రామా కిలోనిస్ పరాన్నజీవి గుడ్లను ఎకరాకు 1 ట్రైకోకార్డ్‌ను రెండు విడతలుగా విడుదల చేయాలి. విత్తిన 35-40 రోజులలోపు ఎకరాకు 4 కిలోల కార్బోఫ్యూరాన్ 3% సి.జి. గుళికలు కాండపు సుడుల్లో వేయాలి.

అగ్గి పురుగు : పిల్ల పురగులు మరియు పెద్ద పురుగులు కంకులను ఆశించి రసాన్ని పీలుస్తాయి. గింజలు పాలు పోసుకొనే దశలో కనుక ఈ పురుగు ఆశించినట్లైతే కంకిలో గింజలు తాలుగా మారి ముడుచుకొని పోవును. పురుగు ఆశించిన గింజలపై ఎర్రని ఇటుక రంగు చారలు కనపడతాయి. దీని నివారణకు క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లేదా థయోడికార్బ్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి రెండు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

చెదలు : తేలిక నేలల్లో చెదల నివారణకు వేసవిలో లోతు దుక్కి దున్ని చెద పుట్టలను త్రవ్వి, రాణి పురుగును చంపి అందులో క్లోరిపైరిఫాస్ 50 ఇ.సి. 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి ఒక్కొక్క పుట్టలో 10-12 లీటర్ల మందు ద్రావణం వేసి చదును చేయాలి. లేత మొక్క దశలో మిడతల నుండి నజ్జ పంటను కాపాడటానికి వేపనూనె (1500 పి.పి.యం.) 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పచ్చకంకి / వెర్రికంకి తెగులు : తెగులు లక్షణాలు మొదట లేత మొక్కలపై 3-4 ఆకులు వేసే దశలో కనిపిస్తాయి. తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులు పసుపు రంగుకు మారుతాయి. తెగులు సోకిన మొక్కలో కంకులు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ఆకుపచ్చని ఆకుల మాదిరిగా మారిపోతాయి. గాలిలో తేమ అధికంగా వున్న వాతావరణంలో ఆకులు అడుగుభాగాన తెల్లని బూజు పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. తెగులు తీవ్రదశలో మొక్కలు గిడసబారి 30 రోజులలోపు చనిపోతాయి. దీని నివారణకు కిలో విత్తనానికి 6 గ్రా. మెటలాక్సిల్ 35 డబ్ల్యూ.ఎస్. మందుతో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. వ్యాధి సోకిన మొక్కలను ఏరి, కాల్చి వేయాలి. విత్తిన 21 రోజులకు తెగులు సోకిన మొక్కలు 5 శాతం మించి వున్నట్లయితే మెటలాక్సిల్ 31.8% ఇ.సి. మందు 1 గ్రా. లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తేనె బంక తెగులు : తెగులు సోకిన కంకి నుండి గులాబి లేదా ఎర్ర రంగుగా ఉన్న తేనె వంటి చిక్కటి ద్రవం బొట్లు బొట్లుగా కారుతుంది. ఈ ద్రవంలో శిలీంధ్ర బీజాలు ఏర్పడతాయి. మొక్కలు పుష్పించే దశలో మబ్బుతో కూడిన ఆకాశం, వర్షపు తుంపరలు, వాతావరణం చల్లగా ఉండటం ఈ తెగులు వ్యాప్తికి దోహదపడుతుంది. దీని నివారణకు విత్తనాలను 2 శాతం (20 గ్రా./లీ.) ఉప్పునీటి ద్రావణంతో శుద్ధి చేయాలి. ఈ తెగులు నివారణకు థైరమ్ 80% డబ్ల్యూ.పి. లేదా కాప్టాన్ 75 శాతం డబ్ల్యూ.ఎస్. 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పంటలో ఈ తెగులును గమనించినట్లయితే 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 2 గ్రా. థైరమ్ 80% డబ్ల్యూ.పి. లేదా కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. 2.5 గ్రా. మందును లీటరు నీటికి వంతున కలిపి వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు కంకులపై పిచికారి చేయాలి.

కాటుక తెగులు : సజ్జ కంకులలో గింజలు ఏర్పడే సమయంలో కాటుక తెగులు కనిపిస్తుంది. కంకిలోని కొన్ని పూలు తెగులుకులోనై పెద్ద అండాకారపు సంచులుగా మారుతాయి. ఈ సంచులలో నల్లని పొడిలాంటి శిలీంధ్ర బీజాల సముదాయాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి మామూలు గింజల కంటే పెద్దవిగా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి పక్వానికి

వచ్చిన దశలో ముదురు గోధుమ లేదా నలుపు రంగుకు మారుతాయి. విత్తనాన్ని కాప్టాన్ 75% డబ్ల్యూ.ఎస్. లేదా థైరమ్ 80% డబ్ల్యూ.పి. 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి పట్టించి విత్తుకోవాలి. పంట కాలంలో ఈ తెగులు ఆశించినప్పుడు జీనెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. 2 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

తుప్పు తెగులు : మొక్కల క్రింది భాగంలోని ఆకుల అడుగు భాగాన చిన్న ఎరుపు రంగు ఉబ్బెత్తు పొక్కులు ఏర్పడతాయి. తెగులు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎర్రటి పొక్కులు ఆకంతా వ్యాపించి ఆకులు తొందరగా ఎండిపోయి రాలిపోతాయి. మొక్కలు నాటిన 21 రోజుల నుండి 15 రోజులకు ఒకసారి హెక్సాకొనజోల్ 5% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లేదా 12% కార్బండెజిమ్ + 63% మాంకోజెబ్ డబ్ల్యూ.పి. 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 2 దఫాలుగా పిచికారి చేసుకోవాలి.

అగ్గి తెగులు : తెగులు సోకిన ఆకులపై నూనె కండె ఆకారం లేదా గుండ్రని మచ్చలు ఏర్పడతాయి. వీటి అంచులు ముదురు గోధుమ రంగులో ఉండి మధ్య భాగం బూడిద రంగులో ఉంటుంది. మచ్చల చుట్టూ పసుపు రంగు వలయాలు ఏర్పడతాయి. తెగులు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మచ్చలు ఒక దానితో ఒకటి కలిసి ఆకులు ఎండిపోతాయి. కిలో విత్తనాలకు 3 గ్రా. థైరమ్ 80% డబ్ల్యూ.పి. లేదా కాప్టాన్ 75% డబ్ల్యూ.ఎస్. కలిపి శుద్ధి చేయాలి. లీటరు నీటికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

సస్యరక్షణలో మంచి ఫలితాలు పొందాలంటే, ఒక ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీటితో సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులో క్రిమినాశక / శిలీంధ్రనాశక మందులను కలిపిన ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయవలసి ఉంటుంది.
పంట కోత : సజ్జ పంటలో పిలక కంకుల కంటే ప్రధాన కాండపు కంకి మొదట కోతకు వస్తుంది. కాబట్టి 2 లేక 3 దశల్లో కంకులు కోయాల్సి వస్తుంది. కోసిన కంకులను బాగా ఆరబెట్టి, నూర్పిడి చేసి నిల్వ చేయాలి.

సజ్జ పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతక ధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,
లాం - 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

రాగి / తైదలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాగి 90 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేయబడుతూ 57 వేల టన్నుల ఉత్పత్తి నిస్తుంది. సరాసరి దిగుబడి ఎకరాకు 631 కిలోలు వస్తుంది. అత్యధికంగా విశాఖ, చిత్తూరు, అనంతపురం, శ్రీకాకుళం మరియు విజయనగరం జిల్లాల్లో సాగుబడిలో ఉంది.

విత్తే సమయం : రాగిని ఖరీఫ్‌లో జూలై – ఆగష్టు మాసాల్లో, రబీలో నవంబరు – డిసెంబరు మాసాల్లో, వేసవిలో జనవరి – ఫిబ్రవరి మాసాల్లో విత్తుకోవచ్చు.

నేలలు : రాగిని తేలిక రకం ఇసుక నేలలలో మరియు బరువు నేలల్లో పండించవచ్చు. నీరు నిల్వ ఉండే భూములు అనువైనవి కావు.

రకాలు

రకం (విడుదలైన సం॥)	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి/ఎ)	గుణగణాలు
1	2	3	4	5
గోదావరి (1974)	ఖరీఫ్, రబీ	120–125	12–16	అన్ని ఋతువుల్లో పండించవచ్చు. పైరు ఎక్కువగా పిలకలు వేస్తుంది. మొక్క పచ్చగా ఉండి, వెన్నులు పెద్దగా, ముద్దగా ఉంటాయి. గింజలు ఎరుపు గోధుమరంగు కలిగి, మధ్యస్థమైన లావుగా ఉంటాయి.
రత్నగిరి (1985)	ఖరీఫ్, వేసవి	110–105	12–16	పైరు ఎక్కువగా పిలకలు వేస్తుంది. మొక్క ఆకు పచ్చగా ఉండి 90 సెం.మీ. ఎత్తు వరకు ఎదుగుతుంది. వెన్నులు పెద్దగా ముద్దగా ఉంటాయి. గింజలు ఎరుపు గోధుమ రంగులో ఉండి, మధ్యస్థమైన లావుగా ఉంటాయి.
సప్తగిరి (1995)	ఖరీఫ్, రబీ	110–115	12–16	పైరు ఎత్తుగా పెరిగి, పిలకలు ఎక్కువగా వేస్తుంది.
మారుతి (1998)	ఖరీఫ్, వేసవి	85–90	10–12	బెట్టను, అగ్గి తెగులును అన్ని దశల్లోను తట్టుకొంటుంది.
చంపావతి (1998)	అన్ని కాలాలకు	80–85	10–12	బెట్టను తట్టుకొంటుంది. అంతర పంటగా పండించేందుకు అనువైనది.
భారతి (2006)	అన్ని కాలాలకు	105–115	14–16	వెన్నులు పెద్దగా ముద్దగా ఉంటాయి. అగ్గి తెగులును కొంతవరకు తట్టుకోగలదు.
శ్రీచైతన్య (2009)	ఖరీఫ్, రబీ	110–115	12–16	పైరు ఎత్తుగా పెరిగి పిలకలు ఎక్కువగా వేస్తుంది. అగ్గితెగులును తట్టుకొనును.
వకుళ (2012)	ఖరీఫ్, రబీ	105–110	13–15	వెన్నులు పెద్దవిగా, ముద్దగా ఉంటాయి. పైరు ఎత్తు తక్కువగా ఉండి పొలం మీద పడిపోదు. అగ్గితెగులును తట్టుకొంటుంది. గింజలు ఎరుపు గోధుమ రంగులో ఉండి లావుగా ఉంటాయి.
హిమ (2012)	రబీ	110–115	10–12	తెల్ల గింజ రాగి రకము. అగ్గి తెగులును తట్టుకొంటుంది.

తిరుమల (2018)	అన్ని కాలాలకు	115–120	14–15	అన్ని రకాల అగ్గి తెగులును తట్టుకొంటుంది. గింజలు నాణ్యత కల్గి ఉంటాయి. చొప్ప దిగుబడి ఎక్కువ.
వేగావతి (2019)	అన్ని కాలాలకు	110–115	14–15	అగ్గి తెగులును మరియు పాము పొడ తెగులును తట్టుకొంటుంది. పైరు పడిపోదు.
సువర్ణముఖి (2019)	అన్ని కాలాలకు	105–110	14–15	పంట చివరి దశలో వచ్చు బెట్టను తట్టుకుంటుంది. అగ్గి తెగులును తట్టుకొంటుంది. వరి మాగాణుల్లో సాగుకు అనుకూలం.
గౌతమి (2020)	అన్ని కాలాలకు	115–120	14–15	అగ్గి తెగులును తట్టుకుంటుంది. పైరు పడిపోదు.
ఇంద్రావతి (2020)	అన్ని కాలాలకు	115–120	14–15	అగ్గి తెగులు మరియు పాము పొడ తెగులును తట్టుకుంటుంది. కాల్షియం, ఐరన్ మరియు జింక్ అధికంగా ఉంటుంది.
సి.ఎఫ్.ఎం.వి. –4 (2022)	ఖరీఫ్, రబీ	110–115	15–16	కాండం ధృడంగా ఉంటుంది. పంట పడిపోదు. పంట అంతా ఒకేసారి కోతకు వస్తుంది. యంత్రాలతో పంట కోతకు అనుకూలం.
గోస్థని (2022)	ఖరీఫ్, రబీ	110–115	14–15	వెన్నులు ముద్దగా ఉంటాయి. అగ్గి తెగులు మరియు పాము పొడ తెగులును తట్టుకొంటుంది. జింకు మరియు ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది.

విత్తనం : 2.5 కిలోల విత్తనంతో 5 సెంట్లలో పెంచిన నారు ఎకరా పొలంలో నాటడానికి సరిపోతుంది. వెదజల్లే పద్ధతిలో ఎకరాకు 3–4 కిలోల విత్తనం వాడాలి.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 2 గ్రా. ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి. మందుతో కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

విత్తటం : తేలికపాటి దుక్కిచేసి విత్తనం చల్లి, పట్టె తోలాలి. నారుపోసి నాటుకోవాలి. మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యంగల నేలల్లో నారు పోసుకోవాలి.

నాటటం : 85–90 రోజుల స్వల్పకాలిక రకాలకు 21 రోజుల వయసు కల్గిన మొక్కలను, 105–125 రోజుల దీర్ఘకాలిక రకాలకు 30 రోజుల వయసు కల్గిన మొక్కలను నాటుకోవాలి. ఎకరాకు దీర్ఘకాలిక రకాలకు లక్ష ముప్పై మూడు వేల మొక్కలు, స్వల్పకాలిక రకాలకు రెండు లక్షల ఆరవై ఆరువేల మొక్కలు ఉంచాలి.

విత్తే దూరం : స్వల్పకాలిక రకాలకు వరుసల మధ్య 15 సెం.మీ., వరుసలో 10 సె.మీ.; దీర్ఘకాలిక రకాలకు వరుసల మధ్య 15–20 సెం.మీ., వరుసలో 15 సెం.మీ. దూరం పాటించి విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు

నారుమడిలో : 5 సెంట్ల నారుమడి ఎకరాకు సరిపోయే నారును ఇస్తుంది. 640 గ్రాముల నత్రజని, 640 గ్రాముల భాస్వరం మరియు 480 గ్రాముల పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను వేయాల్సి ఉంటుంది.

పొలంలో : ఎకరాకు 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసి ఆఖరి దుక్కిలో కలియదున్నాలి. ఎకరాకు 12 కిలోల నత్రజని, 12 కిలోల భాస్వరం, 8 కిలోల పొటాష్‌లను నాటేటప్పుడు వేయాలి. నాటిన 30 రోజులకు మరో

12 కిలోల నత్రజనిని పైపాటుగా వేసుకోవాలి. ఆఖరి దుక్కిలో ఈ పోషకాలతో పాటు 20 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ ఒక ఎకరానికి చొప్పున నేలలో వేసినట్లయితే అధిక దిగుబడులను పొందవచ్చును.

విత్తనం వెదజల్లే పద్ధతి : బాగా మెత్తగా తయారైన పొలంలో విత్తనాన్ని సమానంగా చల్లుకోవాలి. విత్తనం చల్లిన తరువాత బల్లతోగాని, చెట్టుకొమ్మతోగాని, నేలను చదును చేయాలి. లేనిచో విత్తనానికి తగినంత తేమ లభించక మొలకశాతం తగ్గుతుంది.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన రెండు వారాల లోపుగా ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తనం వేసే ముందు మరియు నారు నాటటానికి ముందు పెండిమిథాలిన్ 30% ఎకరానికి 600 మి.లీ. లేదా 750 మి.లీ. అనిలోఫాస్ చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి తడి నేలపై పిచికారి చేసి కలుపును నివారించవచ్చు. నాటిన 25–30 రోజులకు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల నిర్మూలనకు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2, 4 డి సోడియం సాల్ట్ 80% పొడి మందును లేదా 100 మి.లీ. ఇథాక్సీసల్ఫ్యూరాన్ 15% డబ్ల్యూ.డి.జి. మందును 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నాటిన పైరు బాగా వేర్లు తొడిగిన తర్వాత 10 రోజులు నీరు పెట్టరాదు. పూత, గింజ పాలు పోసుకునే దశల్లో పైరు నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా చూడాలి.

అంతర పంటలు : రాగితో కందిని 8:2 నిష్పత్తిలో, చిక్కుడును 8:1 నిష్పత్తిలో సాగు చేయవచ్చు.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

గులాబి రంగు పురుగు : ఈ పురుగు సజ్జ, కొర్ర పంటలను కూడా ఆశిస్తుంది. బాగా ఎదిగిన లార్వాలు లేత గులాబి రంగులో ఉంటాయి. లార్వాలు కాండాన్ని తొలచి సొరంగాలు చేసి లోపలి భాగాలను తినడం వలన మొవ్వు చనిపోతుంది. పంటను కంకి దశలో ఆశిస్తే అవి తెల్ల కంకులుగా మారుతాయి. ఈ లార్వా పురుగులు ఒక మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కకు పాకి నష్టపరుస్తాయి. దీని నివారణకు ఈ పురుగు ఆశించిన మొక్కలను గుర్తించి ఏరివేయాలి. మొక్కల అవశేషాలను కాల్చివేయడం ద్వారా వీటివల్ల కలిగే నష్టం తగ్గుతుంది. అవసరాన్ని బట్టి ఒకటి, రెండు శాతం మొక్కల్లో పురుగు ఆశించినప్పుడు లీటరు నీటికి 2.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ 20% ఇ.సి. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

శనగ పచ్చ పురుగు : ఇది రాగి పంటని కంకి దశలో ఆశించి పూత, గింజలను తిని నష్టపరుస్తుంది. నివారణకు పురుగు ఆశించినప్పుడు కంకులను దులిపి లేదా చేతితో ఏరివేసి నాశనం చేయాలి. అవసరాన్ని బట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి రెండు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

చెదలు : రాగి, కొర్ర పంటలను చెదలు ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపరుస్తాయి. తేలిక నేలల్లో, వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఈ పంటను పండించినప్పుడు చెదలు ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తాయి. వీటి నివారణకు పంటల చుట్టూ అక్కడక్కడ ఎత్తుగా కనిపించే పుట్టను నాశనం చేయాలి. ఆ పుట్టలపై భాగంలో రంధ్రం చేసి లీటరు నీటికి 5 మి.లీ.

క్లోరిపైరిఫాస్ 50 ఇ.సి. మందును కలిపి ఒక్కొక్క పుట్టలో 10–12 లీటర్ల మందు ద్రావణం పోయడం ద్వారా చెదలను నివారించవచ్చు.

కత్తెర పురుగు : సజ్జ పంటలో వివరించడమైనది.

తెగుళ్ళు

అగ్గితెగులు : ఈ తెగులు నారుమడిలోను, తరువాత నాటిన పంటను ఆశిస్తుంది. వర్షపు జల్లులు పడుతూ గాలిలో అధిక తేమ ఉండి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరుకున్నప్పుడు అగ్గితెగులు ఉధృతి ఎక్కువవుతుంది. వాతావరణం ఈ విధంగా ఉంటే అధిక నత్రజని వాడిన పంటల్లో తెగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఎదిగిన మొక్కల ఆకులు, కణుపులు, వెన్నులపైన దారపుకండె ఆకారంలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలు చుట్టూ ఎరుపు గోధుమరంగు అంచులు కలిగి ఉంటాయి. కణుపులపై తెగులు ఆశిస్తే కణుపులు విరగడం, వెన్నుపై ఆశిస్తే గింజలు తాలు గింజలుగా మారుతాయి. దీని నివారణకు పంట పొలాల్లో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. తెగులును తట్టుకొనే శ్రీచైతన్య, వేగావతి, ఇంద్రావతి, సువర్ణముఖి, వకుళ మరియు తిరుమల రకాలను ఎన్నుకోవాలి. మొక్కలపై అక్కడక్కడ మచ్చలు కనిపించినప్పుడు లీటరు నీటికి 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 1 మి.లీ. టెబుకొనజోల్ లేదా 0.5 గ్రా. ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి. మందు కలిపి పిచికారి చేయాలి. నత్రజని ఎరువులను సిఫారసుకు మించి వాడకూడదు. నారు నాటే ముందు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 50% డబ్ల్యూ.పి.లేదా మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి. మందును 3 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి ఆ ద్రావణంలో నారును ముంచి శుద్ధి చేసి నాటుకుంటే పంటను మొదటి దశల్లో ఆశించే తెగుళ్ళ నుండి కాపాడుకోవచ్చు. వెదజల్లే విత్తే పద్ధతిలో 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. లేదా ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి. కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

సస్యరక్షణతో మంచి ఫలితాలు పొందాలంటే, ఒక ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీటితో సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులో క్రిమినాశక / శిలీంధ్రనాశక మందులను కలిపిన ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయవలసి ఉంటుంది.

పంటకోత : రాగి పంట కోతను సరైన సమయంలో ప్రారంభించాలి. గింజలు ముదురు గోధుమ రంగులో ఉన్నప్పుడు, వెన్నుకు దగ్గరి ఆకులు పండినట్లుగా ఉన్నప్పుడు పంటను కోయవచ్చు. పిలక కంకుల కంటే ప్రధాన కాండపు కంకి మొదట కోతకు వస్తుంది. కాబట్టి 2 లేక 3 దశల్లో కంకులను కోయాలి. పొలంలోనే చొప్పను కోసి 2–3 రోజులు ఆరిన తరువాత వెన్నులను విడదీయవచ్చు లేదా నేరుగా చొప్పను కోయకుండా వెన్నులనే కోసి 2–3 రోజులు పొలంలో ఆరబెట్టవచ్చు. బాగా ఆరిన వెన్నులను కర్రలతో కొట్టిగాని, ట్రాక్టరు నడపడం ద్వారా గాని గింజలను సేకరించాలి. అలా సేకరించిన గింజలను గాలికి తూర్పారబెట్టి నాణ్యమైన గింజలను పొందవచ్చు.

రాగి పంటసాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతక ధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

లాం – 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

కొర్ర

భారతదేశంలో సాంప్రదాయంగా పండించే చిరుధాన్యపు పంటలలో కొర్ర ప్రధానమైనది. అనాదిగా పౌష్టికాహారంలో ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొర్ర సాగు విస్తీర్ణం సుమారుగా 45 వేల ఎకరాలు, ఉత్పత్తి 21 వేల టన్నులు మరియు దిగుబడి ఎకరానికి సరాసరి 909 కిలోలు. మన రాష్ట్రంలోని కొర్ర సాగు విస్తీర్ణంలో 70 శాతం అత్యల్ప వర్షపాత ప్రాంతాలైన నంద్యాల, కర్నూలు మరియు అనంతపురం జిల్లాలలోను మిగిలిన విస్తీర్ణం ప్రకాశం, కడప, విజయనగరం, గుంటూరు, చిత్తూరు, శ్రీకాకుళం మరియు విశాఖపట్నం జిల్లాలలో ఉంది. స్థానికంగా ఉపయోగిస్తున్న సాధారణ రకాలకు బదులుగా నూతన వంగడాలను మరియు మెట్ట సాగులో మంచి మెలకువలు పాటిస్తే కొర్రలో అధిక దిగుబడులను పొందవచ్చు.

రకాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ప్రసాద్	1982	ఖరీఫ్, వేసవి	70–75	8–12	కంకులు పెద్దగా ఉండి గింజలు లావుగా, లేత పసుపు రంగులో ఉంటాయి. మొక్కలు 120–130 సెం.మీ. ఎత్తు పెరిగి ఆకులు వెడల్పుగా ఉండి, 3–4 పిలకలు వేస్తాయి.
కృష్ణదేవరాయ	1993	ఖరీఫ్, వేసవి	85–90	10–12	గింజలు లావుగా, లేత పసుపు రంగులో ఉంటాయి. మొక్కలు 110 సెం.మీ. ఎత్తు ఎదిగి 4–6 పిలకలు వేస్తాయి. చొప్ప నాణ్యమైనది.
నరసింహరాయ	1994	ఖరీఫ్, వేసవి	85–90	10–12	గింజలు లావుగా, లేత పసుపు రంగులో ఉంటాయి. మొక్కలు 120–130 సెం.మీ. ఎత్తు పెరిగి బాగా పిలకలు వేస్తాయి. మొక్కల మొదలు మరియు కణుపుల వద్ద ఊదా వర్ణం కలిగి ఉంటుంది.
శ్రీలక్ష్మీ	2002	ఖరీఫ్, వేసవి	80–85	10–12	మొక్కలు 115–120 సెం.మీ. ఎత్తు పెరిగి, వెర్రికంకి, తుప్పు మరియు అగ్గి తెగుళ్ళను కొంతవరకు తట్టుకుంటుంది.
యస్.ఐ.ఎ. 3085	2011	ఖరీఫ్, వేసవి	76–80	10–12	బెట్టను తట్టుకుంటుంది. అగ్గి మరియు గింజ బూజు తెగుళ్ళను తట్టుకుంటుంది. గింజ పసుపు రంగులో ఉండి నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది.

సూర్యనంది (యస్.ఐ.ఎ. 3088)	2012	ఖరీఫ్, వేసవి	70-75	10-12	గింజ పసుపు రంగులో ఉండి నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది. అగ్గి తెగులు మరియు వెర్రికంకి తెగులును తట్టుకొంటుంది. వివిధ పంటల క్రమంలో పండించుటకు అనుకూలం.
యస్.ఐ.ఎ. 3156	2013	ఖరీఫ్, వేసవి	85-90	11-13	అధిక గింజ దిగుబడి, వెర్రికంకి తెగులును తట్టుకొంటుంది.
గరుడ (యస్.ఐ.ఎ. 3222)	2019	ఖరీఫ్, వేసవి	60-62	6-7	అతి స్వల్పకాలిక రకం. పంటల సరళిలో ఉపయోగపడుతుంది. గింజలు కాషాయం రంగులో ఉంటాయి. అగ్గి తెగులును మరియు వెర్రికంకి తెగులును తట్టుకుంటుంది.
రేనాడు (యస్.ఐ.ఎ.3223)	2019	ఖరీఫ్, వేసవి	85-90	11-13	వెర్రికంకిని తట్టుకొనే రకం, అధిక గింజ మరియు చొప్ప దిగుబడినిస్తుంది.
మహానంది (యస్.ఐ.ఎ. 3159)	2022	ఖరీఫ్, వేసవి	80-85	11-13	అగ్గి మరియు వెర్రికంకి తెగుళ్ళను కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది. మొవ్వు చంపు ఈగను కూడా కొంత వరకు తట్టు కుంటుంది. యాంత్రీకరణకు అనువైనది. గింజలలో పోషకాలు అధికముగాఉండును.

నేలలు : తేలిక నుండి మధ్య రకం నేలలు బాగా అనుకూలమైనవి. మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యం గల నల్ల రేగడి నేలలు కూడ అనుకూలం.

నేలల తయారీ : విత్తే సమయం కంటే ముందుగానే నేలను 2-3 సార్లు మెత్తగా దుక్కి చేసి చదును చేసుకొని విత్తటానికి నేలను సిద్ధం చేసుకోవాలి.

విత్తే సమయం : సాధారణంగా కొర్రను వర్షాధారపు పంటగా జూన్, జూలై మాసంలో విత్తుకోవచ్చు. కాని ఖరీఫ్ వర్షాలు ఆలస్యంగా కురిసినప్పుడు కొర్ర ఒక ప్రత్యామ్నాయ పంటగా ఆగష్టు రెండవ పక్షంలో కూడా విత్తుకొని మంచి దిగుబడులు పొందవచ్చు. వేసవి పంటగా అయితే జనవరి మాసంలో విత్తుకోవచ్చు.

విత్తన మోతాదు : సరాసరి ఒక ఎకరాకు వరుసల్లో నాటడానికి 2 కిలోల విత్తనము మరియు వెదజల్లుటకు 4-7 కిలోల విత్తనము సరిపోతుంది. విత్తనం చల్లిన తరువాత బల్లతో గాని, చెట్టు కొమ్మతో గాని, నేలను చదును చేయాలి, లేనిచో విత్తనానికి తగినంత తేమ లభించక మొలక శాతం తగ్గుతుంది.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. థైరమ్ లేదా మాంకోజెబ్ లేదా 2 గ్రా. ట్రైసైక్లోజోల్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసుకొన్నట్లయితే విత్తనాల ద్వారా సంక్రమించే శిలీంద్రాలు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు మరియు లేత దశలో మొక్కలను తెగుళ్ళ బారి నుండి కాపాడుకోవచ్చు.

విత్తే పద్ధతి : వరుసలకు మధ్య 22.5 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 7.5 సెం.మీ. దూరం ఉండేటట్లు సుమారు 2.0 సెం.మీ. లోతులో విత్తనం గొర్రుతో విత్తుకోవాలి. లోతులో పడిన విత్తనం మొలకెత్తకుండా కుళ్ళి చనిపోతుంది.

అవసరం మేరకు విత్తిన రెండు వారాల లోపు ఒత్తు మొక్కలను తీసి, లేని చోట నాటుకోవాలి. ఎకరాకు 2 లక్షల 37 వేల మొక్కలు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసి ఆఖరి దుక్కిలో కలియదున్నాలి. ఎకరాకు 8 కిలోల నత్రజని, 8 కిలోల భాస్వరం విత్తేటప్పుడు వేయాలి. విత్తిన 3–4 వారాల తర్వాత నేలలో తగిన తేమ చూసి పైపాటుగా మరో 8 కిలోల నత్రజనిని వేసుకోవాలి.

అంతర పంటలు : కొర్ర : కంది / సోయాచిక్కుడు – 6:1, కొర్ర : వేరుశనగ – 2:1 నిష్పత్తి.

పంట సరళి : కొర్ర – శనగ.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : విత్తిన రెండు వారాల లోపుగా ఒత్తు మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తిన 30 రోజుల వరకు పంట పొలంలో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి లేదా ఐసోప్రోటూరోన్ 400 గ్రాములను 200 లీటరు నీటికి కలిపి విత్తిన వెంటనే లేదా 2 రోజుల లోపల తడిపై పిచికారి చేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : కొర్ర వర్షాధారపు పంట అయినప్పటికీ, బెట్ట సమయంలో / వేసవి సాగులో 2–3 తేలికపాటి తడులు ఇవ్వాలి. పంట పిలకలు వేసే దశలో (విత్తిన 30–35 రోజుల తరువాత) గింజ గట్టిపడే దశలో (విత్తిన 55–60 రోజులలో) నీటి తడి ఇచ్చినప్పుడు అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు.

సస్యరక్షణ : పురుగులు

కాండం తొలుచు పురుగు : ఈ పురుగు కాండాన్ని తొలచటం వలన మొక్కలు సరిగా ఎదగక చనిపోతాయి. దీని నివారణకు కార్బొప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు ఎకరానికి 8 కిలోలు చొప్పున నీటి తడి ముందు వేసినచో మంచి ఫలితం ఉంటుంది లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆర్మీ వర్మ్ : లద్దె పురుగులు మొక్కలు పెరిగే దశలో ఆకులను, వెన్నులను కొరికి తినివేస్తాయి. దీని నివారణకు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్.జి. 0.4 గ్రా. లేదా స్పైనోసాడ్ 45% ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్ర నిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. లేదా స్పైనిటోరమ్ 11.7% ఎస్.సి. 0.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. పురుగు తీవ్రత ఎక్కువైనప్పుడు విషపు ఎరను సాయంత్రం సమయంలో ఉపయోగించాలి. విషపు ఎర తయారీకి 10 కిలోల తవుడు, 2 కిలోల బెల్లం మరియు 2 లీటర్ల నీరు కలిపి రాత్రంతా పులియ బెట్టి ఉదయం వేళ 100 గ్రా. థయోడికార్బ్ మందును కలిపి ఉండలుగా చేసి మొవ్వులో వేయాలి.

గులాబి రంగు పురుగు : లార్వాలు మొవ్వును తొలిచి తినడం వలన మొవ్వు చనిపోతుంది. పూత దశలో ఆశించినట్లయితే వెన్నులు తెల్ల కంకులుగా మారుతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. వేప నూనె (3000 పి.పి.యం.) లేదా వేప గింజల కషాయం 5% కలిపి పిచికారి చేయాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% యస్.సి. 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

చెదలు : తేలికపాటి నేలల్లో చెద పురుగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొర్ర వేర్లను, భూమిలో ఉన్న చెదలు ఆశించటం వలన మొక్కలు వాడి చనిపోతాయి. వీటి నివారణకు చివరి దుక్కిలో క్లోరిపైరిఫాస్ 28% ఇ.సి. మందును ఎకరానికి 1.2 లీటర్ల వంతున మట్టిలో బాగా కలిసేటట్లు వేయాలి లేదా దీని నివారణకు ఫిప్రోనిల్ 3 జి గుళికలు 17.5 కిలోలను 50 కిలోల ఇసుకతో కలిపి ఒక హెక్టారు పొలానికి వెదజల్లిన వెంటనే నీటి తడి ఇస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

మిడతలు : ఇవి పైరు మొలకెత్తినప్పటి నుంచి ఆకుల అంచులను కొరికి నష్టం కలిగిస్తాయి. వీటి నివారణకు వేప గింజల కషాయం 5 శాతం లేదా అజాడిరెక్టిన్ 1% (1000 పి.పి.యం.) 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి

లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 20% ఇ.సి. మందును ఎకరానికి 500 మి.లీ. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

తుప్పు తెగులు : ఈ తెగులు ఒక రకమైన శిలీంధ్రం వలన కలుగుతుంది. ఆకుల రెండు వైపులా గోధుమ రంగు కలిగిన చిన్న చిన్న ఉబ్బెత్తు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలు ఆకుతొడిమ మరియు కాండం మీద కూడా ఏర్పడుతాయి. ఈ మచ్చలు ఎక్కువ అయిన ఎడల ఆకులు ఎండిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా హెక్సాకొనజోల్ 5% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పైరుపై తెగులు కనిపించిన వెంటనే పిచికారి చేయాలి.

అగ్గి తెగులు : ఎదిగిన మొక్కల ఆకులపై నూలు కండె ఆకారంలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఆకులు అంతటా వ్యాపించి ఆకులు ఎండి రాలిపోతాయి. కంకికాడపై మచ్చలు ఏర్పడినప్పుడు కాడ విరిగి, కంకిలో తాలు గింజలు ఏర్పడతాయి. దీని నివారణకు కాప్టాన్ లేదా థైరామ్ (3 గ్రా./ కిలో) విత్తనాలకు కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి లీటరు నీటికి కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా. లేదా ట్రైసైక్లోజోల్ 0.6 గ్రా./ లీటరు లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి వారం రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

వెర్రికంకి తెగులు : తేమతో కూడిన వాతావరణంలో ఆకుల అడుగువైపున బూజులాంటి శిలీంధ్రం పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అట్టి ఆకులు ఎండి పీలికలుగా కనిపిస్తాయి. మొవ్వులోని ఆకులు సరిగా విచ్చుకోవు. మొక్క నుండి బయటకు వచ్చిన కంకులు గింజల ప్రదేశంలో ఆకుపచ్చని ఆకుల మాదిరిగా మారి కనిపిస్తాయి. దీని నివారణకు 3 గ్రా. థైరామ్ లేదా 3 గ్రా. కాప్టాన్ లేదా 3 గ్రా. మెటలాక్సిల్ కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. మెటలాక్సిల్ 2 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పంటపై పిచికారి చేయాలి.

పక్షులు : కొర్ర పంటలో పక్షులు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. సకాలంలో పక్షుల బెడదను నివారించలేని పక్షంలో దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. గింజ పట్టె దశ నుండి కోసే వరకు పక్షులను ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పారదోలే ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. వీటిలో ముఖ్యంగా రిబ్బన్లుతో పాటు ఇటీవల కాలంలో రైతులు తమ సొంత పరిజ్ఞానంతో పాడైన ఫ్యాన్లు, భోజన ప్లేట్లు, బోల్టులు, రింగులు సాయంతో పక్షులు మరియు జంతువులను తరిమేలా గాలివాటానికి శబ్దం చేసే పరికరాన్ని సిద్ధం చేసుకొని పంటలను రక్షించుకొంటున్నారు.

పంట కోత, నూర్పిడి మరియు నిల్వ చేయటం : పంట కోతకు వచ్చినప్పుడు కంకులలోని గింజ క్రింది భాగమును గమనించినట్లయితే ఒక చిన్నచుక్క కనిపిస్తుంది. మొక్కలలోని అధిక భాగం ఆకులు పసుపు వర్ణంలోకి మారి ఎండిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. కంకులను కోసి వేసిన ఒక వారం తర్వాత ఎండు మొక్కలను లేదా కట్టెను కోసి కుప్ప వేసుకొని పశుగ్రాసంగా వాడుకోవచ్చు. పంట కోసిన తర్వాత కొర్ర కంకులను 4-5 రోజులు ఆరబెట్టి గింజలను కంకుల నుంచి నూర్పిడి చేసే యంత్రం ద్వారా లేదా కర్రలతో కొట్టి గాని లేదా పశువులు / ట్రాక్టరు నడపడం ద్వారా గాని గింజలను వేరు చేస్తారు. తర్వాత తూర్పార పట్టి గింజలను, పొట్టు, దుమ్ము, మట్టి వంటివి లేకుండా శుభ్రపరచాలి. ఈవిధంగా వచ్చిన ధాన్యం దీర్ఘకాలికంగా (6 నెలలు పైగా) నిల్వ చేసుకోవాలంటే గింజలలోని తేమను 13-14 శాతం వచ్చే వరకు ఎండబెట్టిన తర్వాత గోనె సంచులలో నిల్వ చేసుకోవాలి.

కొర్ర పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతక ధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

లాం - 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

సామ

రాష్ట్రంలో సామను వర్షాధారంగా అనంతపురం, చిత్తూరు, విశాఖ మరియు విజయనగరం జిల్లాలలో సాగు చేస్తున్నారు.

విత్తే సమయం : జూన్ నుండి జూలై వరకు విత్తుకోవచ్చును.

నేలలు : తేలికపాటి ఎర్రటి ఇసుక నేలలు

రకాలు

రకం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
జె.కె. 8	80-85	4-5	మొవ్వు ఈగను మధ్యస్థంగా తట్టుకొను రకం. పిలకలు ఎక్కువగా వస్తాయి. పక్వ దశలో కూడా పైరు పచ్చగా వుంటుంది.
బి.ఎల్. 6	90-95	4-5	జింకు & కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి.
డి.హెచ్.ఎల్.ఎం. 36-3	95-100	5-6	దీర్ఘకాలిక రకం.
ఓ.ఎల్.యం. 203 (తరిని)	105-110	6-7	అగ్గి తెగులును మరియు గింజ కాటుక తెగులును తట్టుకొను రకం. పైరు పడిపోదు, గింజ రాలదు. దీర్ఘకాలిక రకం. గింజలు విలువ జోడింపుకు మంచి నాణ్యత కలిగి ఉంటాయి.

విత్తన మోతాదు : ఎకరానికి 3-4 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. **విత్తనశుద్ధి :** ఒక కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. కలిపి విత్తుకోవాలి. **విత్తడం :** విత్తనాన్ని వరుసల మధ్య 25 సెం.మీ. మరియు మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. ఎడంగా గొర్రుతో విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు : ఎకరానికి 2 టన్నుల పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి. ఎకరాకు 8 కిలోల నత్రజని, 8 కిలోల భాస్వరం మరియు 8 కిలోల పొటాష్‌ను విత్తేటప్పుడు వేయాలి.

అంతరకృషి : పంట తొలిదశలో కలుపు మొక్కలను నివారించడానికి విత్తిన రెండు రోజులలోపు ఐసోప్రోట్యురాన్ మందును ఎకరాకు 400 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి తడినేలపై పిచికారి చేయాలి. విత్తిన రెండు వారాల్లోపుగా ఒత్తుగా ఉన్న మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తిన తర్వాత 20-25 రోజుల కలుపు మొక్కలను దంతితో అంతరకృషి చేసి తీసివేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నీటి వసతి క్రింద పండించినప్పుడు, పైరు పిలకల దశ, చిరుపొట్ట దశ మరియు గింజ ఏర్పడే దశల్లో పైరు నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా చూడాలి.

అంతర పంటలు : రెండు వరుసల సామలకు ఒక వరుస మినుము / కంది / నువ్వులు / సోయాబీన్ పంటలను అంతర పంటలుగా చేసుకోవచ్చును.

సామ పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :
ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతకధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,
లాం - 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

ఊద

రాష్ట్రంలో ఊదను వర్షాధారంగా అనంతపురం, విశాఖ మరియు విజయనగరం జిల్లాలలో సాగు చేస్తున్నారు.

విత్తే సమయం : ఖరీఫ్‌లో జూన్ నుండి జూలై వరకు, రబీలో అక్టోబరు మరియు నవంబర్ మాసంలో విత్తుకోవచ్చును.

నేలలు : తేలికపాటి ఎర్రటి ఇసుక నేలలు

విత్తన మోతాదు : ఎకరానికి 3 – 4 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది.

విత్తన శుద్ధి : ఒక కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి. లేదా 3 గ్రా. కాప్టాన్ 75% డబ్ల్యూ.ఎస్. / థైరామ్ 80% డబ్ల్యూ.పి. గాని కలిపి విత్తుకోవాలి.

రకాలు

రకం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
డి.హెచ్.బి.యం 93-3	90-95	8-10	అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం
కొ (కెవి) 2	95-100	8-10	పిలకలు ఎక్కువగా వస్తాయి. కోత సమయంలో పైరు పడిపోదు.
వి.యల్. మధిర 172	75-80	8-10	గింజ కాటుక తెగులును తట్టుకుంటుంది.
సుస్మృత (అర్.ఎ.యు.11)	75-80	8-10	అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం

విత్తడం : విత్తనాన్ని వరుసల మధ్య 25 సెం.మీ. మరియు మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. ఎడంగా గొర్రుతో విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు : ఎకరానికి 2 టన్నుల పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి. ఎకరానికి 8 కిలోల నత్రజని, 8 కిలోల భాస్వరం మరియు 8 కిలోల పొటాష్‌ను విత్తేటప్పుడు వేయాలి.

అంతరకృషి : పంట తోలిదశలో కలుపు మొక్కలను నివారించడానికి విత్తిన రెండు రోజులలోపు ఐసోప్రోట్యురాన్ మందును ఎకరాకు 400 గ్రాములు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి తడినేలపై పిచికారి చేయాలి. విత్తిన రెండు వారాల్లోపుగా ఒత్తుగా ఉన్న మొక్కలను తీసివేయాలి. విత్తిన తర్వాత 20-25 రోజుల కలుపు మొక్కలను దంతితో అంతరకృషి చేసి తీసివేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నీటి వసతి క్రింద పండించినప్పుడు, పైరు పిలకల దశ, చిరుపొట్టదశ మరియు గింజ ఎర్పడే దశల్లో పైరు నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా చూడాలి.

ఊద పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ముతకధాన్యాలు & మొక్కజొన్న); ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం – 522 034, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ : 85559 42733

కంది

కంది పంట ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దాదాపు 2.39 లక్షల హెక్టార్లలో సాగుచేయబడుతూ, 0.96 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి నిస్తుంది. హెక్టారుకి 413 కిలోల సరాసరి దిగుబడినిస్తుంది. ప్రత్తి, మిరప, పొగాకులకు ప్రత్యామ్నాయంగా అలాగే సజ్జ, జొన్న, మొక్కజొన్న, పెసర, సోయాచిక్కుడు, వేరుశనగ లాంటి పైర్లతో అంతర పంటగా కందిని ఖరీఫ్‌లో పండించవచ్చు. నీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాలలో కందిని రబీలో కూడా పండించవచ్చు.

విత్తే సమయం : తక్కువ వర్షపాత మండలంలో, జూన్‌లోను, కృష్ణా, గోదావరి, దక్షిణ మరియు ఉత్తర కోస్తా మండలాల్లో జులై–ఆగష్టు నెలల్లోను; కృష్ణా, గోదావరి, దక్షిణ మండలం, ఉత్తరకోస్తా మండలాల్లో రబీ పంటగా సెప్టెంబరు–అక్టోబరు నెలల్లోను విత్తుకోవచ్చు.

నేలలు : నీరు త్వరగా ఇంకిపోయే గరప, ఎఱ్ఱ రేగడి, చల్కా నేలల్లో మరియు మురుగు నీరు పోయే వసతి గల నల్ల రేగడి నేలల్లో సాగు చేసుకోవచ్చు. చౌడు నేలలు, నీటి ముంపుకు గురయ్యే నేలలు పనికి రావు. భూమిని రెండు సార్లు నాగళ్ళతో దున్ని నేలను మెత్తగా తయారుచేయాలి.

రకాలు :

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంట కాలం (రోజులు)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ఎల్.ఆర్.జి.41	2006	ఖరీఫ్ రబీ	180 120–130	8–10	పైరు ఒకేసారి పూతకు రావటం వలన కొమ్మలు వంగుతాయి. శనగపచ్చ పురుగును తట్టుకొంటుంది. నల్లరేగడి భూములకు అనుకూలం. నీటి వసతితో తేలికపాటి భూముల్లో కూడా పండించవచ్చు.
లక్ష్మి (ఐ.సి.పి.ఎల్. 85063)	1997	ఖరీఫ్ రబీ	160–170 120–130	7–8	చెట్లు గుబురుగా ఉండి ఎక్కువ కొమ్మలు కలిగి ఉంటాయి. ఎండు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. రబీలో విత్తినపుడు, ప్రధాన కొమ్మలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. గింజలు లావుగా ముదురు గోధుమ వర్ణంలో ఉంటాయి.
బి.ఎస్.ఎం.ఆర్. 736	–	ఖరీఫ్ రబీ	180 130	8–10	వెర్రి తెగులును తట్టుకొనే రకము.
ఆశ (ఐ.సి.పి.ఎల్. 87119)	–	ఖరీఫ్	170–180	7–8	మొక్క నిటారుగా, గుబురుగా పెరుగుతుంది. ఎండు మరియు వెర్రి తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది. గింజలు ముదురు గోధుమ రంగులో లావుగా ఉంటాయి.
ఎల్.ఆర్.జి.52 (అమరావతి)	2015	ఖరీఫ్ రబీ	155–160 120–130	8–9	ఎండు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. గింజలు లావుగా ఉంటాయి.

ఎల్.ఆర్.జి.105 (కృష్ణ)	2020	ఖరీఫ్ రబీ	160-170 130-145	8-10	ఎండు తెగులు, వెర్రి తెగులును కొంతవరకు తట్టుకుంటుంది. నిటారుగా పెరుగుట వలన అంతర పంటలకు అనుకూలం.
ఎల్.ఆర్.జి.133 -33 (సౌభాగ్య)	2020	ఖరీఫ్ రబీ	165-175 120-130	8-10	ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనంకు 8 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 10.0 మి.లీ. థయోమిథాక్సామ్ కలిపి విత్తితే రసం పీల్చు పురుగుల నుండి పంటను 30-45 రోజులు రక్షించుకోవచ్చు. ఆఖరుగా ద్రవరూప రైజోబియంను కిలో విత్తనంకు 5-10 మి.లీ. కలిపి విత్తితే అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు.

విత్తే పద్ధతి : నాగలి వెంబడి గాని, సాళ్లలో గొర్రుతో గాని విత్తుకోవాలి. సీడ్ డ్రిల్ ఉపయోగించి విత్తుకోవచ్చు.

విత్తే దూరం : ఖరీఫ్‌లో నల్లరేగడి నేలల్లో 150×20 లేదా 180×20 సెం.మీ. (వరుసల మధ్య × మొక్కల మధ్య), ఎర్ర నేలల్లో 90×20 సెం.మీ., రబీలో వర్షాధారంగా 45-60×10, ఆరుతడి పంటగా 75-90×10 సెం.మీ.

ఎరువులు : చివరి దుక్కిలో ఎకరాకు 2 టన్నుల పశువుల ఎరువు, ఖరీఫ్‌లో 8 కిలోలు, రబీలో 16 కిలోల నత్రజని, మరియు ఈ రెండు కాలాల్లోను 20 కిలోల చొప్పున భాస్వరం వేసుకోవాలి. అంతరపంటగా వేసినప్పుడు పైరును బట్టి వేసే ఎరువు మోతాదు మారుతుంది. ప్రధాన పైరుకు, అంతర పంటకు వేరువేరుగా ఎరువులు వేయాలి.

నీటి యాజమాన్యం : ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం లేని ప్రాంతాల్లో రబీ కందికి 2 తేలిక పాటి తడులు ఇవ్వాలి. ఈ తడులు మొగ్గ రాబోయే ముందు ఒకసారి, కాయదశలో మరోసారి ఇవ్వాలి.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% ఎకరాకు 1.0-1.5 లీటర్లు లేదా అలాక్లోర్ 50% ఎకరాకు లీటరు చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజుగాని పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 30, 65 రోజులప్పుడు గుంటకతోగాని, గొర్రుతోగాని అంతరకృషి చేయాలి. విత్తిన 20-25 రోజుల మధ్య గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలైన ఊద, చిప్పెర మరియు గరిక నివారణకు క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ 5% మందును 400 మి.లీ. ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి చల్లాలి. గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు ఉన్న యెడల ఎకరానికి 250 మి.లీ. ఇమజితాఫిర్ 10% మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

అంతర పంటలు : తక్కువ కాలపరిమితి గల మినుము, పెసర, తృణ ధాన్యాలు, వేరుశనగలను అంతర పంటలుగా వేసుకోవచ్చు. **అంతర పంటల నిష్పత్తి :** కంది + జొన్న/మొక్కజొన్న/సజ్జ (1:2), కంది+పెసర/మినుము/ సోయాచిక్కుడు/ వేరుశనగ (1:7)

పంటల మిశ్రమం	విత్తన మోతాదు (కిలో/ఎకరాకు)		పోషకాలు (కిలో / ఎకరాకు)			
			నత్రజని		భాస్వరం	
	కంది	వేరుశనగ/ మొక్కజొన్న	కంది	వేరుశనగ/ మొక్కజొన్న	కంది	వేరుశనగ/ మొక్కజొన్న
కంది + వేరుశనగ (1:7)	2-3	42-45	8	18	20	35
కంది + మొక్కజొన్న (1:2)	2-3	6	8	22	20	11

రబీ కంది సాగుకి అవకాశాలు

1. కారణాంతరాల వల్ల తొలకరిలో ఏ పైరు వేసుకునేందుకు అవకాశం లేని ప్రాంతాలు.
2. అధిక వర్షాలకు, బెట్టకు మొదటి పంట పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు.
3. తొలకరిలో స్వల్పకాలిక పంటలు (పెసర, మినుము లాంటివి) వేసుకుని రెండవ పంటగా కంది వేసుకోవచ్చు.
4. స్వల్పకాలిక వరి రకాల తర్వాత కూడా కందికి అవకాశముంది. అయితే అక్టోబర్ 20 తర్వాత కంది విత్తకూడదు.
5. తొలకరి కంది ఎక్కువ ఎత్తు పెరగటం వలన ఈ పంటను ఆశించే కాయ తొలుచు పురుగు మరియు మారుకా మచ్చల పురుగుల నివారణ కష్టమౌతుంది. రబీ కంది, అనువైన ఎత్తులో వుండటం వలన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టటం తేలిక. రబీ కంది జనవరిలో పూతకొస్తుంది. ఈ సమయంలో శనగపచ్చ పురుగు ఉధృతి తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి పురుగును తట్టుకుంటుంది.

రబీ కందికి అనువైన ప్రాంతాలు : దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలైన నెల్లూరు మరియు ప్రకాశం రబీ కంది సాగుకు అనుకూలం. నాగార్జునసాగర్ ఆయకట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా కందిని ఆరుతడి పంటగా పండించవచ్చు. నీటి వసతి ఉంటే మన రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా సాగుచేయవచ్చు.

తొలకరిలో 170 నుండి 180 రోజుల్లో కోతకు వచ్చే మధ్యకాలిక రకాలైన ఎల్.ఆర్.జి. 105, ఎల్.ఆర్.జి. 133-33 (సౌభాగ్య), ఐ.సి.పి.ఎల్. 85063, పల్నాడు, ఎల్.ఆర్.జి 38, ఎల్.ఆర్.జి 41, ఎల్.ఆర్.జి.52, సి.11, అభయ, ఐ.సి.పి.ఎల్.87119, ఐ.సి.పి.8863 లను రబీ కాలంలో కూడా వేసుకోవచ్చు.

ఖరీఫ్, రబీ కంది పైరుల తేడాలు

లక్షణాలు	ఖరీఫ్	రబీ
విత్తేకాలం	జూన్ - జులై	సెప్టెంబరు 15 - అక్టోబరు 15
పంటలు	సహ పంటగా	ఏకపంటగా / సహపంటగా
విత్తనం (ఎకరాకు)	2-3 కిలోలు	6-8 కిలోలు
విత్తేదూరం	150×20 లేక 180×20 సెం.మీ.	45-90 × 10 సెం.మీ.
కాల పరిమితి	160-180 రోజులు	120 - 125 రోజులు
మొక్కల ఎత్తు	2 మీటర్ల వరకు	1.2 మీటర్ల వరకు
కొమ్మలు	బాగా వస్తాయి	తగ్గుతాయి
కాయగింజల పరిమాణం	బాగుంటుంది	తగ్గుతుంది
చీడపీడలు	ఎక్కువ	తక్కువ
దిగుబడి (ఎకరానికి)	6-8 క్వింటాళ్ళు	5-6 క్వింటాళ్ళు

సస్యరక్షణ

పురుగులు

ఆకుచుట్టు పురుగు : కంది పెరిగే దశలో ఆకుచుట్టు పురుగు ఆశిస్తుంది. ఆకులను, పూతను చుట్టగా చుట్టుకొని లోపల ఉండి గీరి తింటుంది. దీని ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే నివారణకు 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లేదా 2.0 మి.లీ. క్వినాల్‌ఫాస్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కాయతొలుచు పురుగు / (శనగపచ్చ పురుగు) : ఈ పురుగు పూత, పిందె దశలో కాయలకు రంధ్రాలు చేసి గింజలను తింటూ, ఒక కాయ నుండి మరో కాయకు ఆశిస్తుంది. దీని నివారణకు సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు తప్పక పాటించాలి.

సమగ్ర సస్యరక్షణ

1. వేసవిలో లోతు దుక్కి చేస్తే భూమిలోని పురుగు కోశస్థ దశలు బయటపడి పక్షులు ఏరుకు తినటానికి వీలవుతుంది.
2. ఈ పురుగు తక్కువగా ఆశించే పంటలైన జొన్న, సోయాచిక్కుడు, నువ్వులు, మినుము, ఉలవ, మెట్ట వరి మొదలైన పంటలతో పంట మార్పిడి చేయాలి.
3. ఖరీఫ్‌లో అంతర పంటగా 7 సాళ్ళు, రబీలో 3 సాళ్ళు పెసర/మినుము వేయడం ద్వారా పరాన్న జీవులను వృద్ధి చేయటానికి తోడ్పడతాయి. పొలంచుట్టూ 4 సాళ్ళు జొన్న రక్షితపైరుగా విత్తాలి.
4. పచ్చపురుగును తట్టుకునే ఐ.సి.పి.ఎల్.332, యల్.ఆర్.జి 41 రకాలను లేదా పురుగు ఆశించినప్పటికి తిరిగి పూతకు రాగల ఎల్.ఆర్.జి 30, ఎల్.ఆర్.జి 38 కంది రకాలను సాగు చేసుకోవాలి.
5. పైరు విత్తిన 90–100 రోజుల్లో చిగుళ్ళను ఒక అడుగు మేరకు కత్తిరించాలి.
6. ఎకరాకు 4 లింగాకర్షణ బుట్టలను అమర్చి పురుగు ఉనికిని గమనించి తగిన సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.
7. పురుగులను తినే పక్షులను ఆకర్షించడానికి వీలుగా ఎకరాకు 20 పక్షి స్థావరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
8. పురుగు గుడ్లను, తొలి దశ పురుగులను గమనించిన వెంటనే 5% వేప గింజల కషాయాన్ని లేదా వేప సంబంధమైన మందు (అజాడిరక్టిన్) లను పిచికారి చేయాలి.
9. ఎకరాకు 200 లార్వాలకు సమానమైన యన్.పి.వి ద్రావణాన్ని లేదా 400 గ్రా. బాక్టీరియా సంబంధమైన మందును 200 లీటర్ల నీటితో కలిపి వారం తేడాతో రెండు సార్లు చలికాలంలో సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేయాలి.
10. బాగా ఎదిగిన పురుగులను ఏరివేయాలి లేదా చెట్లను బాగా కుదిపి దుప్పట్లలో పడిన పురుగులను నాశనం చేయాలి.
11. రసాయనిక పురుగు మందులను విచక్షణా రహితంగా వాడరాదు.

12. పైన చెప్పిన చర్యలు తగిన సమయంలో చేపట్టలేనప్పుడు తప్పనిసరి అయితే పురుగు ఉధృతిని బట్టి పైరు మొగ్గ/తొలి పూతదశలో ఉన్నప్పుడు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. పూత లేదా కాయదశలో క్వినాల్‌ఫాస్ 2.0 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా డెల్టామిత్రిన్ 0.9 మి.లీ. లేదా ల్యాండాసైహలోత్రిన్ 1.0 మి.లీ. లేదా ల్యుఫెన్యురాన్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఈ మందులు వాడిన తర్వాత కూడా శనగ పచ్చ పురుగును నివారించలేక పోతే ఇండాక్సాకార్బ్ 1.0 మి.లీ లేదా స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. ను లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మారుకా మచ్చల పురుగు : దీనిని వాడుకలో పూత పురుగు లేదా గూడు పురుగు లేదా బూజు పురుగు అని కూడ అంటారు. ఈ పురుగు యొక్క ఒకటి రెండు దశలు పూమొగ్గల లోపలే ఉండి తిని వేస్తాయి. తరువాత దశలో లేత ఆకులను, పూతను, లేత పిందెలను మరియు కాయలను కలిపి గూడుగా చేసుకొని కాయ అడుగు భాగాన చిన్న రంధ్రం చేసి లోపలికి వెళ్ళి కాయలలోని గింజలను తినివేసి వాటిని డొల్ల చేస్తుంది. దీని నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా థయోడికార్బ్ 1గ్రా. లేదా నొవాల్యురాన్ 1.0 మి.లీ. లేదా స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ల్యాండా సైహలోత్రిన్ 1 మి.లీ. లేదా ఫ్లుబెండియమైడ్ 0.2 మి.లీ. లేదా ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి మందులు మార్చి, ఏడు రోజులకొకసారి పిచికారీ చేయాలి.

కాయ ఈగ : కాయ ఈగ ఆశించినపుడు నష్టం బయటకు కనిపించదు. దీని పిల్ల పురుగులు కాయ లోపలే ఉండి గింజలను తిని వేస్తాయి. ఈ పురుగు అన్ని దశలనూ కాయలోపలే పూర్తి చేసుకొని తల్లి పురుగు మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. తల్లి పురుగు లేత పిందె దశలో కాయలపై గుడ్లు పెడుతుంది. కావున పిందె దశలో 5% వేపగింజల కషాయం పిచికారి చేసినట్లయితే గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించుకోవచ్చు. గింజ గట్టిపడే దశలో డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2.0 మి.లీ. లేదా థయాక్లోప్రిడ్0.7 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 25 డబ్ల్యు.జి. 0.4 గ్రా. లేదా ల్యుఫెన్యురాన్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కాయ రసం పీల్చే పురుగులు : పిల్ల, పెద్ద పురుగులు కాయలలోని గింజల నుండి రసం పీల్చుట వలన గింజలు నొక్కులుగా / పొక్కు గింజలుగా మారి లేత దశలోనే ఎండిపోవడం వలన దిగుబడి తగ్గడమే కాకుండా మొలక శాతం తగ్గిపోతుంది. ఆ గింజలు మొలకెత్తవు. నివారణకు డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లేదా డెల్టామిత్రిన్ 0.9 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

ఎండు తెగులు : ఈ తెగులు సోకిన మొక్కలు పూర్తిగా కాని మొక్కలో కొంత భాగం గాని వాడి ఎండి పోతాయి. ఎండిన మొక్కలను పీకి కాండం మొదలు భాగం చీల్చి పరిశీలిస్తే గోదుమ వర్ణపు నిలువు చారలు కనిపిస్తాయి. నివారణకు ఈ తెగులు అధికంగా కనిపించిన పొలాల్లో పొగాకు లేక జొన్నతో పంట మార్పిడి చేయాలి, ఎల్.ఆర్.జి. 105, ఎల్.ఆర్.జి. 133–33 (సౌభాగ్య), ఐ.సి.పి.ఎల్ 87119 మరియు ఐ.సి.పి.8863 వంటి కంది రకాలు ఈ

తెగులును తట్టుకొంటాయి. ఈ తెగులు నివారణకు ఎలాంటి మందులు లేవు. నీరు నిల్వ వుండే భూముల్లో కందిని సాగు చేయకూడదు (నివారణ చర్యలు మినుము విల్ట్‌లో ఇవ్వబడింది).

వెర్రి తెగులు (స్టెరిలిటీ మొజాయిక్) : ఇది వైరస్ తెగులు. తెగులు సోకిన మొక్క లేత ఆకుపచ్చ రంగు గల చిన్న ఆకులను విపరీతంగా తొడుగుతుంది. పూత పూయదు. ఈ తెగులు అసరియా కజాని అనే కంటికి కనిపించని ఇరియోఫిడ్ నల్లి (మైట్స్) ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ తెగులు ముఖ్యంగా వర్షాధారంగా పండించు తేలిక భూముల ప్రాంతాలైన ప్రకాశం మరియు రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా గమనించటం జరిగింది. అందుచేత, ముందస్తు నివారణ చర్యలలో భాగంగా విత్తిన 30 నుంచి 35 రోజుల వ్యవధిలో నల్లి నివారణకు లీటరు నీటికి 3 గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడి ఆ తర్వాత ప్రొపార్‌జైట్ 2.0 మి.లీ. / లీటరు నీటికి లేదా ఫెన్‌పైరొగ్జిమేట్ 1.5 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి 60-65 రోజులప్పుడు ఒకసారి పిచికారి చేసుకొన్నట్లైతే ఈ తెగులు వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చు. ఈ తెగులును కొంతవరకు తట్టుకోగల ఐ.సి.పి.యల్ 87119, బి.యస్.యమ్.ఆర్ 853, బి.యస్.యమ్.ఆర్. 736, టి.ఆర్.జి. 59 మరియు ఎల్.ఆర్.జి. 105 (కృష్ణ) అను రకాలను సాగుచేయాలి.

మాక్రోఫోమినా ఎండు తెగులు : ముదురు మొక్కల కాండంపైన నూలు కండె ఆకారం కలిగిన ముదురు గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు కన్పిస్తాయి. ఈ మచ్చలు చుట్టు గోధుమ వర్ణంలోనూ మధ్య భాగం తెలుపు వర్ణంలో వుంటాయి. తెగులు సోకిన మొక్కలు పూర్తిగా కాని, మొక్కలో కొన్ని కొమ్మలు గాని వాడి ఎండిపోతాయి. యమ్.ఆర్.జి 66 కంది రకం ఈ తెగులును తట్టుకొంటుంది. కందిని ఎక్కువ కాలం ఒకే పొలంలో వేయరాదు.

పంటకోత - నిల్వ : కాయలు ఎండిన తర్వాతనే కంది పంటను కోసి కట్టెతో కొట్టి కాయల నుండి గింజలను వేరు చేయాలి. నిల్వ చేసేటప్పుడు పురుగులు ఆశించకుండా ఉండేందుకు బాగా ఎండ బెట్టి, బూడిద కాని, వేప ఆకులు గాని కలపాలి.

కంది పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం,

గుంటూరు - 522 034, గుంటూరు జిల్లా. సెల్ : 99896 25215

పెసర

మన రాష్ట్రంలో పెసర 1.47 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయబడుతూ, దాదాపు 0.58 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తిని మరియు ఎకరానికి 400 కిలోల ఉత్పాదకతనిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తొలకరి పంటగాను, కోస్తా ఆంధ్రలో తొలకరి మరియు రబీ పంటగా పండిస్తారు. రబీ వరి తర్వాత మాగాణి భూముల్లో, వేసవిలో కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో మూడవ పంటగాను పండిస్తున్నారు. నీరు ఆలస్యంగా వచ్చి వరి నాట్లు ఆలస్యంగా పడే ప్రాంతాల్లో వరి కంటే ముందు పెసరను పండించవచ్చు. కంది, ప్రత్తి మరియు పండ్ల తోటలలో అంతర పంటగా కూడా పండించవచ్చు.

విత్తే సమయం : ఖరీఫ్ కాలంలో తక్కువ వర్షపాత మండలాల్లో జూన్ నెలలోను, కృష్ణా, గోదావరి, దక్షిణ మరియు ఉత్తరకోస్తా మండలాల్లో జూన్–జులై లోను విత్తుకోవచ్చు.

రబీలో కృష్ణా, గోదావరి, దక్షిణ మరియు ఉత్తర కోస్తా మండలాల్లో అక్టోబరులో విత్తుకోవచ్చు. కృష్ణా, గోదావరి మండలాలలో వరి మాగాణుల్లో నవంబరు–డిశంబరు మొదటి వారంలో, వేసవికాలంలో ఫిబ్రవరి–మార్చిలో విత్తుకోవచ్చు.

నేలలు : పెసరను అన్ని రకాల భూముల్లో సాగు చేయవచ్చు. కాని చౌడు నేలలు మరియు ముురుగు నీరు నిలిచే నేలలు పనికిరావు.

నేల తయారి : ఒకసారి నాగలితోను, రెండుసార్లు గొఱ్ఱు తోను మెత్తగా దున్ని గుంటక తోలి నేలను తయారు చేయాలి. వరి కోసిన పొలాల్లో దుక్కి దున్నవలసిన అవసరం లేదు.

విత్తనం : ఎకరాకు 6–7 కిలోలు (తొలకరిలో), మాగాణిలో వరి కోతల తర్వాత, రబీలో మరియు వేసవిలోని వరి మాగాణుల్లో 10–12 కిలోలు, వేసవిలో మెట్ట ప్రాంతాలకు 6–7 కిలోలు.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్/ కార్బండెజిమ్ వంటి తెగుళ్ళ మందులతో మరియు 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 5 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసినట్లయితే సుమారు 15 నుండి 20 రోజుల వరకు తెగుళ్ళు మరియు రసంపీల్చు పురుగుల బారి నుండి పంటను రక్షించుకోవచ్చు. ఈ పైరును కొత్తగా పండించేటప్పుడు, రైజోబియం కల్చరును విత్తనంతో కలిపి విత్తితే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు.

రకాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ఎల్.జి.జి.407	1993	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	65-70	5-6	మొక్కలు నిటారుగా పెరిగి కాయలు మొక్క పైభాగాన కాస్తాయి. గింజలు మెరుస్తూ మధ్యస్థ లావుగా ఉంటాయి. పల్లాకు, నల్ల ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది. బెట్టను కూడ కొంత వరకు తట్టుకొంటుంది.
ఎల్.జి.జి.460	1997	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	60-65	5-6	కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా పై భాగంలో వుండి కోయడానికి సులువుగా వుంటుంది. ఒకేసారి కోత కొస్తుంది. పల్లాకు, మొవ్వు కుళ్ళు తెగుళ్ళను కొంత వరకు తట్టుకొంటుంది. వరి మాగాణులకు అనువైనది.
ఎల్.జి.జి.450 (పుష్కర)	1993	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	65-70	5-6	మొక్కలు మధ్యస్థ ఎత్తులో ఉండి గుబురుగా కన్పిస్తాయి. పంట కోత సమయంలో వర్షాలు కురిసినా కాయల్లోని గింజలు కొంతవరకు పాడవకుండా ఉంటాయి.
ఎల్.జి.జి.410	1994	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	65-70	5-6	మొక్కలు నిటారుగా గుబురుగా పెరుగుతాయి. గింజలు మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఒకేసారి కోతకు వస్తుంది. కాపు పైభాగంలో ఉంటుంది. వరి మాగాణులకు అనువైనది.
టి.ఎమ్.96-2	2007	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	60-65	4-6	అధిక తేమను మరియు బూడిద తెగులును తట్టుకొంటుంది. గింజలు లావుగా మెరుస్తుంటాయి. వరి మాగాణులకు అనువైనది.
డబ్ల్యు.జి.జి.42	2016	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	55-60	4-6	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొంటుంది. గింజలు లావుగా ఉండి మెరుస్తుంటాయి. ఖరీఫ్ వరికి ముందుగా వేసుకోవటానికి అనువైన రకము.
ఐ.పి.యం. 2-14	2010	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	60-65	4-6	మొక్క నిటారుగా పెరిగి ఒకేసారి కోతకు వచ్చే రకం. గింజలు మధ్యస్థ లావుగా మెరుస్తుంటాయి. పల్లాకు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ఎల్.జి.జి.574	2022	రబీ	65-70	6-7	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొని ఒకేసారి కోతకు వచ్చే రకము. వరి మాగాణులకు అనువైన రకము.
ఎల్.జి.జి.607	2022	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	60-65	6-7	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొని అన్ని కాలాల సాగుకు అనువైన రకము. గింజలు మధ్యస్థ లావు కలిగి మెరుస్తుంటాయి.
ఎల్.జి.జి.630	2023	ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి	65-70	6-7	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొని అన్ని కాలాల సాగుకు అనువైన రకం. వరి మాగాణులకు కూడా అనువైన రకం.
ఎల్.జి.జి.600	2023	రబీ	70-75	6-7	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొని రబీ కాలానికి అనువైన రకం. వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.
ఎల్.జి.జి.610	2024	రబీ	70-75	6-7	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొని రబీ కాలానికి మరియు వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.

విత్తటం : సాళ్ళల్లో గొర్రుతో వెదబెట్టాలి. మాగాణిలో వరి కోయడానికి 2-3 రోజుల ముందు భూమిలో తేమ పరిస్థితిని బట్టి తడి లేక పొడి విత్తనాలు వెదజల్లాలి.

విత్తే దూరం : వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. దూరంలో విత్తుకోవాలి.

ఎరువులు :

ఎరువు	మోతాదు (కిలోలు / ఎకరాకు)	వేయవలసిన దశలు
పశువుల ఎరువు	2000	దుక్కిలో వేసి కలియదున్నుకోవాలి
నత్రజని	8	విత్తనం చల్లే ముందు
భాస్వరం	20	విత్తనం చల్లే ముందు

వరి మాగాణుల్లో ఎరువులు వాడాల్సిన అవసరంలేదు.

నీటి యాజమాన్యం : పెసర వర్షాధారపు పంట. కాని వర్షాభావ పరిస్థితులేర్పడినప్పుడు ఒకటి, రెండు నీటి తడులు ఇస్తే మంచి దిగుబడులు పొందవచ్చు.పెసరకు 25-30 రోజుల దశలో ఒకసారి, 45-50 రోజుల దశలో మరోసారి తేలిక పాటి తడులు ఇవ్వాలి. పూత దశలో నీటితడులు ఇవ్వరాదు.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% ఎకరాకు 1.3–1.6 లీటర్ల చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజుగాని పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20, 25 రోజులప్పుడు గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి. మాగాణి పెసరలో ఊద నిర్మూలనకు ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9% ఎకరాకు 250 మి.లీ. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 20–25 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయాలి. ఊదతో పాటు చిప్పెర, గరిక లాంటి గడ్డిజాతి కలుపు వుంటే, క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% 400 మి.లీ./ ఎకరానికి అదే గడ్డిజాతి కలుపుతో పాటు వెడల్పాకు కలుపు ఉన్నట్లైతే ఇమజితాఫిర్ 200 మి.లీ./ ఎకరానికి 20–25 రోజుల తర్వాత పొలంలో తేమ ఉన్నప్పుడు, కలుపు 2–4 ఆకుల దశలలో పిచికారి చేయాలి.

బంగారు తీగ (కస్కుటా): వరి మాగాణుల్లో బంగారు రంగు గల సన్నని తీగ పైరుపై వ్యాపించి మొక్కల నుండి రసం పీలుస్తుంది. దీని వలన పైరు ఎదగక క్షీణించిపోతుంది. బంగారు తీగ మొలవకుండా ఎకరానికి 1.0 లీటరు పెండిమిథాలిన్ ను 20–25 కిలోల ఇసుకలో కలిపి, పనలు తీసిన రోజున పొలంలో చల్లి, 200 లీటర్ల నీటిని ఎకరానికి సాయంత్రం సమయంలో పిచికారి చేయాలి, ఇలా చేయటం వల్ల 70 శాతం వరకు బంగారు తీగ మొలవకుండా చేసుకోవచ్చు. ఈ తీగ, పైరుపై కనిపించిన వెంటనే తీగ వ్యాపించిన మొక్కలతో పాటు పీకి కాల్చి వేయాలి. దీని ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నచోట పైరు 20 రోజులప్పుడు "ఇమజితాఫిర్" (పర్‌ష్యూట్) అనే కలుపు మందును ఎకరానికి 200 మి.లీ. చొప్పున పిచికారి చేయాలి. అశ్రద్ధ చేస్తే ఇది పైరంతా పాకి విత్తనాల ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం పొలంలో కనిపించి పైరును నష్టపరుస్తుంది.

అంతర పంటలు : పెసరను అంతరపంటగా పత్తి, కందిలో వేసుకోవచ్చు. పెసర : ప్రత్తి/రబీ కంది – 3:1, పెసర : తొలకరి కంది–7:1.

పెసరను పత్తి లేదా రబీ కందితో అంతరపంటగా వేసినపుడు ఎకరానికి 5 కిలోల విత్తనం, 6 కిలోల నత్రజని, 15 కిలోల భాస్వరం వేయాలి. తొలకరి కందితో అంతరపంటగా వేసినపుడు 6 కిలోల విత్తనం, 7 కిలోల నత్రజని, 17.5 కిలోల భాస్వరం వేయాలి.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

చిత్తపురుగులు : ఈ పురుగులు పైరుపై రెండు ఆకుల దశలో ఎక్కువగా ఆశించి గుండ్రటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేస్తాయి. వీటి బెడద ఎక్కువగా ఉన్నపుడు నివారించకపోతే 80 శాతం మొక్కలు ఈ దశలోనే చనిపోయే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు 2.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేక 1 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఇతర రసం పీల్చే పురుగుల నివారణను మినుము పంటలో వివరించబడింది.

పొగాకు లద్దె పురుగు : మొదటి రెండు దశలలోని పిల్ల పురుగులు ఆకుల్లోని పచ్చని పదార్థాన్ని గీరి తినటం వలన ఆకులు తెల్లగా జల్లెడాకులుగా మారతాయి. తరువాతి దశలలోని గొంగళిపురుగులు ఆకులకు రంధ్రాలు చేసి, ఆకులను పూర్తిగాను, పువ్వులను, పిందెలను కూడా తింటాయి. లద్దె పురుగులు రాత్రి పూట ఎక్కువగా తింటూ, పగలు మొక్కల మొదళ్ళలోను, భూమి నెర్రలలోను చేరతాయి.

నివారణకు ఈ క్రింద సూచించిన సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలను పాటించాలి.

1. గుడ్ల సముదాయాలను ఏరివేయాలి.
2. జల్లెడగామారి పిల్ల పురుగులతో ఉన్న ఆకులను ఏరి నాశనం చేయాలి.
3. ఎకరానికి 20,000 ట్రైకోగ్రామ బదనికలను వారం తేడాతో 2 పర్యాయాలు వదలాలి.
4. ఎకరానికి 4 లింగాకర్షణ బుట్టలను ఏర్పాటుచేసి పురుగు ఉధృతిని గమనించాలి.
5. ఎకరానికి ఎన్.పి.వి. 200 యల్.ఇ ద్రావణాన్ని సాయంకాలం పిచికారి చేయాలి.
6. పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు పొలంలో "విషపు ఎర" ముద్దల్ని వెదజల్లాలి. ఎకరానికి 500 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్, 5 కిలోల తవుడు మరియు అర కిలో బెల్లం సరిపడే నీటితో కలిపి చిన్న ఉండలుగా చేసి సాయం సమయంలో వెదజల్లాలి.
7. చివరిగా 2.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేదా 1 మి.లీ. నొవాల్యురాన్ లేదా 1 గ్రా. థయోడికార్బ్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మారుకా మచ్చల పురుగు ఆశించినచో, నివారణకు మినుములో తెలిపిన విధంగా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

తెగుళ్ళు

బూడిద తెగులు : ఈ తెగులు విత్తిన 30-35 రోజుల తర్వాత గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ముదురు ఆకులపై, బూడిద రూపంలో చిన్న చిన్న మచ్చలుగా కనపడి, అవి క్రమేణా పెద్దవై ఆకులపైన, క్రింది భాగాలకు మరియు కొమ్మలు, కాయలకు వ్యాపిస్తుంది. రబీ కాలంలో ఈ తెగులు వ్యాప్తి మరియు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా 1 గ్రా. థయోఫానేట్ మిథైల్ లేదా 1 మి.లీ. కెరాథీన్ లేదా 2 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1.0 మి.లీ. లేదా మైక్లోబుటానిల్ 1.0 గ్రా. లేదా డైఫెన్‌కొనజోల్ 1.0 మి.లీ. కలిపి 10-15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు మందులు మార్చి పిచికారి చేయాలి. నిర్దేశించిన కాలంలో విత్తుకోవాలి. తెగులును తట్టుకునే (టి.యమ్. 96-2) రకాలను విత్తుకోవాలి.

సెర్కోస్పొరా ఆకుమచ్చ తెగులు : ఈ తెగులు సోకిన ఆకులపై గోధుమ రంగు గుండ్రని చిన్న చిన్న మచ్చలు కనిపించి అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ మచ్చలు పెద్దవై అంచులు ముదురు గోధుమ రంగులోను, మధ్యలో తెల్లగా ఉంటాయి. ఆకులు ఎండి రాలిపోతాయి. దీని వలన కాయల్లో గింజలు సరిగా నిండవు. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 2.0 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా 1.0 మి.లీ. ప్రొపికొనజోల్ లేదా 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్

లేదా 1 గ్రా. ధయోఫానేట్ మిథైల్‌లను కలిపి వాడటం ద్వారా ఆకుమచ్చ తెగులుతో పాటు బూడిద తెగులును కూడా నివారించవచ్చు.

బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు : ఈ తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులపై గోధుమ వర్ణంలో చిన్న చిన్న పొక్కుల వలె మచ్చలు కనిపిస్తాయి. 1 గ్రా. పౌషామైసిన్‌ను ఒక లీటరు నీటిలో కలిపిన ద్రావణంలో కిలో విత్తనాన్ని 30 నిమిషాలు నానబెట్టి విత్తాలి. ఈ తెగులు నివారణకు లీటరు నీటికి 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ మరియు 100 మి.గ్రా. ప్లాంటో మైసిన్‌ను కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి.

పెసరపై ఆశించే వైరస్ తెగుళ్ళ గురించి మినుములో చూడండి.

పంట కోత-నిల్వ : తొలకరిలో ఎండిన కాయలను ఒకటి రెండు సార్లుగా కోసి నూర్చుకోవాలి. రబీ కాలంలో కాని, వేసవిలోగాని, మొక్కలను మొదలు వరకు కోసి ఎండిన తర్వాత నూర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండబెట్టి శుభ్రపరచి నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు.

పెసర పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :
ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం,
గుంటూరు - 522 034, గుంటూరు జిల్లా. సెల్ : 99896 25215

మినుము

మన రాష్ట్రంలో మినుము 7.67 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయబడుతూ, దాదాపు 3.45 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తిని మరియు ఎకరాకు 450 కిలోల దిగుబడి నిస్తుంది. రాష్ట్రంలో మినుమును తొలకరిలో, రబీలో మరియు వేసవిలో వరి కోతల తర్వాత పండిస్తారు.

విత్తే సమయం

ఖరీఫ్	రబీ	వరికోసిన మాగాణి పొలాల్లో	వేసవి
జూన్ 15 నుంచి జులై 15 వరకు	అక్టోబర్	నవంబర్ – డిసెంబర్	ఫిబ్రవరి – మార్చి

ఖరీఫ్‌కు అనువైన రకాలు :

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ఎల్.బి.జి.752	2009	75-80	6-7	పల్లాకు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొను పాలిష్ రకము. వరి మాగాణులలో ఆలస్యముగా విత్తుటకు కూడ అనువైన రకము.
పి.యు. 31	2005	70-75	5-6	సాదా రకం, కాయల మీద నూగు ఉంటుంది. పల్లాకు తెగులును పూర్తిగా తట్టుకొంటుంది.
ఎల్.బి.జి. 787	2016	75-80	8-9	పల్లాకు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. కాండం కణుపుల వద్ద కూడా కాపు కాస్తుంది. పాలిష్, మధ్యస్థ గింజ రకము అన్ని కాలాలకు అనువైన రకము.
టి.బి.జి. 104	2016	70-75	8-9	పల్లాకు తెగులును తట్టుకునే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు అనువైన రకం.
జి.బి.జి. 1	2020	70-75	8-9	కొంత వరకు పల్లాకు తెగులును తట్టుకునే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 884	2022	75-80	8-10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 904	2023	85-90	8-10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు కూడా అనువైన రకం.
టి.బి.జి. 129	2023	85-90	8-10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు కూడా అనువైన రకం.

ఈ రకాలన్నీ అన్ని కాలాలకు అనుకూలిస్తాయి. వీటిని రబీ మరియు వేసవిలో మెట్టలో మరియు వరి మాగాణుల్లో కూడ వేసుకోవచ్చు. తక్కువ కాలంలో పండే రకాలు కావున తేమను ఎక్కువగా నిలుపుకోలేని భూములకు అనుకూలం.

రబీ మినుము : రబీ కాలంలో మినుమును వరి మాగాణుల్లో పండించటం మన రాష్ట్ర ప్రత్యేకత. వరి కోయడానికి 2–3 రోజుల ముందుగా మినుము విత్తనాన్ని వెదజల్లుతారు. ఈ విధంగా చల్లిన విత్తనం మొలిచి భూమిలోని మిగిలిన తేమనీ, సారాన్ని ఉపయోగించుకొని పెరిగి పంటకొస్తుంది.

వరి మాగాణులకు ఎంపిక చేసుకునే రకాలు త్వరగా పెరిగి ప్రక్కలకు వ్యాపించి ఖాళీలు పూరించగలగాలి. ఏపుగా దట్టంగా పెరిగి, కలుపు మొక్కలను అణచి వేయగలగాలి. బూడిద మరియు ఎండు తెగుళ్ళను తట్టుకొనగలగాలి. బెట్టకు గురికాక ముందే కోతకు రావాలి.

రబీ మరియు రబీ వరి మాగాణులకు అనువైన రకాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
ఎల్.బి.జి. 752	2009	75–80	6–7	పల్లాకు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. వరి మాగాణులలో ఆలస్యముగా విత్తుటకు కూడ అనువైనది.
ఎల్.బి.జి. 645	2002	85–90	8–10	లావు గింజ పాలిష్ రకము, ఎండు తెగులును తట్టుకొంటుంది. కాయలు పొడవు, నూగు ఉండదు. రబీ వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 648	1996	90–95	8–9	పాలిష్ రకం, ఎండు తెగులును తట్టుకొంటుంది. పైరు తీగ వేస్తూ విస్తరించి పెరుగుతుంది. కాయలపై నూగు కలిగి వుంటుంది. బూడిద, ఆకుమచ్చ, తుప్పు తెగుళ్ళను కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. రబీ వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 787	2016	75–80	8–9	పల్లాకు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకుంటుంది. కాండము కణపుల వద్ద కూడా కాపు కాస్తుంది. పాలిష్, మధ్యస్థ గింజ రకము.
టి.బి.జి. 104	2016	70–75	8–9	పల్లాకు తెగులును తట్టుకునే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు అనువైన రకం.
జి.బి.జి. 1	2020	70–75	8–9	పల్లాకు తెగులును తట్టుకునే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 884	2022	75–80	8–10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు అనువైన రకం.
ఎల్.బి.జి. 904	2023	85–90	8–10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు కూడా అనువైన రకం.
టి.బి.జి. 129	2023	85–90	8–10	పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే పాలిష్ రకం. అన్ని కాలాలకు మరియు వరి మాగాణులకు కూడా అనువైన రకం.

యాజమాన్య పద్ధతులు : మెట్ట ప్రాంతాల్లో తేమను నిలుపుకోగలిగి, మురుగు నీరుపోయే వసతి గల భూములు అనువైనవి. భూమిని బాగా దుక్కిదున్ని విత్తటానికి ముందు ఎకరాకు 8 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం నిచ్చే ఎరువులు వేసి గొఱ్ఱుతో కలియదున్నాలి. వరి మాగాణుల్లో మినుము సాగు చేసేటపుడు ఎరువులు వాడనవసరం లేదు.

	తొలకరి	రబీ		వేసవి	
		మెట్ట	మాగాణి	ఆరుతడి	మాగాణి
విత్తే సమయం	జూన్/జులై	అక్టోబర్	నవంబర్	ఫిబ్రవరి	మార్చి
విత్తన మోతాదు (కిలో/ఎకరాకు)	8 – 10	8 – 10	16–18	10–12	16 – 18
విత్తే దూరం (సెం.మీ.)	30 × 10	30 × 10	వెదజల్లుట	22.5 × 10	వెదజల్లుట

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 2.5గ్రా. మాంకోజెబ్/ కార్బండెజిమ్ వంటి తెగుళ్ళ మందులతో మరియు 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 5 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసినట్లయితే సుమారు 15 నుండి 20 రోజుల వరకు తెగుళ్ళు మరియు రసం పీల్చు పురుగుల బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చు. ఈ పైరును కొత్తగా పండించేటప్పుడు, రైజోబియం కల్చరును విత్తనంతో కలిపి విత్తితే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యం : వర్షాభావ పరిస్థితులేర్పడినప్పుడు ఒకటి, రెండు నీటి తడులు ఇవ్వవలసివస్తుంది. వరి మాగాణుల్లో ఒకటి రెండు తేలికపాటి తడులు, 30 రోజులలోపు మరియు 55 రోజుల తర్వాత ఇస్తే అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% ద్రావకం ఎకరానికి 1.0–1.5 లీటర్లు విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజుగాని పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20–25 రోజులప్పుడు గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి. మాగాణి మినుములో ఊద, చిప్పెర, గరిక లాంటి గడ్డి జాతి మొక్కల నిర్మూలనకు ఫినాక్సీప్రాప్ ఇథైల్ 9% ద్రావకం ఎకరానికి 250 మి.లీ. లేదా క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% ద్రావకం ఎకరాకు 400 మి.లీ చొప్పున ఏదో ఒక దానిని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 20–25 రోజులప్పుడు పిచికారి చేసి సమర్థవంతంగా కలుపును నివారించుకోవచ్చు. వెడల్పాకు గడ్డిజాతి కలుపు ఉన్నపుడు 200 మి.లీ. ఇమజితాఫిర్ 5% ను 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి 20–25 రోజులపుడు పొలంలో తేమ ఉన్నప్పుడు కలుపు 2–4 ఆకుల దశలో పిచికారి చేయాలి. వరి మాగాణులలో బంగారు తీగ నిర్మూలనకు వరి పనలు తీసిన వెంటనే ఎకరాకు 1.5 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% మందును 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి సాయంత్రం వేళ పొలంలో సమానంగా చల్లాలి. వెంటనే ఎకరానికి 200 లీ. నీటిని పిచికారి చేయాలి. ఈ మందును ఒక వేళ వాడనపుడు విత్తిన 15–20 రోజులకు 200 మి.లీ. ఇమజితాఫిర్ 10% మందును 200 లీ. నీటిలో కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. బంగారు తీగ ఇంకా మిగిలి ఉన్నట్లయితే పీకి తగలబెట్టాలి లేదా పారాక్వాట్ 10% మందును లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. చొప్పున కలిపి బంగారు తీగ కలుపు ఉన్నచోటనే పిచికారి చేస్తే పైరుతో పాటుగా బంగారు తీగ కూడ చనిపోతుంది.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

కాండపు ఈగ : ఈ పురుగు క్రిమి దశ కాండంలో చేరి తినటం వలన మొక్క ఎండిపోతుంది. ఎక్కువగా తొలకరి పైరుపై మరియు తేమ ఎక్కువగా ఉండే వరి మాగాణుల్లో ఆశిస్తుంది. నివారణకు థయామిథాక్సామ్ 70 డబ్ల్యు.యస్. 5 గ్రా. లేక ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 5 మి.లీ. కిలో విత్తనానికి కలిపి తప్పనిసరిగా విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి. పైరుపై దీని నివారణకు ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మారుకా మచ్చల పురుగు : ఈ పురుగు మొగ్గ, పూత, పిందె దశల్లో ఆశించి ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తుంది. పూత దశలో పూలను గూడుగా చేసి లోపలి పదార్థాలను తింటుంది. కాయలు తయారయ్యేటపుడు కాయలను దగ్గరకు జేర్చి గూడుగా కట్టి, కాయలకు రంధ్రం చేసి లోపలి గింజలను తినటంవలన పంటకు ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుంది.

నివారణ :

1. పైరు పూత దశకు రాకముందు నుండే జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి. పూత దశలో (35 రోజుల) తప్పనిసరిగా పైరుపై 5% వేప గింజల కషాయం లేదా 5.0 మి.లీ. వేపనూనె ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసినట్లయితే రెక్కల పురుగులు గుడ్లు పెట్టకుండా నివారించవచ్చు. వేప సంబంధిత మందులు వికర్షకాలుగా పనిచేయడం వలన రెక్కల పురుగులు గుడ్లు పెట్టడానికి ఇష్టపడవు.అంతేకాక అప్పటికే పంట మొక్కలపై ఉన్న గుడ్లు కూడా పిగిలి చనిపోతాయి. తక్కువ కాల పరిమితి గల పైర్లలో ఇది అత్యంత ఉపయోగకరం.
2. మొగ్గ, పూత దశలో అక్కడక్కడా కొన్ని పూమొగ్గలను సేకరించి వాటిని తెరిచి పిల్ల పురుగులు ఉన్నాయేమోనని పరిశీలించాలి. పిల్ల పురుగులు కనిపించినట్లయితే వెంటనే 2.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేదా 1.0 గ్రా. థయోడికార్బ్ లేదా 1.0 గ్రా. ఎసిఫేట్ ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
3. పంటలో గూళ్ళు గమనించినట్లయితే నివారణకు 1.0 గ్రా. ఎసిఫేట్ లేదా 2.0 మి.లీ. క్వినాల్‌ఫాస్ లేదా 2.5 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేదా 1.0 మి.లీ. నొవాల్యురాన్ ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. మరల అవసరమైతే మందులను మార్చి మార్చి 2-3 సార్లు పూత మరియు కాయ దశల్లో పిచికారి చేయాలి.
4. పురుగు ఉధృతి అధికంగా గమనించినపుడు స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లేదా కోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ లేదా ఫ్లూబెండియమైడ్ 0.2 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పైరుపై పిచికారి చేసినట్లయితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

మినుముపై ఆశించే చిత్ర, తామర, తెల్లదోమ మరియు పొగాకు లద్దె పురుగుల నివారణ గురించి పెసరలో చూడండి.

తెగుళ్ళు

కొరినోస్పారా ఆకుమచ్చ తెగులు : ఈ తెగులు సోకిన ఆకులపై చిన్న చిన్న గుండ్రని గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెద్ద మచ్చలు వలయాకారంగా ఏర్పడి ఆకులు ఎండి రాలిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్‌లను లేదా 2.0 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా

ప్రొపికొనజోల్ 1.0 మి.లీ. 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు మందులు మార్చి పిచికారి చేయాలి. గట్ల మీద వున్న పైరుకు ముందుగా మందును పిచికారి చేయాలి.

ఎండు తెగులు (విల్ట్) : ఈ తెగులు ఆశించిన మొక్కలు వడలి, ఎండిపోతాయి, పంటకు అధిక నష్టం కలుగుతుంది. ఈ తెగులు, భూమిలో వున్న శిలీంధ్రం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. కనుక పైరుపై మందులను వాడి నివారించుట లాభసాటి కాదు. ఒకే పైరు సంవత్సరాల తరబడి ఒకే పొలంలో వేయరాదు. పొలంలో నీరు నిల్వకుండా చూడాలి. ఎండాకాలంలో లోతుదుక్కి చేయుట వలన భూమిలోని శిలీంధ్ర బీజాలు నశించిపోతాయి. పైరు విత్తుకొనే ముందు తప్పనిసరిగా కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా మాంకోజెబ్ పట్టించి విత్తుకోవాలి. 80 కిలోలు చీకిన పశువుల ఎరువు + 20 కిలోల వేపపిండి లలో అభివృద్ధి పరచిన 2 కిలోల ట్రైకోడెర్మా విరిడె జీవశిలీంధ్రాన్ని ఎకరాకి విత్తే సమయంలో భూమిలో కలయదున్నుకోవాలి.

పక్షికన్ను తెగులు (ఆంత్రాక్నోస్) : ఈ తెగులు సోకిన ఆకులపై లేత పసుపు రంగు అంచులతో కూడిన చిన్న చిన్న గోధుమ రంగు మచ్చలు కనిపిస్తాయి. ఈ తెగులు నివారణకు మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. లేదా హెక్సాకొనజోల్ 2.0 మి.లీ. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి.

తుప్పు లేదా కుంకుమ తెగులు : పైరు పూత దశ నుండి ఈ తెగులు లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఆకు ఉపరితలం పైన లేత పసుపు వర్ణం గల గుండ్రని చిన్న మచ్చలు ఉంటాయి. పిమ్మట కుంభాకృతితో కూడిన గుండ్రని మచ్చలు కుంకుమ/ తుప్పు రంగును పోలి ఉంటాయి. ఈ తెగులు నివారణకు లీటరు నీటికి 2.5 గ్రాముల మాంకోజెబ్ + 1 మి.లీ. డైనోకాప్ లేదా 1 గ్రా. బైలాటాన్ కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు మందులను మార్చి పిచికారి చేయాలి.

రబీ కాలంలో మాగాణి భూముల్లో మినుము పైరుపై 35-40 రోజుల దశలో ఆశించే కొరినోస్పోరా ఆకుమచ్చ తెగులు, 45-50 రోజుల దశలో బూడిద తెగులు మరియు 60-65 రోజుల దశలో తుప్పు తెగుళ్ళు ముఖ్యమైనవి. సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడితే అన్ని తెగుళ్లను సమర్ధవంతంగా అదుపు చేయవచ్చు. ఆకుమచ్చ మరియు బూడిద తెగుళ్ళ నివారణకు 30-35 రోజులకు లీటరు నీటికి హెక్సాకొనజోల్ 2 మి.లీ. చొప్పున, 50-55 రోజులకు ప్రొపికొనజోల్ 1 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. తుప్పు/ కుంకుమ తెగులు నివారణకు పైన సూచించిన మందులు పిచికారి చేయాలి. తెగులు సోకిన చాల రోజుల తర్వాత మందును పిచికారి చేయడం వలన లాభముండదు. వాతావరణ ప్రభావాన్ని బట్టి తెగులు రావచ్చనుకుంటే సిఫారసు చేసిన మందుల్ని ముందుగానే పిచికారి చేయటం మంచిది.

పల్లాకు తెగులు : పల్లాకు తెగులు జెమిని వైరస్ వలన కలుగుతుంది. ఈ తెగులును కలుగచేయు వైరస్ కలుపు మొక్కలు మరియు తెగులు సోకిన ఇతర పంట మొక్కల (పిల్లి పెసర మొ॥) నుండి తెల్లదోమల ద్వారా మినుము మరియు పెసర పంటలకు వ్యాప్తిచెంది అధిక నష్టం కలుగచేస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కలలోని ఆకులపై పసుపు మరియు ఆకుపచ్చ రంగు మచ్చలు కనబడతాయి. అందువలనే దీనికి మొజాయిక్ అనే పేరు వచ్చింది. తొలిదశలోనే ఈ తెగులు ఆశించినట్లయితే పైరు అంతా పసుపు రంగుకు మారిపోయి పూత మరియు పిందె ఏర్పడక అత్యధిక నష్టం కలుగుతుంది. పూత మరియు పిందె దశలో ఈ తెగులు ఆశించినట్లయితే పిందెలు, కాయలు పసుపు రంగులోకి

మారి వంకరలు తిరిగి తాలు కాయలుగా మారిపోతాయి. కాయదశలో ఈ తెగులు ఆశించినట్లయితే దిగుబడిలో పెద్దగా నష్టం కలుగనప్పటికీ గింజలు పసుపు రంగుకు మారి నాణ్యత తగ్గడానికి అవకాశముంది.

ఆకుముడత, తలమాడు తెగులు /మొవ్వుకుళ్ళు : ఈ వైరస్ తెగులు ఉధృతి వర్షాభావ పరిస్థితులలో ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇది తామరపురుగుల (త్రిప్స్) ద్వారా ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్కకు వ్యాప్తి చెందుతుంది. తెగులు ఆశించిన మొక్కలలో ఆకుల అంచులు వెనుకకు ముడుచుకుని మెలికలు తిరిగి గిడసబారి రాలిపోతాయి. ఆకుల అడుగు భాగములోని ఈనెలు రక్తవర్ణమును పోలివుంటాయి. లేత దశలో వ్యాధి సోకినట్లయితే తలలు మాడిపోయి, గిడసబారి మొక్కలు ఎండిపోతాయి. పైరు ముదురు దశలో తెగులు పాక్షికంగా ఉండి తలలు మాడిపోయి అతి తక్కువ కాపు వుంటుంది. తెగులు వ్యాప్తి చెందడానికి కారణమైన తామర పురుగులను నివారించుకోవాలి.

సీతాఫలం తెగులు (బొబ్బర తెగులు) : ఈ వైరస్ తెగులు పేనుబంక మరియు ఇతర రసం పీల్చు పురుగుల ద్వారా ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్కకు వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ తెగులు ఆశించిన మొక్కలలో ఆకుల కాడలు మరియు ఆకులు పెద్దవిగా అయ్యి ఆకుపై ఉబ్బెత్తుగా అయ్యి ముడుతలు పడి సీతాఫలం కాయ లాగా కనబడుతుంది. ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగుకు మారతాయి. ఈ తెగులు సోకిన మొక్కలలో పూత, పిందె అభివృద్ధి చెందక కాయలు ఏర్పడవు. ఈ తెగులు 70 శాతం వరకు విత్తనం ద్వారా కూడా వ్యాప్తిచెందుతుంది. కనుక తెగులు సోకని పంట నుండి విత్తనం సేకరించుకోవాలి. తెగులు వ్యాప్తికి కారణమైన పేనుబంక పురుగులను నివారించుకోవాలి.

వైరస్ తెగుళ్ళ సమగ్ర యాజమాన్యం : వైరస్ తెగుళ్ళు తెల్లదోమ, తామర పురుగులు మరియు పేనుబంక పురుగుల ద్వారా, కలుపు మొక్కల నుండి పంట మొక్కలకు, పంటలో ఒక మొక్క నుండి ఇతర మొక్కలకు వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఈ వైరస్‌ల నిర్మూలనకు ఎలాంటి క్రిమిసంహారక మందులు లేవు కాబట్టి తెగులు వ్యాప్తి కారకాలైనటువంటి తెల్లదోమ, తామర పురుగులు మరియు పేనుబంక పురుగులను అరికట్టడం ద్వారా మాత్రమే ఈ తెగుళ్ళను నివారించగలము.

1. పల్లాకు తెగులును తట్టుకొనే రకాలను సాగు చేసుకోవాలి.
   పెసర : ఎల్.జి.జి. 610, ఎల్.జి.జి. 607, ఎల్.జి.జి. 630, ఎల్.జి.జి. 574, ఎల్.జి.జి. 460, ఐ.పి.యం. 2-14 మరియు డబ్లూ.జి.జి. 42.
   మినుము : ఎల్.బి.జి. 904, టి.బి.జి. 129, ఎల్.బి.జి. 884, ఎల్.బి.జి. 752, పి.యు. 31, టి.బి.జి. 104 మరియు జి.బి.జి. 1 రకాలను సాగు చేసుకోవాలి.
2. **విత్తనశుద్ధి :** పంట విత్తుకొనే 24-48 గంటల ముందుగా ఒక కిలో విత్తనానికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 5 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 70 డబ్లూ.ఎస్. 5 గ్రా. మరియు కార్బండెజిమ్ లేదా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసినట్లైతే తొలి దశలో వైరస్ తెగుళ్ళను వ్యాపింపచేయు రసం పీల్చే పురుగులు మరియు వేరుకుళ్ళు తెగుళ్ళ బారినుండి పంటను కాపాడవచ్చును. వైరస్ తెగుళ్ళ నివారణకు విత్తనశుద్ధి తప్పనిసరిగా చేయవలెను.
3. పంట విత్తుకొనే సమయంలో పొలం చుట్టూ నాలుగు వరుసలలో మొక్కజొన్న/జొన్న/సజ్జ పంటను విత్తుకొన్నట్లయితే ప్రక్క పొలాల నుండి తెల్లదోమ, తామర పురుగులు మరియు పేనుబంక పురుగులను రాకుండా నివారించవచ్చు.

4. పొలంలోనూ, గట్లమీద కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి. గట్లమీది కలుపు మొక్కలను, ఇతర రకాల పంట మొక్కలను గమనిస్తూ వైరస్ తెగుళ్ళు సోకిన కలుపు మొక్కలను, పిల్లిపెసర వంటి ఇతర పంట మొక్కలను పీకి తగులబెట్టాలి.
5. పొలంలో తెగులు సోకిన మొక్కలను గమనించిన వెంటనే పీకి నాశనం చేయవలెను.
6. ఎకరాలో అక్కడక్కడా తెల్లదోమకు 20 చొప్పున పసుపురంగు జిగురు అట్టలు /రేకులు /పళ్లాలను, తామరపురుగులకు 20 నీలిరంగు జిగురు అట్టలను ఉంచటం ద్వారా ఆయా పురుగుల ఉనికిని మరియు ఉధృతిని అంచనా వేసుకోవచ్చు, అంతేకాక తెల్లదోమ మరియు తామరపురుగులు అట్టలకు అంటుకోవటం ద్వారా కొంత వరకు నివారించబడతాయి. కాని పల్లాకు తెగులు వ్యాప్తికి ఒకటి లేక రెండు తెల్లదోమలు ఉన్నా సరిపోతుంది. తెల్లదోమ కనిపించిన వెంటనే పురుగు మందులు పిచికారి చేసినట్లైతే పల్లాకు తెగులు బారి నుండి పంటను రక్షించుకొనవచ్చు.
7. విత్తిన 15 లేక 20 రోజులకు ఒకసారి వేపనూనె 5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి లేక 5% వేప గింజల కషాయము కాని పిచికారి చేసినట్లయితే పంటను రసంపీల్చే పురుగులు ఆశించకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అంతేకాక అప్పటికే పంటలో ఉన్న రసం పీల్చే పురుగుల గుడ్లను మరియు పిల్ల పురుగులను కూడ నాశనం చేసినట్లు అవుతుంది.
8. **తెల్లదోమ నివారణకు** అంతర్వాహిక కీటకనాశినులైన ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లేదా డైఫెన్‌థియురాన్ 1.25 గ్రా. ఏదేని ఒకదానిని ఒక లీటరు నీటికి కలిపి తెల్లదోమ ఉధృతిని బట్టి మందును మార్చి మార్చి వారం నుంచి 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి.
9. **తామర పురుగుల నివారణకు** ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 1.5 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా.లలో ఎదో ఒక మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి తామర పురుగుల ఉధృతిని బట్టి వారం నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో మందులను మార్చి మార్చి పిచికారి చేయాలి. పైరు పూత దశలో వున్నపుడు తామరపురుగుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసినట్లైతే తామర పురుగులతోపాటు మారుక మచ్చల పురుగునుకూడా నివారించుకోవచ్చు.
10. **పేనుబంక పురుగు నివారణకు** ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.4 మి.లీ. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పేనుబంక ఉధృతిని బట్టి వారం నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో మందులను మార్చి మార్చి పిచికారి చేయాలి.

మినుము పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,
లాం, గుంటూరు-522 034, సెల్ : 99896 25215

శనగ

మన రాష్ట్రంలో సాగుచేసే పప్పుధాన్యపు పంటల్లో శనగను రబీ సీజనులో సాగు చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనగ పంటను ఏటా 3.0 – 4.0 లక్షల హెక్టారుల విస్తీర్ణంలో సాగుచేస్తారు. శనగ ఉత్పాదకతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉండడానికి అధిక దిగుబడినిచ్చే శనగ రకాల సాగు మరియు పంట సాగులో చేపడుతున్న విప్లవాత్మకమైన యాంత్రీకరణ పద్ధతులు దోహదం చేసాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శనగ సాగుకు అనువైన రకాలు

క్ర. సం.	రకము	విడుదలైన సంవత్సరం	పంట కాలము (రోజులు)	దిగుబడి క్వి/ఎకరానికి	100 గింజల బరువు (గ్రా.)	ముఖ్య లక్షణాలు
ఎ.	**దేశవాళీ రకాలు**					
1.	జెజి 11	1999	90–95	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	22–24 గ్రా.	ప్యుజేరియం ఎండు తెగులును తట్టుకొనును.
2.	జె.ఎ.కె.ఐ. 9218	2007	95–105	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	23–24 గ్రా.	ప్యుజేరియం ఎండు తెగులును తట్టుకొనును.
3.	నంద్యాల శనగ–1 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 3)	2013	90–100	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి రెండు నీటి తడులతో)	25–26 గ్రా.	బెట్టను, ఎండ వేడిమిని, ఎండు తెగులును తట్టుకొనును. గింజలు లావుగా వుండి, ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
4.	ధీర (ఎన్.బి.ఇ.జి. 47)	2017	95–100	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	24–26 గ్రా.	యంత్రంతో కోయడానికి అనువైన రకము. చదరపు మీటరుకు 44 మొక్కలు ఉండేటట్లు విత్తుకోవాలి.
5.	నంద్యాల గ్రామ్ 49 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 49)	2017	90–105	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	24–26 గ్రా.	ఎండు తెగులును తట్టుకొనును. గింజలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
6.	నంద్యాల గ్రామ్ 452 (ఎన్.బి.ఇ.జి.452)	2020	90–105	7–9 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	22–24 గ్రా.	ఎండు తెగులును తట్టుకొనును. జె.జి. 11 కు మంచి ప్రత్యామ్నాయము.
7.	నంద్యాల గ్రామ్ 857 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 857)	2021	90–105	7–9 (వర్షాధారంగా) 12–14 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	23–24 గ్రా.	ఎండు తెగులును తట్టుకొనును. నీటి పారుదల క్రింద సాగుకు అత్యంత అనుకూలం.
8.	నంద్యాల గ్రామ్ 776 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 776)	2022	95–105	7–8 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	25 గ్రా.	యంత్రంతో కోయడానికి అనువైన రకం. ఎండు తెగులును తట్టుకొనును.
9.	నంద్యాల గ్రామ్1267 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 1267)	2024	90–105	9–10 (వర్షాధారంగా) 10–12 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	22–24 గ్రా.	యంత్రంతో కోయడానికి అనువైన రకం. ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

క్ర. సం.	రకము	విడుదలైన సంవత్సరం	పంట కాలము (రోజులు)	దిగుబడి క్వి/ఎకరానికి	100 గింజల బరువు (గ్రా.)	ముఖ్య లక్షణాలు
బి.	కాబూలీ రకాలు					
1.	కె.ఎ.కె. -2 (పి.కె.వి.కాబూలీ - 2)	1999	95-100	6-7 (వర్షాధారంగా) 10 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	40 గ్రా.	ఎండు తెగులును తట్టుకొనును.
2.	విహార్ (పూలేజి 95311)	2002	100-110	6-7 (వర్షాధారంగా) 10 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	35 గ్రా.	ఎండు తెగులును తట్టుకొనును.
3.	ఎమ్.ఎన్.కె. -1	2011	100-110	4-5 (వర్షాధారంగా) 6-7 (ఒకటి, రెండు నీటి తడులతో)	50-55 గ్రా.	అధిక లావు గింజ కాబూలీ రకము.
4.	నంద్యాల గ్రామ్119 (ఎన్.బి.ఇ.జి. 119)	2016	90-100	6-8 (వర్షాధారంగా) 10 (ఒకటి, రెండు నీటి తడుల క్రింద)	40 గ్రా.	లావు గింజ కాబూలీ రకము.

విత్తే సమయం : శనగ రబీ సీజనులో పండిస్తారు. దీనిని ఖరీఫ్ పంట తరువాత లేదా ఖరీఫ్‌లో ఏ పంట విత్తని పొలాల్లోనూ సాగుచేస్తారు. విత్తడానికి అక్టోబరు 15 నుండి నవంబరు మొదటి పక్షం వరకు మిక్కిలి అనుకూలమని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి. ఆలస్యంగా విత్తినప్పుడు పంట చివరి దశలో బెట్టకు గురి అయ్యి మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల గింజ సరిగా గట్టిపడక దిగుబడి తగ్గవచ్చును.

ఖరీఫ్‌లో కొర్ర పంటను సాగుచేసుకొని, రబీలో శనగ సాగును చేయటంవల్ల రైతులు అధిక నికర ఆదాయం పొందవచ్చునని పరిశోధనలో తేలింది. శనగ పంటకు ముందుగా సాగు చేయడానికి 65-70 రోజుల కాలపరిమితి గల స్వల్పకాలిక కొర్ర రకాలు (ఎస్.ఐ.ఏ. 3222, సూర్యనంది) సాగు చేయడం మంచిది.

నేలలు : శనగను బంక నేలల నుంచి నల్లరేగడి వరకు దేనిలోనైనా సాగుచేయవచ్చు. ఉదజని సూచిక 6-8 వరకు ఉండే ఒండ్రు నేలలు చాలా అనుకూలం. చౌడు నేలలు మరియు నీరు నిల్వ ఉండే నేలలు పనికిరావు.

రైజోబియం కల్చరు పట్టించే విధానం : శనగను మొదటిసారి పొలంలో సాగుచేసినప్పుడు రైజోబియం కల్చరును విత్తనానికి పట్టించాలి. 200 గ్రాముల రైజోబియం మిశ్రమాన్ని 300 మి.లీ. 10% బెల్లం ద్రావణంతో కలిపి విత్తనముతో (200 గ్రా. రైజోబియం మిశ్రమం 8 కిలోల విత్తనాలకు సరిపోతుంది) బాగా కలిపి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవాలి. మొదట శిలీంద్రనాశినితో శుద్ధిచేసి, ఆరబెట్టిన తర్వాత రైజోబియంను విత్తనాలకు పట్టించాలి.

విత్తే విధానం : సాధారణంగా శనగను వర్షాధారం క్రింద సాగు చేస్తారు. విత్తటానికి సరిపడా తేమ లేనప్పుడు ఒక తడి ఇచ్చి విత్తనం వేసుకోవచ్చు. విత్తేటప్పుడు విత్తనాన్ని 5-8 సెం.మీ. లోతున తడి మట్టి తగిలేలా విత్తుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ. వరుసలో మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. దూరం ఉండేట్లు విత్తుకోవాలి. ఒక చదరపు మీటరుకు 33 మొక్కలు వుండునట్లు చూసుకోవాలి. నీటి వసతి వున్నప్పుడు మరియు లావు గింజల

కాబూలీ రకాలను ఎంచుకున్నప్పుడు వరుసల మధ్య 45–60 సెం.మీ దూరం పాటించవచ్చు.

విత్తన మోతాదు : శనగ రకాలలో విత్తన బరువును బట్టి ఎకరాకు వేసుకోవాల్సిన విత్తన మోతాదు మారుతుంది.

క్ర. సంఖ్య	విత్తన బరువు (100 గింజల బరువు)	రకాలు	విత్తన మోతాదు (ఎకరాకు)
1	మధ్యస్థ లావు గింజ రకాలు (20-30 గ్రా.)	జె.జి.11, జె.ఎ.కె.ఐ.9218, నంద్యాల శనగ-1 నంద్యాల గ్రామ్ 49, నంద్యాల గ్రామ్ 452, నంద్యాల గ్రామ్ 776, నంద్యాల గ్రామ్ 857, నంద్యాల గ్రామ్ 1267	30-35 కిలోలు
2	లావు గింజ రకాలు (35-40 గ్రా.)	కె.ఎ.కె.2, విహార్, ధీర, ఎన్.బి.ఇ.జి. 119	45-50 కిలోలు
3	అధిక లావు గింజ రకాలు (50 గ్రా. అంతకంటే ఎక్కువ)	ఎమ్.ఎన్.కె. - 1	60-70 కిలోలు

విత్తనశుద్ధి : విత్తనాన్ని విత్తుకునే ముందు ప్రతి కిలో విత్తనానికి కార్బండెజిమ్ 2.5 గ్రా. లేదా విటావాక్స్ పవర్ (కార్బాక్సిన్ 37.5% + థైరమ్ 37.5% డి.ఎస్.) 1.5 గ్రా. లేదా టెబ్యుకొనజోల్ 1.5 గ్రా. మరియు ట్రైకోడెర్మా విరిడి పొడి 10 గ్రా. తో విత్తనశుద్ధి చేయటం వలన విత్తనం ద్వారా మరియు నేల ద్వారా వ్యాపించే తెగుళ్ళను అరికట్టవచ్చు. మొదట శిలీంధ్రనాశిని తరువాత ట్రైకోడెర్మాను వాడి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

ఎరువుల యాజమాన్యం : నేల స్వభావాన్ని బట్టి నేలలో లభించే పోషకాల మోతాదును బట్టి ఎరువులను వాడాలి. సాధారణంగా హెక్టారు శనగ సాగుకు 20 కిలోల నత్రజని, 50 కిలోల భాస్వరంనిచ్చే ఎరువులను వేయాలి. నేలలో భాస్వర నిల్వలు సరిపడా ఉన్నప్పుడు భాస్వరం ఎరువులు వేయనక్కర్లేదు. అన్ని ఎరువులను ఆఖరి దుక్కిలో వేయాలి. ఎకరాకు 18 కిలోల యూరియా మరియు 125 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ లేదా 50 కిలోల డి.ఎ.పి.ని వేసినచో పంటకు కావలసిన నత్రజని, భాస్వరం అందుతాయి. భాస్వరం ఎరువును సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో వేసిన, పంటకు కావలసిన గంధకము కూడా అందుతుంది. ఎకరాకు 20 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ వాడాలి. నేలలో గంధకము 8 పి.పి.ఎమ్. కంటే తక్కువ ఉన్న నేలల్లో 8 –10 కిలోల నీటిలో కరిగే గంధకమును విత్తునప్పుడు వాడాలి లేదా గంధకమును సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో అందించాలి.

కలుపు యాజమాన్యం : విత్తిన 24 గంటలలోపు పెండిమిథాలిన్ 1–1.2 లీ. చొప్పున పిచికారి చేస్తే కలుపును పంట తొలి దశలో సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. పైరు విత్తిన 30 రోజుల వరకు పొలంలో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి. గొర్రుతో అంతరకృషి చేసి, అవసరమైతే కూలీలతో కలుపు తీయించాలి.

నీటి యాజమాన్యం : శనగ వర్షాధారపు పంట అయినప్పటికీ, అవసరమైతే పంట కొమ్మలు వేసే దశలో (విత్తిన 30-35 రోజుల తరువాత) గింజ గట్టిపడేదశలో (విత్తిన 55-60 రోజుల) నీటి తడి ఇచ్చినపుడు 15-20% అధిక దిగుబడులు నమోదు అయ్యాయి. స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా కూడా శనగకు నీటి తడులు ఇవ్వవచ్చును.

సస్యరక్షణ

తెగుళ్ళు

ఎండు తెగులు : ఈ తెగులు ఆశించిన మొక్కలు ఒక్కసారిగా కాడలతోపాటు ముడుచుకుపోయి చనిపోతాయి. వేరు మరియు కాండాన్ని చీల్చి చూసినపుడు గోధుమ లేదా నలుపు రంగులో చార కనిపిస్తుంది. ఈ తెగులు కలుగజేయు శిలీంధ్రము విత్తనము మరియు మట్టి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. శనగపంట లేకున్నా పొలంలో 6 సంవత్సరములు బ్రతికి ఉండగలదు.

యాజమాన్యం

- ఎండు తెగులును తట్టుకొనే రకాలను సాగుచేయడం. (నంద్యాల పరిశోధనా స్థానం నుండి విడుదల చేయబడిన రకాలు)
- వేసవిలో లోతుగా దుక్కి దున్నుట వలన మరియు ముందు పంట అవశేషాలు తీసివేయడం వలన తెగులు తీవ్రత తగ్గించవచ్చు.
- జొన్న లేదా ధాన్యపు పంటలతో పంటమార్పిడి చేయడం.
- విత్తనశుద్ధి చేసి పంట విత్తుకోవడం.

మొదలు కుళ్ళు తెగులు : కాండం మొదలులో ఒక నొక్కు ఏర్పడి మొక్క చనిపోతుంది. తెగులు సోకిన తొలిదశలో తెల్లని శిలీంధ్ర బీజాలు ఆవగింజల మాదిరి కాండం మీద కనిపిస్తాయి. నేలలో ఎక్కువ తేమ ఉండడం, అంతగా కుళ్ళని సేంద్రియ పదార్థం ఉండడం మరియు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఈ తెగులు ఉధృతికి తోడ్పడుతాయి.

యాజమాన్యం

- విత్తనశుద్ధి చేసిన విత్తనం వాడడం
- జొన్న మరియు ఇతర ధాన్యపు పంటలతో పంటమార్పిడి చేయడం.
- కుళ్ళని చెత్తను విత్తుటకు ముందు తీసివేసి పొలాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం.
- విత్తిన 10-15 రోజుల తరువాత పొలంలో మొదలుకుళ్ళు గమనించినప్పుడు, ఎకరానికి కార్బండెజిమ్ 200 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 600 గ్రా. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని మొక్కల మొదలు భాగము తడిచేటట్టు పిచికారి చేయాలి.

వేరుకుళ్ళు తెగులు : బెట్ట పరిస్థితులలో మరియు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. పూత మరియు కాయ దశల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. వేర్లు నల్లగా మారి పూర్తిగా కుళ్ళిపోతాయి. తల్లివేరు తేలికగా ఊడిపోతుంది.

యాజమాన్యం

- పంట మార్పిడి అవలంబించడం.
- శిలీంధ్రనాశినులతో విత్తనశుద్ధి చెయ్యడం.
- సకాలంలో విత్తుకోవడం వల్ల పంట చివరిదశలో బెట్టకు మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురికాకుండా చూసుకోవడం వల్ల తెగులు తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు.

ట్రైకోడెర్మా వినియోగం :

- శనగలో నేల ద్వారా ఆశించే తెగుళ్ళను అరికట్టుటకు ఎకరానికి 2 కిలోల ట్రైకోడెర్మా పొడిని, 4 కిలోల వేప చెక్కతో కలిపి 90-100 కిలోలు బాగా చివికిన / మాగిన పశువుల ఎరువులో 10-15 రోజులు వృద్ధి చేసుకొని విత్తుటకు ముందు తప్పనిసరిగా పొలంలో కలియదున్నాలి.

ఆకుమాడు తెగులు : ఈ తెగులు పంటకాలములో ఎప్పుడైనా ఆశించవచ్చు. ఈ తెగులు ఆశించిన పొలంలో అక్కడక్కడా పూర్తిగా ఎండిపోయిన మొక్కలు మరియు పాక్షికంగా ఎండిపోయిన కొమ్మలు కనిపించును. కొమ్మల పై గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కొన భాగం నుండి క్రింది వరకు ఎండిపోవును. ఆకులు మరియు కాయలపై ముధురు గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కొన భాగం నుండి క్రింది వరకు ఎండిపోవును. ఈ తెగులు విత్తనము మరియు నేల ద్వారా వ్యాప్తి చెందును. ఆకాల వర్షాలు కురిసినపుడు ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది.

యాజమాన్యం

- ఒక ఎకరానికి హెక్సాకొనజోల్ 400 మి.లీ. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 200 మి.లీ. లేదా క్లోరోథలోనిల్ 400 గ్రా. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయడం ద్వారా వ్యాధిని సమర్ధవంతంగా నివారించవచ్చును.
- పొలంలో అధిక మొక్కల సాంద్రత ఉండకుండా చూసుకోవాలి. సిఫారసు చేసిన విత్తన మోతాదు మాత్రమే వాడాలి.

తుప్పు తెగులు : శనగ పైరు పక్వానికి వచ్చే దశలో ఆకులపై గుండ్రని, చిన్న గోధుమరంగు పొక్కులు ఏర్పడతాయి. ఈ పొక్కులు ఆకుల అడుగు భాగంలో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. కొమ్మలపై పొక్కులు అరుదుగా ఏర్పడతాయి. తెగులు తీవ్రమైనపుడు మొక్కలు పక్వానికి రాకముందే ఎండిపోతాయి. చల్లని, తడి వాతావరణం ఈ తెగులు వ్యాప్తికి దోహదపడుతుంది.

యాజమాన్యం

- ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంట మార్పిడి చేయాలి. ఒక ఎకరానికి హెక్సాకొనజోల్ 400 మి.లీ. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 200 మి.లీ లేదా ట్రైఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ + టెబ్యుకొనజోల్ 160 గ్రా. లేదా ఆజాక్సీస్ట్రోబిన్ 200 మి.లీ. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి.

బూజు తెగులు : శనగ పైరు పూతదశలో ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది. మొక్కలు గుంపులు గుంపులుగా చనిపోతాయి. గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు కాండము, కొమ్మలు, ఆకులు, పూలు కాయలపై ముదురు

గోధుమరంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలపై బూజు పెరుగుదల గమనించవచ్చు. విత్తనాల ద్వారా ఈ తెగులు వ్యాప్తి చెందుతుంది. పూత, పిందె దశలో ఉష్ణోగ్రత 20^0–25^0 సెంటీగ్రేడ్ మరియు గాలిలో తేమ అధికంగా ఉంటే ఈ తెగులు ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది.

యాజమాన్యం

- సిఫారసు చేసిన విత్తనమోతాదు మరియు తగిన మొక్కల సాంద్రత పాటించాలి. నిటారుగా ఉండే మరియు పొడవైన రకాలను విత్తుటకు ఉపయోగించాలి.
- మాంకోజెబ్ 600 గ్రా. లేదా కార్బండెజిమ్ 200 గ్రా. ఒక ఎకరానికి 200 లీటర్ల కలుపుకొని పిచికారి చేయడం ద్వారా వ్యాధి ఆశించకుండా నివారించవచ్చును.

పురుగులు

శనగ పచ్చపురుగు

శనగ పండించే అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా నష్టం కలిగిస్తుంది.

యాజమాన్యం : పురుగును తట్టుకొనే రకాలు అందుబాటులో లేవు. పురుగుమందుల వాడకంతో బాగా అరికట్టగలిగినా సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను అనుసరించడం వలన, పర్యావరణానికి హాని కలుగకుండా, సహజమిత్ర పురుగులను పరిరక్షించి, పురుగు మందుల నిరోధకశక్తి పెరగకుండా కాపాడవచ్చు. పురుగు సంతతిపై నిఘా ఉంచడానికి పొలంలో ఒక మీటరు ఎత్తులో లింగాకర్షక బుట్టలు ఎకరానికి నాలుగు చొప్పున ఏర్పాటుచేసుకొని, పురుగు ఉధృతి బట్టి ఈ క్రింది నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

నివారణ చర్యలు

- పంటను సరియైన కాలంలో విత్తుకోవాలి.
- వేసవిలో లోతుగా దుక్కులు దున్నుకున్నట్లైతే భూమిలో కోశస్థ దశలు బయటపడి పక్షులు ఏరుకుని తింటాయి.
- శనగలో అంతర పంటగా ఆవాలు మరియు ధనియాలను 8 : 2 సాగు చేసుకోవడం వలన పరాన్నభుక్కులు పెరగడానికి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడి పురుగు సహజసిద్ధ నివారణలో తోడ్పడును.
- పొలం చుట్టూ నాలుగు వరుసలు జొన్న పంటను రక్షణ పంటగా వేసుకోవాలి.
- ఎకరాకు 4–6 పక్షి స్థావరాలను ఏర్పాటుచేయడం వలన పురుగులను తినడానికి పక్షులను ఆకర్షించవచ్చును.
- పొలంలో అక్కడక్కడ బంతి మొక్కలను వేసుకున్నట్లయితే శనగపచ్చ పురుగుకు ఎరపంటగా పనిచేస్తాయి.
- పంటలో వరుస పది మొక్కలలో ఒక పురుగు చొప్పున గమనించినప్పుడు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- జీవనియంత్రణలో భాగంగా ఉపయోగించే బేసిల్లస్ తురింజియన్సిస్ బాక్టీరియా, న్యూక్లియార్ పాలీహైడ్రోసిన్ (NPV) మరియు కీటకములకు రోగము కలుగజేయు శిలీంధ్రము (మెటారైజియమ్ అనిసోప్లియె) మొదలైనవి మార్కెట్‌లలో రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- యన్.పి.వి. ద్రావణాన్ని (ఎకరాకు 200 లార్వాలకు సమానమైన ద్రావణం) లేదా 5% వేపగింజల కషాయము మొలకెత్తిన 15 రోజుల తరువాత పిచికారి చేసుకొనిన పురుగు ఉధృతిని బాగా నియంత్రించవచ్చు.

- బి.టి. ఫార్ములేషన్ ఎకరాకు 400 గ్రా. చొప్పున పిచికారి చేసిన పురుగు నియంత్రణకు బాగా దోహద పడుతుంది.
- పై పద్ధతుల ద్వారా పురుగు ఉధృతి తగ్గకపోతే ఒక ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో క్రిమిసంహార మందులైన రైనాక్సిపైర్ 60 మి.లీ. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 40 మి.లీ. లేదా ఇండాక్సాకార్బ్ 200 మి.లీ. లేదా స్పైనోసాడ్ 70 మి.లీ. లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 80 గ్రా. చొప్పున కలిపి 10 నుండి 15 రోజుల వ్యవధిలో పూత, పిందె దశల్లో మందులు మార్చి మార్చి పిచికారి చేయాలి.

పచ్చ రబ్బరు పురుగు

- పచ్చ రబ్బరు పురుగు నివారణకు ముందస్తు చర్యగా పంట వేసిన 15 రోజులకు వేపగింజల కషాయం 5% లేదా ఒక లీటరు వేప నూనెను 200 లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి.
- పురుగు ఉధృతి ఎక్కువైతే ఎకరాకు ఇండాక్సాకార్బ్ 200 మి.లీ. లేదా రైనాక్సిపైర్ 60 మి.లీ. లేదా ఫ్లూబెండియమైడ్ 40 మి.లీ. లేదా నొవల్యురాన్ 200 మి.లీ. పిచికారి చేయాలి.

కోత మరియు నూర్పిడి : ఆకులు పచ్చబారడం, రాలడం, కాయలు పసుపుగా మారి మొక్కలు ఎండిపోయి, గింజ గట్టిగా మారినపుడు కోతకు సిద్ధమవ్వాలి, పంట కొసిన తరువాత గింజలు తగినంతగా ఎండు వరకు ఆరబెట్టాలి. నూర్పిడి యంత్రాలలో కాని, చేతితో గాని నూర్చుకోవచ్చు.

గింజ నిల్వ చేయడం : దుమ్ము, ధూళి, తాలు గింజల విత్తనాలను తొలగించి నిల్వచేయాలి. నిల్వ చేయడానికి ముందు విత్తనాలలో తేమ 9-10 శాతం మించకుండా చూడాలి. నిల్వ చేసే ముందు నిల్వచేసే సాధనాలను (గోనె సంచులు) శుభ్రపరచుకోవాలి. బ్రూచిడ్ పుచ్చు పురుగు ఆశించకుండా గోనె సంచులను 10 శాతం వేప ద్రావణం పిచికారి చేసి వాడుకోవాలి లేదా 5% వేప కషాయంలో ముంచి ఆరబెట్టిన గోనెసంచులను వాడాలి లేదా సంచులపై డెల్టామెత్రిన్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసి తరువాత ఆరబెట్టి నిల్వ ఉంచుకోవాలి. బస్తాలు నిల్వచేసే గది గోడలపైన, క్రింద మలాథియాన్ ద్రావణం 10 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. నిండిన బస్తాలను చెక్క బల్లలపై వరుసలలో పేర్చి తేమ తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. గోదాములలో కాని, మనుషుల సంచారానికి దూరంగా ఉన్న రూములో నిలువ వుంచినట్లైతే అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ (సెల్ఫాన్) టాబ్లెట్లను టన్ను విత్తనానికి 3 గ్రా. (ఒక టాబ్లెట్) చొప్పున 5 రోజుల పాటు ఊదర పెట్టి తర్వాత గాలి తగలనివ్వాలి.

శనగ పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

అఖిల భారత రబీ అపరాల (శనగ) సమన్వయ పరిశోధన పథకము,

ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నంద్యాల.

సెల్ : 98660 21755, 82474 44303, 81432 14443

సోయాచిక్కుడు

సోయాచిక్కుడు నల్లరేగడి భూములలో సాగు చేయడానికి వీలైన శక్తివంతమైన లెగ్యూమ్ జాతి పంట. ఈ పైరు అధిక దిగుబడి సామర్థ్యము కలిగి ఎక్కువ మాంసకృత్తులు (43 శాతం) మరియు నూనె (20 శాతం) కలిగి ఉంటుంది. మన రాష్ట్రంలో సోయాచిక్కుడు నంద్యాల, గుంటూరు, కడప, పల్నాడు, కర్నూలు మరియు అనంతపురం జిల్లాల్లో సుమారుగా 23 వేల ఎకరాలలో సాగు చేయబడుతూ ఉంది. మన రాష్ట్రంలో ఈ పైరును రబీలో కూడా సాగు చేసే అవకాశముంది. అమెరికా మరియు బ్రెజిల్ దేశాలలో దీనిని జీవ ఇంధన నూనె తయారీకి కూడా వాడుతున్నారు. సోయా నూనెలో ఎక్కువ శాతం అసంతృప్త క్రొవ్వు ఆమ్లాలే ఉండుట వలన మనం వాడే నూనెలన్నింటికన్నా ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. సోయాలో లభించే మాంసకృత్తులు జంతు సంబంధమైన మాంసకృత్తులతో సమానమైన పోషక విలువ కలవి. ఇనుము, కెరోటీన్, ఫోలిక్ ఆమ్లము అధిక శాతంలో ఉండటం వలన స్త్రీలలో అధికంగా కనిపించే రక్తహీనతను నివారించడానికి సోయాబీన్ వాడకం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. నూనె తీసిన సోయా పిండిలో 55-60 శాతం మాంసకృత్తులుంటాయి. దీనికి విదేశాల్లో మంచి గిరాకి ఉంది. దీన్ని గోధుమ, శనగ పిండితో కలిపి వాటి నాణ్యతను పెంచవచ్చు. సోయానూనె ఆరోగ్యానికి మంచిది. సోయాగింజలు వివిధ ఉత్పత్తుల (పాల సంబంధింత ఉత్పత్తులు, మందులు, రంగులు, ఆయిల్స్ మొ॥) తయారీలో ఉపయోగపడతాయి.

రకాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
జె.యస్.335	1994	90-95	8-10	కాయపై నూగు ఉండదు. గింజ మొలకశక్తి ఎక్కువ. కాయలు చిట్లటం తక్కువ. మొవ్వు కుళ్ళు తెగులును కొంత వరకు తట్టుకొంటుంది.
ఎల్.యస్.బి.1	2001	65	6	స్వల్పకాలిక పొట్టి రకం. కాపు గుబురుగా, వత్తుగా కాస్తుంది. ప్రత్తి, కంది పైర్లలో అంతర పంటగా అనువైనది.
ఎల్.యస్.బి.3	2008	110-115	8-10	కాయలపై రాగి రంగు నూగు ఉండును, కాయలు చిట్లుట తక్కువ. బ్యాక్టీరియా పొక్కు మరియు మొవ్వు కుళ్ళు తెగుళ్ళను తట్టుకొనును.
ఎల్.ఎస్.బి.18 (భీమ్)	2012	105-110	10-12	కాండము మరియు కాయలపై బూడిద రంగు నూగు కలిగి ఉండును. ఆకుమచ్చ తెగులు, తలమాడు తెగులు మరియు మొజాయిక్ తెగులును తట్టు కుంటుంది. విత్తనము లేత పసుపు రంగు కలిగి గుండ్రముగా మధ్యస్థ సైజులో ఉంటుంది.
ఎ.ఎస్.బి.22 (బాసర)	2018	105-110	10-11	కాండము మరియు కాయలపై గోధుమ రంగు నూగు కలిగి ఉండును. కోత ఆలస్యమైన కాయలు చిట్లుట ఉండదు. గింజలు లేత పసుపు వర్ణములో గుండ్రముగా ఉంటాయి.

విత్తనం : ఎకరాకు 25–30 కిలోలు (విత్తన మోతాదు గింజ పరిమాణం మరియు మొలకశాతంపై ఆధారపడుతుంది).

విత్తే సమయం : ఖరీఫ్–జూన్ 15 నుండి జులై 15 వరకు (కోస్తా జిల్లాల్లో ఆగష్టు–సెప్టెంబర్ వరకు), రబీ–అక్టోబర్, వేసవి–ఫిబ్రవరి.

విత్తనశుద్ధి : ముందుగా కిలో విత్తనానికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ మందుతోను, తరువాత 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 30 గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. 8–10 కిలోల విత్తనానికి 200 గ్రా. రైజోబియం జపానికం కల్చరును కలిపి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవాలి.

విత్తేదూరం : నల్లరేగడి భూముల్లో 45×5 సెం.మీ. తేలిక భూముల్లో 30×7.5 సెం.మీ, ఒక చ.మీ.కు 40 మొక్కల చొప్పున ఎకరాకు లక్షా అరవైవేల మొక్కలు ఉండాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 12 కిలోల నత్రజని, 24 కి. భాస్వరం మరియు 16 కి. పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను చివరి దుక్కిలో వేయాలి. భాస్వరం ఎరువును సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫెట్ రూపంలో వేస్తే గంధకం కూడా లభ్యమవుతుంది.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% 1.4 లీ. చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజున గాని పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20, 25 రోజులప్పుడు గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి లేదా విత్తిన 25 రోజులప్పుడు క్విజాలాపాప్ ఇథైల్ 5% 400 మి.లీ. చొప్పున పిచికారి చేసి గడ్డి జాతి మొక్కలను, ఇమజిథాపిర్ 10% 250 మి.లీ. చొప్పున పిచికారి చేసి వెడల్పాకు మరియు గడ్డిజాతి కలుపునూ నిర్మూలించుకోవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యము : సోయాచిక్కుడు వర్షాధారపు పంట. నీటి సౌలభ్యత ఉన్నచోట విత్తిన 15–20 రోజులకు ఒకసారి, కాయ దశలో మరోసారి నీటి తడులను ఇచ్చి అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు.

అంతర పంటలు మరియు పంటల సరళి : సోయాచిక్కుడును కంది (1:7), ప్రత్తి, జొన్న, మొక్కజొన్న (1:1) మరియు పండ్ల తోటలలో అంతర పంటగా సాగు చేయవచ్చు. ఖరీఫ్ సోయా తరువాత రబీలో శనగ, ధనియాలు, ఆవాలు మరియు మినుము వంటి పంటలను సాగు చేసి వాణిజ్య పంటల కంటే అధిక నికర ఆదాయం పొందవచ్చు.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

చిత్తపురుగులు, రసంపీల్చు పురుగులు : ఆకుల్లోని రసం పీల్చడం వలన ఆకులు పసుపు మరియు గోధుమ రంగులోకి మారి దిగుబడులు తగ్గుతాయి. తామర పురుగుల ద్వారా మొవ్వుకుళ్ళు, తెల్లదోమ ద్వారా మొజాయిక్ తెగులు వ్యాపిస్తుంది. వీటి నివారణకు పురుగు మందుతో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పైరుపై ఆశించినపుడు ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుముడత పురుగు : ఈ పురుగు ఆకుల అంచులను కలిపి పత్రహరితాన్ని గీకి నష్టపరుస్తుంది. ఈ పురుగు ఉధృతి బెట్ట పరిస్థితులలో ఎక్కువవుతుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ 2.0 మి.లీ. ను కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కాండం తొలిచే ఈగ : ఈ పురుగులు లేత కాండంపై చిన్న గుంటలు చేసి గుడ్లను పెడతాయి. గుడ్ల నుండి వెలువడిన లార్వాలు కాండంలోనికి చేరి తినడం వలన మొక్కలు వడలి సమూలంగా నాశనమవుతాయి. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందు 5 మి.లీ. ఒక కిలో విత్తనానికి కలిపి శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఈ పురుగును నివారించవచ్చు. పైరుపై ఆశించినప్పుడు ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుగూడు పురుగు : ఈ పురుగు ఆకులను కలిపి గూడులా కట్టుకొని దానిలో ఉండి ఆకులలోని పత్రహరితాన్ని గీకి తింటాయి. నివారణకు ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పెంకు పురుగు : ఈ పురుగు కాండము మీద అర్ధచంద్రాకారములో రంధ్రము చేసి లోపలికి పోయి ప్రధాన కాండమును, ప్రక్క కొమ్మల లోపలి పదార్థమును తినుట వలన కొమ్మల చివరి భాగము ఎండిపోవును. నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పొగాకు లద్దె పురుగు : ఈ పురుగులు ఆకులలోని పచ్చని పదార్థాన్ని గీకి తినడం వలన ఆకులు జల్లెడగా మారతాయి. ఆకులకు రంధ్రాలు చేసి, ఆకులను పూర్తిగాను, పువ్వులను, కాయలను కూడా తింటుంది. నివారణకు పురుగు మొదటి రెండు దశలలో క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.0 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. పురుగు తర్వాత దశల నివారణకై సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను ఆచరించాలి.

తెగుళ్ళు

మొవ్వుకుళ్ళు తెగులు : తామర పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వైరస్ తెగులు. తెగులు సోకిన లేత మొక్కల ఆకులు గిడసబారిపోతాయి. మొక్క మొవ్వు నుండి ఎండిపోతుంది. చేలో మొక్కల సాంద్రత సరిగా చూసుకోవాలి. తామర పురుగుల నివారణకై విత్తనశుద్ధి తప్పనిసరిగా చేయాలి. పైరుపై ఆశించినప్పుడు డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.4 మి.లీ. లేదా థయామిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుమచ్చ తెగులు : ఆకులపై గోధుమరంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. నివారణకు లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా 2 గ్రా. క్లోరోథలోనిల్ లేదా 2.0 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా 1.0 మి.లీ. ప్రొపికొనజోల్ కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో అవసరాన్ని బట్టి 2 సార్లు మందులు మార్చి పిచికారి చేయాలి.

బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు : ఆకులపై పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడి ముదురు గోధుమ రంగులోకి మారతాయి. నివారణకు 10 లీటర్ల నీటికి 1.5 గ్రా. పొషామైసిన్ + 30 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడు కలిపి 2–3 దఫాలుగా 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి. యల్.యస్.బి 1, యమ్.ఎ.సి.యస్ 58, పి.కె 472 రకాలు ఈ తెగులును తట్టుకొంటాయి.

పల్లాకు తెగులు : తెల్లదోమ ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వైరస్ తెగులు. తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులు, కాయల మీద పసుపుపచ్చ పొడ ఏర్పడి మొక్క పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. నివారణకు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. ఎసిఫేట్ లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. కలిపి 2–3 సార్లు పిచికారి చేయాలి. మినుములో పల్లాకు తెగులు నివారణకు వివరించిన సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించవలెను.

తుప్పు తెగులు లేదా కుంకుమ తెగులు : ఆకులపై గోధుమరంగు తుప్పు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తెగులు తీవ్ర దశలో ఆకులపై తుప్పు రంగు పొడి ఏర్పడుతుంది. నివారణకు లీటరు నీటికి 2.0 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా 1.0 మి.లీ. ప్రోపికొనజోల్ కలిపి వారం వ్యవధిలో అవసరాన్ని బట్టి 2–3 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

సోయాచిక్కుడు పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం,

గుంటూరు – 522 034, గుంటూరు జిల్లా.

సెల్ : 99896 25215

❖❖❖

ఉలవలు

మన రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్‌లో మొదటి పంట తరువాత, వర్షాధారంగా లేదా ఏ పంటలు వేయడానికి అనువుగా లేనప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ పంటగా ఉలవలు సాగు చేయవచ్చు. ఖరీఫ్‌లో వేరుశనగ, నువ్వులు, గోగు, మెట్టవరి తరువాత ఏక పంటగాను, రాగి, జొన్న పంటల్లో సహ పంటగాను వేయవచ్చు.

పంటకాలం : సెప్టెంబర్ – అక్టోబర్

నేలలు : చల్కా, ఎర్ర, నల్లరేగడి నేలలు అనుకూలం. మురుగు నీరు నిలువ ఉండే నేలలు పనికి రావు.

రకాలు

రకం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి/ఎ)	లక్షణాలు
పి.డి.యం 1	105	6-6.5	గింజలు బూడిద తెలుపు రంగులో ఉంటాయి.
వి.జడ్.యం 1	90-95	6-6.5	గింజలు నలుపు రంగులో ఉంటాయి.
పి.హెచ్.జి 62	85	6-6.5	గింజలు నలుపు రంగులో ఉంటాయి.
పి.హెచ్.జి. 9	90-100	6	గింజలు బూడిద తెలుపు రంగులో ఉంటాయి. పల్లాకు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
క్రీడ 1-18 ఆర్	85-90	5-6.5	గింజలు గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. పల్లాకు తెగులు మరియు బూడిద తెగులును తట్టుకొంటుంది.
క్రీడ హర్ష (సి.ఆర్.హెచ్.జి. 19)	85-95	6-7.7	గింజలు గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. బూడిద తెగులు మరియు ఆంత్రాక్నోస్‌ను తట్టుకొంటుంది.
క్రీడ వర్ధన్ (సి.ఆర్.హెచ్.జి. 22)	85-90	6-7.5	గింజలు నలుపు రంగులో ఉంటాయి. గింజ రాలదు. ఆంత్రాక్నోస్, బూడిద తెగులు మరియు పల్లాకు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
అనంత ఉలవ (ఎ.టి.పి.హెచ్.జి. - 11)	110-120	6-6.5	గింజలు బూడిద గోధుమ రంగులో మధ్యస్థముగా తట్టుకొనును. వేరుకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ మందు చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

నేలతయారి : ఖరీఫ్‌లో మొదటి పంట కోసిన తరువాత తగినంత తేమ చూసుకొని, భూమిని నాగలితో ఒకసారి, గొర్రుతో రెండుసార్లు మెత్తగా దున్ని తయారు చేసుకోవాలి.

విత్తనం, విత్తేదూరం : గొర్రుతో వరుసలలో విత్తే పద్ధతిలో ఎకరాకు 8–10 కిలోలు, వెదజల్లే పద్ధతిలో 12–15 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ. దూరం పాటించాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 4 కిలోల నత్రజని, 10 కిలోల భాస్వరం, 8 కిలోల పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను ఆఖరి దుక్కిలో విత్తేముందు వేసుకోవాలి.

అంతరకృషి : విత్తిన 25–30 రోజుల మధ్య నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు, గొర్రు వేసి కలుపు నివారణ చేసుకోవాలి.

సస్యరక్షణ: కాయతొలుచు పురుగు : పూత మరియు పిందె ఏర్పడే సమయంలో, పంటకు నష్టం కలుగజేస్తుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

బూడిద తెగులు : వాతావరణంలో అధిక తేమ ఉండి, రాత్రి, పగటి ఉష్ణోగ్రతలలో ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బెండజిమ్ చొప్పున కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. తెగులు ఉధృతంగా ఉన్న ఎడల 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండోసారి కూడ పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఉలవల సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం,

గుంటూరు – 522 034, గుంటూరు జిల్లా.

సెల్ : 99896 25215

రాజ్మా

రాజ్మా బీన్స్‌ను కిడ్నీ బీన్ మరియు ఫ్రెంచ్ బీన్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. పప్పు ధాన్యాల పంటల్లో రాజ్మా ఒక ముఖ్యమైన పంట. రాజ్మా చిక్కుళ్ళు 23% మాంసకృత్తులు, అధిక పోషక విలువలు విటమిన్ ఎ, బి 5, బి 6, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఈ, విటమిన్ కె, ఫోలిక్ యాసిడ్, థయామిన్, రైబోఫ్లావిన్, నియాసిన్, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, జింకు, రాగి, సెలీనీయమ్ వంటి మూలకాలు, పీచు పదార్థాలు, ఫోలేట్ మరియు మాల్బిడినమ్ వంటి పోషకాలు కలిగి ఆరోగ్యకరమైన శరీర పెరుగుదలకు చాలా ఉపయోగపడుతాయి. పప్పుదినుసులు మరియు బఠాణితో పోలిస్తే రాజ్మాలో అధిక దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలదు. ఈ పంటను ఎక్కువగా మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో సుమారుగా 80-85 వేల హెక్టార్లలో సాగు చేయబడుతుంది. చల్లని వాతావరణం గల ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంతాల్లో రాజ్మా పంటను ఖరీఫ్‌లో సాగు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సమతుల ప్రాంతాలలో రబీలో తగు యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా సాగు చేయవచ్చు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం ఏజన్సీతో పాటు తెలంగాణ, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడా రాజ్మా చికుళ్ళను సాగు చేస్తున్నారు.

ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంతాలకు అనువైన రకాలు :

సం.	రకాలు	కాల పరిమితి	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	లక్షణాలు
1.	అరుణ్ (ఐ.పి.ఆర్.98-3-1)	120 రోజులు	4-5	విత్తనం ఎరుపు రంగుతో, మధ్యస్థ గింజ పరిమాణం కలిగి పల్లాకు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
2.	ఉదయ్ (పి.డి.ఆర్. -14)	115 రోజులు	4-5	ఎరుపు, తెలుపు మచ్చలు కలిగి మధ్యస్థ గింజ పరిమాణంతో అధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది.
3.	ఉత్కర్ష్ (ఐ.పి.ఆర్. 98-5)	125 రోజులు	5-6	ఎరుపు రంగు విత్తనం, మధ్యస్థ గింజ పరిమాణంతో అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం.
4.	అంబర్ (ఐ.పి.ఆర్. 96-6)	134 రోజులు	3-4	ఎరుపు, తెలుపు మచ్చలు కలిగి, పల్లాకు తెగులును తట్టుకుని, అధిక దిగుబడినిచ్చు రకం.
5.	జ్వాల	125 రోజులు	5-6	ఎరుపు, తెలుపు మచ్చలు కలిగి మధ్యస్థ గింజ పరిమాణంతో, అధిక దిగుబడినిస్తుంది.
6.	చింతపల్లి వైట్	90 రోజులు	2.5-3.5	తెలుపు, ఎరుపు మచ్చలు కలిగి, మధ్యస్థ గింజ పరిమాణం కలిగిన దేశీయ రకం.
7.	చింతపల్లి రెడ్	90 రోజులు	3-4	ఎరుపు రంగు కలిగి, స్వల్ప గింజ పరిమాణం. దేశీయ రకం.

నేలలు : తేమతో కూడిన తేలికపాటి ఇసుక నుండి బంకమట్టి నేలలు వరకు అనుకూలం. లవణ సాంద్రత తటస్థంగా ఉండాలి. చౌడు లేని, ఏటవాలు కలిగి, నీరు నిల్వ ఉండని నేలలు అనుకూలమైనవి.

విత్తు సమయం : ఖరీఫ్‌లో జులై చివరి పక్షం నుండి ఆగష్టు మొదటి పక్షం వరకు, రబీలో అక్టోబర్ రెండవ పక్షం.

విత్తన మోతాదు మరియు విత్తే దూరం : వెదజల్లే పద్ధతిలో ఎకరాకు 25 కిలోలు, వరుసలలో విత్తుటకు 15 నుండి 20 కిలోల విత్తనము అవసరము.

ఖరీఫ్ : 45–50 సెం.మీ. × 8–10 సెం.మీ.

రబీ : 40 సెం.మీ. × 10 సెం.మీ. (నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉన్న భూముల్లో)

– 30 సెం.మీ. × 10 సెం.మీ. (వర్షాధారం)

పంట విధానం :

- కొండ వాలు మరియు పోడు భూముల్లో 1:2 నిష్పత్తిలో మొక్కజొన్నలో అంతర పంటలు పండిస్తారు.
- మొక్కజొన్నలో వరుసల మధ్య దూరం 90 సెం.మీ. ఉండే విధంగా నాటాలి. రెండు వరుసల మొక్కజొన్న మధ్య రెండు వరుసలు రాజ్మా ఉండేలా నాటుకోవాలి. (వరుసల మధ్య దూరం 30 సెం.మీ.) ఈవిధంగా నాటినట్లు అయితే ఒక హెక్టారుకు 1,20,000 రాజ్మా మరియు 40,000 మొక్కజొన్న మొక్కలను సర్దుబాటు చేయవచ్చు మరియు రాజ్మాలో వచ్చు బి.సి.యం.వి. వ్యాధిని నియంత్రణలో ఉంచవచ్చు.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 2 గ్రా. కార్బండెజిమ్ వంటి తెగుళ్ళ మందులతో మరియు 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 30 గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. 20 కిలోల విత్తనానికి 2 కిలోల రైజోబియం కలిపి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవాలి.

ఎరువుల యాజమాన్యం : ఇతర రబీ పప్పు ధాన్యాల మాదిరిగా కాకుండా, మన దేశ నేలల్లో తగినంత రైజోబియం జాతి అందుబాటులో లేనందున రాజ్మాలో నత్రజని స్థిరీకరణ అనేది సమర్థవంతంగా లేదు. అందువలన దీనికి నత్రజని ఎరువులు అధిక మోతాదులో వినియోగించాలి. ఎకరాకు 32:24:16 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాషియం నిచ్చే ఎరువులను వేసుకోవాలి. నత్రజనిని సగం విత్తేటప్పుడు మరియు మిగిలిన సగం పై పాటుగా వేసుకోవాలి. తృణధాన్యాల వలె భాస్వరం ఎరువుకు అధికంగా స్పందిస్తుంది.

నీటి యాజమాన్యం : విత్తిన 25 రోజుల తర్వాత పూత దశలో, కాయ పక్వ దశలో నీటితడులు అవసరం.

కలుపు యాజమాన్యం : విత్తిన 30–35 రోజుల తర్వాత చేతితో కలుపు తీయడం / కోయడం లేదా విత్తిన 24 – 48 గంటల లోపు 500–600 లీటర్ల నీటిలో 1.3 లీటర్ల పెండిమిథాలిన్‌ను నేలపై పిచికారి చేసినట్లయితే కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు.

సస్యరక్షణ :

తెగుళ్ళు :

ఆంత్రాక్నోస్ : మొలకెత్తిన బీజాదళాలపై లేత గోధుమ రంగు ఒత్తబడిన మచ్చలు, ఆకులపై గాఢ గోధుమ రంగు

మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చలు ఆకుల అడుగు భాగంలోని ఈనెలలో పరిమితమై ఉంటాయి. కాండంపై పొడవైన ఒత్తబడిన మచ్చలు ఏర్పడతాయి.

నివారణ చర్యలు : మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. లేదా కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా. లను 2-3 సార్లు, విత్తిన 45, 60, 75 రోజులకు పైపాటుగా పిచికారి చేయాలి. కోత కోసిన అనంతరం పంట అవశేషాలను తొలగించాలి. 2 నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు పంట మార్పిడి విధానాన్ని పాటించాలి. అధిక నీటి నిల్వను తగ్గించాలి.

కాండం ముడత :

లక్షణాలు : తెగులు ఆశించిన 4-10 రోజులకు ఆకులపై చిన్న చిన్న నీటి మచ్చలు గమనించవచ్చు. తెగులు ఉధృతి పెరిగే కొలది మచ్చ యొక్క మధ్య భాగం ఎండి, గోధుమ రంగులోనికి మారుతుంది. మచ్చల చుట్టూ పసుపు రంగు వలయం ఏర్పడుతుంది.

నివారణ చర్యలు : సమయానికి, మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యం గల నేలల్లో విత్తుకోవాలి. అధిక మొక్కల సాంద్రతను నిరోధించాలి. కార్బండెజిమ్‌ను లీటరు నీటికి 2 గ్రా. కలిపి పైపాటుగా పిచికారి చేయాలి.

కోణీయ ఆకుమచ్చ :

లక్షణాలు : మచ్చ యొక్క అడుగు భాగంలో బూడిద రంగు బూజు ఏర్పడును. తెగులు సోకిన కాయలపై గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తెగులు సోకిన ఆకులపై మచ్చలు ఒకదానికొకటి కలిసిపోయి పసుపు రంగులోనికి మారి, కణజాల క్షయం ఏర్పడుతుంది.

నివారణ చర్యలు : కిలో విత్తనానికి 2-3 గ్రా. కార్బండెజిమ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ 15 రోజుల వ్యవధిలో 3 సార్లు పైపాటుగా పిచికారి చేయాలి. కోత అనంతరం పంట అవశేషాలను నేలలో కలియదున్నాలి. 2-3 సంవత్సరాలు అపరాల పంట కాకుండా వేరొక కుటుంబానికి చెందిన పంటతో పంట మార్పిడి చేయాలి.

ఎండు తెగులు (విల్ట్) : ఈ తెగులు ఆశించిన మొక్కలు వడలి ఎండిపోతాయి. పంటకు అధిక నష్టం కలుగుతుంది. ఈ తెగులు భూమిలో ఉన్న శిలీంధ్రము ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బండెజిమ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

పల్లాకు తెగులు : ఈ తెగులును కలుగచేయు వైరస్ కలుపు మొక్కలు మరియు తెగులు సోకిన ఇతర పంట మొక్కల నుండి తెల్ల దోమ ద్వారా వ్యాప్తి చెంది అధిక నష్టం కలుగజేస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కలలో ఆకులపై పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తొలి దశలోనే ఈ తెగులు ఆశించిన యెడల పైరు అంతా పసుపు రంగుకి మారిపోయి పూత మరియు పిందె ఏర్పడక అత్యధిక నష్టం కలుగుతుంది. తెల్లదోమను నివారించాలి మరియు వైరస్ తెగుళ్ళ సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను ఆవలంభించాలి.

పురుగులు :

ఆకు తొలుచు పురుగు :

గాయపరుచు విధానం : క్రమంగా ఆకులనేవి పసుపు రంగులోనికి మారి రాలిపోతాయి. ఆశించిన మొలకలు గిడసబారి, చనిపోతాయి. శాఖీయ దశలో దీనిని గమనించవచ్చు.

నివారణ చర్యలు : 15 రోజుల వ్యవధిలో 1 లీటరు నీటిలో 1 మి.లీ. (మెటాసిస్టాక్స్) ఆక్సీడెమాటాన్ మిథైల్‌ని కలిపి పిచికారి చేయాలి. పురుగు ఆశించిన మొక్కలను ఏరివేయాలి, అలానే ఆశించిన ఆకులను కూడా చేతితో ఏరివేసి నాశనం చేయాలి. వేప గింజల కషాయం (ఎన్.ఎస్.కె.ఇ. 5%) మరియు వేప నూనె (10000 పి.పి.యం.) 1 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసినట్లైతే పురుగును బాగా అదుపులో ఉంచుతుంది.

కాండపు ఈగ :

గాయపరుచు విధానం : ఇది ఆశించినచో కాండము ఉబ్బి, పగిలిపోయి వేళ్ళు అభివృద్ధి ఆగిపోవును. ఆశించిన మొక్కల నుండి పిల్ల వేర్లు ఏర్పడతాయి. లేత మొక్కలు మరియు ఆకులు వత్తిడికి గురై చనిపోతాయి.

నివారణ చర్యలు : కిలో విత్తనానికి 8 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. ఫోరేట్ 10 జి. గుళికలు 4 కిలోల చొప్పున ఎకరాకు నేలలో వేయాలి. మల్చింగ్ చెయ్యడం వలన తేమ శాతాన్ని కాపాడుకోవటమే కాకుండా (తల్లి వేర్లు) అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది మరియు పిల్ల పురుగుల ఉధృతి నుండి తట్టుకుంటుంది. ఈ పంటకు దగ్గరలో అలసంద, సోయాబీన్ మరియు ఇతర లెగ్యూమ్ జాతి పంటలను పండించరాదు. ఎందుకనగా ఈ పంటలు, ఈ పురుగుకు నివాసాలుగా మారవచ్చు. వేప గింజల కషాయం (ఎన్.ఎస్.కె.ఇ. 5%) మరియు వేప నూనె (10000 పి.పి.యం.) 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నల్ల పేనుబంక :

గాయపరుచు విధానం : పేనుబంక మొక్కల నుండి రసాన్ని పీలుస్తుంది. అధికంగా గాయపడిన మొక్క యొక్క ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి. మొక్కలు గిడసబారిపోతాయి. కాయలు ఏర్పడవు, లేత మొక్కలు ఎండిపోతాయి, ఉధృతి అధికంగా ఉన్నచో మొక్కలు చనిపోతాయి.

నివారణ చర్యలు : జీవ నియంత్రణ పద్ధతిలో 400 చదరపు మీటర్లకు 1000 కాక్సినెల్లా సెప్టంపంక్టేటా (అక్షింతల పురుగు) పెద్ద పురుగులను విడుదల చేయాలి. 2–3 సంవత్సరాల వరకు లెగ్యూమ్ జాతి పంటలతో పంట మార్పిడి చేయరాదు. అంతర్వాహిక కీటక నాశిని అయిన డైమిథోయేట్, ఆక్సీడెమటాన్ మిథైల్ లీటరు నీటిలో 1 మి.లీ. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. వేపగింజల కషాయం (ఎన్.ఎస్.కె.ఇ. 5%) మరియు వేప నూనె (10000 పి.పి.యం.) 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

రాజ్మా సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అపరాలు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం,

గుంటూరు – 522 034, సెల్ : 99896 25215

వేరుశనగ

విత్తే సమయం

ప్రాంతం	ముందస్తు ఖరీఫ్/వేసవి	ఖరీఫ్	రబీ
ఉత్తరకోస్తా	మార్చి – ఏప్రిల్	జూన్ – జూలై	నవంబరు నుండి డిసెంబరు 15 వరకు
రాయలసీమ (దక్షిణ మరియు అత్యల్ప వర్షపాత మండలాలు)	మార్చి – ఏప్రిల్	జూలై–ఆగష్టు మొదటి వారం వరకు (జూలై మొదటి పక్షం అనుకూలం)	నవంబరు నుండి డిసెంబరు 15 వరకు (డిసెంబరు మొదటి పక్షం అనుకూలం)

నేలలు : ఇసుకతో కూడిన ఎర్ర గరప నేలలు శ్రేష్ఠం. చల్కా మరియు ఎర్ర గరపనేలలు కూడా అనుకూలం. సేంద్రియ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండి ఉదజని సూచిక 6.0 – 7.5 మధ్య గల నేలలు శ్రేష్ఠం.

రకాలు

సీజను/పరిస్థితి (1)	అనువైన రకాలు (2)	పంట కాలం (రోజుల్లో) (3)
రబీ (నవంబరు–డిసెంబరులో విత్తుటకు)	కదిరి 6, ధరణి, ధీరజ్, విశిష్ఠ, నిత్యహరిత, హిమని, ఐ.సి.ఎ.ఆర్. కోణార్క్	105–110
	కదిరి 9, భీమ	110–115
	కదిరి అమరావతి, కదిరి చిత్రావతి	115–120
	కదిరి 7, బోల్డ్, కదిరి లేపాక్షి	130–135
రబీ వరి మాగాణులలో సాగు (జనవరిలో విత్తుటకు)	కదిరి 6, ధరణి, ధీరజ్, విశిష్ఠ	105–110
తట్టుకునే గుణం ఆధారంగా కాళహస్తి మెలడి (చిట్టి కాయ తెగులు) ఉన్న ప్రాంతాలలో	కదిరి 9	110–115
	కదిరి లేపాక్షి	130–135
	విశిష్ఠ	105–110
ఆకుమచ్చ మరియు తుప్పు తెగుళ్ళను తట్టుకొను రకాలు	కదిరి 9	110–115
	కదిరి లేపాక్షి	130–135

సీజను/పరిస్థితి (1)	అనువైన రకాలు (2)	పంట కాలం (రోజుల్లో) (3)
ముందస్తు ఖరీఫ్ నీటి సదుపాయం ఉన్న చోట	కదిరి 6, ధరణి, ధీరజ్, విశిష్ఠ, నిత్యహరిత, కోణార్క్	105-110
	కదిరి 9, భీమ	110-115
	కదిరి అమరావతి, కదిరి చిత్రావతి	115-120
	కదిరి 7 బోల్డ్	120-125
	కదిరి లేపాక్షి	130-135
వర్షాభావ పరిస్థితిని తట్టుకునే గుణం ఆధారంగా ఖరీఫ్‌లో అత్యల్ప వర్షపాతం ఉన్న చోట	కదిరి 9	110-115
	ధరణి, నిత్యహరిత, విశిష్ఠ, ఐ.సి.ఎ.ఆర్ కోణార్క్	105-110
ఖరీఫ్-సాధారణ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలలో / బెట్టలో 2-3 తడులు ఇవ్వగల అవకాశం ఉన్న చోట	కదిరి 6, ధరణి, ధీరజ్, విశిష్ఠ, నిత్యహరిత, ఐ.సి.ఎ.ఆర్ కోణార్క్	105-110
	కదిరి 9, భీమ	110-115
	కదిరి అమరావతి, కదిరి చిత్రావతి	115-120
ఖరీఫ్ వర్షాలు ఆలస్యమైనప్పుడు	కదిరి 9	110-115
	ధరణి, నిత్యహరిత, విశిష్ఠ, కోణార్క్	105-110

నేల తయారీ : వేసవిలో లోతు దుక్కులు చేయడం వలన పంటను నష్టపరిచే కీటకాలు, తెగుళ్ళ ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు. విత్తే ముందు నేలను మెత్తగా దుక్కిచేసి చదును చేయాలి.

విత్తన మోతాదు : గింజ పరిమాణము, విత్తే అదను, రకాన్ని బట్టి విత్తనమోతాదు నిర్ణయించబడుతుంది.

రకం	గింజల రూపంలో (కిలోలు/ఎకరాకు)	
	ఖరీఫ్	రబీ
కదిరి 6, ధరణి, విశిష్ఠ	52-56	72-76
లావు మరియు చిన్న గుత్తి రకాలు	64-68	80-88
కదిరి 7 బోల్డ్, కదిరి చిత్రావతి, కదిరి అమరావతి	40-42	40-42
కదిరి లేపాక్షి	30-35	30-35

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 50% + కార్బండెజిమ్ 25% లేదా 3 గ్రాముల మాంకోజెబ్ మరియు 8 గ్రా. ట్రైకోడెర్మా విరిడి పొడి మందును పట్టించాలి. కాండం కుళ్ళు వైరస్ తెగులు (పిఎస్ఎన్డి) మరియు వేరు పురుగు ఆశించే ప్రాంతాలలో కిలో విత్తనానికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్. 2 మి.లీ. చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవచ్చు. వరి మాగాణుల్లో లేక కొత్తగా వేరుశనగ సాగు చేసేటప్పుడు విత్తనానికి రైజోబియం కల్చరుని పట్టించాలి. మొదలు కుళ్ళు, వేరుకుళ్ళు, కాండము కుళ్ళు తెగుళ్ళు ఎక్కువగా ఆశించే ప్రాంతాలలో కిలో విత్తనానికి 10 గ్రాముల ట్రైకోడెర్మా విరిడిని పట్టించాలి. విత్తనాన్ని మొదట క్రిమిసంహారక మందుతో శుద్ధి చేసి, నీడలో ఆరబెట్టిన తరువాత శిలీంధ్రనాశనితో శుద్ధి చేయాలి. అవసరమైతే రైజోబియం కల్చరును కూడ విత్తనాలకు పట్టించవచ్చు.

నిద్రావస్థను తొలగించటం : నిద్రావస్థగల రకాల (కదిరి-7 బోల్డ్, కదిరి అమరావతి, కదిరి చిత్రావతి, కదిరి లేపాక్షి) విత్తనాన్ని 5 మి.లీ. ఇథరిల్ (100%) ను 10 లీటర్ల నీటిలో కలిపిన ద్రావణంలో 12 గంటలు నానబెట్టి తర్వాత నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవాలి లేదా మార్కెట్లో దొరికే ఎథోఫాన్ (39%), 125 మి.లీ. ఐదు లీటర్ల నీటిలో కలిపి 100 కిలోల విత్తనంపై పిచికారి చేసి గాలి చొరబడిని సంచులలో ఒక రాత్రి (8-12 గం॥) వుంచి, మరుసటి రోజు ఉదయమే నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకోవాలి. (అనగా 25 మి.లీ. ఎథోఫాన్ ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి 20 కిలోల విత్తనంపై పిచికారి చేసుకోవాలి).

విత్తే దూరం :

రకం	సీజను	
	ఖరీఫ్	రబీ
కదిరి 6, ధరణి, ధీరజ్, నిత్యహరిత, విశిష్ఠ	30 × 10 సెం.మీ.	22.5 × 10 సెం.మీ.
కదిరి అమరావతి, కదిరి లేపాక్షి, కదిరి 7 బోల్డ్, కదిరి చిత్రావతి	30 × 15 సెం.మీ.	30 × 15 సెం.మీ.

విత్తటం : విత్తనాన్ని గొర్రుతో గాని లేదా నాగలి చాళ్ళలో గాని లేదా ట్రాక్టరుతో నడిచే విత్తు యంత్రముతో గాని విత్తాలి. విత్తే సమయంలో నేలలో తగినంత తేమ ఉండాలి. విత్తనాన్ని 5 సెం.మీ. లోతు మించకుండా విత్తుకోవాలి. ట్రాక్టరు డ్రిల్ను వాడినట్లైతే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణములో విత్తుకోవడమేకాక, ఖర్చును కూడా గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చును.

రకాల గుణగణాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	గుణగణాలు	గింజ శాతం	నూనె శాతం	దిగుబడి (కిలోలు/ఎకరాకు)
1	2	3	4	5	6
నారాయణి	2002	చిన్న గుత్తి రకం. రబీకి కూడా అనువైనది. మొక్కలో అన్ని కాయలు ఒకేసారి పక్వానికి వస్తాయి. గింజలు లేత ఎరువు రంగులో ఉంటాయి.	76.0	49.0	ఖరీఫ్: 800-1000 రబీ : 1400-1800
కదిరి-6	2002	చిన్న గుత్తిరకం. పంట కాలం 100 రోజులు, గింజ పరిమాణం జె.ఎల్.-24 కంటే 5% పెద్దదిగా ఉంటుంది.	72.0	48.0	ఖరీఫ్: 800-880 రబీ : 1600-1700
ప్రసూన	2006	చిన్న గుత్తిరకం. 105-110 రోజులలో కోతకు వస్తుంది. కాళహస్తి (చిట్టికాయ) తెగులును తట్టుకుంటుంది.	76.0	50.0	రబీ : 1600-1800
గ్రీష్మ	2009	చిన్న గుత్తిరకం. 100 రోజుల స్వల్పకాలిక రకం. నీటి వినియోగ సామర్థ్యము ఎక్కువ (తక్కువ నీటి వినియోగంతో అధిక దిగుబడినిచ్చే రకం).	76.0	52.0	ఖరీఫ్: 800-1000 రబీ : 1600-1800
కదిరి-7 బోల్డు	2009	పెద్ద గుత్తిరకం. ఆకుమచ్చ, తామర పురుగులను తట్టుకొంటుంది. లావు గింజల రకం. వంద గింజల బరువు 65-70 గ్రా. నీటి వసతి ఉన్న సారవంతమైన ప్రాంతాలకు అనువైన రకం. 40 రోజుల వరకు నిద్రావస్థ కలదు. పంట కాలం-ఖరీఫ్‌లో 120-125 రోజులు, రబీలో 130-135 రోజులు	70.0	49.0	1800-2000
కదిరి-9	2009	చిన్న గుత్తిరకం. వర్షాభావ పరిస్థితులను, బెట్టను బాగా తట్టుకొంటుంది. ఆకుమచ్చ, వేరు కుళ్ళు తెగుళ్ళను, రసం పీల్చే పచ్చదోమ, తామర పురుగులు, నులి పురుగు, ఎర్రనల్లిని తట్టుకుంటుంది. నిద్రావస్థ 30 రోజులు. పంట కాలం -ఖరీఫ్‌లో 105-110 రోజులు, రబీలో 115-120 రోజులు	80.0	52.0	ఖరీఫ్: 800-1000 రబీ : 1400-1600
భీమ	2010	చిన్న గుత్తి రకం. లావు గింజల రకం. పంట కాలం :110-115 రోజులు. నీటి వసతి గల ప్రాంతాలకు అనువైన రకం. వంద గింజల బరువు 65-70 గ్రా.	72.0	45.0	1400-2000
ధరణి	2012	చిన్న గుత్తి రకం. బెట్టను తట్టుకుంటుంది. 100-105 రోజుల పంట కాలం. మొక్కలు మధ్యస్థముగా ఉంటాయి. మొవ్వు, కాండము కుళ్ళు వైరస్ తెగుళ్ళను, కాండము, వేరు కుళ్ళు తెగుళ్ళను కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది.	76.0	49.0	ఖరీఫ్: 600-1000 రబీ : 1500-1700
కదిరి అమరావతి	2016	మేలైన చిన్న గుత్తి రకం. ఆకుమచ్చ తెగులును, రసం పీల్చే పురుగులను, బెట్టను, మొవ్వుకుళ్ళును, కాండం కుళ్ళు వైరస్ తెగులును సమర్థవంతంగా తట్టుకునే రకము. పంట కాలం: ఖరీఫ్‌లో 115-120 రోజులు	70.0	50.0	ఖరీఫ్: 800-1000 రబీ : 1400-1500

రకాల గుణగణాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	గుణగణాలు	గింజ శాతం	నూనె శాతం	దిగుబడి (కిలోలు/ఎకరాకు)
కదిరిచిత్రావతి	2017	చిన్న గుత్తి రకం, ఆకుమచ్చను, మొవ్వుకుళ్ళు మరియు కాండం కుళ్ళు వైరస్, వేరు కుళ్ళు తెగుళ్ళను, రసం పీల్చు పచ్చ దోమ,తామర పురుగులను తట్టుకుంటుంది. టి.ఎ.జి. 24 కంటే 40% అధిక కాయ దిగుబడి, 53% అధిక గింజ దిగుబడి. గింజలు గులాబీ రంగు లో ఉంటాయి.	70.0	49.0	రబీ : 1200-2070
నిత్యహరిత	2018	110 రోజులు. వంద గింజల బరువు 50 గ్రా. అధిక శాతం 3 గింజల కాయలు. కొద్ది వరకు రసం పీల్చు పురుగులను తట్టుకుంటుంది. పరిపక్వ నిద్రావస్థ 20 రోజులు, పొట్టి రకం.	76.0	50.0	ఖరీఫ్: 1000-1080
ధీరజ్	2018	తక్కువ నీటి వినియోగంతో అధిక దిగుబడినిస్తుంది. నీటి సదుపాయంతో ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో సాగుకు అనుకూలం. కాయలు, గింజలు పెద్దవి. 105-110 రోజులు పంట కాలం. అధిక వేడిని, అధిక చలిని కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది. నూరు గింజల బరువు రకం.	73-80	49	ఖరీఫ్ : 800-1000
ప్రగతి	2018	పొట్టి రకం. అధిక నీటి వినియోగ సామర్థ్యం ఉన్న రకం. కాయలు నున్నగ, గింజలు గులాబీ రంగులో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. పంట కాలం 105 రోజులు.	70	48	ఖరీఫ్: 1200
కదిరి లేపాక్షి	2020	ఆకుమచ్చను, వైరస్ తెగులను, రసం పీల్చే పురుగుతైన తామర పురుగులను తట్టుకుంటుంది. పంట కాలం 115 రోజులు. అధిక దిగుబడిని, అధిక నూనెను, మాంసకృత్తులను కలిగినది. తీవ్ర బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకొని ఎకరానికి 6-8 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది.	70	51.0	ఖరీఫ్: 1400
విశిష్ఠ	2022	ఆకుమచ్చను తట్టుకునే 110 రోజుల పంట కాలము కలిగిన రకము	72-75	50.0	ఖరీఫ్ : 1200 రబీ : 1600
హిమని	2023	100-105 రోజుల పంట కాలముతో, అధిక నీటి వినియోగ సామర్థ్యం కలిగిన రకం.	70-75	48.5	ఖరీఫ్: 1200 రబీ : 1600
కోణార్క్	2023	105-110 రోజుల పంట కాలముతో, ఆకుమచ్చను తట్టుకునే, అధిక నీటి సామర్థ్యం కలిగిన రకం.	70-75	49.0	ఖరీఫ్: 1200

ఎరువులు (ఎకరానికి కిలోల్లో)

భూసార పరీక్షలననుసరించి ఎరువుల మోతాదును నిర్ణయించుకోవాలి. సాధారణంగా వేరుశనగకు ఈ క్రింది మోతాదు ఎరువులు అవసరం.

పోషకం/ఎరువు	వర్షాధారపు పంటకు (కి./ఎ.)	నీటి పారుదల పంటకు (కి./ఎ.)
నత్రజని (యూరియా రూపంలో)	8 (18)	12 (27)
భాస్వరం (సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో)	16 (100)	16 (100)
పొటాష్ (మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో)	20 (33)	20 (33)
జిప్సం	200	200
జింక్ సల్ఫేట్ (లోపమున్న నేలలకు ప్రతి మూడు పంటలకు ఒకసారి)	20	20

కదిరి 7 బోల్డ్, కదిరి అమరావతి, కదిరి చిత్రావతి, కదిరి లేపాక్షి రకాలకు పై ఎరువుల మోతాదును నీటి పారుదల క్రింద రెట్టింపు వేసి అత్యధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చు.

దుక్కిలో ఎకరానికి 4-5 టన్నుల సేంద్రీయ ఎరువు వేయాలి. మొత్తం భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులను ఆఖరు దుక్కిలో వేసుకోవాలి. వర్షాధారపు పంటకు ఎకరానికి 18 కిలోల యూరియాను విత్తే సమయంలోనే వేయాలి. నీటిపారుదల పంటకు, అలాగే రబీలో 18 కిలోల యూరియాను విత్తనాలను విత్తే సమయంలో, 9 కిలోల యూరియాను 30 రోజుల తర్వాత అంటే తొలి పూత దశలో వేసుకోవాలి.

జిప్సంను గరిష్ఠ పూత దశలో (ఖరీఫ్‌లో విత్తిన 35-40 రోజులకు, రబీలో 40-45 రోజులకు) వేసుకోవాలి. రెండవ సారి కలుపు తీసే ముందు జిప్సంను వేసి త్రవ్వితే కాయలు అభివృద్ధి చెందే పొరల్లో (4-5 సెం.మీ. లోతులో) పడుతుంది.

సూక్ష్మ పోషక పదార్థ లోపాలు - సవరణ : జింకు లోపించిన ఆకులు చిన్నవిగా మారి గుబురుగా కనిపిస్తాయి. మొక్కలు గిడసబారతాయి. ఆకు ఈనెల మధ్య భాగం పసుపు రంగుగా మారవచ్చు. ఈ లోపాన్ని సవరించడానికి ఎకరానికి 400 గ్రా.ల చొప్పున జింక్‌సల్ఫేట్‌ను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి వారం వ్యవధితో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి. ఇనుముధాతు లోపం నల్లరేగటి నేలల్లో అధిక తేమ ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తుంది. లేత ఆకులు పసుపుపచ్చగాను తర్వాత తెలుపు రంగుకు మారుతాయి. ఈ లోపాన్ని సవరించడానికి ఎకరానికి 1 కిలో అన్నభేది మరియు 200 గ్రాముల సిట్రిక్ ఆమ్లాన్ని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి వారం వ్యవధితో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి. నీటి పారుదల క్రింద సాగుచేసే పంటకు ఎకరానికి 2 కిలోల బోరాక్స్‌ను విత్తేటప్పుడు వేయాలి. బోరాన్ గింజల అభివృద్ధికి అవసరం.

నీటి వసతి క్రింద వేసిన వేరుశనగ క్రొత్త రకాలకు సూక్ష్మధాతువులు మాక్స్ / గ్రోత్ /ఫార్ములా – 4 లలో ఏదో ఒక దానిని అర కిలో పొడిని 200 లీ. నీటిలో కరిగించి విత్తిన 40 మరియు 60 రోజులకు పిచికారి చేస్తే దిగుబడి మరియు కాయ నాణ్యత పెరుగుతుంది.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : వేరుశనగ విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజుల లోపు ఎకరానికి ఒక లీటరు పెండిమిథాలిన్ 30% ద్రావకం లేదా బ్యుటాక్లోర్ 50% ద్రావకం లేదా అలాక్లోర్ 50% ద్రావకంలో ఏదో ఒక దానిని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నేలపై పిచికారి చేయాలి.

కలుపు నివారణకు విత్తిన 24 గంటల లోపు పెండిమిథాలిన్ 30 శాతం ఇ.సి. + ఇమాజితాపైర్ 2 శాతం ఇ.సి. ద్రావణాన్ని 5 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

విత్తిన 20–25 రోజులపుడు గొర్రుతో అంతరకృషి చేసి మొక్కల మొదళ్ళకు మట్టిని ఎగదోస్తే కలుపు నిర్మూలనతో పాటు ఊడలు భూమిలోకి దిగి బాగా ఊరతాయి.

అంతరకృషి కుదరనపుడు, విత్తిన 20 రోజులలోపు గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ఎకరాకు 250 మి.లీ. ప్రోపిక్విజఫాప్ 10% ద్రావకం లేదా 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ 5% ద్రావకం లలో ఏదో ఒక దానిని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఈ కలుపు మందులు వెడల్పాటి ఆకు గల కలుపు మొక్కలను నివారించవు.

నీటి యాజమాన్యం : వేరుశనగకు 400–450 మి.మీ. నీరు అవసరమవుతుంది. తేలిక నేలల్లో 8–9 తడులు పెడితే సరిపోతుంది. విత్తేముందు నేల బాగా తడిచేటట్లు నీరు పెట్టి తగినంత చెమ్మ ఉన్నప్పుడు విత్తనం వేయాలి. రెండవ తడిని విత్తిన 20–25 రోజులకు (మొదటి పూతదశలో) ఇవ్వాలి. తర్వాత తడులు నేల లక్షణం, బంకమట్టి శాతాన్ని అనుసరించి 7–10 రోజుల వ్యవధితో పెట్టాలి. ఆఖరి తడి, పంటకోతకు 15 రోజుల ముందు ఇవ్వాలి. ఊడలు దిగే దశనుండి కాయలు ఊరే దశవరకు (విత్తిన 45–50 రోజుల నుండి 85–90 రోజుల వరకు) సున్నితమైనది, కనుక ఈ దశలో నీరు సక్రమంగా తగు మోతాదులో కట్టుకోవాలి. నీటిని తుంపర్లు (స్ప్రింకర్లు) ద్వారా ఇచ్చినట్లైతే 25 శాతం సాగు నీటి ఆదాతోపాటు దిగుబడి పెరుగుతుంది. డ్రిప్ పద్ధతిలో సాగు చేయునప్పుడు 90×90 సెం.మీ దూరంలో డ్రిప్పర్లు ఏర్పాటు చేసుకొని, కాయ ఏర్పడే దశ వరకు ప్రతి 3 రోజులకు ఒకసారి 10 మి.మీ నీరు ఇవ్వాలి. ఆ తరువాత ప్రతి రెండు రోజులకు ఒక తడి 10 మి.మీ చొప్పున ఇవ్వాలి. వర్షాధార పంటకు పైరు మొలచిన 15–20 రోజులలోపు ఎకరానికి 5 టన్నుల వేరుశనగ పొట్టును పొలంపై పరచాలి. బెట్ట పరిస్థితుల్లో పొడి సున్నం లీటరు నీటికి 50 గ్రా. చొప్పున కలిపి పైరుపై పిచికారి చేసి మొక్కల ద్వారా ఆవిరైపోయే నీటి నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు. బెట్టనుండి పైరు త్వరగా కోలుకోవడానికి లీటరు నీటికి 20 గ్రా. యూరియాని కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పంటల సరళి : కంది, ఆముదం, సజ్జ మరియు జొన్న పంటలను వేరుశనగలో పంటమార్పిడి చేయవచ్చు. వర్షాధార వేరుశనగ పంటలో ప్రతి 7 వేరుశనగ సాళ్ళకు ఒక కంది లేక ఒక ఆముదం సాలు వేసినచో నికరాదాయం అధికంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఆరుసాళ్ళ వేరుశనగకు రెండు సాళ్ళ సజ్జను అలాగే ప్రతి 5 సాళ్ళ వేరుశనగకు 3 నుంచి 4 సాళ్ళ కొర్ర లేదా సామలు వేసుకోవడం వలన అధిక ఆదాయం పొందవచ్చును. సజ్జ, జొన్న అంతర పంటగా వేసుకోవడం వలన వేరుశనగలో తామర పురుగుల ఉధృతి తగ్గి, వైరస్ వ్యాప్తి కొంతవరకు తగ్గును. ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఖరీఫ్ వేరుశనగ తర్వాత పెసలు లేదా అలసంద లేదా ఉలవలు లేదా గోరుచిక్కుడు వేసుకోవచ్చు. వేరుశనగను వరితో పంట మార్పిడి చేయడం వలన వేరుశనగకు నులిపురుగుల బెడద తగ్గించుకోవచ్చు.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

వేరుపురుగు : వేరు పురుగు యొక్క తల్లి పురుగులు (పెంకు పురుగులు) తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే భూమిలోనుంచి బయటకు వచ్చి చుట్టుప్రక్కల వున్న వేప / రేగు/నల్లతుమ్మ/ మునగ చెట్లపై జీవిస్తాయి. ఆడ పురుగులు భూమిలోపల గుడ్లు పెట్టి తెల్లటి ఎరుపురంగు తల కలిగిన పిల్ల పురుగులు బయటకి వెలువడతాయి. బాగా ఎదిగిన వేరుపురుగు "C" ఆకారంలో వుండి మొక్క వేర్లను కత్తిరిస్తుంది. తేలికపాటి ఇసుక నేలల్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. వేరుపురుగు ఆశించిన మొక్కలు ఎండిపోయి చనిపోతాయి. మొక్కలను పీకితే సులువుగా ఊడి వస్తాయి. సాళ్ళ వరుసలలో మొక్కలు గుంపులు గుంపులుగా చనిపోతాయి.

నివారణ : లోతు దుక్కి చేయడం వలన వేరుపురుగు కోశస్థదశలు బయటపడి పక్షులబారిన పడతాయి, లేదా ఎండ వేడిమికి చనిపోతాయి. కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి. గుళికలు ఎకరానికి 10 కిలోలు విత్తేటప్పుడు వేయాలి. ఒక కిలో విత్తనానికి 2 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్. లేదా 2 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. మందును 4 మి.లీ. నీటిలో కలిపి విత్తుకోవాలి.

రసం పీల్చే పురుగులు (తామర పురుగులు, పేనుబంక, ఆకుపచ్చ దోమ)

రసం పీల్చు పురుగులు వాతావరణంలో అధిక వేడి మరియు తేమ ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా జూన్ నుంచి ఆగస్టు నెల వరకు ఉధృతంగా ఉత్పత్తి చెంది వేరుశనగ పంటపై ఆశించును.

అ) తామర పురుగులు : వేరుశనగ మొలకెత్తిన 9వ రోజు నుంచి పిల్ల, పెద్ద పురుగులు ఆకులపై పచ్చదనాన్ని గోకి రసాన్ని పీలుస్తాయి. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే ఆకులు ముడుచుకొని, మొక్కలు గిడసబారి పోతాయి. ఆకుల అడుగు భాగాన గోధుమరంగు వర్ణములో మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ పురుగు వేరుశనగలో "మొవ్వు కుళ్ళు మరియు కాండము కుళ్ళు" వైరస్ తెగుళ్ళను వయ్యారిభామ వంటి కలుపు మొక్కల నుండి సంక్రమింపజేస్తుంది.

ఆ) పేను బంక (నల్లజీడ) : తల్లి మరియు పిల్ల పురుగులు మొక్కల కొమ్మల చిగుర్లపైన, లేత ఆకుల అడుగు భాగాన మరియు కొన్ని సందర్భాలలో పూతపై గుంపులుగా ఏర్పడి రసాన్ని పీలుస్తాయి. దీనివలన మొక్కలు

గిడసబారుతాయి. పూతదశలో ఆశించినపుడు పూత రాలిపోతుంది. ఈ పురుగులు తేనె వంటి జిగురు పదార్థం స్రవించడం వల్ల, మొక్కలపై నల్లని బూజు ఏర్పడుతుంది.

ఇ) ఆకుపచ్చ దోమ (దీపపు పురుగు) : పిల్ల మరియు తల్లి పురుగులు ఆకుల అడుగు భాగాన చేరి రసాన్ని పీల్చివేస్తాయి. మొదట ఆకు పైభాగాన మొదటగా "V" ఆకారంలో పసుపు పచ్చని మచ్చలు ఏర్పడి, క్రమేపి ఆకులన్ని పసుపు పచ్చగా మారుతాయి.

రసం పీల్చు పురుగుల నివారణకు ఎకరానికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్. 60 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–20 రోజులలోపు పిచికారి చేయాలి. ఆ తర్వాత 15 రోజుల వ్యవధిలో 50 మి.లీ. థయాక్లోప్రిడ్ 21.7 ఎస్.సి. 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. పేనుబంక, పచ్చదోమ నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 యస్.ఎల్. 60 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. వేరుశనగ పైరులో అక్షింతల పురుగులు మొక్క ఒక్కింటికి 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్రిమిసంహారక మందుల వాడకం తగ్గించాలి. కిలో విత్తనానికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 2 మి.లీ. + 4 మి.లీ. నీటికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయుట వలన మొక్కలకు రసం పీల్చే పురుగుల నుండి 20–25 రోజుల వరకు రక్షణ కల్పించవచ్చును.

3.ఆకు ముడత : ఆకు ముడత విత్తిన 15 రోజుల నుండి ఆశిస్తుంది. తల్లి పురుగులు బూడిద రంగులో ఉంటాయి. తొలిదశలో ఆకులపై గోధుమ రంగు మచ్చలు వుంటాయి. వాటిలోపల ఆకుపచ్చ రంగులో నల్లని తల కలిగిన పిల్లపురుగులు దాగి వుంటాయి. ఇవి 2, 3 ఆకులను కలిపి గూడు చేసి వాటిలో వుండి, పచ్చదనాన్ని తినివేయడం వలన ఆకులన్నీ ఎండి, దూరం నుండి చూస్తే ఆకులు కాలిపోయినట్లు కనబడతాయి.

దీనినే రైతులు అగ్గితెగులు అని కూడా అంటారు.దీని నివారణకు అంతర పంటలుగా జొన్న లేక సజ్జ 7 : 1 నిష్పత్తిలో వేయాలి. **సోయాచిక్కుడు తర్వాత వేరుశనగ వేయరాదు.** ఎకరానికి 4 లింగాకర్షణ (డెల్టా జిగట ఎర) బుట్టలు పెట్టి రెక్కల పురుగు ఉనికిని, ఉధృతిని గమనించాలి. పొలంలో పరాన్న జీవులు 50 శాతం పైగా ఉన్నపుడు క్రిమిసంహారక మందులు వాడవలసిన అవసరం లేదు. క్వినాల్‌ఫాస్ 400 మి.లీ. లేక క్లోరిపైరిఫాస్ 500 మి.లీ. లేక నొవాల్యురాన్ 200 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి.

4. ఎర్రగొంగళి పురుగు : జూలై మాసంలో పడే వర్షాలకు భూమిలోని కోశస్థ దశలోవున్న పురుగుల నుంచి, వర్షం పడిన రెండవ రోజున తల్లి రెక్కల పురుగులు బయటకి వస్తాయి. తల్లి పురుగులు తెలుపుతో కూడిన లేత గోధుమరంగులో ఉండి పై రెక్కల అంచున ఎర్రటి చార కలిగి, ఒక్కొక్కటి దాదాపు 1000 పైగా తెల్లని గుడ్లని గుంపులు, గుంపులుగా వేరుశనగ ఆకులపైన, వెడల్పు ఆకుల మొక్కలపైన, మట్టిగడ్డలపైన మరియు రాళ్ళపైన పెడతాయి. వీటినుండి వచ్చిన పిల్ల పురుగులు గట్లపై లేక పొలంలో ఉన్న గడ్డి మొక్కలను మరియు వేరుశనగ ఆకులనాశించి వాటిపైనున్న పచ్చదనాన్ని గోకి తింటాయి. బాగా ఎదిగిన గొంగళి పురుగులు ఆకులను తినివేసి రెమ్మలను, మొదళ్ళను మిగులుస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలలో పువ్వులను కూడా తింటాయి.

దీని నివారణకు ఏప్రిల్, మే నెలలో పడిన వర్షాలకు లోతు దుక్కి చేయడం వలన పురుగు కోశస్థ దశలు బయటపడి సూర్యరశ్మికి లేదా పక్షుల బారినపడి చనిపోతాయి. తొలకరి వర్షాలు పడిన 48 గంటల తర్వాత రాత్రిపూట 8–11 గంటల సమయంలో సామూహిక మంటలు వేసి లేదా కాంతి ఎరలు ఏర్పాటుచేసి ఎర్రగొంగళి రెక్కల పురుగులను ఆకర్షించి అరికట్టవచ్చు. గుడ్ల సముదాయాలను, పిల్లపురుగులను గమనించి ఏరివేయాలి. క్వినాల్‌ఫాస్ పొడిమందుని ఎకరానికి 10 కిలోల చొప్పున చల్లాలి. పొలం చుట్టూ లోతు గాడి తీసి మీటరు పొడవు గాడిలో క్వినాల్‌ఫాస్ పొడిమందు చల్లాలి. అలసంద, ఆముదం పైర్లను ఎరపంటలుగా వేయాలి. వెర్రి ఆముదం, జిల్లేడు కొమ్మలను పొలంలో అక్కడక్కడ ఎరగా వేసి, పురుగులు వాటిని ఆశించిన వెంటనే వాటినన్నిటిని సేకరించి తగులబెట్టాలి. తల్లి లేదా గుడ్డు లేదా నుసి పురుగు దశను గమనించగానే 5 శాతం వేపగింజల కషాయం పిచికారి చేయాలి. ఎదిగిన గొంగళి పురుగుల నివారణకు నొవల్యురాన్ 200 మి.లీ. లేదా ఇండాక్సాకార్బ్ 200 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. విషపు ఎరను (వరి తవుడు 10 కిలోలు + బెల్లం 1 కిలో + తగినంత నీరు + 1 లీటరు క్వినాల్‌ఫాస్) చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారుచేసి, ఎకరా పొలంలో సమానంగా చల్లితే పురుగును సమర్ధవంతంగా అరికట్టవచ్చు.

పొగాకులద్దె పురుగు : తల్లి పురుగులు లేత గోధుమ రంగులో ఉండి ఆకుపైన మరియు అడుగు భాగాన నూగుతో కప్పిన గుడ్లు పెడతాయి. పిల్లపురుగులు గుంపులుగా వుండి ఆకుపై పత్రహరితాన్ని గోకి తినివేసి, జల్లెడగా మారుస్తాయి. బాగా ఎదిగిన పురుగులు ఆకులను తినివేస్తాయి. పగటివేళ ఈ పురుగులు చెట్ల అడుగుభాగాన లేక మట్టి పెళ్ళలు లేక గులక రాళ్ళ క్రింద దాగి ఉండి రాత్రిపూట మొక్కలను ఆశించి ఆకులను పూర్తిగా తినివేస్తాయి.

దీని నివారణకు నేలను లోతుగా దుక్కి చేయాలి. యూరియాను ఎక్కువ మోతాదులో వాడరాదు. ఎకరాకు 4 లింగాకర్షణ బుట్టలు పెట్టి మగరెక్కల పురుగులను ఆకర్షించాలి. ఎకరా వేరుశనగ పొలంలో 30–40 ఆముదం, ప్రొద్దు తిరుగుడు మొక్కలు ఎర పంటలుగా ఉండేటట్లు చూడాలి. గుడ్ల సముదాయాన్ని, పిల్ల పురుగులను ఏరి వేయాలి. లింగాకర్షణ బుట్టలద్వారా తల్లి పురుగుల ఉధృతిని గమనించి గుడ్ల పరాన్న జీవిని 50,000 ఒక ఎకరానికి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 4 సార్లు పొలంలో వదలాలి. 100 పురుగుల ద్వారా వచ్చిన ఎన్.పి.వి. ద్రావణాన్ని ఒక ఎకరానికి సాయంకాలం పిచికారి చేయాలి. 5 శాతం వేపగింజల కషాయంను గుడ్లు మరియు పురుగులు చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేయాలి. క్వినాల్‌ఫాస్ 400 మి.లీ. లేక వేపనూనె 1000 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటికి చొప్పున కలుపుకొని ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. ఎకరానికి 10 పక్షిస్థావరాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఎదిగిన లార్వాలకు నొవాల్యూరాన్ 200 మి.లీ. లేదా క్లోరోఫినాఫైర్ 400 మి.లీ., రైనాక్సిఫైర్ 50 మి.లీ. లేక ఫ్లూబెండియమైడ్ 40 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి లేదా విషపు ఎర ఉండలను చిన్నవిగా తయారు చేసి (వరి తవుడు 5 కిలోలు + బెల్లం 1/2 కిలో + క్లోరిపైరిఫాస్ 500 మి.లీ.) ఎకరా పొలంలో సాయంత్రం పూట సమానంగా చల్లాలి.

నులి పురుగులు : (కాళహస్తి తెగులు) : నులి పురుగులు కంటికి కనిపించనటువంటి అతిసూక్ష్మ పురుగులు. వీటిని భూతద్దముతో మాత్రమే చూడగలము. ఇవి వేరుశనగ పిందె మరియు గింజ నిండే దశలో, కాయలపై ఆశించడం వలన నల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిందెలు మరియు కాయలు నల్లగా మారి లోపలి గింజలు అభివృద్ధి చెందక ముడతలు ఏర్పడును. కాయ, గింజ పరిమాణము తగ్గుతుంది.

నివారణ

❖ నేలను లోతుగా దుక్కి చేయాలి. ❖ చిరుధాన్యాలతో పంట మార్పిడి చేయాలి.

❖ ఈ పురుగు గమనించిన వెంటనే తడిపెట్టిన తరువాత కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి. 10 కిలోలు ఎకరాకు చొప్పున తొలి పూత దశలో వేయాలి.

వేరుశనగ కాయ తొలుచు పురుగు : ఇది ఎక్కువగా కాయలు నిల్వఉంచినపుడు వస్తుంది. తల్లి పురుగులు గోధుమ రంగులో వుండి, వేరుశనగ కాయలపై తెల్లటి గుడ్లను పెడతాయి. పిల్ల పురుగులు కాయలను తొలిచి విత్తనాల్లోకి వెళ్ళి పొడిగా మారుస్తాయి. ఎదిగిన పురుగులు కాయలపై రంధ్రాలు చేసి బయటకు వచ్చి కాయలపై, సంచులపై గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు దాదాపు 40 రోజుల్లో ఒక జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేస్తుంది.

దీని నివారణకు కాయల్లోగాని, విత్తనాల్లో గాని తేమ శాతం 9 కి మించి ఉండరాదు. కిలో కాయలకు 5 మి.లీ. వేపనూనె లేదా కానుగనూనె కలిపినచో దాదాపు 5 నెలల వరకు కాయతొలుచు పురుగు నుండి వేరుశనగను కాపాడవచ్చు. గిడ్డంగుల గోడలపైన, కాయ సంచుల మీద స్పైనోశాడ్ 0.5 మి.లీ. లేదా డెల్టామెత్రిన్ 0.5 మి.లీ. లేదా మిథైల్ పెరాథియాన్ 20% ఇ.సి. 2 మి.లీ./ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఒక టన్ను కాయలకు 3 గ్రా. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ బిళ్ళలు ఒకటి లేక రెండు చొప్పున ఉంచి కాపాడుకోవచ్చును.

కాయనల్లి : బూడిద రంగు తల్లి పురుగులు పొలంలో మొక్కలు పెరిగిన తరువాత కుప్పలలో ఉన్న పచ్చికాయ లోపలి విత్తనాలను గాయపరుస్తాయి. పురుగు గాయపరచిన విత్తనాలు నూనె శాతం తగ్గిపోయి తినడానికి మరియు విత్తనాలుగా ఉపయోగపడవు. దీని నివారణకు గడ్డి వాములపై డెల్టామెత్రిన్ పొడిని వెదజల్లి వరిగడ్డితో లేదా ప్లాస్టిక్ షీటుతో కప్పి ఉంచాలి.

తెగుళ్ళు

తిక్కా ఆకుమచ్చ తెగులు : త్వరగా వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు, పంట వేసిన 30 రోజుల నుండి కనిపిస్తుంది. ఈ మచ్చలు కొంచెం గుండ్రంగా వుండి, ఆకు పైభాగాన ముదురు గోధుమ రంగు కలిగి ఉంటాయి. ఆలస్యంగా వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు మచ్చలు చిన్నవిగా, గుండ్రంగా ఉండి, ఆకు అడుగు భాగాన నల్లని రంగు కలిగి ఉంటాయి. కాండం మీద, ఆకు కాడలమీద, ఊడలమీద కూడ మచ్చలు ఏర్పడతాయి.

దీని నివారణకు తెగులును తట్టుకొనే రకాలను (కదిరి హరితాంధ్ర, అభయ, నిత్యహరిత మరియు కదిరి లేపాక్షి) సాగు చేసుకోవాలి. తెగులు కనిపించిన వెంటనే ఎకరాకు మాంకోజెబ్ 400 గ్రా. మరియు కార్బండెజిమ్ 200 గ్రా. లేదా క్లోరోథలోనిల్ 400 గ్రా. లేదా హెక్సాకొనజోల్ 400 మి.లీ. లేదా టెబ్యుకొనజోల్ 200 మి.లీ. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒకసారి, తరువాత 15 రోజులకు మరొకసారి పిచికారి చేయాలి.

తుప్పు లేక కుంకుమ తెగులు : ఆకుల అడుగు భాగంలో ఎరుపు లేక ఇటుక రంగు గల చిన్న పొక్కులు ఏర్పడి ఆకు పైభాగంలో పసుపు రంగు మచ్చలు కన్పిస్తాయి. తెగులు ఉధృతి ఎక్కువైనపుడు ఈ పొక్కులు పూల మీద తప్ప మొక్క మిగతా అన్నిభాగాల మీద కన్పిస్తాయి.

దీని నివారణకు ఎకరానికి 400 గ్రా. క్లోరోథలోనిల్ లేదా 400 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 400 మి.లీ. హెక్సాకొనజోల్ లేదా 200 మి.లీ. టెబ్యుకొనజోల్ మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కలు తడిచే విధంగా పిచికారి చేయాలి.

మొదలు కుళ్ళు తెగులు : ఈ తెగులు ఆశించడం వలన విత్తిన తర్వాత మొలక రాకుండానే విత్తనం కుళ్ళి పోతుంది. రెండవ దశలో మొలకెత్తిన తర్వాత కాండంపైన నల్లని శిలీంధ్ర బీజాలతో కప్పబడి ఉంటుంది. తెగులు మచ్చలు మొదట నేల మట్టంపై ఉన్న కాండం మీద ఏర్పడి క్రమంగా పై కొమ్మలకు వ్యాపిస్తాయి. కాయలపై కూడ శిలీంధ్రం ఆశించి నల్లని మచ్చల్ని కలుగజేస్తుంది. ఎదిగిన మొక్కలకు తెగులు సోకినట్లయితే మొక్కలు వడలిపోయి, ఎండిపోతాయి.

దీని నివారణకు విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 50% + కార్బండెజిమ్ 25% డబ్ల్యు.యస్. చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. విత్తనాన్ని 5 సెం.మీ.ల కంటే లోతుగా వేయకూడదు. రెండు కిలోల ట్రైకోడెర్మా విరిడి ఫార్ములేషను 90 కిలోల బాగా మాగిన పశువుల ఎరువు మరియు 10 కిలోల వేప పిండిని కలిపి గోనె సంచులతో కప్పి నీడలో 15 రోజుల వరకు మాగ పెట్టాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని విత్తిన వెంటనే మట్టిలో కలపాలి. ఇదేవిధంగా పంట వేసిన 30 రోజులకు మరియు 60 రోజులకు మరొకసారి వేసుకోవాలి.

కాండం కుళ్ళు తెగులు : ఈ తెగులును బూజు తెగులు లేక బుడిమ తెగులు అని కూడ అంటారు. ఈ తెగులును కలుగజేసే శిలీంధ్రం భూమిద్వారా, విత్తనం ద్వార్వా వ్యాపిస్తుంది. ఈ తెగులు పంట వేసిన తర్వాత సుమారు 70వ రోజు నుండి పంట చివరి వరకు కనిపిస్తుంది. తెగులు ఆశించడం వలన ప్రారంభదశలో మొక్క మొదలులో ఉన్న శాఖలు పసుపు వర్ణానికి మారి ఎండిపోతాయి. తరువాత భూమిపై ఉన్న కాండం మీద తెల్లటి బూజు తెరలుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ తెల్లటి బూజులో ఆవగింజ పరిమాణంలో ఉన్న శిలీంధ్ర సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడుతాయి. ఊడలు, కాయలు కూడ ఈ తెగులుకు లోనవుతాయి. కాయలోని గింజలపై నీలి, బూడిద రంగు మచ్చలు ఏర్పడుతాయి. ఈ తెగులు ఆశించిన మొక్కలను పీకినపుడు నేలపై ఉన్న మొక్క భాగాలు మాత్రమే ఊడివస్తాయి. వేర్లు, కాయలు నేలలోనే ఉండిపోతాయి.

దీని నివారణకు వేసవిలో లోతు దుక్కులు చేసుకోవాలి. ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను అదుపులో ఉంచినచో కాండం కుళ్ళు తెగులు యొక్క ఉధృతి తగ్గుతుంది. సజ్జ, జొన్న వంటి పంటలతో పంట మార్పిడి చేయాలి. సేంద్రీయ ఎరువులను పొలంలో వేసి కలియ దున్నాలి. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 50% + కార్బండెజిమ్ 25% డబ్ల్యు.యస్. కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. మొదలకుళ్ళు నివారణకు రెండు కిలోల ట్రైకోడెర్మా విరిడి పొడిని 90 కిలోల పశువుల ఎరువు మరియు 10 కిలోల వేపగింజల పిండితో కప్పి 3 రోజుల కొకసారి నీరు చల్లుతూ, 15 రోజుల తర్వాత ఒక ఎకరా భూమిలో విత్తే ముందు వేసుకోవాలి మరియు ఇదేవిధంగా పంట వేసిన 30 రోజులకు మరియు 60 రోజులకు వేసుకోవాలి. ఎకరానికి 200 కిలోల జిప్సం ఎరువును పూత సమయంలో వేయటం వలన తెగులు యొక్క ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు. పంట పీకిన తరువాత పంట అవశేషాలను తీసి కాల్చివేయాలి. పంట మార్పిడి పద్ధతిని అవలంభించాలి.

వేరు కుళ్ళు తెగులు : ఈ తెగులు 'రైజోక్టోనియా బెటాటికోలా' అనే శిలీంధ్రం వలన కలుగుతుంది. ఈ తెగులు సుమారు 25–30 రోజుల తర్వాత వర్షాభావ పరిస్థితుల వలన ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. మొదట కాండం మీద గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు ఏర్పడుతాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత నలుపు వర్ణానికి మారి కాండం పైభాగానికి మరియు వేరుకు కూడా వ్యాపిస్తాయి. ఈ తెగులు వలన తల్లి వేరు కుళ్ళిపోయి నలుపు రంగుకి మారి నుజ్జు నుజ్జుగా తయారవుతుంది. మొక్కను పీకినప్పుడు నేల క్రిందన ఉన్న వేరు భాగము ఊడి వస్తుంది.

ఈ తెగులు నివారణకు తెగులు సోకని పొలం నుండి విత్తనాలను సేకరించి తప్పనిసరిగా విత్తనశుద్ధి చేయాలి. కాండం కుళ్ళు నివారణకు పైన తెలిపిన విధంగా ట్రైకోడెర్మా విరిడి ఫార్ములేషన్‌ను (2 కిలోలు), పశువుల ఎరువు (90 కిలోలు), మరియు వేపపిండి (10 కిలోలు) ని కలుపుకొని 15 రోజుల తరువాత విత్తేముందు పొలంలో వేసుకోవాలి మరియు 30 రోజులకు, 60 రోజులప్పుడు వేసుకోవాలి. పొలంలో తెగులు ఆశించిన మొక్కలను పీకి కాల్చివేయాలి. పంట పీకిన తరువాత పంట అవశేషాలను తీసి కాల్చివేయాలి. పంట మార్పిడి పద్ధతిని అవలంభించాలి.

మొవ్వు కుళ్ళు వైరస్ తెగులు (పి.బి.ఎన్.డి.) : ఇది వేరుశనగ బడ్ నెక్రోసిస్ వైరస్ వల్ల వచ్చే తెగులు. ఈ తెగులు యొక్క లక్షణాలు మొదటగా లేత ఆకులపై నిర్జీవ వలయాలు లేక చారలు కన్పిస్తాయి. మొవ్వు ఎండిపోతుంది. లేత దశలో తెగులు ఆశిస్తే మొక్కలు కురచబడి, ఎక్కువ రెమ్మలు వస్తాయి. ఆకులు చిన్నవిగా మారి లేత ఆకుపచ్చని మచ్చలు కలిగి పాలిపోయి ఉంటాయి. లేత దశలో ఆశించిన మొక్కలలో కాయలు ఏర్పడవు. ముదిరిన మొక్కలలో తెగులు లక్షణాలు కొన్ని కొమ్మలలో మాత్రమే కన్పిస్తాయి. తెగులు సోకిన మొక్కల నుండి వచ్చిన వేరుశనగ కాయ మరియు విత్తనాలు చిన్నవిగా ఉండి, ముడుచుకొని ఉంటాయి.

ఈ తెగులు నివారణకు కిలో విత్తనానికి 2 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. అనే మందును 4 మి.లీ. నీటితో కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసిన తర్వాత 3 గ్రాముల మాంకోజెబ్ లేదా మిశ్రమ మందు అయిన 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ 50% + కార్బండెజిమ్ 25% డబ్ల్యు.యస్. అనే పొడి మందుతో కలిపి తరువాత విత్తుకోవాలి. మొక్కల సాంద్రత చదరపు మీటరుకు ఖరీఫ్‌లో 33 మొక్కలు, రబీలో 44 మొక్కలు ఉండాలి. వేరుశనగతో సజ్జ పంటను 7:1 నిష్పత్తితో అంతరపంటగా వేయాలి. విత్తిన 20 రోజుల తరువాత తామర పురుగులను (త్రిప్స్)

వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి పంట వేసిన 20-25 రోజులకు థయాక్లోప్రిడ్ 480 యస్.సి. 60 మి.లీ. మరియు 40 రోజులకు ఫిప్రోనిల్ 5 యస్.సి. 200 మి.లీ. మరియు 60 రోజులకు అసిటామిప్రిడ్ 20 యస్.పి. 40 గ్రా. మందులను 200 లీటర్ల నీళ్ళలో కలిపి ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి.

కాండం కుళ్ళు వైరస్ తెగులు (పి.యస్.ఎన్.డి) : ఈ తెగులును "టొబాకో స్ట్రీక్ వైరస్" కలుగజేస్తుంది. లేత ఆకులపై మరియు ఆకు ఈనెలపై నల్లటి మాడు పట్టిన మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తరువాత ఈ మచ్చలు ఆకు తొడిమ నుండి కాండం పైకి విస్తరిస్తాయి. మొవ్వు ఎండిపోతుంది. 15 రోజుల లోపు వయస్సు ఉన్న మొక్కలకు తెగులు ఆశించిన యెడల మొక్కలు చనిపోతాయి. 15-30 రోజుల పైన వయస్సు ఉన్న మొక్కలకు తెగులు ఆశిస్తే మొక్కలు గిడసబారి, చిన్న చిన్న ఆకులతో ఉండి, మొక్క ఊడలు నల్లగా మారుతాయి. కాయలపై మచ్చలు ఏర్పడతాయి. గింజలు కూడా రంగు మారుతాయి.

కలుపు మొక్కలలో ముఖ్యంగా వయ్యారిభామ, ఉత్తరేణి, ఎన్నెద్దులాకు, కుక్కముళ్లు, గడ్డి చేమంతి, గరిటికమ్మ పువ్వుల్లోని పుప్పొడి రేణువులలో ఈ వైరస్ ఉంటుంది. అందువలన ఈ కలుపు మొక్కలను పూత దశకు రాక ముందే నిర్మూలించాలి. పొలం చుట్టూ దట్టంగా మేర సాళ్లు (4-6) సజ్జ / జొన్న / మొక్కజొన్న వేసుకోవాలి. దీనివలన గాలి మరియు తామర పురుగుల ద్వారా వచ్చే పుప్పొడి రేణువుల వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు. పొలంలో అంతరపంటగా 7:1 లేదా 11:1 నిష్పత్తిలో సజ్జ / జొన్న / మొక్కజొన్న వేసుకోవాలి. కిలో విత్తనానికి 2 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 4 మి.లీ. నీళ్ళ మిశ్రమం మందుతో విత్తనశుద్ధి చేసిన తర్వాత పైన తెలిపిన ఏదైన ఒక శిలీంధ్రనాశిని మందుతో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. పంట కాలంలో 30 రోజుల తర్వాత ఎకరాకు 400 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 80 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని పిచికారి చేయాలి.

వేరుశనగ పైరులో వాడే కలుపు నివారణ మరియు సస్యరక్షణ మందులు

సంఖ్య	కలుపు / సస్యరక్షణ మందులు	తెగులు/పురుగు/కలుపు	మోతాదు
1.	**కలుపు నివారణ మందులు**		
	1. పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి.	కలుపు	ఎకరానికి 1.3-1.6 లీ. మందు. విత్తిన వెంటనే లేదా 1-3 రోజుల లోపు
	2. బుటాక్లోర్ 50% ఇ.సి. లేదా అలాక్లోర్ 50% ఇ.సి	కలుపు	ఎకరానికి 1 లీటరు మందు. విత్తిన వెంటనే లేదా 1-3 రోజుల లోపు
	3. క్విజలోపాప్ ఇథైల్ 5% ఇ.సి.	కలుపు	ఎకరానికి 400 మి.లీ. విత్తిన 21 రోజులలోపు
2.	**విత్తనశుద్ధి మందులు**		
	1. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్.	తామర పురుగులు/ పి.యస్.ఎన్.డి	2 మి.లీ./కిలో విత్తనానికి
	2. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్.	తామర పురుగులు/ పి.యస్.ఎన్.డి	2 మి.లీ.+ 4 మి.లీ. నీరు /కిలో విత్తనానికి
	3. మాంకోజెబ్ 50% + కార్బండెజిమ్ 25%	మొదలు కుళ్ళు, కాండం కుళ్ళు తెగులు, వేరు కుళ్ళు తెగులు	3 గ్రాము / కిలో విత్తనానికి

సంఖ్య	కలుపు/సస్యరక్షణ మందులు	తెగులు/పురుగు/కలుపు	మోతాదు
	4. మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యు.పి.	మొదలు కుళ్ళు, కాండం కుళ్ళు తెగులు, వేరుకుళ్ళు తెగులు	3 గ్రా. / కిలో విత్తనానికి
3.	**పురుగు మందులు**		
	1. మిథైల్ పారాథియాన్ 50% ఇ.సి./ క్వినాల్‌ఫాస్ 25 ఇ.సి.	ఎర్ర గొంగళి పురుగు/ ఆకుముడత	ఎకరానికి 10 కిలోల పొడి లేదా 400 మి.లీ. మందును 200 లీ. నీటికి
	2. ఫోరేటు గుళికలు 10 జి.	వేరుపురుగు/చెదలు	ఎకరానికి 6 కిలోలు
	3. క్వినాల్‌ఫాస్/నొవాల్యురాన్/ క్లోరిఫెనాపైర్/థయోడికార్బ్ 75% డబ్ల్యు.ఎ.పి./ ఫ్లూబెండియమైడ్ 25% డబ్ల్యు.డి.జి.	పొగాకు లద్దె పురుగు	ఎకరానికి 400 మి.లీ./ 200 మి.లీ./400 మి.లీ./ 200 గ్రా./40 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటికి
	4. మోనోక్రోటోఫాస్ + వేపనూనె	తామర పురుగులు	1 ఎకరానికి 320 మి.లీ. + 1000 మి.లీ. 200 లీ. నీటికి
	5. థయోక్లోప్రిడ్ 480 యస్.సి.	తామర పురుగులు	1 ఎకరానికి 60 మి.లీ.
	6. ఫిప్రోనిల్ 5 యస్.సి.	తామర పురుగులు	1 ఎకరానికి 200 మి.లీ.
	7. అసిటామిప్రిడ్ 20 యస్.సి.	తామర పురుగులు	1 ఎకరానికి 40 గ్రా.
	8. డైమిథోయేట్	పచ్చదోమ, పేనుబంక	400 మి.లీ., ఎకరానికి
	9. క్వినాల్‌ఫాస్ 25. ఇ.సి./ క్లోరిపైరిఫాస్ /నొవాల్యురాన్ 10%ఇ.సి	ఆకుముడత	400 మి.లీ. నీటికి 500 మి.లీ./200 మి.లీ. ఎకరానికి
	10. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్	గోదాముల్లో కాయతొలుచు పురుగు	3 గ్రా. బిళ్ళలు ఒకటి/రెండు ఒక టన్ను కాయలకు
4.	**తెగుళ్ళ మందులు**		
	1. మాంకోజెబ్ 63% + కార్బండెజిమ్ 12%	తిక్కా ఆకుమచ్చ తెగులు	2 గ్రా. /లీ. నీటికి (400 గ్రా. . ఎకరానికి 200 లీ. నీటికి)
	2. క్లోరోథలోనిల్ 75% డబ్ల్యు.పి.	తిక్కా ఆకుమచ్చ / తుప్పు / కుంకుమ తెగులు	2 గ్రా. లీ. నీటికి / (400 గ్రా. ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటికి)
	3. హెక్సాకొనజోల్ 5% ఇ.సి.	తిక్కా ఆకుమచ్చ తెగులు / కుంకుమ తెగులు	2 మి.లీ. / లీటరు నీటికి (400 మి.లీ. ఎకరానికి / 200 లీటర్ల నీటికి)
	4. టెబ్యుకొనజోల్ 25.9% ఇ.సి.	తిక్కా ఆకుమచ్చ తెగులు	1 మి.లీ. 1 లీ. నీటికి (200మి.లీ. ఎకరానికి/ 200 లీ. నీటికి)
	5. మాంకోజెబ్	తుప్పు / కుంకుమ తెగులు	2 గ్రా. / లీటరు నీటికి (ఎకరానికి 400 గ్రా. / 200 లీటర్ల నీటికి)
	6. ట్రైకోడెర్మా విరిడి + పశువుల ఎరువు + వేపపిండి	కాండము కుళ్ళు తెగులు / వేరు కుళ్ళు తెగులు	2 కిలోలు + 90 కిలోలు + 10 కిలోలు

పంటకోత – నిల్వ : మొక్కల ఆకులు, కొమ్మలు పసుపు వర్ణంగా మారి మొక్కలోని 80% కాయలు కాయడొల్ల లోపలి భాగం నలుపుగా మారినపుడు మొక్కలను పీకాలి. అంటే ప్రతి మొక్కలో 80 శాతం కాయలు ముదిరి ఉండాలి. కోత సమయంలో నేలలో తగినంత తేమ ఉండాలి. భూమినుండి మొక్కలను తీయడానికి ట్రాక్టరుతో నడిచే ఎ.యన్.జి.ఆర్.ఎ.యు బ్లేడు గుంటక లేక వేరుశనగ డిగ్గర్‌ను వాడుకోవాలి. చెట్ల నుండి కాయలను వేరు చేయడానికి పచ్చి లేక ఎండు కాయలను వేరుచేయు యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రబీలో ఉత్పత్తి అయిన విత్తనం కాయలను విత్తనం కొరకు నేరుగా ఎండలో ఎండబెట్టకుండా నీడలో ఆరబెట్టాలి. కాయల్లో తేమ శాతం 9 కి లోపు ఉండేటట్లు ఆరబెట్టి పాలిథిన్ లైనింగ్ ఉన్న గోనె సంచుల్లో నిల్వ చేయాలి. నిల్వలో కాయతొలచు పురుగు మరియు ఇతర కీటకాల నుండి రక్షణకు 2–3 వారాల కొకసారి మలాథియాన్ ద్రావణాన్ని 150 మి.లీ. పది లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా డెల్టామెత్రిన్ 0.5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వేరుశనగ సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వేరుశనగ), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి–515 591, అనంతపురం జిల్లా.

ఫోన్ నెం. 08494–295001, 99896 25217

నువ్వులు

మన రాష్ట్రంలో నువ్వు పంట సుమారు 33 వేల హెక్టార్లలో సాగు చేయబడుతూ సగటున హెక్టారుకు 270 కిలోల దిగుబడి ఇస్తున్నది. నువ్వులో నూనె 49-55%, ప్రోటీన్లు 20-25% ఉండడమే కాకుండా అధిక పోషక విలువలను మరియు ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉండటం వలన వివిధ రకాల వంటకాల్లో వాడుతున్నందున ఈ పంటకు మార్కెట్లో మంచి ధర ఉంది.

నేలలు : నీరు నిలువని తేలిక, బరువు నేలలు శ్రేష్ఠం. ఆమ్ల, క్షార నేలలు పనికిరావు.

నేలతయారి : నేలను 2-4 సార్లు మెత్తగా దున్ని, 2 సార్లు గుంటకతోలి, చదును చేయాలి.

విత్తనం, విత్తే పద్ధతి : ఎకరాకు 2 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. విత్తనానికి సమపాళ్ళలో ఇసుక లేదా నూకలు కలిపి గొర్రుతో వరుసల్లో విత్తుకోవాలి.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 3 గ్రాముల కార్బండెజిమ్ / మాంకోజెబ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తడం వల్ల నేల నుంచి సంక్రమించే తెగుళ్ళను 21 రోజుల వరకు నివారించవచ్చు. పంట తొలిదశలో రసం పీల్చే పురుగుల నుండి కాపాడుటకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70 డబ్ల్యూ.ఎస్. 5 గ్రా. / కిలో విత్తనానికి చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి.

విత్తేదూరం : వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ. మరియు మొక్కల మధ్య 15 సెం.మీ. ఉండాలి.

విత్తే సమయం : ఎర్లీ ఖరీఫ్‌లో మే రెండవ పక్షము, రబీ లేదా వేసవిలో నీటి పారుదల కింద డిసెంబరు రెండవ పక్షం నుండి జనవరి రెండవ పక్షము వరకు విత్తుకోవచ్చును. నువ్వు పంటను రబీ-వేసవి కాలంలో సాగు చేసినప్పుడు అధిక దిగుబడి వస్తుంది.

నువ్వు పంటలో అధిక దిగుబడులకు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత, సమానముగా విస్తరించిన వర్షపాతము అవసరము. ఉష్ణోగ్రత 25^0-27^0 డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ ఉన్నప్పుడు మొలక శాతము, తొలిదశలో పెరుగుదల, పూత బాగా ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత 20^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే తగ్గితే పెరుగుదల ఉండదు. అలానే పూత దశలో 37^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉన్నట్లైతే ఫలదీకరణ జరగక గింజ కట్టదు.

ఎరువులు : ఖరీఫ్‌లో ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరాకు 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు, 16 కిలోల నత్రజని, 8 కిలోల పొటాష్, 8 కిలోల భాస్వరాన్నిచ్చే ఎరువులు వేసుకోవాలి. నత్రజని సగభాగం, మొత్తం భాస్వరం మరియు పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులను ఆఖరి దుక్కిలో వేసి బాగా కలియదున్నాలి. మిగతా సగభాగం నత్రజని ఎరువును విత్తిన నెల రోజులకు కలుపు తీసి వేయాలి. భాస్వరం ఎరువును సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో వాడినప్పుడు అదనంగా కాల్షియం, గంధకం లభించి దిగుబడి పెరుగుతుంది.

నీటి యాజమాన్యం : విత్తిన వెంటనే మొదటి తడి ఇవ్వాలి. పూత, కాయ అభివృద్ధి మరియు గింజకట్టు దశల్లో తడులు ఇవ్వాలి. విత్తిన తర్వాత 35-40 రోజుల నుండి 55 - 60 రోజుల వరకు నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి. నువ్వు పంటకు తేలికపాటి తడులు మాత్రమే ఇవ్వాలి. పంట నీటిముంపుకు గురి అయినట్లైతే మొక్కలు చనిపోయే అవకాశం ఉంది.

రకాలు :

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	ఋతువు	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (కిలోలు ఎకరాకు)	నూనె శాతం	గుణగణాలు
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
గౌరి	1973	ఎర్లీ ఖరీఫ్ & రబీ	90	250	50	ముదురు గోధుమ రంగు విత్తనం. కోస్తా జిల్లాలకు అనువైనది.
మాధవి	1977	ఎర్లీ ఖరీఫ్	70-75	200	50-51	లేత గోధుమ రంగు విత్తనం. పలు పంటల సరళికి అనుకూలం.
ఎలమంచిలి-11 (వరాహ)	1992	ఎర్లీ ఖరీఫ్ & రబీ	80-85	300-350	52.5	ముదురు గోధుమరంగు విత్తనం. కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలకు అనుకూలం. పంట ఒకేసారి కోతకు వస్తుంది.
ఎలమంచిలి-17 (గౌతమ్)	1992	ఎర్లీ ఖరీఫ్ & రబీ	75-80	340-400	52.5	లేత గోధుమరంగు విత్తనం. కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలకు అనుకూలం. ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది.
ఎలమంచిలి-66 (శారద)	2009	ఖరీఫ్ రబీ/వేసవి	80-90	500-600	51.5	లేత గోధుమరంగు విత్తనం, కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలకు అనుకూలం. బూడిద, ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% 4-5 మి.లీ. /లీటరు చొప్పున విత్తిన 48 గంటలలోపు తడినేలపై పిచికారి చేయాలి. విత్తిన వెంటనే వర్షం పడే సూచనలున్నట్లైతే పెండిమిథాలిన్‌ను పిచికారి చేయకూడదు. పెండిమిథాలిన్ పిచికారి చేసిన వెంటనే నీటి తడి పెట్టకూడదు లేదా ప్రొటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున ఎకరానికి 400 మి.లీ. మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన మూడవ రోజు లోపు నేలంతా తడిచేలా వెనక్కి నడుస్తూ పిచికారి చేయాలి. మొక్కలు మొలచిన 15 రోజులకు అదనపు మొక్కలను తీసి వేయాలి. విత్తిన 20, 25 రోజులప్పుడు గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి.

సస్యరక్షణ

పురుగులు

రసం పీల్చే పురుగులు (తెల్లనల్లి, తామర పురుగులు, పచ్చదోమ) : పిల్ల, తల్లి పురుగులు ఆకుల అడుగు భాగాన

చేరి ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చి వేస్తాయి. ఆకులు పాలిపోయి, తర్వాత దశలో ఎండిపోతాయి. తెల్లనల్లి ఆశిస్తే ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగుకు మారి ఈనెలు పొడవుగా సాగి క్రింది వైపుకు ముడుచుకొని పోయి, దోనె ఆకారంగా మారి పాలిపోతాయి.

నివారణ : మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. తెల్లనల్లి నివారణకు డైకోఫాల్ 3 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లేదా 5% వేపకషాయం 5 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.3 గ్రా. లేదా థయోక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుముడత మరియు కాయతొలుచు పురుగు : తొలిదశలో చిన్న గొంగళి పురుగులు రెండు, మూడు లేత ఆకులను కలిపి గూడుకట్టి లోపలి నుండి ఆకుల్లోని పచ్చని పదార్థాన్ని గోకి తినుట వలన ఆకులు ఎండిపోతాయి. పురుగులు ఎదిగిన కొలది ఎక్కువ ఆకులను కలిపి గూడుగా చేసికొని ఆకులను తింటాయి. మొగ్గ ఏర్పడే దశలో మొగ్గలను, పూతను, కాయల్లోని లేత గింజలను తింటూ పంటకు నష్టం చేస్తాయి.

నివారణ : ఆకులలో గూడు కట్టుకొని ఉన్న గొంగళి పురుగులను ఏరి నాశనం చేయాలి. క్వినాల్‌ఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా 5% వేపకషాయం 5 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా స్పైనోసాడ్ 0.2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

కోడు ఈగ : చిన్న పురుగులు లేత మొగ్గ, పూత తినివేయటం వలన మొగ్గలు పువ్వుగా, కాయలుగా ఏర్పడక గింజ కట్టక తాలు కాయలు ఏర్పడతాయి. పురుగు ఆశించిన మొగ్గ మరియు పూత వాడి రాలిపోతుంది.

నివారణ : పురుగు ఆశించిన మొగ్గల్ని మరియు తాలు కాయల్ని ఏరి నాశనం చేయాలి. మొగ్గదశలో డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా 5% వేపకషాయం 5 మి.లీ./లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి మొగ్గదశలో పిచికారి చేసుకోవాలి.

బీహారి గొంగళి పురుగు : తొలి దశలో చిన్న గొంగళి పురుగులు గుంపులుగా ఆకులలోని పత్రహరితాన్ని గోకి తిని జల్లెడాకులుగా చేస్తాయి. ఎదిగిన గొంగళి పురుగులు ఇతర మొక్కలపైకి ప్రాకుతూ మొగ్గలకు, పువ్వులకు మరియు కాయలకు రంధ్రాలను చేస్తూ విత్తనాలను తినేస్తాయి.

నివారణ : పంటలో గుడ్లు సముదాయం కాని, గొంగళి పురుగులు కాని కనిపించిన వెంటనే ఏరి నాశనం చేయాలి లేదా ఇండాక్సికార్బ్ 0.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

వేరుకుళ్ళు, కాండం కుళ్ళు తెగులు : ఎండుతెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులు పసుపు వర్ణానికి మారి వ్రేలాడుతుంటాయి. తదుపరి, ఆకుల అంచులు లోనికి ముడుచుకొని రాలిపోతాయి. కాండం మీద నల్లని చారలేర్పడతాయి. వేర్లను చీల్చి పరిశీలిస్తే గోధుమ రంగు చారలు కన్పిస్తాయి. వేర్లు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా కుళ్ళిపోతాయి. తెగులు సోకిన కాండంమీద, కాయలమీద గులాబి రంగు శిలీంధ్ర బీజాల సముదాయం కన్పిస్తుంది.

తెగులు కల్గించే శిలీంధ్రం భూమిలోను విత్తనాలు మరియు పంట అవశేషాలపై జీవిస్తుంది. భూమిలో అధిక ఉష్ణోగ్రత తెగులు వృద్ధికి దోహదపడుతుంది.

నివారణ : పంట మార్పిడి తప్పకుండా చేయాలి. పంట అవశేషాలను నాశనం చేయాలి. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బండెజిమ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ లేదా మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుమచ్చ (ఆల్టర్నేరియా) తెగులు : గాలిలో తేమశాతం అధికంగా ఉన్నప్పుడు తెగులు అధికంగా వ్యాపిస్తుంది. ఆకులపై, కాండము మీద గోధుమరంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ముదురు గోధుమరంగు కలిగిన చిన్న చిన్న వలయాకారపు మచ్చలు ఆకు అంతా వ్యాపించి ఆకులు ఎండిపోయి, రాలిపోతాయి.

నివారణ : కిలో విత్తనాలకు 3 గ్రా. చొప్పున కార్బండెజిమ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పంట దశలో కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 15 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

వెర్రితెగులు (ఫిల్లోడి) : ఈ తెగులు పూత సమయంలో ఆశిస్తుంది. మన ప్రాంతంలో సాధారణంగా ఆలస్యంగా వేసిన పంటలో ఎక్కువగా వస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కల్లో పువ్వులోని భాగాలన్నీ ఆకుల మాదిరిగా మారిపోయి కాయలు ఏర్పడవు. ఈ తెగులు దీపపు పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

నివారణ : తెగులు కనిపించిన వెంటనే తెగులు సోకిన మొక్కలను పీకి తగులబెట్టాలి. పైరుపై డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకొని దీపపు పురుగులను అరికట్టాలి.

బూడిద తెగులు : ఆకులపై బూడిద వంటి పదార్ధం ఏర్పడుతుంది. గింజ బరువు తగ్గుతుంది.

నివారణ : నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడి 3 గ్రా. లీటరు నీటకి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పంటకోత : ఆకులు పసుపురంగుకు మారినపుడు, 75% కాయలు లేత పసుపు రంగుకి వచ్చినపుడు పైరు కోయాలి. కోసిన పంటను కట్టలుగా కట్టి నిలబెట్టాలి. 5-6 రోజులు ఎండిన తర్వాత కట్టెలతో కొట్టి నూర్పిడి చేయాలి.

నిల్వ చేయటం : గింజల్లో తేమ శాతం 8 కి తగ్గేవరకు ఎండలో ఆరబెట్టాలి. గోనెసంచుల్లో నిల్వ చేయాలి. మధ్య మధ్య పురుగు పట్టకుండా ఎండలో ఆరబెట్టాలి. వేపనూనె 25 మి.లీ.లేక బూడిద 25 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొప్పున కలిపిన పురుగు పట్టదు.

నువ్వుల సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఎలమంచిలి - 531 055,
అనకాపల్లి జిల్లా, సెల్ నెం : 94409 77352

ప్రొద్దుతిరుగుడు

మన రాష్ట్రంలో ప్రొద్దుతిరుగుడు చాలా ముఖ్యమైన నూనెగింజల పంటగా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ప్రొద్దుతిరుగుడులో నూనె (49 శాతం) మరియు మాంసకృత్తులు (22 శాతం) ఉంటాయి. ఈ నూనెలో లినోలిక్ ఆమ్లం (66 శాతం) ఎక్కువగా ఉండుట వలన ఆరోగ్యపరంగా కూడా వేరుశనగ మరియు నువ్వుల నూనె కంటే శ్రేష్ఠమైనది. అంతేకాక ఈ నూనెను వనస్పతి తయారీకి, వార్నిష్, సబ్బు, కలప పరిశ్రమల్లో విస్తారంగా వాడుతున్నారు. నూనె తీసిన తరువాత వచ్చిన పిప్పిలో కూడా అధికంగా మాంసకృత్తులు (21 శాతం) ఉండుట వలన పశువులు మరియు కోళ్ళ దాణాగాను విరివిగా వాడుతున్నారు.

అనువైన వాతావరణ పరిస్థితులు : ఈ పంట యొక్క ఎదుగుదల 12 గంటల పగటి సమయం వున్నట్లయితే అధికంగా ఉంటుంది. ఈ పంట సాగుకు 20-25° సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అనువైనది. వర్షాధారపు పంట కాలంలో 500-750 మి.మీ. వర్షపాతం సమానంగా విస్తరించి, పూత మరియు గింజ కట్టు దశలో అధిక వర్షపాతం లేనట్లయితే అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు. నీటి పారుదల క్రింద ఈ పంటను సంవత్సరం పొడవునా పండించవచ్చు. అయితే పంట విత్తేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయమేమిటంటే పూత మరియు గింజలు తయారయ్యే దశలో పంట దీర్ఘకాల వర్షంతో కాని లేదా పగటి ఉష్ణోగ్రత 38° సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా కాని వుండకుండా చూసుకోవాలి. రబీ మరియు వేసవిలో విత్తిన పంట ఖరీఫ్ కంటే అధిక దిగుబడినిస్తుంది.

అనువైన సంకరాలు

సం.	సంకరము	దిగుబడి (కి./హె.) / వర్షాధారం	నూనె శాతం (%)	ప్రత్యేక లక్షణములు
1.	ఎన్.డి.ఎస్.హెచ్. 1012	2000 - 2500	40-41	దిగుబడి మరియు నూనె శాతం అధికంగా బూజు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
2.	కె.బి.ఎస్.హెచ్. 41	1300 - 1500	39-41	బెట్టను తట్టుకుంటుంది.
3.	కె.బి.ఎస్.హెచ్. 44	1400 - 1600	36-38	బూజు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
4.	కె.బి.ఎస్.హెచ్. 53	2400 - 2600	42-44	బూడిద తెగులును తట్టుకుంటుంది.
5.	కె.బి.ఎస్.హెచ్. 78	1700 - 2300	39-41	పువ్వు పెద్ద పరిమాణంలో ఉంటుంది.
6.	ఆర్.ఎస్.హెచ్. 1887	1800 - 2500	38-40	అధిక దిగుబడినిస్తుంది.
7.	డి.ఆర్.ఎస్.హెచ్. 1	1300 - 1600	42-44	నూనె శాతం ఎక్కువ.
8.	తిలహాన్ టెక్ సన్ హెచ్ 1	1500 - 1900	38-40	అధిక దిగుబడినిస్తుంది.

విత్తు సమయము : ఖరీఫ్‌లో తేలికపాటి నేలల్లో జూన్ మరియు జూలై మాసాల్లో బరువు నేలల్లో ఆగష్టు రెండవ పక్షంలో విత్తుకోవచ్చు. రబీలో నవంబర్ – డిశంబరు మరియు వేసవిలో నీటి పారుదల క్రింద జనవరి రెండవ పక్షం నుండి ఫిబ్రవరి మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకోవచ్చు. వరి తరువాత ప్రొద్దుతిరుగుడు వేసుకునే పక్షంలో డిసెంబరు ఆఖరి వారం నుండి జనవరి మొదటివారం వరకు విత్తుకోవాలి. విత్తు సమయం కూడా నూనె నాణ్యతను పెంచుతుంది. పువ్వు వికసించే మరియు విత్తనం గట్టిపడే సమయంలో ఎక్కువ పగలు (12 గంటలు) మరియు సూర్యరశ్మి ఉన్నట్లయితే నూనెశాతం ఎక్కువ వస్తుంది.

అనువైన నేలలు : నీరు నిల్వ వుండని తటస్థ భూములయిన ఎర్ర, చల్కా, ఇసుక, రేగడి మరియు ఒండ్రు నేలలు దీని సాగుకు శ్రేష్టం. ఉదజని సూచిక 6.5 – 8.0 మధ్య వున్న నేలలు ఈ పంట సాగుకు అనువైనవి. ఒండ్రునేలల కన్నా ఇసుక పరిమాణం తగినంత వున్న నేలలు ఈ పంట సాగుకు అనుకూలమైనవి. భూసారం కన్నా మురుగునీరు పోయే వసతి అధిక ప్రాధాన్యమైనది. ఈ పంట అధిక తేమను తట్టుకోలేదు కనుక లోతట్టు మరియు సముద్ర తీరప్రాంతాల్లో సాగు చేయరాదు. వర్షాధారంగా పండించుటకు బరువు నేలలు అనుకూలమైనవి. నీటి వసతి ఉన్నట్లయితే తేలిక నేలలు అత్యంత అనుకూలమైనవి. ఆమ్ల, చౌడు మరియు మురుగు నీరు వసతి లేని నేలలు ఈ పంట సాగుకు పనికిరావు.

అంతర పంటలు : దీనిని ఏక పంటగానూ లేదా వేరుశనగ + ప్రొద్దుతిరుగుడు 4:2, కంది + ప్రొద్దుతిరుగుడు 1:2 పైర్లతో అంతర పంటగా పండించుకోవచ్చు.

పంట మార్పిడి : చిరుధాన్యాలు (కొర్ర, జొన్న, సజ్జ), అపరాలు (కంది, శనగ, మినుము), వేరుశనగ మొదలగు పంటలతో పంట మార్పిడి చేయవచ్చు.

నేల తయారీ : భూమిని మూడు నుంచి నాలుగుసార్లు బాగా దున్ని మెత్తటి దుక్కిని తయారు చేసుకోవాలి. బరువు నేలల్లో ఒకటి రెండుసార్లు కలియదున్ని తరువాత చదును చేసి ఆ తర్వాత విత్తుకోవాలి.

విత్తన మోతాదు : ఎకరాకు 2 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది.

విత్తనాలను నానబెట్టుట : కిలో విత్తనమును ఒక లీటరు మంచి నీటిలో 14 గంటల సేపు నానబెట్టి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తినట్లయితే మొలకశాతం పెరుగుతుంది.

విత్తనశుద్ధి : ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు క్వింటాల్ (ఇప్రోడియోన్ 25% + కార్బెండిజిమ్ 25%) లేదా ఫ్లక్షపైరాక్సడ్ యఫ్.యస్. 1.5 గ్రా. లేదా సాఫ్ (కార్బండెజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63%) 2 గ్రా. కిలో విత్తనానికి వాడి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. నెక్రోసిన్ వైరస్ అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కిలో విత్తనానికి థయోమిథాక్సామ్ (క్రూయిజర్) 4 గ్రా. మందును లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (గౌచో) 5 గ్రా. మందుతో విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

విత్తు దూరము : సరియైన మొక్కల సాంద్రతను పొలంలో పొందగలిగినట్లయితే మొక్కకు కావలసిన సూక్ష్మ వాతావరణాన్ని అందించి మొక్కల ఎదుగుదలలో ఆరోగ్యకరమైన పోటీని కల్పించి అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు. తేలిక నేలల్లో వరుసల మధ్య 45 సెం.మీ. మొక్కల మధ్య 20–25 సెం.మీ. మరియు బరువు నేలల్లో వరుసల మధ్య 60 సెం.మీ. మరియు మొక్కల మధ్య 30 సెం.మీ. వుండేటట్లు కుదురుకు 2–3 విత్తనాలు నాటాలి.

పలుచన చేయుట : విత్తనం మొలకెత్తిన 10-15 రోజుల తరువాత కుదురుకు ఆరోగ్యవంతమైన ఒక మొక్కను ఉంచి మిగిలిన మొక్కలను తీసివేయాలి. ఈ విధంగా చేయటం వలన మొక్కల మధ్య నీరు మరియు పోషకాలకోసం పోటీ తగ్గి పువ్వు పరిమాణం పెరిగి అధిక దిగుబడి పొందుటకు దోహదపడుతుంది.

ఎరువులు : ఎకరాకు 3 టన్నుల చివికిన పశువుల ఎరువును విత్తే 2-3 వారాల ముందు వేసి కలియదున్నాలి. భూసార పరీక్ష ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో పోషకాలు వాడాలి. భాస్వరం మధ్యస్థం నుంచి అధికంగా వున్న నేలల్లో భాస్వరం వేయకపోయినా దిగుబడులు ఏమాత్రం తగ్గవు.

వర్షాధారపు పంటకు ఎకరానికి 24:24:12 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులను వేయాలి. సగం నత్రజని, మొత్తం భాస్వరం మరియు పొటాష్‌లను ఆఖరి దుక్కిలో వేసి, మిగతా సగం నత్రజనిని 30 రోజుల తర్వాత పై పాటుగా వేయాలి. నీటి పారుదల పంటకు ఎకరానికి 30:36:12 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాష్ ఎరువులను వేయాలి. నత్రజనిని మూడు దఫాలుగా విత్తేటప్పుడు, 30 రోజులప్పుడు, 50 రోజులప్పుడు వేయాలి. పైపాటుగా ఎరువు వేసేటప్పుడు నేలలో తగినంత తేమ వుండేటట్లు చూసుకోవాలి. గంధకం తక్కువగా వున్న నేలల్లో ఎకరాకు 10 కిలోల గంధకాన్ని జిప్సం రూపంలో (55 కిలోలు / ఎకరాకు) వేస్తే నూనె శాతం పెరిగి అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు. 2 గ్రా. బోరాక్స్ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పైరు పూతదశలో (ఆకర్షక పత్రాలు వికసించే దశలో) ఎకరాకు 200 లీటర్ల మందు ద్రావణం పిచికారి చేయాలి. దీనివలన గింజ బాగా కడుతుంది. మొదట బోరాక్స్‌ను వేడి నీటిలో కరిగించి తగినంత ద్రావణం తయారు చేయాలి లేదా ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరాకు 8 కిలోల చొప్పున బోరిక్ ఆమ్లాన్ని వేస్తే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు.

పంట పరిస్థితి	నత్రజని (కి./ఎ.)	భాస్వరం (కి./ఎ.)	పొటాష్ (కి./ఎ.)
వర్షాధారపు పంట	24 (12+12)	24	12
నీటి పారుదల పంటల	30 (10+10+10)	36	12

నీటి యాజమాన్యము : నేల స్వభావాన్ని బట్టి 4-6 తడులు పంటకు అవసరం. తేలికపాటి నేలల్లో 8-10 రోజుల వ్యవధిలో, నల్లరేగడి నేలల్లో 15 రోజుల వ్యవధిలో తడులు పెట్టాలి. మొగ్గ తొడిగే దశ, పూవు వికసించే దశ మరియు గింజ కట్టే దశ నీటి తడులకు కీలకమైనది. ఈ దశలలో పంట ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోను బెట్టకు

గురికాకుండా చూసుకోవాలి. నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్నట్లయితే సాలు మార్చి సాలు పద్ధతిలో నీరు పెట్టాలి. దీనివలన నీటి వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుటయే కాకుండా స్ప్రింక్లర్ యం వడలు తెగులు వ్యాప్తిని కూడా అరికట్టవచ్చును.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : విత్తిన 30–40 రోజుల వరకు పంటలో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి. లీటరు నీటికి పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి. 5 మి.లీ. కలుపుకొని విత్తిన వెంటనే లేదా మరుసటి రోజు పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20–25 రోజుల తరువాత గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి లేదా ఫినాక్సిప్రాప్ ఇథైల్ / క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 1.25 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి గడ్డిజాతి కలుపును నివారించవచ్చు.

సస్యరక్షణ : పురుగులు

రసం పీల్చు పురుగులు : పచ్చ దీపపు పురుగులు, తెల్లదోమలు, తామర పురుగులు మరియు పిండినల్లి.

దీపపు పురుగులు ఆశించిన ఆకుల చివర్లు పసుపు పచ్చగా మారి, క్రమేపి ఆకు అంతా ఎర్రబడి చివరగా ఆకులు ముడుచుకొని దోనెలలాగా కనిపిస్తాయి. వీటి నివారణకు ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా మిథైల్ డెమెటాన్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి ఆకుల అడుగు భాగం బాగా తడిసేలా పిచికారి చేయాలి. తెల్లదోమ ఆకుల అడుగుభాగం నుండి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు పసుపు రంగుకు మారి మొక్కలు కూడా గిడసబారి ఎండిపోతాయి. వీటి నివారణకు థయోమిథాక్జామ్ 0.2 గ్రా. లేదా డైఫెన్థియురాన్ 1.25 గ్రా. లేదా ఫ్లోనికమైడ్ 0.3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తామరపురుగులు ఈ పంటను మొదటి దశ నుంచి ఆశిస్తాయి. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉన్నపుడు మరియు పైరు బెట్టకు గురైనప్పుడు వీటి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి చాలా చిన్నవిగా వుండి పసుపుపచ్చ లేక గోధుమ రంగులో, చీలిన రెక్కలతో ఉంటాయి. పిల్ల, పెద్ద పురుగులు ఆకులను, పువ్వులను గోకి రసాన్ని పీలుస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ పురుగులు లేత భాగాన్ని ఆశ్రయించి పెరగడం వలన ఆకులు పెళుసుగా మారి మొక్క గిడసబారిపోతుంది. ఇవి ఆశించిన ఆకులపై పొడలాంటి మచ్చలు ఏర్పడి ఆకులు పాలిపోయి ముడుచుకొనిపోతాయి. పరోక్షంగా ఇవి నెక్రోసిస్ వైరస్ తెగులును వ్యాప్తి చేసి తీరని నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. వీటిని అదుపు చేసే నిమిత్తం మందులు పిచికారి చేయడం కంటే కిలో విత్తనానికి 5 గ్రాముల ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 4 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. తరువాత సహజంగా అదుపు చేసే మిత్ర పురుగులు పైరులో వృద్ధి చెందుతాయి. పైరుపై ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 4 మి.లీ./10 లీటర్ల నీటికి లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.20 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి రెండు లేక మూడుసార్లు పిచికారి చేయాలి. పిండినల్లి గుడ్లు సముదాయంతో కూడి తెల్లని పొడి కవచం కలిగి ఆకులు మరియు మొగ్గ కింది భాగాన చేరి రసాన్ని పీలుస్తాయి. తద్వారా మొక్క పసుపు వర్ణంలోకి మారుతుంది. పురుగు ఎక్కువగా ఆశించినట్లయితే మొక్క చనిపోతుంది. దీని నివారణకు గాను పంటలో కలుపు మొక్కలు, ముఖ్యంగా వయ్యారిభామ లేకుండా చూసుకోవాలి. అధికంగా ఆశించిన మొక్కలను పీకి పారవేయడం మంచిది. ఈ పురుగును నివారించుటకు ప్రొఫెనోఫాస్ 50% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇ.సి. 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి 10–15 రోజుల వ్యవధిలో మందులను మార్చి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుల్ని తినే పురుగులు : పొగాకు లద్దె పురుగు, బీహారీ గొంగళి పురుగు మరియు శనగపచ్చ పురుగు.

పొగాకు లద్దె పురుగు : ఇవి తొలిదశలో గుంపులుగా ఆకులపై పత్రహరితాన్ని గీకి తింటాయి. దీనివలన ఆకులు జల్లెడాకులుగా మారుతాయి. వీటి నివారణకు స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా నొవాల్యురాన్ 1 మి.లీ. లేదా ఫ్లుబెండియమైడ్ 0.2 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

బీహారి గొంగళి పురుగు : తల్లి పురుగు ఆకులపై గుడ్లను గుంపులుగా పెడుతుంది. లార్వాల శరీరం లేత పసుపు రంగుతో వుండి ముదురు పసుపు రంగు వెంట్రుకలతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ లార్వాలు ఆకుల్ని తిని తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. పురుగు ఉధృతంగా ఆశిస్తే మొక్కలు మోడుబారి పోతాయి. గుడ్లు మరియు తొలిదశ గొంగళి పురుగులు గుంపులుగా ఆకులు మీద ఉన్నప్పుడు ఏరి నాశనం చేయాలి. తొలి దశ గొంగళి పురుగులను నివారించేందుకు వేప గింజల ద్రావణాన్ని (5 శాతం) పిచికారి చేయాలి.

శనగపచ్చ పురుగు : ప్రొద్దుతిరుగుడు పండించే అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది. దీని లార్వాలు పువ్వులు, గింజల మధ్య చేరి వాటిని తింటూ అధిక నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఉధృతి ఎక్కువగా వున్న యెడల స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా నొవాల్యురాన్ 1 మి.లీ. లేదా ఫ్లుబెండియమైడ్ 0.2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. హెచ్.ఎన్.పి.వి. అనే వైరస్‌ను ఎకరాకు 200 ఎల్.ఇ. పిచికారి చేసి కూడా ఈ పురుగును నివారించవచ్చు.

తెగుళ్ళు

ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగులు : ఈ తెగులు ప్రొద్దుతిరుగుడు పండిస్తున్న అన్ని ప్రాంతాలలో ఆశించి విపరీత నష్టం కలుగజేస్తుంది. ఇది వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. వాతావరణంలో అధిక తేమ శాతం మరియు ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఉధృతి కొనసాగుతుంది. వాతావరణం అనుకూలించినట్లయితే పంట వేసిన 20 రోజుల నుండి ఈ తెగులు మొదలవుతుంది. ఈ తెగులు సాధారణంగా 45-60 రోజుల మొక్కల మీద కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా మొక్కల పూత దశలో మరియు గింజకట్టే దశలో ఈ తెగులు ఉధృతి అధికం కావడం గమనించవచ్చు. ముదురు గోధుమ రంగు లేదా నల్లటి గుండ్రని లేదా అండాకారపు మచ్చలు మొక్క యొక్క క్రింది ఆకులపై ఏర్పడతాయి. ఈ మచ్చల చుట్టూ పసుపు పచ్చని వలయాలు ఏర్పడి మచ్చల మధ్యభాగం బూడిద రంగులో కనిపిస్తుంది. తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మచ్చలన్నీ కలిసిపోయి ఆకులు మాడిపోవటమే గాక పువ్వు కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల గింజ నాణ్యత తగ్గి మొలకశాతం తగ్గిపోతుంది. ఈ తెగులు లక్షణాలు ఆకులపైనే కాక ఆకు కాడలు, కాండం, పువ్వు వెనక భాగాలు మరియు పూరేకులపై కనిపిస్తాయి. కాండం మీద మచ్చలేర్పడినపుడు వాటి మధ్యభాగం చీలిపోయి ఉంటుంది. దీని నివారణకు క్వింటాల్ (ఇప్రోడియోన్ 25% + కార్బెండిజిమ్ 25%) లేదా సాఫ్ (కార్బండెజిమ్ 12% + మాంకోజెట్ 63%) 2 గ్రా. ను కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. అదేవిధంగా సాఫ్ లేదా క్వింటాల్ అనే మందును 2 గ్రా. లేదా టాస్పా (డైఫెనకొనజోల్ 25% + ప్రొపికొనజోల్ 25%) 0.25 గ్రా. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 25% ఇ.సి. 1 మి.లీ. లేదా నేటివో (ట్రిఫ్లాక్సిస్ట్రోబిన్ 25% + టెబ్యుకొనజోల్ 50%) 0.3 గ్రా. లేదా అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 18.2% + డైఫెన్‌కొనజోల్ 11.4% యస్.సి. 1 మి.లీ. లేదా ఫ్లుయెపైరామ్ 17.7% + టెబ్యుకొనజోల్ 17.7% (400 యస్.సి.) 1 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి 45 రోజులకు ఒకసారి లేదా తెగులు లక్షణాలు మొక్కల మీద కనిపించినప్పుడు మరియు రెండవ పిచికారి 60 రోజులకు లేదా మొదటి పిచికారి చేసిన 15 రోజులకు చేయవలెను. పంట అవశేషాలను పూర్తిగా నిర్మూలించాలి.

పువ్వు (తల) కుళ్ళు : ఈ తెగులు పూతదశలో ఎక్కువగా వర్షాలు పడినపుడు ఆశిస్తుంది. మొదట మొక్క చివరి భాగంలో మరియు పువ్వు క్రింద వున్న ఆకులు శిలీంధ్రం ఆశించుట వలన ఎండిపోతాయి. పువ్వు క్రింది భాగం నీటిలో తడిచినట్టు వుండి తర్వాత గోధుమ రంగుకు మారుతుంది. దీని నివారణకు ఫెన్‌థియాన్ 1 మి.లీ., నీటిలో కరిగే గంధకం 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పువ్వు దశలో 10 రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

నెక్రోసిస్ తెగులు : ఈ తెగులు పైరును అన్ని కాలాల్లో, ఏ దశలోనైనా ఆశించవచ్చు. ఇది వైరస్ వల్ల వచ్చే తెగులు. తామర పురుగుల ద్వారా ఈ తెగులు పొలమంతా వ్యాపిస్తుంది. ఈ తెగులు సోకినపుడు ఆకుల మధ్య ఈనె దగ్గరగా వుండే భాగం ఎండిపోయి మొదట బూడిద రంగులోను తర్వాత నల్లగా మారి వంకరలు తిరుగుతుంది. తరువాత ఆకు కాడకు, కాండానికి పువ్వుకు వ్యాపించి నల్లగా మాడి ఎండిపోతాయి. లేత మొక్కలలో ఈ తెగులు వస్తే ఆకులు సరిగా పెరగక గిడసబారి ఎండిపోతాయి. పూతదశలో వస్తే పువ్వు సరిగా విచ్చుకోక, మెలిక తిరిగి వంకర టింకరగా మారిపోతుంది. పుష్ప భాగాలు దెబ్బతిని విత్తనవృద్ధి జరగదు.

నివారణ : వేసవి దుక్కులు చేయాలి. పంట చుట్టూ నాలుగు సాళ్ళు జొన్న / సజ్జ / మొక్కజొన్న పంట వేయాలి. కిలో విత్తనానికి థయోమిథాక్సామ్ (క్రూయిజర్) 4 గ్రా. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 5 గ్రా. విత్తనశుద్ధి చేసి తొలి దశలో తామర పురుగులు ఆశించకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చు. గట్లమీద పార్థీనియం మొక్కలను, ఈ తెగులు సోకిన పంట మొక్కలను పూదశ రాకముందే పీకివేసి నాశనం చేయాలి. ఈ తెగులును వ్యాపింపజేసే తామర పురుగులను నివారించుటకు మెటాసిస్టాక్స్ 2 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్. 0.4 మి.లీ. లేదా థయామిథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి. అను మందును 0.20 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి 30 మరియు 45 రోజులు పంట కాలంలో పిచికారి చేసి నివారించుకోవచ్చు.

ఆకు ముడత (లీఫ్ కర్ల్) : ఈ తెగులు వైరస్ వలన వచ్చును. ఈ తెగులు రబీలో సాగు చేసే ప్రొద్దుతిరుగుడు పంటను ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపరచును. సాధారణంగా ఈ తెగులు శాఖీయ దశ, మొగ్గ తొడిగే దశ మరియు పూత దశలలో వస్తుంది. ఈ తెగులు సోకినట్లయితే తొలిదశలలో మొక్కల ఎదుగుదల తగ్గి, సన్నగా ఉండి గిడసబారి ఉంటాయి. ఈ మొక్కలలో పువ్వు పరిమాణం బాగా చిన్నదిగా ఉండి, గింజలు తయారుకావు. తరువాత దశలలో అనగా మొగ్గ తొడిగే దశ మరియు పూత దశలలో కనుక తెగులు సోకినట్లయితే మొక్కల ఆకులు దళసరిగా ఉండి ముడుచుకుపోవటం గమనించవచ్చు. కొన్ని సార్లు పత్రాలలో ఈనెలు ఉబ్బి, వంకర టింకరగా కూడా ఉండును. తెగులు ఉధృతి కొనసాగినపుడు మొక్కలు గిడసబారి గుబురుగా కనిపించును. కొన్ని సార్లు పువ్వు కూడా ముడుచుకుపోయి గింజలు ఏర్పడక దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. కొన్ని మొక్కలలో పైన ఉన్న ఆకులు (4-5) చిన్నవిగా తయారయి ముడుచుకుపోవును. పంట తరువాత దశలో కనుక ఈ వ్యాధి సోకినట్లయితే తెగులు ప్రభావం దిగుబడి మీద అంతగా కనిపించదు.

ఈ తెగులు వైరస్ కారకం కావున తెల్లదోమ ద్వారా ఒక మొక్క నుండి ఇంకొక మొక్కకు వ్యాపిస్తుంది. దీని నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 5 గ్రా. ఒక కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. దీని వలన మొక్కలకు తొలిదశలో రసం పీల్చు పురుగుల బారి నుండి కాపాడవచ్చును. అంతేగాకుండా తెల్లదోమ ఉధృతిని తగ్గించడానికి పైరు మీద డైఫెన్‌థ్యూరాన్ 50 డబ్ల్యు.పి. 1.25 గ్రా. లేదా ఫ్లోనికమైడ్ 0.3 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 15 రోజులకు ఒకసారి 2-3 సార్లు పిచికారి చేయవలెను. వీలైనంత వరకు ప్రొద్దుతిరుగుడు పంటను ప్రత్తి పంటకు దగ్గరగా వేయకపోవడం మంచిది.

బూడిద తెగులు : ఆకులపైన మరియు ఆకుల అడుగు భాగాన బూడిద లాంటి పొడితో కప్పబడి ఉంటుంది. తేమ తక్కువగా వుండే పొడి వాతావరణంలో తెగులు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. తీవ్రత ఎక్కువైతే ఆకులు పచ్చబడి రాలిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 3 గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకం పొడి లేక 1 మి.లీ. డినోక్యాప్ లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1 మి.లీ. లేదా డైఫెన్‌కొనజోల్ 0.5 గ్రా. పిచికారి చేయాలి. 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి.

తుప్పు తెగులు : చలికాలంలో ఈ తెగులు తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. ఈ తెగులు మొదట ఆకులపై చిన్న ఇటుక వర్ణపు పొక్కులుగా ఏర్పడి, తర్వాత పై ఆకులకు, పువ్వులోని పచ్చని భాగాలకు వ్యాపించి ఎరుపు రంగుకు మారి ఎండిపోతుంది. ఈ తెగులు నివారణకు పంట అవశేషాలు మరియు శిలీంధ్రానికి ఆశ్రయమిచ్చే ఇతర కలుపు మొక్కల నిర్మూలన చేయాలి.

బూజు తెగులు : ఈ తెగులు సోకిన ఆకుల మధ్య ఈనె వెంట పత్రహరితం కోల్పోయి, ఈనెలు ఉబ్బి ఆకులు క్రిందకు ముడుచుకొని ఉంటాయి. ఇటువంటి ఆకుల అడుగు భాగాన తెల్లని బూజు లాంటి శిలీంధ్రపు పెరుగుదలను గమనించవచ్చు. పంట మార్పిడి, పంట అవశేషాల నిర్మూలన, మెటలాక్సిల్ 35 డబ్ల్యు. ఎస్ 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తనశుద్ధి మరియు మెటలాక్సిల్ 8% ఎమ్.జడ్ + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు.పి. 2 గ్రా. లేక కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 50% డబ్ల్యు.పి. 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసి ఈ తెగులును అరికట్టవచ్చు.

పక్షుల బెడద : ఈ పంటకు ముఖ్యంగా రామచిలుకల బెడద ఎక్కువ. వీటి నివారణకు పైరును పెద్ద కమతాలలో వేయాలి. మెరుపు రిబ్బనులను పైరుపైన అడుగు ఎత్తున సూర్యరశ్మి రిబ్బనుపై పడేటట్లు ఉత్తర మరియు దక్షిణ దిశగా కట్టాలి. శబ్దం చేయడం వలన గాని, దిష్టి బొమ్మలను ఉపయోగించి కాని పక్షులను పారద్రోలాలి.

పైరుకోత : పువ్వు వెనుకభాగం నిమ్మ పచ్చ రంగుకి మారిన తరువాత పువ్వులను కోసి వాటిని 2–3 రోజులపాటు ఆరనివ్వాలి. కర్రలతో కొట్టి గాని, వలిచిగాని విత్తనాన్ని వేరు చేయాలి. విద్యుత్ ద్వారా నడిచే నూర్పిడి యంత్రాలను ఉపయోగించి విత్తనాన్ని వేరుచేసుకోవచ్చు. గింజలలో తేమ 9–10% వచ్చేవరకు ఎండబెట్టాలి.

దిగుబడి : ఎకరాకు సుమారు వర్షాధారం క్రింద 400 కిలోలు, నిశ్చిత వర్షపాత పరిస్థితులలో 400–600 కిలోలు, శీతాకాలం లేదా వేసవిలో నీటిపారుదల క్రింద 800–1000 కిలోలు దిగుబడిని సాధించవచ్చు.

ప్రొద్దు తిరుగుడు సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (నూనెగింజలు), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి–515 591,

అనంతపురం జిల్లా, ఫోన్ నెం. 08494–295001, 99896 25217

ఆముదం

ఆముదము సాగు విస్తీర్ణం (10.30 లక్షల హెక్టార్ల) మరియు ఉత్పత్తిలో (18.79 లక్షల టన్నులు) ప్రపంచంలో మన దేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఈ పంట మన రాష్ట్రంలో సుమారు 0.66 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేస్తూ, 0.20 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తితో హెక్టారుకు 302 కిలోల దిగుబడి వస్తుంది (ఇండియాస్టాట్, 2022-23). ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోని ఆముదము విస్తీర్ణంలో 3 వ స్థానం, ఉత్పత్తిలో 5 వ స్థానం, ఉత్పాదకతలో 14 వ స్థానంలో ఉన్నది. మన రాష్ట్రంలో ఆముదమును చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులు పూర్తిగా వర్షాధార పంటగా సాగు చేయటం వలన, సమయానికి వర్షాలు రాక తరచుగా బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడటం మరియు పూత, కాయ దశలలో అధిక వర్షాల వలన బూజు తెగులు రావటం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఈ పంటను అనంతపురము, శ్రీ సత్యసాయి, నంద్యాల మరియ కర్నూలు జిల్లాల్లో విస్తారంగానూ, ప్రకాశం జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా పండిస్తున్నప్పటికీ, అన్ని జిల్లాల్లోనూ ప్రత్యేకించి రబీలో ఈ పంటను ఆరుతడి పంటగా పండించటానికి చాలా అవకాశముంది. ఆముదము పంటకు జింకలు, అడవి పందులు మరియు పక్షుల బెడద లేకపోవటమే కాక విత్తనాన్ని నిల్వ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఎటువంటి పురుగులు ఆశించకపోవటం విశేషం.

ఆముదము ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక నూనె పంట. ఆముదము నూనెను వైమానిక రంగంలో, జెట్ మరియు రాకెట్ పరిశ్రమలలో లూబ్రికెంట్ గాను, పాలిష్‌లు, ఆయింట్‌మెంట్లు మరియు మందుల తయారీల్లోను, డీజిల్ పంపుసెట్లలో డీజిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగాను, సబ్బులు మరియు డిటర్జెంట్లు తయారు చేసే పరిశ్రమల్లో, రంగులు మరియు ముద్రణ పరిశ్రమల్లోను వాడుచున్నారు. నూనె తీయగా వచ్చిన చెక్కను మంచి సేంద్రియ ఎరువుగా వాడుచున్నారు. ఆముదము నుండి లభించే ఉత్పత్తులు మరియు ఉప ఉత్పత్తుల వలన భారత దేశానికి సాలీనా రూ. 3,500 కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం లభిస్తుంది. ఆముదపు ఆకులను ఎరి పట్టు పురుగులకు ఆహారంగా కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.

నేలలు : అన్ని రకాల నేలల్లో సాగు చేయవచ్చు. నీరు బాగా ఇంకే నేలలు అనుకూలం. చవుడు నేలల్లో మరియు నీరు నిలువ ఉండే నేలల్లో పండించరాదు.

నేల తయారీ : వేసవిలో రెండు, మూడు సార్లు కల్టివేటర్ లేదా డిస్క్ నాగలితో దున్ని గుంటకతో చదును చేయాలి. విత్తే దూరాన్ని బట్టి పొలానికి ఇరువైపులా మార్కర్ నడిపించి అచ్చు వేయాలి.

విత్తనశుద్ధి : కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. థైరామ్ / కాప్టాన్ లేదా 2 గ్రా. సాఫ్ పొడి మందును లేదా 10 గ్రా. ట్రైకోడెర్మా విరిడి లేదా 10 గ్రా. ట్రైకోడెర్మా హరిజియానమ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. ఇలా చేయటం వలన మొలక కుళ్ళు తెగులు (ఫైటోప్తోరా బ్లైట్), అల్టేర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగులు మరియు కొంతవరకు వడలు తెగులును అరికట్టవచ్చు. వడలు తెగులు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా 10 గ్రా. ట్రైకోడెర్మా విరిడితో విత్తనశుద్ధి చేయాలి లేదా ఒక కిలో ట్రైకోడెర్మా హరిజియానమ్ పొడి మందును 90 కిలోల పశువుల ఎరువు మరియు 10 కిలోల వేప పిండితో వారం రోజుల పాటు నీడలో మగ్గిచ్చి వృద్ధి చేసి విత్తనం వేసే పొలంలో ఆఖరి దుక్కిలో చల్లుకోవాలి.

విత్తే దూరం మరియు విత్తన మోతాదు :

పరిస్థితులు	రకాలు/సంకర రకాలు	విత్తన మోతాదు (కి./ఎ.)	విత్తేదూరం (సెం.మీ.)
ఖరీఫ్			
బరువైన నేలలు, అధిక వర్షపాతం	అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు	2–2.5	90×60
	సంకర రకాలు	2.0	90×60
తేలిక నేలలు, తక్కువ వర్షపాతం	అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు	4.0	90×45
	సంకర రకాలు	2–2.5	90×60
రబీ (నీటి పారుదల క్రింద)			
సారవంతమైన నేలలు	సంకర రకాలు	2.0	120×90
తేలిక నేలలు	సంకర రకాలు	2.0	120×45

విత్తే సమయం మరియు పద్ధతి : ఖరీఫ్‌లో మే చివరి వారం నుండి జూలై 31 వరకు తొలకరి వర్షాలకు విత్తాలి. జూలై తర్వాత ఆముదము ఏక పంటగా వేయాలి. 90×60 సెం.మీ. కనీస దూరం పాటించాలి. ఆగష్టు తర్వాత 60×45 సెం.మీ. లేదా 60×30 సెం.మీ. కనీస దూరంలో వేయవచ్చు. నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్–అక్టోబర్‌లో విత్తుకోవచ్చు. కానీ అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఆముదంను విత్తుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ దిగుబడిని పొందవచ్చు.

ఎద్దుల వెంట గొర్రుతో విత్తటం, బోదెల మీద చేతితో విత్తటం మామూలు పద్ధతి. అనంత విత్తు పరికరంతో ఆముదము విత్తవచ్చు. తక్కువ సమయంలో అధిక విస్తీర్ణంలో విత్తవచ్చు. మొక్కలు మొలిచిన 20 రోజులకు 6 సాళ్ళకు ఒక మడక సాలు లేదా చివరి అంతరకృషి తర్వాత బోదెలు మరియు కాలువలను వేసుకున్నట్లయితే తేమ మరియు మట్టి సంరక్షణ జరుగుతుంది.

రకాలు :

రకం	విడుదల సంవత్సరం	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ) వర్షాధారంగా	గుణగణాలు
సూటి రకాలు				
హరిత	2002	130-150	5.5-6.5	ఎండు తెగులు, నీటి ఎద్దడిని బాగా తట్టుకొంటుంది.
జ్వాల	2007	90-180	4.0-5.0	ఎండు తెగులును మరియు కొంత వరకు బూజు తెగులును, ఉప్పదనమును కూడా తట్టుకుంటుంది.
డి.సి.ఎస్. 107	2011	100-150	5.0-5.5	అధిక వంద గింజల బరువు మరియు ఎండు తెగులును బాగా తట్టుకొంటుంది.
ప్రగతి	2015	120-140	6.0-7.0	ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది. త్వరగా కోతకు వస్తుంది.
సంకర రకాలు				
డి.సి.హెచ్. 177	2000	90-180	6.0-7.5	బెట్టను తట్టుకుంటుంది. ఎండు తెగులును బాగా తట్టుకుంటుంది.
డి.సి.హెచ్. 519	2006	90-180	6.0-7.5	ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
పి.సి.హెచ్. 111	2012	90-180	7.0-8.0	ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
పి.సి.హెచ్. 222	2012	90-170	7.0-8.0	ఎండు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
జి.సి.హెచ్. 8	2018	95-180	7.0-8.0	ఎండు తెగులును, వేరుకుళ్ళును మరియు పచ్చదోమను తట్టుకుంటుంది.
ఐ.సి.హెచ్. 66	2019	90-180	7.0-9.0	ఎండు తెగులును మరియు బెట్టను తట్టుకుంటుంది.
ఐ.సి.హెచ్. 5	2022	90-180	7.0-9.0	ఎండు తెగులును మరియు వేరుకుళ్ళును తట్టుకొంటుంది.

పై రకాలన్నీ ఖరీఫ్ మరియు రబీ కాలాలకు అనుకూలం. అయినప్పటికీ రబీ కాలంలో నీటిపారుదల క్రింద సాగు చేసేటప్పుడు హైబ్రిడ్ రకాలను వేసుకొని అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు. హరిత, ప్రగతి రకాలను మరియు పి.సి.హెచ్ 111, పి.సి.హెచ్. 222 అను హైబ్రిడ్‌లను ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పాలెం నుండి పొందవచ్చు. జ్వాల, డి.సి.హెచ్. 107 రకాలను మరియు డి.సి.హెచ్. 519, డి.సి.హెచ్.177, ఐ.సి.హెచ్ 66 మరియు ఐ.సి.హెచ్. 5 సంకర రకాలను అఖిల భారత నూనె గింజల పరిశోధనా సంస్థ, రాజేంద్ర నగర్, హైదరాబాద్ నుండి పొందవచ్చు.

అంతర పంటలు : ఆముదములో అంతర పంటలుగా వేరుశనగ 1:5 నిష్పత్తిలో, ఆముదము + సజ్జ / జొన్న / గోరు చిక్కుడు / అలసంద (1:2), ఆముదము మరియు కంది 1:1 లేదా 1:5 నిష్పత్తిలో వేయవచ్చు.

పంటల సరళి : ఆముదము–వేరుశనగ, ఆముదము–నువ్వులు, ఆముదము–ప్రొద్దుతిరుగుడు, ఆముదము – ఉలవ పంటలతో అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చును.

పోగుంతలు మరియు ఒత్తు మొక్కలు పీకి వేయుట : విత్తిన 7–10 రోజులలో మొలక వస్తుంది. విత్తిన 15–20 రోజులకు కణుపుకు ఒకే మొక్క ఉండే విధంగా ఒత్తు మొక్కలను పీకి వేయాలి. అదే సమయంలో విత్తనం మొలవని చోట కొత్త గింజను విత్తుకోవాలి.

ఆముదములో తలలు త్రుంచుట : నీటి వసతి ఉన్న సారవంతమైన భూముల్లో ఆముదము మొక్క తలను చేతితో కాని, కత్తితో గాని ఒక మొగ్గను ఉంచి మిగిలిన కొమ్మలను త్రుంచుట వలన మొగ్గ బాగా పెరుగుతుంది. మొదటిసారి ఆముదము విత్తిన 45–50 రోజులకు మొదటి కొమ్మను ఉంచి మిగిలిన కొమ్మలను తీసివేయాలి. వారం తర్వాత రెండవ కొమ్మ, రెండవ గెలను ఉంచి మిగిలిన కొమ్మలను తీసివేయాలి. విడతలుగా 5–6 గెలలుంచి మిగిలినవి తీసివేయాలి. దీని వలన అనవసర కొమ్మల పెరుగుదలను ఆపి, కణుపుల మధ్య దూరం తగ్గి మొక్క ఎత్తు తగ్గుతుంది. గెల పొడవు, గింజ లావుగా వుండి తూకము ఎక్కువగా రావటానికి అవకాశం ఉంది. పంట కాలం తగ్గుతుంది. దాదాపు 40 రోజుల వరకు తగ్గుతుంది. మొక్క ఎత్తు తక్కువగా ఉంటే పిచికారి సులువుగా చేయవచ్చు.

ఎరువుల యాజమాన్యం : ఎకరానికి 2 టన్నుల పశువుల ఎరువును దుక్కిలో వేసి కలియ దున్నాలి. రకాలను సాగు చేసేటప్పుడు, 12 కిలోల నత్రజని, 16 కిలోల భాస్వరం మరియు 12 కిలోల పొటాషియం ఇచ్చే ఎరువులను విత్తేటప్పుడు వేసుకోవాలి. పై పాటుగా 6 కిలోల నత్రజనిని విత్తిన 30–35 రోజులకు, మిగిలిన 6 కిలోల నత్రజనిని విత్తిన 60–65 రోజులకు వేసుకోవాలి. సంకర రకాలు సాగు చేసేటప్పుడు అదనంగా మరొక 6 కిలోల నత్రజనిని విత్తిన 90–95 రోజులకు వేసుకోవాలి.

ఫర్టిగేషన్ : ఎకరా ఆముదానికి 1.08 కిలోల మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, 2.41 కిలోల యూరియా మరియు 1 కిలో సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్‌ను 6 రోజుల వ్యవధిలో విత్తిన 30 రోజుల వరకు 6 దఫాలుగా, 30 నుండి 90 రోజుల పంట కాలంలో 12 దఫాలుగా మరియు 90 రోజుల నుండి 120 రోజుల పంట కాలంలో 6 దఫాలుగా

డ్రిప్పు ద్వారా నీటిలో కరిగే ఎరువుల రూపంలో ఇవ్వాలి. రెండు గంటలు నీరు ఇచ్చిన తరువాత ఎరువులను పంపి అరగంట నీటిని ఇస్తే ఎరువులు బాగా ఉపయోగపడతాయి.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : విత్తిన 40–60 రోజుల వరకు పంటలో కలుపు లేకుండా చూడాలి. పెండిమిథాలిన్ (30%) 1.8 నుండి 1.6 లీ. లేదా అలాక్లోర్ (50%) తేలిక నేలల్లో 800 మి.లీ., బరువు నేలల్లో 1.0 లీటరు చొప్పున విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజునగాని పిచికారి చేయాలి. ఫినాక్సిఫాప్ ఇథైల్ / క్విజలోఫాప్ ఇథైల్/ ప్రొపాక్విజోఫాప్ ఇథైల్ లేదా సైహలో ఫాప్ పి బ్యుటైల్ 1.25 మి.లీ. / లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసి గడ్డి జాతి కలుపును నివారించవచ్చు. తర్వాత దశలలో వచ్చే కలుపును గుంటక లేదా గొర్రుతో అంతరకృషి చేసి నివారించవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యం : ఖరీఫ్‌లో ఆముదమును వర్షాధారంగా పండిస్తారు. అయితే బెట్ట పరిస్థితుల్లో, నీటి వసతి వున్న ప్రాంతాలలో 1–2 తడులను స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా ఇస్తే 15–20% దిగుబడి పెరుగుతుంది. డ్రిప్పు పద్ధతిలో లేటరల్‌కు లేటరల్‌కు మధ్య 90 సెం.మీ. దూరము, డ్రిప్పుకు డ్రిప్పుకు మధ్య దూరము 60 సెం.మీ., 4 లీ. డిశ్చార్జి గల డ్రిప్పులు వాడి 2 $^{1}/_{2}$–3 గంటలు మూడు రోజులకొకసారి నీటిని ఇస్తే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చును.

రబీ ఆముదమును దమ్ము చేసిన దుక్కిలో నేరుగా విత్తిన తర్వాత నీరు ఇవ్వాలి. నేల రకం మరియు పంట ఎదుగుదల, ఉష్ణోగ్రత ఆధారంగా నీటి తడులు ఇవ్వాలి. అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నీటిని 12–15 రోజులకు ఒకసారి ఇవ్వాలి. జనవరి నెల నుండి పెరిగే ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో పెట్టుకుని 8–10 రోజుల వ్యవధిలో నీరు ఇవ్వాలి. బోదెలు మరియు కాలువల ద్వారా నీరు ఇవ్వడం వల్ల నీరు వృధా కాకుండ ఉంటుంది. మొక్కలు పుష్పించే దశ మరియు కాయ ఊరే దశల్లో నీటి ఎద్దడి రాకుండా చూడాలి.

దిగుబడి : ఖరీఫ్‌లో ఆముదము పండించినప్పుడు ఎకరాకు 4–6 క్వి. దిగుబడి వస్తుంది. అదే రబీలో సంకర రకాలను వేసి మంచి యాజమాన్య పద్ధతులను పాటిస్తే, ఎకరాకు 10–12 క్వి. దిగుబడి వస్తుంది.

సస్యరక్షణ :

పురుగులు :

ఎర్రగొంగళి పురుగు : ఈ పురుగు ఉధృతి జూన్–జూలై మాసాల్లో పైరు మొలచిన వెంటనే అధికంగా ఉంటుంది. గొంగళి పురుగులు ఆకుల కాడలను, ఈనెలను, లేత కొమ్మలను మాత్రమే మిగుల్చుతాయి.

సమగ్ర యాజమాన్యం : వేసవిలో భూమిని లోతుగా (15–80 సెం.మీ.) దున్నుకోవాలి. లోతు దుక్కులు చేయడం వలన కోశస్థ దశలో భూమి లోపలి పొరల్లో దాగున్న ఎర్ర గొంగళి పురుగు, శనగ పచ్చ పురుగు, పొగాకు లద్దె పురుగు మరియు వేరు పురుగులు బయటపడి ఎండ తీవ్రతకు గాని, పక్షుల బారినపడి గాని చనిపోతాయి. భూమి తేమను నిలుపుకొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటుంది. కలుపు సమస్య తగ్గుతుంది మరియు పంటను సకాలంలో విత్తుకోవచ్చును. ఆముదానికి ముందుగా, పొలం గట్లపైన అక్కడక్కడా దోస నాటడం వల్ల

ఎరగా ఉపయోగపడుతుంది. తొలకరి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు, రాత్రి 7–00 నుండి 10–00 గంటల సమయంలో రైతులందరు సామూహికంగా మంటలు పెట్టడం ద్వారా మరియు దీపపు ఎరలను అమర్చడం ద్వారా రెక్కల పురుగులను అరికట్టవచ్చు. ఎదిగిన గొంగళి పురుగులు ఒక పొలం నుండి వేరొక పొలంలోకి పోకుండా పొలం చుట్టూ లోతైన నాగటి చాలును తీసి అందులో మిథైల్ పెరాథియాన్ 2% లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ 1.5% పొడి మందును (ఒక కిలో పొడి మందు 70 మీటర్ల నాగటి సాలులో) చల్లి పురుగులను నివారించవచ్చు. ఎదిగిన గొంగళి పురుగుల నివారణకు మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయోట్ 2.0 మి.లీ. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 0.2 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫోస్ 2 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

దాసరి పురుగు / నామాల పురుగు : ఈ పురుగు ఆగష్టు, సెప్టెంబర్ మరియు అక్టోబర్ మాసాల్లో తీవ్ర నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది. లద్దె పురుగులు తొలి దశలో ఆకులను గీకి తర్వాత దశలో రంధ్రాలేర్పరిచి ఆకులను తింటాయి. పెరిగిన లద్దె పురుగులు భూమిలో గాని, క్రింద పడిన ఎండిన ఆకులలో గాని లేదా ముడుచుకొన్న ఆకులలో గాని కోశస్థ దశలోకి ప్రవేశిస్తాయి.

సమగ్ర యాజమాన్యం : ఆగష్టు మరియు సెప్టెంబరు మాసాల్లో ఎకరాకు 50,000 ట్రైకోగ్రామా పరాన్న జీవులను వదిలి దాసరి పురుగు ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు. ఆగష్టు, సెప్టెంబరు మరియు నవంబరు మాసాల్లో లద్దె పురుగును మైక్రోప్లైటిస్ మాక్యులిపెన్నిస్ మరియు యూప్లెక్టస్ మాటర్నస్ అను పరాన్న జీవులు ఎక్కువగా ఆశించి లద్దె పురుగులను అదుపులో ఉంచుతాయి. దాసరి పురుగు మొదటి దశలో అవసరమైతే పరాన్న జీవులకు హాని చేయని వేపనూనె 5 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా నొవాల్యురాన్ 1 మి.లీ. లేదా థయోడికార్బ్ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి దాసరి పురుగును అరికట్టవచ్చు. దాసరి పురుగులు పెద్దవిగా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఏరి నాశనం చేయాలి. పొలంలో ఎకరాకు 10 పక్షి స్థావరాలను పక్షులు వాలేందుకు వీలుగా అమర్చినట్లయితే పొలంలోకి పక్షులు వచ్చి పురుగులను ఏరి తింటాయి. పంట పూర్తిగా కోసిన తర్వాత పొలంలోని చెత్తను కాల్చినట్లయితే కోశస్థ దశలోని దాసరి పురుగును నివారించవచ్చును. పురుగులు పెరిగేకొద్ది ఒకొక్క పురుగు విడిపోయి ఆకులపై రంధ్రాలను చేసి ఈనెలను మాత్రమే మిగుల్చుతాయి.

పొగాకు లద్దె పురుగు : పొగాకు లద్దెపురుగు ఆగష్టు మాసం నుండి ఆశించి, అక్టోబర్ మరియు నవంబర్ మాసాల్లో తీవ్ర నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది. తొలి దశలో గుంపులుగా ఆకుల క్రింది భాగంలో చేరి పత్రహరితాన్ని గీకి తింటాయి. తర్వాత దశలో ఆకులపై రంధ్రాలేర్పరిచి జల్లెడాకులుగా మారుస్తాయి. పురుగులు పెరిగే కొద్ది ఒక్కొక్క పురుగు విడిపోయి ఆకులపై రంధ్రాలను చేసి ఈనెలను మాత్రమే మిగుల్చుతాయి.

సమగ్ర యాజమాన్యం : వేసవిలో నేలను లోతుగా దున్నుకోవాలి. గుడ్ల సముదాయాలను మరియు లద్దె పురుగులున్న జల్లెడాకులను ఏరి నాశనం చేయాలి. ఎకరాకు 4 లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చాలి. తొలి దశలో లద్దె పురుగుల నివారణకు వేపనూనె 5 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయవలెను. పురుగు మధ్యస్థ దశలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ గాఢత కల్గిన ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా

థయోడికార్బ్ 1.5 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 0.2 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయవలెను. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇండాక్సాకార్బ్ 1 మి.లీ. లేదా నొవాల్యురాన్ 1 మి.లీ. లేదా లూఫెన్యురాన్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఎదిగిన లద్దె పురుగుల నివారణకు 5 కిలోల తవుడు, 1/2 కిలో బెల్లం, 500 మి.లీ. మోనోక్రోటోఫాస్ లేదా 500 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లేదా 500 గ్రా. కార్బరిల్‌లను తగినంత నీటిలో కలిపి చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసి, సాయంకాలం పొలంలో అక్కడక్కడ చల్లడం ద్వారా అదుపు చేయవచ్చు.

కొమ్మ మరియు కాయ తొలిచే పురుగు : ఈ పురుగు ఉధృతి పంట పుష్పించే దశ నుండి మొదలై పంట పూర్తి కాలం వరకు ఉంటుంది. తొలిదశలో పురుగు కొమ్మలపై మరియు కాయలపై ఉన్న పత్రహరితాన్ని గీకి తింటుంది. పుష్పించే దశలో కొమ్మలోకి పోవడంవల్ల కొమ్మ ఎండిపోతుంది. తర్వాత దశల్లో కాయలోకి చొచ్చుకొనిపోయి కాయలను నష్టపరుస్తుంది. లార్వా పాలిపోయిన పచ్చ రంగులో ఉండి వీపుపైన గులాబి రంగు కలిగి, కణుపుల వద్ద చిన్న వెంట్రుకలు ఉంటాయి. రెక్కల పురుగులు పసుపు వర్ణం కలిగి రెక్కల పైన నల్లని మచ్చలు కలిగి ఉంటాయి. దీని నివారణకు పూత దశలో ఒకసారి మరియు 20 రోజులకు మరొకసారి ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా ఇండాక్సాకార్బ్ 1 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 1 మి.లీ. లేదా స్పైనోసాడ్ 0.4 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పచ్చ దీపపు పురుగులు లేదా పచ్చదోమ : ఈ పురుగుల ఉధృతి నవంబరు నుండి జనవరి వరకు ఉంటుంది. పిల్ల మరియు తల్లి పురుగులు ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చి తీవ్ర నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి. తర్వాత దశలో ఆకులు పసుపు వర్ణంలోకి మారి మాడిపోతాయి. పిల్ల, తల్లి పురుగులు పాలిపోయిన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి ఆకుల అడుగు భాగాన ప్రక్కకు నడుస్తూ కనిపిస్తాయి. దీని నివారణకు తొలి దశలో వేపనూనె 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లీటరు నీటికి మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 1 మి.లీ. లేదా క్లోథయానిడిన్ 0.1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి ఆకుల అడుగుభాగం బాగా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.

తెల్ల దోమ : వీటి ఉధృతి జనవరి నుండి మార్చి వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్ల మరియు పెద్ద పురుగులు ఆకుల నుండి రసం పీల్చటం వల్ల ఆకులు మసిబారినట్లుగా మారుతాయి.

నివారణ : సాళీల్లు, అక్షింతల పురుగులు తెల్లదోమ పురుగులను మరియు గుడ్లను తింటాయి. కావున ఇవి ఉన్నపుడు మందులను పిచికారి చేయరాదు. తొలి దశల్లో మిత్ర పురుగులకు హాని చేయని వేపనూనె (5 మి.లీ./ లీటరు నీటికి) పిచికారి చేయాలి. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైఫెన్‌థియురాన్ 1 గ్రా. లేదా బుప్రొఫెజిన్ 1.5 మి.లీ. లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసి వీటిని నివారించవచ్చు.

తామర పురుగులు : పంట కాలంలోని అన్ని దశలలోనూ తామర పురుగులు ఆశించి పంటను నష్టపరచగలవు. తామర పురుగులు లేత ఆకులను మరియు పూవ్వులను గీకి రసం పీల్చటం వలన ఆకులు ముడుచుకొనిపోతాయి. పూవులు ఎండిపోయి ఆముదపు కంకిలో కాయలు ఏర్పడవు.

నివారణ : పచ్చదోమ మరియు తామర పురుగులను తట్టుకోగల ట్రిపుల్ బ్లూమ్ రకాలైన డి.సి.హెచ్. 519, ఐ.సి.హెచ్ 66, జి.సి.హెచ్. 4 హైబ్రిడ్ లను సాగు చేసుకోవటం ద్వారా అధిగమించవచ్చును. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మోనోక్రొటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 1 మి.లీ. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా క్లోథయోనిడిన్ 0.1 గ్రా. లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 0.2 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకు తొలిచే పురుగు : ఈ పురుగు ఉధృతి ఆగష్టు మాసం నుండి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది. పిల్ల పురుగు పసుపు వర్ణం కలిగి ఉంటుంది. రెక్కల పురుగు చిన్న ఈగ మాదిరిగా వుండి లేత ఆకులపై గ్రుడ్లను పెడుతుంది. తొలి దశలో పిల్ల పురుగులు ఆకు పొరలలోనికి పోయి సొరంగాలుగా తొలిచి ఆకులను తింటుంది. దీనినే పాముపొడ తెగులు అంటారు. ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆకులు పూర్తిగా ఎండి రాలిపోతాయి. తొలి దశలో ఆకులపై పురుగు ఉధృతి గమనించగానే వేపనూనెను (5 మి.లీ./లీటరు నీటికి) పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు :

వడలు తెగులు/ఎండుతెగులు : ఈ తెగులు పంట విత్తిన 20-60 రోజుల మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశముంది. లేత దశలో తెగులు సోకినట్లయితే మొక్కలు వడలిపోయి, బీజ పత్రాలు రంగును కోల్పోయి, పాలిపోయి తర్వాత మొక్కలు చనిపోతాయి. కాని కాస్త పెద్ద మొక్కలకు సోకినట్లైతే, లేత ఆకులు ముందుగా వడలిపోయి, క్రమేపి పసుపు వర్ణానికి మారి తర్వాత ఎండిపోతాయి. కాండం చీల్చి చూస్తే లోపల తెల్లని బూజులాంటి శిలీంధ్రపు పెరుగుదలను గమనించవచ్చు.

నివారణ : నీరు నిలిచే నేలల్లో మరియు పల్లపు ప్రాంతాల్లో ఆముదం సాగు చేయరాదు. కనీసం 2-3 సంవత్సరాల కొకసారి జొన్న/సజ్జలతో పంట మార్చిడి చేయాలి. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. కార్బండెజిమ్ లేదా ట్రైకోడెర్మా విరిడి 10 గ్రా. లేదా సాఫ్ 2 గ్రా. కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి. ఒక ఎకరంలో ఉపయోగించుటకు గాను 125 కిలోల బాగా మాగిన పశువుల ఎరువుకు 2.50 కిలోల ట్రైకోడెర్మా పొడి మందు మరియు 2.0 కిలోల వేపపిండి కలిపి, గోనె సంచితో కప్పి ప్రతి 2-3 రోజులకు ఒకసారి నీరు చిలకరిస్తూ ఉండాలి. 15 రోజుల తరువాత ఈ ఎరువును విత్తేముందు నేలపై చాళ్ళలో వేసుకోవాలి. తెగులును తట్టుకునే వంగడాలైన హరిత, జ్యోతి, పి.సి.హెచ్. -111, పి.సి.హెచ్.-222, డి.సి.హెచ్.-177, ఐ.సి.హెచ్.-66, ఐ.సి.హెచ్.-5 లాంటి రకాలను ఎన్నుకొని విత్తుకోవాలి. తెగులు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా. లేదా కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటిలో కలిపి మొక్కల మొదళ్ళ దగ్గర భూమిని తడపాలి. తెగులు సోకి చనిపోయిన మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు పొలం నుండి తొలగించి నాశనం చేయాలి.

కాయకుళ్ళు / బూజు తెగులు : ఈ తెగులు వల్ల ముఖ్యంగా గెలపైన లేదా కొన్ని కాయలపైన గోధుమ రంగు మచ్చలేర్పడి, తర్వాత ఈ వ్యాధి అన్ని కాయలకు వ్యాపిస్తుంది. తెగులు సోకిన భాగాలపైన దూది పింజ లాంటి బూడిద లేదా గోధుమ వర్ణపు శిలీంధ్రపు పెరుగుదల కన్పిస్తుంది. శిలీంధ్రపు బీజాలు గాలి ద్వారా ఒక మొక్క నుండి మరొక మొక్కకు వ్యాపిస్తాయి. తెగులు సోకిన కాయలు మెత్తబడి, కుళ్ళి రాలిపోతాయి. గెలపై ఉన్న పూలపై శిలీంధ్రం ఆశించటం వలన కాయలు తయారుకాకుండా నల్లగా మారిపోతాయి. ఆముదం మొక్క గెలవేసే సమయంలో గాలిలో తేమ 90% పైన ఉండి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 22^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కన్న తక్కువగా ఉండి, తుఫాను వల్ల ఎడ తెరపి లేకుండా 5-6 రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నపుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

నివారణ : పొలంలో మొక్కల మధ్య సరియైన దూరం ఉండాలి. మరీ దగ్గరగా విత్తరాదు. పంటను ఆలస్యంగా కాకుండా సకాలంలో విత్తుకోవాలి. తెగులును పూర్తిగా తట్టుకునే వంగడాలు లేవు కనుక కొంతవరకు తట్టుకునే రకాలైన జ్వాల మరియు కిరణ్ రకాలను విత్తుకోవాలి. తుఫాను సూచనలు తెలిసిన వెంటనే వర్షానికి కనీసం 6-8 గంటల ముందు లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండెజిమ్‌ను లేదా 1 గ్రా. థయోఫెనేట్ మిథైల్‌ను కలిపి మొక్క అన్ని భాగాలు తడిసేలా పిచికారి చేయాలి. వర్షాలు తగ్గాక మళ్ళీ 6-8 గంటలలోపు మరొకసారి కార్బండెజిమ్‌తో పిచికారి చేయాలి. తెగులు సోకిన కాయలను, గెలలను కోసి పొలానికి దూరంగా వేసి తగులబెట్టి దీని వ్యాప్తిని అరికట్టాలి. వర్షాలు తగ్గిన తర్వాత నేలలో తేమ ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 20 కిలోల యూరియా మరియు 10 కిలోల పొటాష్ ఎరువులను అదనంగా పై పాటుగా వేసినట్లైతే తర్వాత వచ్చే గెలలు బాగా వచ్చి, నష్టాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకునే వీలు కుదురుతుంది.

మొలక కుళ్ళు తెగులు లేదా ఫైటాఫ్తోరా బ్లైట్ : ఈ వ్యాధి పైటాఫ్తోరా పారసైటికా అనే శిలీంధ్రము ద్వారా వస్తుంది. విత్తనం మొలకెత్తిన తర్వాత బీజ దళాలపై గుండ్రని ఆకుపచ్చ రంగు మచ్చలు కన్పిస్తాయి. తెగులు సోకిన ఆకులు వాడి కుళ్ళిపోయి మొక్కకు వ్రేలాడును. ముదురు ఆకులపైన పెద్ద పెద్ద మచ్చలు ఆకు చివరి నుండి తొడిమె వైపుకు వ్యాపించును. ఈ తెగులు కాండానికి కూడా వ్యాపించి మొక్కలు చనిపోవును. గాలిలో మరియు నేలలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆకుల అడుగు భాగాన తెల్లని శిలీంధ్రపు పెరుగుదలను గమనించవచ్చును.

నివారణ చర్యలు

1. నీరు నిలువ వుండే భూములలో ఆముదం పండించరాదు.
2. కిలో విత్తనానికి 3-4 గ్రా. చొప్పున థైరామ్ లేదా కాప్టాన్ లేదా 2 గ్రా. సాఫ్ మందు కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.
3. రాగి ధాతువు గల బ్లైటాక్స్ లేదా ఫైటోలాన్ 8 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పంటపై పిచికారి చేయాలి.

పంటకోత – నిల్వ : ఆముదపు పంట అంతా ఒకేసారి కోతకు రాదు, 3–4 సార్లు కాయలు కోయవలసి వస్తుంది. విత్తిన 90–95 రోజులకు మొదటి గెల కోతకు వస్తుంది. ఒక గెలలో 80 శాతం వరకు కాయలు ముదిరి, ఆకుపచ్చ రంగు నుండి లేత పసుపు రంగుకు మారినపుడు ఆ గెలను కోసుకోవాలి. గెలలను కోసి కుప్పగా పోసి టార్పాల్ కప్పి ఉంచాలి. రెండు రోజుల తర్వాత కాయలు విడిపోతాయి. కాయలను ఎండబెట్టి వేరుశనగ యంత్రంతోనే జల్లెడ మార్చుకొని నూర్చుకొనవచ్చును. కాయలను బాగా ఎండబెట్టి, తేలికైన కర్రలతో కొట్టి విత్తనాలను నూర్చుకోవాలి లేదా ఆముదపు నూర్పిడి యంత్రం (క్యాస్టర్ త్రెషర్) ను వాడినట్లయితే కూలీల సమస్యను అధిగమించి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కాయలను నూర్పిడి చేయవచ్చు. గింజల్లో 9–10% తేమ ఉండేటట్లు బాగా ఎండబెట్టి గోనె సంచుల్లో నిలువ ఉంచుకోవాలి.

తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడికి సూచనలు

1. నాణ్యత గల విత్తనాన్ని వాడాలి. 2. విత్తనశుద్ధి తప్పనిసరిగా చేయాలి. 3. ఎరువులను తగు మోతాదులో సరైన సమయంలో వేయాలి. 4. కీలక దశలలో వీలైతే నీరు పెట్టాలి. 5. సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను పాటించాలి. 6. సరైన సమయంలో కోయడం మరియు నూర్చుట చాలా ముఖ్యం.

ఆముదం సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (నూనెగింజలు), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి–515 591,
అనంతపురం జిల్లా, ఫోన్ నెం. 08494–295001, 99896 25217

వలిశెలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సాగుచేస్తున్న సాంప్రదాయమైన నూనెగింజ పంటలలో వలిశెలు కూడా ముఖ్యమైనది . ఈ పంటను అడుసులు లేదా వెర్రి నువ్వులు అని కూడా పిలుస్తారు. మన రాష్ట్రంలో ఈ పంట దాదాపు 1000 హెక్టార్లలో సాగు చేయబడుతూ, దాదాపు 6 వేల టన్నుల ఉత్పత్తినిస్తున్నది. సరాసరి దిగుబడి హెక్టారుకు 350-750 కిలోలు వస్తుంది. గింజలో నూనెశాతం 32-45 వరకు ఉంటుంది. ఈ పంట నూనెను కేవలం వంటలలోనే కాకుండా సబ్బులు, వార్నిష్లు, సౌందర్య సాధనాల తయారీలోనూ విరివిగా వాడతారు. నూనె తీయగా మిగిలిన పిండిని పశువుల దాణాగా మరియు ఎరువుగా కూడా వాడతారు. నూనె శాతంలో సుమారుగా 70 శాతానికి పైగా అసంతృప్తి కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉండటం వలన గుండె సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా అరికట్టవచ్చు. అగ్రి టూరిజంలో, అధిక పంటకాలం ఉన్న రకాల ద్వారా వ్యవసాయ పర్యాటకం ఆకర్షించి అధిక ఆదాయం పొందవచ్చు. వలిశ పంట నూనె జీవ ఇందనంగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపయోగిస్తారు. మన రాష్ట్రంలో ఈ పంటను ముఖ్యంగా విశాఖపట్టణం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పుగోదావరిలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మరియు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో సాగు చేస్తున్నారు.

ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంతాలకు అనువైన రకాలు :

సం.	రకము పేరు	కాల పరిమితి	దిగుబడి క్వి./ఎ.
1	జె.ఎన్.ఎస్. - 28	100-110	4-5
2	జె.ఎస్.ఎస్. - 30	100-110	4-5
3	జె.ఎన్.ఎస్. - 9	95-100	3.5-4.5
4	జె.ఎన్.ఎస్. - 6	110	3-4
5	కె.జి.యన్. -2	100-110	2-3
6	ఉత్కల్నైజర్-150	100-110	4-5

నేలలు : తేలికపాటి గరప నేలలు, కొండవాలు భూములు, పోడు నేలలు, తేమ నిల్వ ఉంచుకుని మురుగునీరు పోయే వసతి గల అన్ని రకాల నేలలు అనుకూలం.

నేల తయారీ : నేలను 2-3 సార్లు బాగా దున్ని మెత్తగా తయారుచేసి విత్తుకోవాలి.

విత్తటం : ఎకరాకు 2 కిలోల విత్తనం అవసరం. విత్తనమును 10 కిలోల ఇసుకతో కలిపి వెదజల్లి చెట్టు కొమ్మను నేలపై లాగి విత్తనాన్ని మట్టితో కలియబెడతారు. కానీ, వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 10 సెం.మీ దూరంతో విత్తితే, బంగారు తీగ వ్యాప్తి తగ్గి దిగుబడి అధికంగా ఉంటుంది.

విత్తు సమయం : ఆగస్టు రెండవ పక్షం నుండి సెప్టెంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తటానికి అనుకూలం. విత్తటం ఆలస్యం అయితే పూత, గింజకట్టు దశల్లో పైరు వర్షాభావానికి లోనై దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.

ఎరువులు : ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరానికి 2.5 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేయాలి. ఎకరానికి 16:8:8 కిలోల నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాషియం ఇచ్చే ఎరువులను పంట విత్తిన 15-20 రోజుల్లో వేసినట్లయితే ఎకరానికి సుమారు 80 కిలోల వరకు అదనంగా దిగుబడి వచ్చి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా

పంట మధ్యలో పూత సమయంలో తేనె పెట్టెలు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే పరపరాగ సంపర్కానికి దోహదపడి 20 నుండి 25 శాతం అధిక దిగుబడి మరియు తేనె ద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు.

కలుపు యాజమాన్యం : ఎకరాకు 400 గ్రా. ఎ.ఐ. ఫ్లూక్లోరాలిన్ మందును విత్తక ముందు లేదా విత్తిన 24 గంటల లోపు 1.3 లీటర్ల పెండిమిథాలిన్ ను నేలపై పిచికారి చేసినట్లయితే నేలలో ఉండి విత్తనం ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఆకాశ పందిరి (బంగారు తీగ) తో పాటు ఇతర కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు. విత్తిన 25–30 రోజుల వ్యవధిలో సైకిల్ వీడర్‌లు / చేతి దంతెలు ఉపయోగించి కూడా కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించవచ్చు.

బంగారు తీగ నిర్మూలన : బంగారు తీగ అనే సంపూర్ణ కాండ పరాన్నజీవి నాటిన నెల రోజుల్లో ఈ పంటను ఆశించి ఎక్కువగా నష్టపరుస్తుంది. వలిశెల విత్తనాల్లో బంగారు తీగ విత్తనాలు కలియడం ద్వారా లేదా భూమిలో ఉన్న విత్తనాల ద్వారా ఇది బాగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. దీనిని ఈక్రింది పద్ధతులలో నివారించవచ్చు.

ఎ) జల్లెడ పద్ధతి : ఈ పద్ధతిలో వలిశెల విత్తనాలను 0.85–1.00 మి.మీ. రంధ్రాలు గల జల్లెడతో జల్లించి బంగారు తీగ విత్తనాలను వేరు చేయాలి.

బి) ఉప్పునీటి ద్రావణం పద్ధతి : ఒక ఎకరాకు కావలసిన 2 కిలోల విత్తనాన్ని 20 లీటర్ల నీటికి 2 కిలోల ఉప్పు కలిపి ఆ ద్రావణం వేసి బాగా కలియబెట్టినట్లైతే బంగారు తీగ విత్తనాలు అడుగుకు, వలిశెల విత్తనాలు నీటి పైభాగానికి చేరుతాయి. ఈ విధంగా పై భాగానికి చేరిన విత్తనాలను పైకి తీసి మంచి నీటితో మరోసారి శుభ్రం చేసి పొడి గుడ్డపై ఆరబెట్టి వెంటనే విత్తుకోవాలి.

సి) వరుసలలో విత్తటం : విత్తనాన్ని వరుసలలో తగిన దూరంలో విత్తుకోవటం వలన ఆకాశ పందిరి పక్క వరుసలలో పాకకుండా అరికట్టవచ్చు. అంతే కాకుండా పొలంలో బంగారు తీగ పూత దశకు రాకముందే పీకివేసి గుంతలో పూడ్చడం లేదా తగలబెట్టడం వలన కూడా దీని ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు.

సస్యరక్షణ : ఈ పంటకు పురుగులు మరియు తెగుళ్లు బెడద చాలా తక్కువ. అయితే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పొగాకు లద్దె పురుగు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అడపా దడపా ఆశించే అవకాశం ఉంది.

పురుగులు :

పొగాకు లద్దె పురుగు : గుడ్లు నుండి వెలువడిన లద్దె పురుగులు ఆకులను విపరీతంగా తిని, ఆకులు లేకుండా చేస్తాయి. పూత తగ్గిపోయి గింజ కట్టక దిగుబడి తగ్గుతుంది. వేప గింజల కషాయం (ఎన్.ఎస్.కె.ఇ. 5%) మరియు వేప నూనె (10000 పి.పి.యం.) 5 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పేనుబంక, దీపపు పురుగులు : తల్లి మరియు పిల్ల పురుగులు ఆకుల్లోని రసాన్ని పీల్చివేస్తాయి. మొక్క ఎదుగుదల తగ్గిపోతుంది. పూత మరియు గింజ కట్టడం బాగా దెబ్బతింటుంది. వేప గింజల కషాయం (ఎన్.ఎస్.కె.ఇ. 5%) మరియు వేప నూనె (10000 పి.పి.యం.) 5 మి.లీ. /లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. మందును లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు :

ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళు : ఆకులపైన చిన్న చిన్న గుండ్రని గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. గాలిలో తేమశాతం ఎక్కువైనప్పుడు ఈ మచ్చలు పెద్దవై ఒక దానితో ఒకటి కలిసి ఆకులు ఎండిపోతాయి. తెగులు కలుగజేసే శిలీంధ్రాలు గింజ మీద మరియు కోత తర్వాత మిగిలిన ఆకులు, మోళ్ళ పైన ఉండటం వలన, వాతావరణ

అనుకూలతను బట్టి పంట ఏ దశలోనైనా తెగులు ఆశించవచ్చు. వీటి నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. / లీ. లేదా మాంకోజెబ్ మందును 2.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

బూడిద తెగులు : విత్తిన 35–40 రోజుల తరువాత గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ముదురు ఆకులపై బూడిద రంగులో చిన్న చిన్న మచ్చలు కనబడతాయి. ఈ మచ్చలు ఆకు అంతటా వ్యాపించటం వలన ఆకులు రాలిపోతాయి. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి డైనోకాప్ 1 మి.లీ. కలిపి తెగులు కనిపించిన వెంటనే ఒకసారి పిచికారి చేయాలి.

పంట కోత : పంట 95–110 రోజుల్లో కోతకొస్తుంది. మొక్కల ఆకులు ఎండిపోయి మరియు హెడ్ (పుష్పగుచ్ఛం) నల్లగా మారినప్పుడు మాత్రమే పంటకోత ప్రారంభించాలి. మొక్కలను నేలమట్టం వరకు కోసి ఎండలో ఆరబెట్టి, కట్టెలతో కొట్టి గింజలను వేరుచేయాలి. తర్వాత గింజలను 3–5 రోజుల వరకు ఎండలో ఆరబెట్టి బస్తాల్లో నిల్వ చేయాలి.

వలిశెల పంట కోతలో యాంత్రీకరణ : వలిశెల పంట కోతకు వరిలో వాడే రీపర్ ఉపయోగించవచ్చు. ఈ యంత్రము సహాయంతో రెండు గంటల వ్యవధిలో ఒక మనిషి ఎకరం పంటను కోసుకోవచ్చును. గంటకు సుమారు 0.6 – 0.7 లీటర్లు పెట్రోల్ ఇంధనం కావాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా కూలీల ఖర్చు తగ్గి నికర ఆదాయం ఎక్కువగా పొందవచ్చు.

వలిశె పంటలో తేనె ఉత్పత్తి : వలిశెల పంటలో తేనెటీగల పెట్టెలు 10 × 3 మీటర్ల దూరంలో పెట్టుకొని రైతు యొక్క నికర ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు. ఐరోపా తేనెటీగలు కన్నా పుట్ట తేనెటీగలు ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. వలిశెల పంటలో తేనెటీగల పెట్టెలు సాగు మూలాన సుమారుగా 10–20% అధిక దిగుబడితో పాటు తేనె నుండి సుమారుగా 1500 రూపాయలు హెక్టారుకి అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.

అంతర పంటలు : గిరిజన ప్రాంతాల్లో రైతు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవటానికి అంతర పంటల సాగు అవసరం ఎక్కువగా ఉంది.

సం.	అంతర పంటలు	వరుస నిష్పత్తి
1	వలిశెలు + వేరు శనగ	4:2 లేదా 6:2
2	వలిశెలు + సామలు	2:4
3	వలిశెలు + రాగులు	2:2 లేదా 4:2
4	వలిశెలు + రాజ్మా చిక్కుళ్ళు	4:2

వలిశెలు సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (నూనెగింజలు), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, కదిరి–515 591,

అనంతపురం జిల్లా, ఫోన్ నెం. 08494–295001, 99896 25217

వివిధ పంటలలో విత్తనోత్పత్తి

వరి విత్తనోత్పత్తి

పెరుగుతున్న దేశ జనాభా ఒకవైపు, తరుగుతున్న సహజ వనరులు మరోవైపు, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆహార భద్రతను కల్పించాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సగటు ఉత్పాదకతను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనదేశంలో వరి ప్రధాన ఆహార పంట. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో అధిక దిగుబడినిచ్చే వరి వంగడాలు రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి తోడు వరి ఉత్పత్తి, ఉత్పాదకతలను ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని దానిద్వారా దిగుబడులను పెంచుకోవాలి.

వరి దిగుబడిని ప్రభావితం చేసే వివిధ అంశాల్లో మొదటిది నాణ్యమైన విత్తనాన్ని ఉపయోగించడం, నాణ్యమైన విత్తనం అంటే కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలను అనుసరించి, అధిక జన్యుస్వచ్ఛత, అధిక మొలక శాతం కలిగి, అతి తక్కువ జడ పదార్థం, తక్కువ సంఖ్యలో కలుపు, ఇతర పంటల విత్తనాలను కలిగి తెగుళ్ళ బారిన పడనటువంటి విత్తనం.

రైతు స్థాయిలో విత్తనోత్పత్తి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 19.21 లక్షల హెక్టార్ల వరి విస్తీర్ణానికి సరిపడే నాణ్యమైన విత్తనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్తనాభివృద్ధి సంస్థగాని, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధనా స్థానాలు గాని లేదా ప్రైవేట్ విత్తన సంస్థలు గాని సరఫరా చేయలేవు. కావున రైతులు తమ పొలంలోనే విత్తనోత్పత్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

వరిలో స్వపరాగ సంపర్కం ద్వారా విత్తనం ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం రైతుల పొలాల్లో సాగులో ఉన్నవన్నీ సూటి రకాలే. కావున రైతులు ఒకసారి ధృవీకరింపబడిన విత్తనం కొనుగోలు చేసి సరైన మెళకువలు పాటించినట్లయితే రైతు స్థాయిలోనే తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన విత్తనాన్ని తయారుచేసుకొని తమ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చును.

సాధారణంగా ఒకే రకం విత్తనాన్ని కొంతకాలం సాగుచేసిన తర్వాత వరి వంగడం దిగుబడి సామర్థ్యం తగ్గుతుందనే అపోహ రైతుల్లో ఉంది. కాని దానికి ముఖ్యకారణం విత్తనంలో కల్తీ జరిగి జన్యుస్వచ్ఛత తగ్గడం. జన్యు స్వచ్ఛత అనేది ఇతర రకాలతో కల్తీ జరగడం వల్ల, పరపరాగ సంపర్కం వల్ల, స్వల్ప జన్యుపరమైన మార్పులు, యాంత్రిక కల్తీ వల్ల, ఆశించే తెగుళ్ళ ప్రభావం వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి విత్తన కల్తీలను నివారించి, జన్యు స్వచ్ఛతను కాపాడటం ద్వారా నాణ్యమైన విత్తనాన్ని పొందుటకు కొన్ని మెళకువలు పాటించాలి.

నాణ్యమైన విత్తనం కొరకు పాటించాల్సిన మెళకువలు

- సార్వాకు సిఫారసు చేసిన రకాల విత్తనోత్పత్తిని సార్వాలోను, దాళ్వాకు సిఫారసు చేసిన రకాల విత్తనోత్పత్తిని దాళ్వాలోనే చేపట్టాలి.

- ❖ విత్తనోత్పత్తి సారవంతమైన, మంచి నీటి వసతి ఉన్న పొలాల్లోనే చేపట్టాలి. లేనిచో విత్తన నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశముంది.
- ❖ విత్తనోత్పత్తి చేసే పొలం చుట్టూ అదే పంటకి చెందిన వేరే రకం ఉంటే కనీసం 3 మీటర్ల వేర్వాటు దూరం / అంతర దూరం పాటించాలి.
- ❖ నారుమడిని పోసేటప్పుడు నేలను బాగా దున్ని, కలుపు లేకుండా చేసి, నారు పెట్టడానికి, తీయడానికి వీలుగా కాలువలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ❖ నారుమడిలో పశువుల ఎరువు, పచ్చిరొట్ట పైర్లు పెంచి భూమిలో కలియదున్నాలి. దుక్కిలో సిఫారసు చేసిన నత్రజనిలో సగభాగం, మొత్తం భాస్వరం, పొటాష్‌లను వేసిన తరువాత రెండో భాగం నత్రజనిని విత్తిన 12–15 రోజుల మధ్య పైపాటుగా వేయాలి.
- ❖ నాట్లు వేసేటప్పుడు 25–30 రోజుల వయస్సు గల నారును, రకాల కాలపరిమితిని బట్టి నాటాలి.
- ❖ కుదురుకి 2–3 మొక్కల చొప్పున పైపైన నాటాలి. దీర్ఘకాలిక రకాలైతే చ.మీ.కి 33 కుదుళ్ళు, స్వల్పకాలిక రకాలైతే 44 కుదుళ్ళు ఉండేలా చూడాలి.
- ❖ ప్రతి 2 మీ. ఊడ్పుకి 20 సెం.మీ. కాలిబాటలు వేయాలి. దీనివల్ల మొక్కలకు గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలి, దోమ ఉధృతి తగ్గుతుంది.
- ❖ పైరు నాటిన 40 రోజుల వరకు, పొలంలో కలుపు లేకుండా చూడాలి.
- ❖ కలుపు నివారణకు నాటిన 3–5 రోజుల లోపు పొలంలో పలుచగా నీరుపెట్టి 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో ఎకరాకు 80 గ్రా. పైరజోసల్ఫ్యురాన్ ఇథైల్ 10% పొడి మందు లేదా 1.0–1.25 లీ. బ్యుటాక్లోర్ 50% ఇ.సి. లేదా 400 మి.లీ. ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. కలిపి పొలంలో సమానంగా వెదజల్లాలి. గడ్డి, తుంగ, వెడల్పాటి ఆకులున్న కలుపు మొక్కలు సమస్యగా ఉంటే నాటిన 3–5 రోజుల లోపు పొలంలో పలుచగా నీరు పెట్టి 20 కిలోల ఇసుకలో 4 కిలోల బెన్‌సల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + ప్రెటిలాక్లోర్ 6.6% జి. గుళికలు ఎకరం పొలంలో సమానంగా పడేలా వెదజల్లుకోవాలి.
- ❖ భూసార పరీక్షననుసరించి సిఫార్సు మేరకు ఎరువులు వేయాలి. భాస్వరం గాని, భాస్వరం కలిగిన కాంప్లెక్స్ ఎరువులు గాని పైపాటుగా వేయరాదు.
- ❖ సకాలంలో సస్యరక్షణ పద్ధతులు పాటించాలి.
- ❖ విత్తిన పంటకు మామూలు వాణిజ్య పంటవలె నీటి యాజమాన్యం పాటించాలి. కీలక దశలైన అంకురం ఏర్పడుట, పూత దశ, గింజ పాలుపోసుకునే దశ, గింజ గట్టిపడే దశల్లో నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ దశల్లో పైరు నీటి ఎద్దడికి గురైతే దిగుబడితోపాటు, విత్తన నాణ్యత లోపిస్తుంది.

కేళీల ఏరివేత : విత్తనోత్పత్తిలో ప్రధాన అంశం పంటలో కేళీలను తీయుట. ఈ కేళీల ఏరివేత ముఖ్యంగా 4 దశల్లో చేపట్టాలి. అవి ఏమిటంటే :

1. పైరు దుబ్బు చేసే సమయంలో
2. పూత దశలో

3. గింజ గట్టిపడుచున్నప్పుడు
4. వరి కోతకు ముందు

దుబ్బు చేసే సమయం : మనం సాగుచేసిన రకం భౌతిక లక్షణాలను బట్టి అంటే పైరు ఎత్తు, ఆకు రంగు, దుబ్బు చేసే గుణం మొదలగు లక్షణాలకు భిన్నంగా, పొట్టిగా లేదా పొడుగుగా, ఆకు రంగులో మార్పు, ఇతరత్రా భౌతికంగా వేరుగా ఉండే మొక్కలను పూర్తిగా వేర్లతో సహా తీసివేయాలి.

పూత దశ : ఈ సమయంలో ముందుగా పూతకు వచ్చినవి లేదా ఆలస్యంగా పూతకు వచ్చేవి, పోటాకు అమరికలో వ్యత్యాసాలున్న మొక్కలు పూర్తిగా తీసివేయాలి.

గింజ గట్టిపడే దశ : వెన్ను లక్షణాలు, గింజ రంగు, ఆకారం, పరిమాణం మొదలగు లక్షణాల్లో తేడా ఉన్న మొక్కలను సమూలంగా తీసివేయాలి. పై విధంగా వివిధ దశల్లోను కేళీలను ఏరివేయాలి.

కోత :

- ❖ 90 శాతం వరి కంకులు పక్వానికి వచ్చి గడ్డి రంగులోకి మారినప్పుడు కోత కోయాలి.
- ❖ చేనుపై గింజ రాలిక స్వభావం కలిగిన రకాలను కర్ర పచ్చి మీద కోసుకోవాలి.
- ❖ తుఫాను మరియు వర్షసూచన ఉన్న నేపధ్యంలో పంట కోయరాదు.
- ❖ కూలీలతో కోత కోసినప్పుడు పంట మొదళ్ళ వరకు కోయడం వలన పురుగులు మరియు తెగుళ్ళ ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు.
- ❖ కూలీలతో కోసిన వరిగడ్డి పశువుల మేతకు అనువుగా ఉంటుంది.
- ❖ వరి కోత కోసినప్పుడు, నూర్పిడి సమయాల్లో యాంత్రిక కల్తీ అనగా యంత్రాల ద్వారా గాని, మనుషుల ద్వారా గాని, పనిముట్లు ద్వారా గాని ఇతర రకాల గింజలు కలవకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. నూర్పిడి యంత్రాల ద్వారా విత్తన కల్తీ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. కావున విత్తనోత్పత్తి చేలలో యంత్రాలను తగు జాగ్రత్తలతో వాడాలి.
- ❖ కోత మరియు నూర్పిడి యంత్రాలను వాడినప్పుడు ముందుగా యంత్రాలను బ్లోయర్ మరియు ఇతర పరికరాలతో శుభ్రం చేసుకొని ముందుగా కోసిన కొంత భాగాన్ని విత్తనానికి తీసుకోకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

విత్తన నిల్వలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

- ❖ విత్తనాన్ని ఎండబెట్టేటప్పుడు తేమ 12-13 శాతం స్వల్పకాలిక నిల్వ కోసం, 8-9 శాతం దీర్ఘకాలిక నిల్వ కోసం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- ❖ విత్తన నిల్వకు కొత్త సంచులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అలాగే నిల్వ చేసేటప్పుడు అధిక తేమ శాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రతకు గురికాని గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలే గిడ్డింగులలో నిల్వ చేయాలి.

- ❖ స్వల్పకాలిక నిల్వ కోసం (8–9 నెలలు) విత్తనాలను గోనె లేదా గుడ్డ సంచులలో నిల్వ చేయాలి.
- ❖ మధ్యకాలిక నిల్వ కోసం (12–15 నెలలు) విత్తనాలను పాలీలైన్డ్ గోనె సంచులలో నిల్వ చేయాలి.
- ❖ దీర్ఘకాలిక నిల్వ కోసం (15 నెలల కంటే ఎక్కువ) విత్తనాలను 700 గేజీ పాలిథిన్ సంచిలో నిల్వ చేయాలి.
- ❖ విత్తనాన్ని గాదెల్లో గాని, పాతరల్లో గాని లేదా ఎరువుల సంచుల్లో గాని నిల్వ ఉంచరాదు. విత్తనాన్ని నిల్వ ఉంచిన చోట ఎరువులను గాని, పురుగు మందులను గాని ఉంచరాదు.

విత్తనోత్పత్తి గ్రామ స్థాయిలో లేదా రైతు సహకార సంస్థ స్థాయిలో చేసేటప్పుడు, ఒక ప్రాంత రైతులందరూ తమకు కావల్సిన విత్తనాన్ని ముఖ్యంగా ఒకే రకానికి చెందినదై ఉండే విత్తనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం మంచిది.

ఈవిధంగా మెళకువలు పాటిస్తే పైన వివరించిన లక్షణాలు గల నాణ్యమైన విత్తనాన్ని రైతులు తమ తమ పొలాల్లో తామే స్వయంగా తయారు చేసుకొని, విత్తనాల ఖర్చు తగ్గించుకొనడమే కాక, కల్తీ విత్తనాల బారిన పడకుండా తమను తాము రక్షించుకొని, అధిక దిగుబడులను సాధించగలరు.

ఫీల్డ్ స్టాండర్డ్స్ :

వేర్పాటు దూరం : వరి విత్తనోత్పత్తి క్షేత్రాలలో దిగువ పేర్కొన్న విధంగా వేర్పాటు దూరాన్ని అనుమతించడం ద్వారా కలుషితాలను నివారించవచ్చు.

కలుషితాలు	విత్తన తరగతి	
	పునాది విత్తనం కనీస దూరం (మీ.)	సర్టిఫైడ్ విత్తనం కనీస దూరం (మీ.)
ఇతర రకాల క్షేత్రాలు	3	3
విత్తన క్షేత్రాలలో వేసే రకం కాని, సర్టిఫికేషన్ కొరకు ధరఖాస్తు చేయని క్షేత్రం	3	3

నిర్ధిష్ట అవసరాలు :

కారకం	విత్తన తరగతి	
	పునాది (గరిష్టంగా శాతంలో)	సర్టిఫైడ్ (గరిష్టంగా శాతంలో)
కేళీలు	0.050	0.200
అభ్యంతరకరమైన కలుపు మొక్కలు	0.010	0.020

ధృవీకరణ విత్తన నాణ్యతా ప్రమాణాలు :

కారకం	విత్తన ప్రమాణాలు	
	పునాది విత్తనం	సర్టిఫైడ్ విత్తనం
జన్యు స్వచ్ఛత	98%	98%
జడ పదార్థం (గరిష్టంగా)	2.0%	2.0%
పొట్టులేని విత్తనాలు (గరిష్టంగా)	2.0%	2.0%
ఇతర పంట విత్తనాలు (గరిష్టంగా)	10/కిలోకి	20 / కిలోకి
కలుపు విత్తనాలు (గరిష్టంగా)	10 / కిలోకి	20 / కిలోకి
అభ్యంతరకరమైన కలుపు విత్తనాలు (గరిష్టంగా)	2 / కిలోకి	5 / కిలోకి
నల్లకాటుక తెగులు సోకిన విత్తనాలు	0.10% (సంఖ్య ద్వారా)	0.10% (సంఖ్య ద్వారా)
మొలక శాతం (కనిష్టంగా)	80%	80%
తేమ (గరిష్టంగా)	13.0%	13.0%

వరిలో కనీస నాణ్యత ప్రమాణాలు

మన భారత ప్రభుత్వం ప్రతీ పంటకు కనీస మద్ధతు ధరను నిర్ణయించుటకు కొన్ని నిర్ధిష్ట ప్రమాణాలను నిర్దేశించింది. ఈ ప్రామాణిక నిబంధనలకు లోబడి ఉండే ప్రమాణాలనే కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలు అంటారు. రైతు పండించిన ధాన్యానికి సరైన గిట్టుబాటు ధర లభించాలంటే నాణ్యత కలిగిన ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకోగలగాలి. ధాన్యము యొక్క నాణ్యత కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేకపోతే నిర్ధారించిన మద్ధతు ధర లభించదు. భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్.సి.ఐ.) ద్వారా భారత ప్రభుత్వం దేశ భవిష్యత్తు అవసరాల కొరకు మరియు ప్రజా సరఫరా వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకు సరఫరా చేయుట కొరకు ధాన్యాన్ని సేకరిస్తుంది. దీని కొరకు ఎఫ్.సి.ఐ వారు అన్ని రకాల ధాన్యాలకు కొన్ని గరిష్ట స్థాయి ప్రమాణాలను రూపొందించారు.

ఎఫ్.సి.ఐ. వారి కొనుగోలు ప్రమాణాలు :

1. సామాన్య లక్షణాలు : ధాన్యం శుభ్రంగా, పొడిగా, ఒకే రంగు మరియు ఆకారంలో ఉండాలి. బూజు, కీటకాలు, సూక్ష్మజీవులు ఆశించకుండా చెడు వాసన లేకుండా ఉండాలి. కలుపు విత్తనాలు ఉండకూడదు.

2. ప్రత్యేక లక్షణాలు

పట్టిక : వరిలో గరిష్ఠ స్థాయి నాణ్యతా ప్రమాణాలు

క్ర.సం.	వివరాలు	గరిష్ఠ స్థాయి (%)
1.	ఫారెన్ మేటర్ ఎ) రసాయనిక పదార్థాలు బి) సేంద్రీయ పదార్థాలు	 1.0 1.0
2.	దెబ్బతిన్న, రంగుమారిన, మొలకెత్తిన మరియు పుచ్చిన గింజలు	3.0
3.	పూర్తిగా నిండని సన్నని గింజలు	3.0
4.	తక్కువ స్థాయి కల్తీలు	8.0
5.	తేమ శాతం	14.0

రైతు పండించిన ధాన్యం పైన వివరించిన ప్రమాణాలకు లోబడి ఉన్నట్లయితే ధాన్యానికి నిర్దేశించిన మద్ధతు ధర లభ్యమవుతుంది. ఒక వేళ నిర్దేశించిన గరిష్ఠ స్థాయి ప్రమాణాల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక శాతానికి ధాన్యం ధరలో కోత ఉంటుంది.

భారత ప్రభుత్వం ధాన్యాన్ని రెండు గ్రేడులుగా విభజించారు :

1. కామన్ గ్రేడు – పొట్టి లావు మరియు పొడుగు లావు బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసే వడ్ల రకాలు. బియ్యపు గింజ పొడవు 6 మి.మీ. కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉండి పొడవు, వెడల్పుల నిష్పత్తి 2.5 కంటే తక్కువ గల బియ్యం.

2. 'ఎ' గ్రేడు : మధ్యస్థ సన్నం (మీడియం స్లెండర్), పొడవు సన్నం (లాంగ్ స్లెండర్) మరియు పొట్టి సన్నం (షార్ట్ స్లెండర్) బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసే రకాలు బియ్యపు గింజ పొడవు 6 మి.మీ. కన్నా తక్కువగా ఉండి పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి 2.5–3.0 లేదా బియ్యపు గింజ పొడవు 6 మి.మీ. కన్నా ఎక్కువగా ఉండి పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి 3.0 కన్నా ఎక్కువ గల బియ్యం.

భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్.సి.ఐ.) పై రెండు రకాల ధాన్యాన్ని బట్టి ధరను నిర్ధారిస్తుంది. అయితే ఈ రకాల బియ్యాన్ని క్రింద తెలిపిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు చేస్తుంది.

మార్కెట్లో బియ్యం గ్రేడులు నిండు గింజల శాతాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ప్రీమియం గ్రేడు బియ్యంలో 95 శాతం, ఒకటో నెంబరు గ్రేడ్‌లో 85 శాతం, రెండో నెంబరు గ్రేడ్‌లో 75 శాతం, మూడో నంబరు గ్రేడ్‌లో 65 శాతం నిండు గింజలు ఉండాలి.

వరిలో కనీస నాణ్యతా ప్రమాణాలను సాధించుటకు పాటించవలసిన మెళకువలు : వరిలో గింజ నాణ్యత ప్రధానముగా సాగు చేస్తున్న రకము యొక్క గుణగుణాలపై ఆధారపడినప్పటికీ, కొంత మేర వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు చేత ప్రభావితమవును. వరిలో నాణ్యతా లక్షణములను జన్యుపరమయినవి మరియు వాతావరణ సంబంధితమైనవిగా విభజించవచ్చు.

అనగా గింజ నాణ్యత అనేది పంట పండించిన వాతావరణము, కోత విధానాలు, ప్రాసెసింగ్ మరియు నిల్వలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా విత్తనం నాటిన దగ్గర నుండి మరలా కోత వరకు జరిపే వివిధ ప్రక్రియలు నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తాయి.

పట్టిక : సాధారణ మరియు సన్న రకాల బియ్యం కొనుగోళ్ళలో ఎఫ్.సి.ఐ. వారి గరిష్ఠ నాణ్యతా ప్రమాణాలు :

సం.	వివరాలు	నాన్-సార్టెక్స్		సార్టెక్స్	
		'ఎ' గ్రేడ్ (సన్న రకాలు)	కామన్ గ్రేడు (సాధారణ రకాలు)	'ఎ' గ్రేడ్ (సన్న రకాలు)	కామన్ గ్రేడ్ (సాధారణ రకాలు)
1.	విరిగిన గింజలు (నూకలు)	25.0	25.0	15.0	15.0
2.	దుమ్ము, ధూళి, రాళ్ళు మినరల్ వ్యర్థాలు (<0.25%), పశు సంబంధిత వ్యర్థాలు (<0.1%)	0.5	0.5	0.0	0.0
3.	చెడిపోయిన గింజలు (బరువు శాతం)	3.0	3.0	1.5	1.5
4.	రంగు మారిన గింజలు (బరువు శాతం)	3.0	3.0	3.0	3.0
5.	తాలు గింజలు (బరువు శాతం)	5.0	5.0	1.0	1.0
6.	ఎర్ర గింజలు (బరువు శాతం)	3.0	3.0	3.0	3.0
7.	పొట్టు తీసిన గింజలు (బరువు శాతం)	13.0	13.0	14.0	14.0
8.	తేమ శాతం	14.0	14.0	14.0	14.0
9.	వేరే రకాల గింజలు (బరువు శాతం)	6.0	0.0	6.0	0.0

జన్యు పరము మరియు వాతావరణ సంబంధిత నాణ్యతా లక్షణములు

జన్యుపరము	వాతావరణ సంబంధితము
గింజ పరిమాణము	గింజ రంగు
గింజ ఆకారము	గింజ బరువు
గింజ సాగే శక్తి	పొట్ట తెలుపు
అన్నం వదిగే శక్తి	గింజ పగుళ్ళు
నీటిని గ్రహించే నీటి పరిమాణం	గింజ స్వచ్ఛత
జెలాటినైజేషన్ ఉష్ణోగ్రత	అపరిపక్వ గింజలు
జెల్ కన్సిస్టెన్సీ	నిండు గింజల దిగుబడి
అమైలోజ్	నూక శాతం
మాంసకృత్తులు	తేమ శాతం
స్టార్చ్ / పిండి పదార్థం	

మొక్కజొన్నలో హైబ్రిడ్ విత్తనోత్పత్తి

రాష్ట్రంలో దాదాపు 70,000 హెక్టార్లలో మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్ విత్తనోత్పత్తి చేపడుతున్నారు. రైతులు మొక్కజొన్న విత్తనోత్పత్తి ద్వారా సాధారణ సరళి మొక్కజొన్నసాగు కన్నా అధిక లాభాలను పొందవచ్చు. మొక్కజొన్న విత్తనోత్పత్తికి కావలసిన అన్ని అనుకూలతలు ఉండటం కారణంగా జాతీయ మరియు రాష్ట్రస్థాయి విత్తన సంస్థల ద్వారా హైబ్రిడ్ విత్తనోత్పత్తి ఎక్కువ శాతం మన రాష్ట్రం లోని తూర్పు మరియు పశ్చిమ గోదావరి, కర్నూల్, ప్రకాశం జిల్లాల్లో జరుగుతుంది.

సంకర (హైబ్రిడ్) రకాలు : ఏక సంకర రకాలు; ద్విసంకర రకాలు; త్రిసంకర రకాలు; ప్రస్తుతం మొక్కజొన్నలో ఏక సంకర రకాలే ఎక్కువ ప్రాచూర్యంలో ఉన్నాయి.

సంకర విత్తనోత్పత్తికి కావాల్సిన ఆవశ్యకతలు :

- రబీ సీజన్
- సారవంతమైన నేలలు.
- క్రితం పంట మొక్కజొన్న వేసి ఉండరాదు.
- నీటి వసతి ఉండాలి.
- అంతర దూరం / అంతర సమయం పాటించాలి.

సంకర విత్తనోత్పత్తిలో సాంకేతిక అంశాలు :

- అంతర దూరం/అంతర సమయం పాటించుట.
- నిర్దేశించిన ఆడ మరియు మగ రకాల నిష్పత్తిని పాటించుట.
- సకాలంలో బెరుకులు తీసివేయుట.
- విత్తనోత్పత్తి కొరకు నిర్దేశించిన అధిక దిగుబడినిచ్చు ఆడ రకం మరియు అధిక పుప్పొడిని ఎక్కువ సమయం వరకు ఇచ్చు మగ రకం ఉపయోగించాలి.
- ఆడ మరియు మగ రకాలు ఒకేసారి పుష్పించుట ఆవశ్యకం.
- జల్లులు తీసివేయుట (డిటాస్లింగ్).

విత్తనోత్పత్తి కొరకు పొలం ఎంపిక :

- మురుగు నిలువని, కలుపు మరియు తెగుళ్ళు లేని సారవంతమైన నేలలు అనుకూలం.
- క్రితం సీజన్లో మొక్కజొన్న పండించి ఉండకూడదు క్రితం పంట మొక్కజొన్న వేసి ఉన్నట్టయితే జన్యు స్వచ్ఛత కొరకై నీటి తడిని ఇచ్చి క్రితం సీజన్ నేలలోని విత్తనాలను మొలకెత్తనిచ్చి బెరుకులు లేకుండా దున్ని నశింపజేయాలి.

విత్తు సమయం : రబీ : అక్టోబర్ 15 నుండి నవంబర్ 15

విత్తన మోతాదు : ఎకరానికి 10 కిలోలు (మగ + ఆడ). ఆడ మరియు మగ విత్తనాల మోతాదు వాటి వరుసల నిష్పత్తి మరియు సంకర రకాన్ని బట్టి ఆధారపడును.

విత్తు పద్ధతి : 60×20 సెం.మీ. చొప్పున బోదెలపై 1/3 వ వంతు ఎత్తులో విత్తుకోవాలి. ఎక్కువ లోతులో మరియు పెల్లల మధ్య విత్తుకోరాదు. మగ మొక్కలు దగ్గరగా విత్తుకోవాలి (ఎక్కువ విత్తనం వాడాలి). ఆడ మొక్కలు దూరంగా విత్తుకోవాలి.

కలుపు, ఎరువులు మరియు నీటి యాజమాన్యం : నీటి యాజమాన్యం దాదాపు సాధారణ మొక్కజొన్న పంటలో మాదిరిగానే ఉండును. పంట అన్ని దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి. మొదటి తడి ఆడ, మగ సాళ్లలోని విత్తనాలు కలిసిపోకుండా ఇవ్వవలెను. గింజ తయారగు దశలో ఎకరానికి 20 కిలోల నత్రజనిని అదనంగా వేయవలెను.

అంతర దూరం/ సమయము : రెండు క్షేత్రముల మధ్య అంతర దూరము, హైబ్రిడ్ రకము (ఏక, ద్వి & త్రి సంకర) మరియు దశలను బట్టి 200–600 మీ. వరకు ఉండాలి. రెండు క్షేత్రముల మధ్య అంతర సమయము దాదాపు 4–5 వారాలు పాటించాలి. సాంకేతికంగా విత్తనం పంటలో 5.0 శాతం కన్న ఎక్కువ పీచు ఉన్న దశలో ప్రక్క పంటల నుండి 0.2% కన్నా తక్కువ జల్లులు/మొక్కలు (ఇన్ బ్రెడ్ లు మరియు పునాది ఏక సంకరణ విత్తనం) లేదా 0.5% కన్నా తక్కువ జల్లులు/ మొక్కలు (ఏక సంకరణ, ద్వి సంకరణ, త్రి సంకరణ మరియు టాప్ క్రాస్ హైబ్రిడ్లు) ఉండాలి.

ఆడ మరియు మగ రకాల నిష్పత్తి : ఆడ మరియు మగ రకాల నిష్పత్తి హైబ్రిడ్ రకం, దశ, మగ రకం పుప్పొడినిచ్చు శక్తిని బట్టి 1:3 లేదా 1:4 (ఏక సంకర) నుండి 1:5 లేదా 1:6 (త్రి, ద్వి సంకర) వరకు ఉండును.

బెరుకులు తీయుట : విత్తన పంట పుష్పించుటకు ముందే బెరుకులను ఏరివేయాలి. నేలలో క్రితం పంటకు చెందిన మొలకెత్తిన బెరుకు మొక్కలు, ఇతర పంట మొక్కలు, కలుపు మొక్కలు ఏరివేయాలి. శాఖీయ దశలో మొక్కల ఎత్తు, ఆకుల మరియు కాండం యొక్క లక్షణాలను బట్టి బెరుకులను తీసివేయాలి. పూత దశలో, జల్లులు పుప్పొడిని వెదజల్లుటకు ముందే ఆడ మరియు మగ వరుసలలోని కేళీలను జల్లు, పూల, కేసరాల గుణగణాలను బట్టి ఏరివేయాలి.

ఆడ మరియు మగ రకాలు ఒకేసారి పుష్పించుట : కాల పరిమితిని బట్టి ఆడ మరియు మగ రకాలను వేరు వేరు తేదీలలో విత్తుకోవాలి. మగ రకంను దగ్గర దగ్గరగా ఎక్కువ సాంద్రతలో విత్తుకోవాలి. ఎక్కువ రోజుల పుప్పొడి లభ్యతకై, మగ రకాన్ని అదే వరుసలో 4 రోజుల వ్యవధితో రెండో సారి విత్తుకోవాలి.

జల్లులు తీసివేయుట (డిటాస్లింగ్) : ఆడ వరుసలలోని ప్రతి మగ పుష్పగుచ్ఛాన్ని మొవ్వు నుండి బయటకు వచ్చిన వెంటనే తీసివేయాలి. ఎడమ చేతితో కాండాన్ని పట్టుకొని కుడి చేతితో జల్లు మొత్తం ఒకేసారి వచ్చేలా

లాగాలి. ఈ ప్రక్రియ క్రమం తప్పకుండా రోజూ జల్లులు వేయుట పూర్తి అయ్యే వరకు (దాదాపు 15 రోజులు) చేపట్టాలి.

కోత మరియు తదుపరి యాజమాన్యం :

పక్వదశలో ముందుగా మగ వరుసల కోత చేపట్టాలి. తదుపరి ఆడ వరుసల కోతను గింజలో 25–30 శాతం తేమ ఉన్న దశలో చేపట్టాలి. కల్తీ కండెలను కండె ఆకారం, బెండు రంగు, గింజ రంగు లక్షణాలు మరియు తెగులు సోకిన కండెల ఆధారంగా ఏరి వేయాలి. కండెలను 15 శాతం తేమ వరకు కళ్ళాలలో లేదా యంత్రాల ద్వారా ఆరబెట్టాలి. యంత్రాల సహాయంతో గింజలను ఒలిచి తేమ శాతం 8–12 శాతం వరకు ఆరబెట్టాలి. ప్రాసెసింగ్, గ్రేడింగ్ మరియు విత్తనశుద్ధి చేసి ప్యాకింగ్ చేయాలి.

దిగుబడి : ఏక సంకర రకాలు : 12–15 క్వి/ఎ, త్రి సంకర రకాలు : 20–25 క్వి/ఎ, ద్వి సంకర రకాలు : 25–30 క్వి/ఎ.

అపరాలలో విత్తనోత్పత్తి

ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అపరాలను సుమారుగా **9.27** లక్షల హెక్టార్లలో సాగుచేస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా శనగ, మినుము, కంది, పెసర పంటలను ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగుచేస్తున్నారు. ఉలవ, అలసంద మరియు రాజ్‌మాష్ కొద్ది విస్తీర్ణంలో, కొన్ని ప్రాంతాలలో సాగుచేస్తున్నారు. సుమారుగా 75% అపరాలను రబీ కాలంలో సాగుచేస్తున్నారు.

శాఖాహారమే ప్రధానంగా గల మనదేశంలో మాంసకృత్తులను అందించే అపరాల పైర్లు ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. అంతేకాక ఈ పైర్లు నత్రజనిని స్థిరీకరించి భూమిని సారవంతం చేస్తాయి. ఈ పైర్లు ధాన్యపు పైర్లతో పోలిస్తే అత్యల్ప నీటిని వాడుకుని, తక్కువ సమయంలో నాణ్యమైన పంట దిగుబడులను ఇస్తాయి. అపరాలను వివిధ పంటల్లో అంతర /మిశ్రమ పంటలుగా సాగుచేస్తారు. ఈ పైర్లను ఎక్కువగా వర్షాధారంగా, తక్కువ సారవంతమైన నేలల్లో పండిస్తున్నారు.

హరిత విప్లవానికి ముందు తలసరి అపరాల వాడకం రోజుకు 60.7 గ్రాములు ఉంటే ప్రస్తుతం 40 గ్రాముల కంటే తక్కువగా ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు అపరాలను వర్షాధారంగా పండించటం, జనాభా పెరగటం, సాగు విస్తీర్ణం తగ్గటం వంటివి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. నూతన రకాలకు ఉన్న దిగుబడి శక్తికి మరియు అసలు వస్తున్న దిగుబడులకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటున్నాయి. దీనికి ప్రధానమైన కారణం కొత్త రకాల విత్తనం రైతులకు అందుబాటులో లేకపోవటం. రైతులందరికి కావలసిన అపరాల విత్తనాన్ని అందించటం ఏ ప్రభుత్వ మరియు ప్రవేటు సంస్థలకు సాధ్యమవ్వదు. కాబట్టి రైతులు గ్రామస్థాయిలో ఎవరి విత్తనాన్ని వారే స్వంతంగా తయారు చేసుకొని వాడినట్లైతే పంటపై పెట్టే పెట్టుబడులను తగ్గించి నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు.

సాధారణంగా అపరాల పైర్లు స్వపరాగ సంపర్కానికి చెందిన పైర్లు. వీటిలో సాగులో ఉన్నవన్నీ రకాలే. కాబట్టి అపరాల విత్తనోత్పత్తి చేయటం చాలా తేలిక. దృవీకరణ విత్తనాలను వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాలు లేదా ఇతర సంస్థల నుండి విత్తనాలను సేకరించి విత్తనోత్పత్తిలో కొన్ని మెళకువలను పాటించి నాణ్యమైన విత్తనాలను తయారు చేయవచ్చు.

విత్తన నాణ్యత తగ్గటానికి ప్రధాన కారణాలు :

వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులలో పండించటం వలన ఉత్పన్నమయ్యే మార్పులు, ఇతర రకాలతో జరిగే కొద్దిపాటి పరపరాగ సంపర్కం వలన, స్వల్ప జన్యుపరమైన మార్పులు, విత్తేటపుడు, కోత మరియు నూర్పిడి సమయంలో జరిగే యాంత్రిక కల్తీవల్ల, ఆశించే తెగుళ్ళ ప్రభావం వల్ల మరియు సహజ ఉత్పరివర్తనాలవల్ల విత్తన నాణ్యత తగ్గుతుంది.

మంచి నాణ్యత కల్గిన విత్తనం జన్యు మరియు భౌతికపరంగా స్వచ్ఛమైనదై అత్యధికంగా మొలకశాతాన్ని కలిగి, కలుపు మొక్కల గింజలు కాని ఏ ఇతర పంటల /రకాల గింజలు కానీ మట్టి లేదా రాళ్ళ వంటివి లేనటువంటివి.

నాణ్యతమైన విత్తనం కొరకు పాటించాల్సిన మెళకువలు :

- ఏ ఏ ప్రాంతాలకు, కాలాలకు సిఫార్సుచేసిన రకాలను ఆయా ప్రాంతాలలో విత్తనోత్పత్తికి సాగుచేయాలి.
- విత్తనోత్పత్తిని సారవంతమైన, నీటివసతిగల ప్రాంతాలలో సాగుచేసినట్లైతే అధిక నాణ్యమైన దిగుబడులను సాధించవచ్చు.
- పెసర, మినుము, శనగ వంటి పైర్లను 5 మీటర్లు మరియు కంది పైరులో 200 మీటర్ల అంతర దూరాన్ని అదే పంటలకు సంభందించిన ఇతర రకాలనుండి పాటించినట్లైతే యాంత్రిక కల్తీని, పరపరాగ సంపర్కాన్ని నిరోధించవచ్చు.
- విత్తనం వేయటానికి ముందు భూమిని సరిగా తయారుచేసినట్లయితే విత్తన మొలక శాతాన్ని పెంచి, కలుపును నాశనం చేయవచ్చు.
- ఆయా ప్రాంతాలకు సిఫారసుచేసిన రకాల నాణ్యమైన, దృవీకరించిన విత్తనాన్ని పరిశోధనా స్థానాలు లేదా విత్తన సంస్థల నుండి సేకరించి విత్తుకోవాలి.
- సిఫార్సుచేసిన తెగుళ్ళు, పురుగు మందులు మరియు రైజోబియంతో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.
- ఆయా అపరాల పైర్లకు సిఫార్సు చేసిన విత్తేసమయాన్ని, ఎరువులను, విత్తన మోతాదులను, విత్తే దూరాన్ని పాటించాలి.
- పూతకు ముందు, గింజ గట్టిపడే దశలలో తేలికపాటి నీటి తడులు ఇవ్వాలి.
- విత్తిన అపరాల పంటలలో కలుపు లేకుండా సమగ్ర కలుపు యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించాలి.
- సకాలంలో సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను పాటించి పురుగులు మరియు తెగుళ్ళను నివారించాలి.
- కేళీల ఏరివేత అనేది విత్తనోత్పత్తిలో ప్రధానమైన అంశం. కేళీల ఏరివేత ముఖ్యంగా మూడు దశలలో చేపట్టాలి. ముందుగా రైతుసోదరులు తాము విత్తనోత్పత్తి చేయదలచిన రకాల లక్షణాలను తెలుసుకోవాలి. మొదటి దశలో పూతకుముందు మొక్క పెరుగుదల, ఆకుల పరిమాణం, రంగు, కాండంపై రంగు, నూగు వంటి లక్షణాలనుబట్టి కేళీలను ఏరివేయాలి. రెండవ దశ పూత సమయంలో పూతకువచ్చే సమయం మరియు పూత రంగు వంటి లక్షణాలతో కేళీలను ఏరివేయాలి. చివరిదశలో పంట తయారైనప్పుడు పంట ఎత్తు, కాయ రంగు, పొడవు, నూగు, గింజ రంగు, పరిమాణం, పంట కోతకు తయారైన సమయం వంటి లక్షణాల ఆధారంగా కేళీలను ఏరివేయాలి. అదే విధంగా వివిధ దశలలో ఆశించే తెగుళ్ళు ముఖ్యంగా వైరస్ తెగుళ్ళు సోకిన మొక్కలను తీసి నాశనం చేయాలి.

- విత్తన అపరాల పైర్లను కోసేటపుడు కోత యంత్రాల వల్లగాని. పనిముట్ల ద్వారాగాని. మనుషుల ద్వారాగాని ఇతర రకాల గింజలు కలవకుండా జాగ్రత్తవహించాలి.
- విత్తన తేమను 9% చేరుకొనే వరకు ఎండబెట్టాలి.
- నిల్వకు శుభ్రంచేసిన గోనెసంచులను లేదా కొత్త సంచులను మాత్రమే నిల్వకు ఉపయోగించాలి. బాగా గాలి, వెలుతురు తగిలే ప్రదేశాల్లో నిల్వచేయాలి. నిల్వచేసిన విత్తనానికి పురుగు పట్టకుండా చూసుకోవాలి.

పైన తెలిపిన విత్తనోత్పత్తి మెళకువలను పాటించి రైతులు నాణ్యమైన అపరాల విత్తనాన్ని తమపొలంలో తామే తయారుచేసుకొని, విత్తనాలపై పెట్టే పెట్టుబడులను తగ్గించి, కల్తీ విత్తనాల బారిన పడకుండా అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు.

అపరాల విత్తన ధృవీకరణ నాణ్యతా ప్రమాణాలు

వివరము	పంట			
	కంది	పెసర / మినుము	ఉలవ	అలసంద / రాజమాష్
జన్యు స్వచ్ఛత (శాతం)	98	98	98	98
జడ పదార్థం (శాతం)	2	2	2	2
మొలక (శాతం)	75	75	80	75
తేమ (శాతం)	9	9	9	9
ఇతర పంటల విత్తనం (కిలోకి)	10	10	10	10
ఇతర రకాల విత్తనం (కిలోకి)	20	20	10	10
విత్తన వృద్ధి నిష్పత్తి	1:100	1:40	1:40	1:40

శనగలో విత్తనోత్పత్తి

శనగ విత్తనోత్పత్తి చేపట్టినపుడు సిఫారసు చేసిన మెళకువలు పాటించి ఆ రకం యొక్క జన్యు స్వచ్ఛత మరియు భౌతిక స్వచ్ఛతను నిర్ధేశించిన మోతాదులో నియంత్రించగలిగినప్పుడే మెరుగుగా ఉంటుంది. శనగలో ఫౌండేషన్ మరియు సర్టిఫైడ్ విత్తనోత్పత్తి చేపట్టాలనుకునే ఔత్సాహిక రైతులు ముందుగా తాము వేయబోయే రకాలను మరియు విస్తీర్ణాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్తన ధృవీకరణ సంస్థ వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు సరిపడ రుసుమును వారికి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ రూపంలో చెల్లించాలి. విత్తనోత్పత్తి చేయడానికి కావలసిన మూల విత్తనాన్ని అంటే ఫౌండేషన్ విత్తనోత్పత్తికి బ్రీడరు విత్తనాన్ని, సర్టిఫైడ్ విత్తనోత్పత్తికి ఫౌండేషన్ విత్తనాన్ని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంల నుండి కాని విత్తనోత్పత్తి సంస్థల నుండి కాని సేకరించాలి.

సాధారణంగా వివిధ రకాల పంటలకు వాటికి నిర్ధేశించిన మరియు విత్తన ప్రమాణాలు మారుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఒకే పంటలో వివిధ దశలలో చేసే విత్తనోత్పత్తికి ఈ ప్రమాణాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ తేడాలో సాధారణంగా పంట ఫలధీకరణ విధానంపై ఆధారపడి తదనుగుణంగా నిర్ధేశితమౌతాయి.

శనగలో క్షేత్ర మరియు విత్తన నాణ్యత ప్రమాణాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి.

సంఖ్య	అంశము	ఫౌండేషన్ విత్తనం	సర్టిఫైడ్ విత్తనం
1.	వేర్పాటు దూరం	10 మీ.	5 మీ.
2.	పొలంలో నాణ్యతా ప్రమాణాన్ని పరిశీలించడానికి సందర్శనలు	2	2
3.	మొలక శాతం (గట్టి విత్తనాలను కలుపుకొని)	85	85
4.	భౌతిక స్వచ్ఛతా శాతం	98	98
5.	ఇతర పదార్ధాల శాతం	2	2
6.	ఆమోద యోగ్యమైన తెగుళ్ళ శాతం	0.1	0.2
7.	కేళీలు/బెరుకుల శాతం	0.1	0.2
8.	వేరే పంటల విత్తనాల సంఖ్య (కిలో విత్తనానికి)	0	5
9.	వేరే రకాల విత్తనాల సంఖ్య (కిలో విత్తనానికి)	5	10

వేర్పాటు దూరం : శనగలో ప్రధానంగా స్వపరాగ సంపర్కం (99%) ద్వారా విత్తనోత్పత్తి జరగడం వలన అంతర దూరం ఎక్కువ అవసరం ఉండదు. ఇతర శనగ పొలాల నుండి ఫౌండేషన్ విత్తనోత్పత్తికి 10 మీటర్లు మరియు సర్టిఫైడ్ విత్తనోత్పత్తి 5 మీటర్ల అంతర దూరం పాటించాలి.

నేల తయారీ : శనగ సాగుకు ముందు సీజన్లో కోత తరువాత మిగిలిన మొక్కలను మరియు వాటికి సంబంధించిన అవశేషాలను ఏరి వేయాలి. నేలను మెత్తగా దున్ని నీరు నిల్వ ఉండకుండా చదును చేయాలి. నేల గట్టిగా ఉంటే గింజలు సరిగా మొలకెత్తవు.

సాగు యాజమాన్యం : ఇంతకుముందు వివరించిన విధంగా పంటను మంచి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించి సాగు చేయాలి.

కేళీలు ఏరివేయటం : విత్తనం ఉత్పత్తి చేయు పొలాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి కావాల్సిన పంట రకం యొక్క లక్షణాలను భిన్నంగా ఉండే మొక్కలను ఏరి వేయడానికి కేళీలు ఏరివేయుట అంటారు. ఈ పద్ధతి పాటించడం వలన విత్తనం స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. కేళి మొక్కలు, వేరే పంట మొక్కలు, కలుపు మొక్కలు, పరాన్న కలుపు మొక్కలైన బంగారు తీగ మరియు శిలీంధ్రం మరియు వైరస్ చీడ పీడలు ఆశించిన మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు ఏరి వేస్తూ ఉండాలి.

కోత మరియు నూర్పిడి : యాజమాన్య పద్ధతులలో వివరించబడినది.

విత్తనాన్ని శుభ్రపరచడం : ఎండిన తరువాత గింజలను శుభ్రపరిచేటప్పుడు దానిలో ఉన్న కలుషిత పదార్థాలైన మొక్క భాగాలు, మట్టి రేణువులు, రాళ్ళు, కలుపు విత్తనాలు, వేరే మొక్క గింజలు, శుష్కించిన, విరిగిన మరియు గాయపడిన విత్తనాలను వేరు చేయాలి. శుభ్రపరచడం మరియు గ్రేడింగ్ చేయడమనేవి విత్తన పరిమాణంలోని భౌతికమైన భేదాలు ఆధారంగా మంచి విత్తనం, చెడు విత్తనం మరియు అవసరం లేని కలుషిత పదార్థాలుగా వేరు చేయాలి. విత్తన శుభ్రత మరియు గ్రేడింగ్ చేయడంలో మొదటి దశగా తూర్పార పట్టడం తరువాత యాంత్రిక జల్లెడల ద్వారా చేపడతారు.

విత్తనాన్ని నిల్వచేయడం : యాజమాన్య పద్ధతులలో వివరించబడినది.

నూనెగింజల పంటలు – విత్తనోత్పత్తి

వేరుశనగలో విత్తనోత్పత్తి

'విత్తు కొద్ది పంట' అనే నానుడి అనాదిగ వస్తూ ఉంది. అధిక దిగుబడి శక్తి కలిగి వివిధ రకాల ఒత్తిడులను తట్టుకునే రకాలు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ఫలితంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ రకాల యొక్క ఉన్నత ప్రమాణాలున్న నాణ్యమైన విత్తనాన్ని సిఫారసు మేరకు సాగు మెళకువలను పాటించి సాగు చేస్తే అధిక దిగుబడి, నికర లాభముతో నాణ్యమైన పంటను పండించవచ్చును.

నాణ్యమైన విత్తనం – ప్రమాణాలు

జన్యు స్వచ్ఛత : ఆయా రకాల అసలు గుణాలను కలిగి, పంట మొత్తం సారూప్యతతో, అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం.

బాహ్య స్వచ్ఛత : ఇతర పంటలు, కలుపు మొక్కల విత్తనాలు, జడ పదార్థాలు, మట్టి, తొక్కలు మొదలైనవి నిర్ణీత కనిష్ఠ స్థాయికి మించరాదు.

తేమ శాతం : వేరుశనగ విత్తనాలలో 8–9 శాతం తేమ మాత్రమే ఉండాలి. దీని కంటే ఎక్కువగా ఉంటే శిలీంధ్రాలు, పురుగులు వృద్ధి చెందుతాయి. మొలక దశలో మొక్కలు తెగుళ్ళకు గురి అవుతాయి. మొలక శాతం తగ్గుతుంది.

మొలకెత్తే స్వభావం/దారుఢ్యం : అన్ని విత్తనాలు ఒకేసారి సమంగా మొలకెత్తి దారుఢ్యంగా ఉండాలి. ఆయా రకాల లక్షణాలను బట్టి మొక్కల ఎదుగుదలతో తేడా ఉంటుంది. బరువైన, ధృడమైన విత్తనాలు అన్నీ సమంగా మొలకెత్తి శక్తివంతంగా పెరుగుతాయి.

విత్తన స్వచ్ఛత : విత్తనాలలో తెగుళ్ళను సంక్రమింపజేసే శిలీంధ్రాలు, పురుగులు లేకుండా ఉండాలి.

మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వేరుశనగ సాగు విస్తీర్ణము ఖరీఫ్‌లో 5.55 లక్షల హెక్టార్లు, రబీలో 97,000 హెక్టార్లు. ఖరీఫ్‌లో సాగుకు, రబీలో సాగుకు సుమారుగా 19 లక్షల క్వింటాళ్ళ సర్టిఫైడ్ విత్తనము అవసరమవుతుంది. విత్తనోత్పత్తి నిష్పత్తి వేరుశనగ 1:8 నుండి 1:10 వరకు అనుకుంటే సుమారుగా 18,950 క్వింటాళ్ల బ్రీడరు విత్తనం 1,89,500 క్వింటాళ్ళ ఫౌండేషన్ విత్తనం అవసరము.

ఇంత పెద్ద మొత్తంలో లక్షల క్వింటాళ్ళ వేరుశనగ ఉత్పత్తి చేయాలంటే అంత సులభం కాదు. చాలా కష్టతరం. వివిధ స్థాయిలలో పర్యవేక్షణ జరిగితేనే నాణ్యమైన పంట రైతులకు అందుబాటులోనికి వస్తుంది. పంటలో వివిధ దశలలో కల్తీలను గుర్తించి ఏరివేయటంతో పాటు, వివిధ దశలలో సిఫారసు మేరకు సాగులో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే అధిక స్థాయిలో నాణ్యమైన విత్తనోత్పత్తి జరుగుతుంది. ఏ ఒక్క స్థాయిలో పొరపాటు జరిగినా – విత్తనం సేకరించడం, విత్తన ప్రమాణాలను, మొలకెత్తే శక్తిని లెక్కగట్టడం, పొలం తయారీ, పొలం ఎంపిక, విత్తే అదును, విత్తే లోతు, పంట వివిధ దశలలో చీడపీడల యాజమాన్యం, కలుపు నివారణ, అంతరకృషి,

సస్యరక్షణ, సాగు నీటి యాజమాన్యం, పంట తీయడం, ఆరబెట్టడం అన్ని సక్రమంగా జరిగితే నాణ్యమైన విత్తనం అభివృద్ధి అవుతుంది.

ఉన్నత ప్రమాణాలున్న విత్తనం ఆవశ్యకత : ఉన్నత ప్రమాణాలున్న విత్తనం నుండి వచ్చే పంట దిగుబడి అధికంగా ఉండటంతో పాటు అంతా ఒకే పరిమాణంలో కాయలు, గింజలు ఉంటాయి. పై పొట్టు తీసే యంత్రాలు అన్ని ఒకే రకమైన గింజలు ఉంటే సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. వేయించిన తరువాత ఒకే రంగులో ఉంటాయి. ఇలాంటి సారుప్యత ఉండటం ఎగుమతి చేయడానికి, మన దేశంలో కూడా మంచి ధర రావటానికి దోహద పడుతుంది. వివిధ రకాల తినుబండారాల తయారీకి కూడ అనువుగా ఉంటుంది. కల్తీ విత్తనాలను సాగు చేస్తే దిగుబడి తగ్గుతుంది, ఉత్పత్తి నాణ్యత బాగుండదు. కాయలు, గింజల పరిమాణంలోని వ్యత్యాసం వల్ల ఎగుమతికి, వివిధ తినుబండారాల ఉత్పత్తిలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అన్ని ఒకేసారి పక్వానికిరావు. ఒక రకం మొక్కలు ముందుగా పక్వానికి వస్తాయి. ఇంకోక రకం మొక్కలు కొంచెం ఆలస్యంగా పక్వానికి వస్తాయి, కానీ పంట తీయడం ఒకేసారి జరగడం వల్ల, తీసిన పంటలో వివిధ పరిమాణంలో కాయలు, గింజలు ఉంటాయి. దిగుబడి తగ్గడంతో పాటు వాణిజ్య సరళిలో అమ్ముకోవడానికి మంచి ధర రాదు.

నాణ్యమైన విత్తనాభివృద్ధికి వేరుశనగలో చేపట్టవలసిన చర్యలు : పెద్ద మొత్తంలో విత్తనం అవసరం కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన, ప్రైవేటు సంస్థలైన ఈ పనిని చేయడం చాలా కష్ట సాధ్యం. ప్రైవేటు సంస్థలు వేరుశనగ విత్తనోత్పత్తి చేయడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో అధిక దిగుబడి, రకరకాల సమస్యలను ఎదుర్కొనే శక్తి గల క్రొత్త రకాలను రైతులకు లభించేటట్లు చేయడానికి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో పాటు రైతులు వాళ్ళ స్థాయిలో ఫౌండేషన్ విత్తనంను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన నేషనల్ సీడ్స్ కార్పోరేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ, ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని పరిశోధనా స్థానాలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల నుండి సేకరించుకొని విత్తనోత్పత్తిలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను తీసుకొని విత్తనాభివృద్ధిని చేయవచ్చును. రైతు మిత్ర గ్రూపుల ద్వారా లేదా రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా లేదా అలాంటి ఇతర గ్రూపుల ద్వారా సేకరించుకొని లేదా అభివృద్ధి చేసి అందరి రైతులకు అందేటట్లు చేయవచ్చును. దీని ద్వారా విత్తనం సకాలంలో, నమ్మకమైన మన సంస్థ ద్వారా తక్కువ ధరకు అందుతుంది. వేరుశనగ సాగులో ప్రధాన ఖర్చు విత్తనం కొనుగోలు కోసం వెచ్చించకుండా సాగు ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చును. కల్తీ జరగకుండా ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరములైనా వారి విత్తనమును వారు వాడుకోవచ్చును. ఎందుకంటే వేరుశనగలో ప్రత్యుత్పత్తి స్వపరాగ సంపర్కం ద్వారా జరుగుతుంది. పుప్పొడి ద్వారా కల్తీ అయ్యే అవకాశం దాదాపు ఉండదు. వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా గ్రామ విత్తన పథకం లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా నాణ్యమైన విత్తనాన్ని అందుబాటులోనికి తీసుకొని రావచ్చును. దీని ద్వారా స్థానికంగా విత్తనం లభ్యమవ్వడమే కాకుండా రవాణా ఖర్చు తగ్గుతుంది. రైతు స్థాయిలో విత్తనోత్పత్తిలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను తెలుసుకునేముందు రకాలు విడుదలై నోటిపై అయిన తరువాత విత్తనం ఏ స్థాయిలలో/ దశలలో పెంపొందింపబడుతుందో తెలుసుకోవాలి.

విత్తన వర్గీకరణ :

1. న్యూక్లియస్ విత్తనం : రకాన్ని రూపొందించిన బ్రీడరు ఆధ్వర్యంలో ప్రొజనీ-రో పద్ధతిలో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.

బ్రీడరు, ఫౌండేషన్ విత్తనోత్పత్తి చేసే పొలాల నుండి ఆయా రకాల అసలు గుణాలున్న, కాయలు అధికంగా ఉన్న మొక్కలను ఎంపిక చేసి, ప్రతి మొక్క సంతతిని విడివిడిగా వరుసలలో విత్తి, వివిధ దశలలో మొక్కల సంతతిని పరిశీలించాలి. ఏదైనా వరుసలో ఆయా రకం అసలు గుణాలు లేకపోతే ఆ వరుసను తీసివేయాలి. అసలు గుణాలున్న మొక్కల సంతతి నుండి వచ్చిన కాయలను కలిపితే వచ్చేదే న్యూక్లియస్ విత్తనం. ఈ విత్తనం అత్యున్నత జన్యు స్వచ్ఛత ప్రమాణాలున్న విత్తనం. బ్రీడరు, న్యూక్లియస్ విత్తనాలకు నిర్ధిష్ట ప్రమాణాలు ఏమి లేవు. కాని, భారత విత్తన కనిష్ఠ ధృవీకరణ ప్రమాణాల ప్రకారం బ్రీడరు విత్తనం అత్యున్నత స్థాయి ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటే తరువాత స్థాయిలలో జరిగే ఫౌండేషన్, ధృవీకరించిన విత్తనంలో ప్రమాణాలు నిర్దేశింపబడిన ప్రమాణాలకు ధీటుగా ఉంటాయి.

2. బ్రీడరు విత్తనం : న్యూక్లియస్ విత్తనం నుండి బ్రీడరు విత్తనం రకాన్ని రూపొందించిన బ్రీడరు / ఆ పంటలో అనుభవం ఉన్న బ్రీడర్ల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. విత్తనోత్పత్తి నిష్పత్తి వేరుశనగలో తక్కువ కాబట్టి బ్రీడరు విత్తనంను రెండు స్థాయిలలో – బ్రీడరు విత్తనం దశ – 1, బ్రీడరు విత్తనం దశ–2 గా ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. దశ 1 విత్తనాన్ని దశ –2 విత్తనోత్పత్తికి ఉపయోగించవచ్చును.

3. ఫౌండేషన్ (పునాది) విత్తనం : ఈ విత్తనాన్ని బ్రీడరు విత్తనం నుండి ఉత్పత్తి చేస్తారు. జన్యుస్వచ్ఛత, జన్యు ప్రమాణాలు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటాయి. గుర్తింపు పొందిన సాంకేతిక నిపుణుల ధృవీకరణ సంస్థలు ఆధ్వర్యంలో ఫౌండేషన్ విత్తనం ఉత్పత్తి జరుగుతుంది.

4. ధృవీకరించిన విత్తనం : ఫౌండేషన్ విత్తనం నుండి గుర్తింపు పొందిన సాంకేతిక నిపుణుల / ధృవీకరణ సంస్థల పర్యవేక్షణలో ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. రైతులకు వాణిజ్య సరళిలో విస్తృత సాగుకు లభ్యమయ్యేది ఈ స్థాయి విత్తనమే.

అభ్యుదయ రైతులు, వివిధ రైతు సంఘాలు, చిన్న స్థాయి వ్యాపారస్తులు విడుదలైన రకాలను విత్తనాభివృద్ధి చేసి ట్రూత్‌ఫుల్ విత్తనముగా అమ్మవచ్చును. వ్యవసాయ శాఖ, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సమన్వయంతో గ్రామీణ విత్తనోత్పత్తి ప్రణాళికల ద్వారా విత్తన ఉత్పత్తి క్షేత్రాలతో విత్తనాభివృద్ధి చేయాలి. రైతులు వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళ పొలంలో పండిన విత్తనమును విత్తనము కోసం విడిగా సేకరించుకొని భద్రపరచుకోవాలి.

వేరుశనగ విత్తనోత్పత్తి ముఖ్యాంశాలు :

- మూల విత్తనాన్ని పరిశోధనా స్థానం / ఎ.పి. సీడ్స్ / ఎన్.ఎస్.సి. / ఎ.పి. ఆయిల్ ఫెడ్ లాంటి నమ్మకమైన సంస్థల నుండి సేకరించాలి.
- విత్తన సేకరణ చేసే ముందు / విత్తే ముందు మొలక శాతం నిర్ధారించుకోవాలి. మొలకశాతం 85 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు.
- పంటకు అనువైన విత్తే అదునులో విత్తాలి. ఖరీఫ్‌లో జూన్–జులై మాసాలలో, రబీలో నవంబరు–డిసెంబరు మాసాలల్లో విత్తుకోవాలి.
- వేరుశనగ సాగుకు అనువైన నేలలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. నీరు త్వరగా ఇంకిపోవు తేలికపాటి ఎర్రనేలల్లో తగినంత సేంద్రీయ పదార్థాలు, కాల్షియం, గంధకం ఉండే భూములు శ్రేష్ఠమైనవి.

- నీటి వసతి ఉన్న పొలాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముందు సీజనులో అదే పొలములో విత్తనోత్పత్తి చేయబోయే రకం కాకుండా వేరే రకం సాగు చేసి ఉండకూడదు. ఆ రకం కాయలు భూమిలో ఉండి విత్తనోత్పత్తి కోసం వేసిన రకంతో బాటు మొలకెత్తి తద్వారా విత్తనోత్పత్తి కోసం వేసిన రకంతో కల్తీ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
- వేర్పాటు దూరం రకానికి రకానికి మధ్య అన్ని ప్రక్కల నుండి 3 మీ. ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఆయా సీజనులో సిఫారసు మేరకు సాగులో మెళకువలు పాటించాలి – నేలల తయారీ నుండి పంట తీయడం వరకు.
- కల్తీ మొక్కలను వివిధ దశలలో – పూత దశ, పెరిగే దశ, పంట తీసేటప్పుడు ఆయా రకాల గుణాలు లేని మొక్కలను కల్తీ మొక్కలుగా గుర్తించి ఏరి వేయాలి. ఉదాహరణకు ధరణి రకంలో నారాయణి రకం కల్తీ అయ్యి ఉంటే పూత దశలో, పైరు ఎదిగే దశలో సులభంగా గుర్తించవచ్చును. ధరణి రకం భిన్న పత్రాలు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో బూడిద రంగు పూతతో, నారాయణి రకం భిన్న పత్రాల కంటే కొంచెం తక్కువ వెడల్పుతో ఉంటాయి. పంట తీసేటప్పుడు కాయలపైన ఉండే గీరలు నారాయణి రకంలో ప్రస్ఫుటంగా ఉంటాయి. గింజల కాయలలో గింజకు గింజకు మధ్య నొక్కు ప్రస్ఫుటంగా ఉంటుంది. ధరణి రకంలో గీరలు, నొక్కు అంత ప్రస్ఫుటంగా ఉండవు.
- పంట పక్వానికి వచ్చినప్పుడే తీయాలి. ముందుగా తీయడం, ఆలస్యంగా తీయడం రెండూ హానికరమే. పంట పక్వానికి వచ్చినపుడు ఆకులు, కొమ్మలు పసుపు రంగుకు తిరుగుతాయి. కాయ డొల్ల లోపలి భాగం నల్లగా గోధుమ రంగుకు మారుతుంది. ప్రతి మొక్కలో సుమారు 80% ఈ విధంగా ఉంటే పంట తీయాలి.
- పంట తీసిన తరువాత మొక్కలను ఓదెలుగా వరుసగా ఉంచాలి. కాయలను పరిశీలించి ఏ మొక్కలోనైనా కాయలు ఆయా రకం కాయలను పోలిక లేకపోతే ఆ మొక్కలను ఏరి వేయాలి. తెగుళ్ళు సోకిన మొక్కలను కూడా తీసివేయాలి.
- పంట తీసేటప్పుడు కాయలలో 35–60 శాతం తేమ ఉంటుంది. తేమను 8–9 శాతానికి వచ్చేటట్లు వెంటనే ఆరబెట్టాలి. అధిక తేమ శాతం ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే కాయలలో శిలీంధ్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.
- రబీ సీజనులో పండించే పంట తీసేటప్పుడు వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత 40^0 సెంటీగ్రేడ్ దాటుతుంది. ఇలాంటప్పుడు కాయలను నేరుగా ఎండలో సిమెంటు ఫ్లోర్స్ పైన ఆరబెట్టకూడదు. నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి. ఎండ తీవ్రత ఉదయం 11 గంటల వరకు మరియు సాయంత్రం 4 గంటల తరువాత తక్కువ కాబట్టి ఈ సమయాలలో ఎండలో ఆరబెట్టుకోవచ్చును.
- ఆరబెట్టేటప్పుడు వేరే రకాల కాయలు కలిసిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. వీలైనంత వరకు కూలీలతో కాయలను మొక్కల నుండి వేరు చేయాలి. నూర్పిడి యంత్రాలను ఉపయోగించేటప్పుడు, యంత్రాలను రకం మారినపుడు ప్రతిసారి శుభ్రపరచాలి.

- విత్తనం కోసం బాగా ముదిరిన కాయలను శుభ్రపరచి నిల్వ చేయాలి.
- నిల్వలో కాయలను బూజు (శిలీంధ్రాలు), పురుగులు, అతి వేడి, తేమ నుండి కాపాడాలి.
- నిల్వకు పాలిథీన్ లైనింగ్ ఉన్న గోనె సంచులను వాడాలి. బస్తాలను ఒక దానిపైన ఒకటి వరుసలో 10 బస్తాల చొప్పున అమర్చాలి. వరుసకు వరుసకు మధ్య కొంచెం స్థలం వదలాలి. నేరుగా నేల మీద పర్చకుండా క్రింద కొయ్య చెక్కలను, ఇనుము పెలేట్స్‌ను అమర్చాలి. గదులలో బాగా వెలుతురు, గాలి రావాలి.
- కాయలు మొలకెత్తే శక్తిని ఎక్కువ కాలం కోల్పోకుండా ఉండాలంటే నిల్వ చేసే ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండాలి. గాలిలో తేమ 65-70 శాతం ఉండాలి. దీని కంటే ఎక్కువగా ఉంటే శిలీంధ్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.
- అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ మాత్రలను మెత్తి వేసి కాయలను తొలిచే పురుగులను అదుపులో ఉంచవచ్చు.
- విత్తన స్థాయిని బట్టి సర్టిఫికేషన్ టాగ్స్‌ను ప్రతి సంచికి కుట్టాలి. బ్రీడరు విత్తనముకు టాగ్ పసుపు రంగులోను, ఫౌండేషన్ విత్తనముకు తెల్లరంగు టాగ్‌ను, సర్టిఫైడ్ విత్తనముకు నీలి రంగు టాగ్ ఉంటుంది.

ఫార్మల్ విత్తన వ్యవస్థ : శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన క్రొత్త రకాలను దేశ స్థాయిలో సెంట్రల్ వరైటల్ రిలీజ్ కమిటీ, రాష్ట్ర స్థాయిలో స్టేట్ వరైటల్ రిలీజ్ కమిటీ విడుదల చేస్తుంది. స్టేట్ సీడ్ సబ్ కమిటీ విడుదల చేసిన రకాల నోటిఫికేషన్‌ను సెంట్రల్ సీడ్ సబ్ కమిటినే చేస్తుంది. నోటిఫైడ్ రకాలను మాత్రమే ఫార్మల్ సీడ్ సిస్టమ్‌లో సర్టిఫై చేయవచ్చును.

క్రొత్త రకాలను తొందరగా అందుబాటులోకి తేవడానికి బ్రీడరు విత్తనం అభివృద్ధి చేయాలి. సీడ్ కార్పోరేషన్స్, కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మొదలగు వివిధ సంస్థలు, వ్యవసాయశాఖ, మినిస్టరీ ఆఫ్ కో ఆపరేషన్, భారత ప్రభుత్వము విత్తన విభాగం వారికి విత్తన అవసరాలను ముందుగానే తెలియజేయాలి. ప్రైవేటు కంపెనీలు వాళ్ళ అవసరాలను సీడ్ అసోసియేషన్ వారికి తెలియజేస్తే వాళ్ళు అందరి అవసరాలను క్రోడికరించి వ్యవసాయ విత్తన విభాగానికి తెలియజేస్తారు. దీనిని డిప్యూటి డైరెక్టర్ జనరల్ (పంటలు), ఐ.సి.ఎ.ఆర్.(ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్), ఆయా పంటల ప్రాజెక్టు కో-ఆర్డినేటర్స్ ద్వారా విత్తనాభివృద్ధి జరిగేటట్లు చూస్తారు. విత్తనాభివృద్ధి కేంద్రాలు విత్తనోత్పత్తిలో పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు కో-ఆర్డినేటర్స్‌కు తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. బ్రీడరు విత్తనం సీడ్ సర్టిఫికేషన్ పరిధిలో లేనప్పటికి మల్టీ డిసిప్లినరి టీమ్ - ప్లాంట్ బ్రీడర్స్, పాథాలజిస్ట్, ఎంటమాలజిస్ట్, డి.జి.ఆర్. శాస్త్రవేత్త / నేషనల్ సీడ్ ప్రాజెక్ట్ శాస్త్రవేత్త పంట వివిధ దశలలో పొలంలో ఆయా రకాల గుణగణాలను, వేర్పాటు దూరాన్ని పరిశీలిస్తారు. పంట వివిధ దశలలో పరిశీలించవలసిన గుణగణాలను, వాటిని గుర్తించడానికి అనువైన దశలను గురించి విపులంగా పట్టికలో పొందుపరచటమైనది.

ముఖ్య గుణాలు – గుర్తించడానికి అనువైన దశ

గుణము	దశ	వైవిధ్యము
పెరిగే విధము		నిటారు / కొంచెం గుబురు / ప్రాకడం
రెమ్మలు, పూలు వచ్చే పద్ధతి		పూలు, రెమ్మలు మార్చి రావడం / వరుసగా అన్ని కణుపుల నుండి ప్రధాన రెమ్మపైన పూలు రావడం / ప్రధాన రెమ్మపైన పూలు ఉండడం, నియమ పద్ధతిలో లేకుండుట / ప్రధాన రెమ్మపైన పూలు ఉండడం, లేకుండడం
భిన్న పత్రముల రంగు	పూత దశ	లేత ఆకుపచ్చ / ఆకుపచ్చ / ముదురాకుపచ్చ
భిన్న పత్రముల పరిమాణము	నుండి కాయలు	చిన్నవి / పెద్దవి / మధ్యస్థం
భిన్న పత్రముల ఆకారము	పట్టే వరకు	కూనియేట్ / అబ్ కూనియేట్ / ఎలిప్టిక్ / అబ్‌లాంగ్–ఎలిప్టిక్/ నేరో ఎలిప్టిక్ / వైడ్–ఎలిప్టిక్ / సబ్ ఆర్‌బిక్యులార్ / ఓవేట్ / అబ్ లాంగ్–లాంసియోలేట్ / లాంసియోలేట్
భిన్న పత్రముల కొన		అబ్‌ట్యూజ్ / అక్యూట్ / మ్యూక్రోనేట్
కాండముపై రంగు		ఉంది / లేదు
పుష్పగుచ్ఛ రకము		సింపుల్ / కాంపౌండ్
పుష్పం పెద్ద రేకు రంగు	పూత దశ	పసుపు / కాషాయము / ముదురు కాషాయము రంగు / యిటుక మట్టి రంగు
ఊడలపై రంగు	పూత దశ	ఉంది/లేదు
పంట పక్వదశ	పంట తీసేటప్పుడు	తొందరగా / మధ్యస్థంగా /ఆలస్యంగా
సమయము కాయ ముక్కు		ఉంది / లేదు / కొంచెము / మధ్యస్థము / ప్రస్ఫుటం
కాయపైన గీరలు		ఉంది / లేదు / కొంచెము / మధ్యస్థము / ప్రస్ఫుటం
కాయలలో గింజల మధ్య నొక్కు		ఉంది / లేదు / కొంచెము / మధ్యస్థము / ప్రస్ఫుటం
గింజల రంగు		ఎరుపు / లేత గులాబీ రంగు / మిశ్రమ రంగు

గమనిక : భిన్న పత్రాల రంగు మారవచ్చు. ఉదాహరణకు ఇనుప ధాతు లోపమున్నప్పుడు పత్రాల రంగు పసుపు పచ్చగా పాలిపోయినట్లు ఉంటుంది. బెట్ట వచ్చినప్పుడు అన్ని రకాల ఆకులు ముదురాకు పచ్చరంగులో ఉంటాయి. ఊడలపైన, కాండముపైన రంగు ఉష్ణోగ్రతను, పండించే కాలాన్ని బట్టి మారవచ్చు. గింజల రంగు పంట తీసిన వెంటనే చూడాలి. కొన్ని రోజుల తరువాత రంగు మారవచ్చు.

కాయలలో గింజల సంఖ్య – ఎక్కువ శాతము ఎలా ఉంటాయో నిర్ణయింపబడుతుంది. ఎక్కువ కాయలు మూడు గింజల కాయలుంటే మూడు గింజల రకమని, ఎక్కువ రెండు గింజల కాయలుంటే రెండు గింజల రకమని నిర్ధారిస్తారు. పంట కాలములో పరిస్థితులను బట్టి ఈ నిష్పత్తి మారవచ్చు.

మన దేశంలో నిర్దేశింపబడిన విత్తన ప్రమాణాలు క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడినవి.

(సెంట్రల్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ బోర్డు, వ్యవసాయ మంత్రిత్వశాఖ, భారత ప్రభుత్వం)

అంశం	విత్తన స్థాయి	
	ఫౌండేషన్	సర్టిఫైడ్
స్వచ్ఛమైన విత్తనము (కనిష్ఠ పరిమితి)	96%	96%
జడ పదార్థము (గరిష్ఠ పరిమితి)	4%	4%
ఇతర రకాల విత్తనాలు (గరిష్ఠ పరిమితి)	0.1%	0.2%
ఇతర పంటల విత్తనాలు (గరిష్ఠ పరిమితి)	ఉండకూడదు	ఉండకూడదు
కలుపు మొక్కల విత్తనాలు (గరిష్ఠ పరిమితి)	ఉండకూడదు	ఉండకూడదు
మొలక శాతం (కనిష్ఠ పరిమితి)	70%	70%
తేమ శాతం (గరిష్ఠ పరిమితి)	9%	9%

నువ్వు పంటలో విత్తనోత్పత్తి

నువ్వు పంటలో విత్తనోత్పత్తి -మెళకువలు : నువ్వు పంటలో సుమారు 95% స్వపరాగ సంపర్కం, 5% పరపరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది. నువ్వు రకాలైన గౌరి, మాధవి, యలమంచిలి 11 (వరహా), యలమంచిలి 17 (గౌతమ్), యలమంచిలి 66 (శారద) మన రాష్ట్రానికి ఖరీఫ్ మరియు రబీ/వేసవి కాలలకు అనుకూలం. ఇవి గోధుమ రంగు గింజ కలవి.

వేర్పాటు దూరం : రకానికి రకానికి మధ్య 100 మీ. ఉండాలి.

కేళీల ఏరివేత :

కేళీల ఏరివేత విత్తనోత్పత్తిలో ముఖ్యమైనది. పూత దశకు ముందు, పూత దశలో మరియు పంట కోసే ముందు కేళీలను ఏరి వేయాలి. కేళీల ఏరివేత దశలో ప్రధానంగా మొక్క ఎత్తు, కొమ్మల అమరిక విధానం, ఆకుల రంగు, ఆకులపై నూగు, పూత రంగు, కాయ రంగు, గింజ రంగు మొదలగు లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని చేయడం వల్ల రకాల స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవచ్చు.

పంట కోత :

ఆకులు పసుపు రంగుగా మారినప్పుడు కాయలలో గింజలు నలుపు రంగుగా మారతాయి. ఆ సమయంలో పంట కోయాలి. ఎండలో ఆరబెట్టి గింజలను వేరు చేయాలి. విత్తనాన్ని 40^0 సెంటీగ్రేడ్ అంతకు మించిన ఎండలో ఆరబెట్టకూడదు. మొలక శాతం తగ్గుతుంది.

నువ్వు పంట యాజమాన్య పద్ధతులను నువ్వు సాగులో వివరించబడింది.

ప్రొద్దుతిరుగుడులో విత్తనోత్పత్తి

ప్రొద్దుతిరుగుడు పంటలో విత్తనోత్పత్తి మెళకువలు : ప్రొద్దుతిరుగుడు పంటలో మోర్డెన్, డి.ఆర్.ఎస్.ఎఫ్.-108, కె.బి.యస్.హెచ్.-1, ఎన్.డి.యస్.హెచ్.-1, డి.ఆర్.యస్.హెచ్.-1, ఎన్.బి.యస్.హెచ్.-1012, కె.బి.యస్.హెచ్.-44, డి.ఆర్.యస్.ఎఫ్.-113 రకాలు మన రాష్ట్రానికి అనుకూలం.

విత్తనోత్పత్తి : అధిక నాణ్యత కలిగిన సంకర రకాల ఉత్పత్తి మరియు సరఫరాకు బాగా ముఖ్యమైనది. న్యూక్లియస్, బ్రీడర్, ఫౌండేషన్ తల్లిదండ్రుల మరియు రకాల విత్తన విధానం చాలా ప్రధానమైనది.

వేర్పాటు దూరం : ప్రొద్దుతిరుగుడులో విత్తనోత్పత్తి పరపరాగ సంపర్కం వలన జరుగుతుంది. అందువల్ల విత్తనోత్పత్తిలో అవాంచనీయ పుప్పొడిని నివారించటం చాలా అవసరం. అయితే మరింత ఎక్కువగా పరపరాగ సంపర్కం జరగటం కోసం ప్రధానంగా తేనెటీగలను ఆకర్షిస్తుంది. విత్తనోత్పత్తికి ఎంపిక చేసిన పొలాన్ని ఇతర ప్రొద్దుతిరుగుడు పువ్వు పంట నుండి బ్రీడరు విత్తనోత్పత్తి కోసం 1000 మీ. పైగా వేర్పాటు దూరం ఉండాలి. ఫౌండేషన్ మరియు సర్టిఫైడ్ విత్తనాల కోసం 600 మీ., 400 మీ. ఉంచవచ్చును. అయితే సూచించిన ప్రమాణాల కంటే ఎక్కువ దూరం ఉంటే ఎక్కువ జన్యు స్వచ్ఛత పొందవచ్చు.

తల్లిదండ్రుల మొక్కలను సంశయాలలో నాటడం :

తల్లిదండ్రుల పుష్ప ఉత్పత్తిని ఎ వరుస, మరియు సంకర విత్తనాల ఉత్పత్తిని చేపట్టడానికి ముందే కనుగొనాలి. సంకర విత్తనోత్పత్తిలో అవసరాలు

సం.	సంశయం/అవసరం	సంకరాలు
1.	ఒకేసారి ఎ మరియు ఆర్ వరుసలను నాటడం	డి.ఆర్.ఎస్.హెచ్.1
2.	ఆర్ వరుసలను ఎ కంటే 3-5 రోజుల ముందు నాటడం	కె.బి.ఎస్.హెచ్.44
3.	ఆర్ వరుసలను ఎ వరుసల కంటే 6-7 రోజుల ముందు నాటడం	కె.బి.ఎస్.హెచ్.1 ఎన్.డి.ఎస్.హెచ్.1 ఆర్.ఎస్.ఎఫ్.హెచ్.1

నేలలు : నీటి వసతి కలిగిన ఎరుపు, నల్లరేగడి, గరప సారవంతమైన నేలలు అనుకూలం. మురుగునీరు నిలిచే భూములు, చవుడు భూములు పనికి రావు.

అనువైన కాలం : విత్తనోత్పత్తికి, రబీ, రబీ/వేసవి కాలాలు అనుకూలం. రబీలో అక్టోబర్–నవంబర్, రబీ/ వేసవి పంటగా డిసెంబరు–జనవరి నెలల్లో విత్తుకోవాలి. పూత దశలో ఉష్ణోగ్రత 44^0 సెంటీగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ కాని, 12 డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ కాని ఉండరాదు.

విత్తన మోతాదు : హెక్టారుకు 5 కిలోలు ఆడ విత్తనం, 2 కిలోలు మగ విత్తనం అవసరం.

విత్తనశుద్ధి : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 6 గ్రా. కిలో విత్తనానికి కలిపి శుద్ధి చేయడం వల్ల రసం పీల్చే పురుగులను 40 రోజుల వరకు అరికట్టవచ్చు.

విత్తే దూరం : తేలిక నేలల్లో వరుసల మధ్య 45 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 20–25 సెం.మీ., బరువు నేలల్లో వరుసల మధ్య 60 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 30 సెం.మీ. ఉండేటట్లు కుదురుకు 2–3 విత్తనాలు నాటాలి.

నిర్వహణ బ్రీడింగ్ :

బహిరంగ సంపర్క రకాల యొక్క న్యూక్లియస్ విత్తనోత్పత్తి :

వేర్పాటు దూరంలో పెంచిన 5000–8000 మొక్కలను మూల మొక్కలుగా ఎంపిక చేయాలి. ఈ మొక్కల విత్తన దిగుబడి, నూనె శాతం, 100 విత్తనాల బరువు, పొట్టు శాతం పరీక్ష చేయాలి. ఇలాంటి ఉత్తమ మొక్కలను పరీక్షించి ఎంపిక చేసిన పిల్ల మొక్కలను ఒకే వరుసలో పెంచాలి. ప్రతి 10–20 మొక్కలకు ఒక చెక్ రకాన్ని వేయాలి. కొంత భాగాన్ని స్వపరాగ సంపర్కం చేసి ఆ విత్తనాన్ని తరువాత తరం కోసం ఉంచాలి. పిల్ల మొక్కల కోత తరువాత దిగుబడి, నూనె శాతం ఇతర లక్షణాలను పరీక్షించాలి. తదుపరి 150–200 మంచి మొక్కలను ఎంపిక చేయాలి. ఈ విధంగా ఎంపిక చేసిన మొక్కల విత్తనాలను న్యూక్లియస్ విత్తనాలుగా తయారు చేయాలి.

సంకర మొక్కల యొక్క తల్లిదండ్రుల న్యూక్లియస్ విత్తనోత్పత్తి : సంకర మొక్కల నాణ్యత వాటి తల్లిదండ్రుల జన్యు స్వచ్ఛత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

బి పంక్తి నిర్వహణ :

పంట కాలం 1 : బి వరుస మొక్కలను మూల మొక్కల నుండి వేరు చేసి పెద్ద సంఖ్యలో పెంచాలి.

మొదటి దశ : ఏక రీతిగా ఉన్న మొక్క ఎత్తు, పక్వత, విత్తనాన్ని నింపే సామర్థ్యం, తల ఆకారం మరియు పరిమాణం ఉన్న 5000–8000 మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

రెండవ దశ : పిల్ల మొక్కల పరీక్ష కోసం 1000–5000 మొక్కలను వాటి విత్తన దిగుబడి, నూనె శాతం ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకోవాలి.

మూడవ దశ : బ్రీడరు విత్తనోత్పత్తిని న్యూక్లియస్ విత్తనాన్ని ఉపయోగించి పెంచుట.

పూత సమయంలో ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న 1000 మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. చివరగా పొలంలో మరియు ప్రయోగశాలలో చేసిన విత్తన రంగు, ఆకారం, ఇతర లక్షణాల ఆధారంగా స్వపరాగం చేసిన మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

పంట కాలం 2 : స్వపరాగ మొక్కల విత్తనంను శేష విత్తనంగా గుర్తించి, ఆ విధంగా గుర్తించిన మొక్కల విత్తనాన్ని ప్రతి వరుసకు ఒక మొక్క యొక్క విత్తనాన్ని 2 రిప్లికేషన్స్‌గా వేసుకోవాలి. పిల్ల మొక్కల వరుసలలో విత్తన దిగుబడి, నూనె శాతం, ఇతర లక్షణాలు బి వరుసలకు అనుకూలంగా లేకపోతే తొలగించాలి. మంచి లక్షణాలు కలిగిన పిల్ల మొక్కలను సేకరించాలి.

పంట కాలం 3 : వేరుచేయబడిన విత్తనాలను అధిక మొత్తంలో పెంచాలి. పూత దశలో తగినంత పరాగ సంపర్కం చేతి ద్వారా చేయాలి. వృద్ధి చేసిన బి వరుస విత్తనాలను మూల విత్తనాలుగా పరిగణించాలి.

ఎ వరుసల నిర్వహణ :

కాలం 1 : ఎ వరుసల నిర్వహణకు ముందే బి వరుసల నిర్వహణ 3 పంట కాలాలు దాటిపోతుంది. కావున ఈ ప్రక్రియ అంతా 4 కాలాల్లో పూర్తవుతుంది. ఎ వరుసలను బి వరుసలతో ఒక దాని తరువాత ఒకటి వేసికోవాలి. ఎ మరియు బి వరుస మొక్కలను జతలు పరంగా సంపర్కం చేయాలి. ఈ జతలను 1ఎ–1బి, 2ఎ–2బి లుగా గుర్తించాలి.

కాలం 2 : శేష విత్తనాలను వేరుచేసాక ఎ మరియు బి వరుసలలో స్వపరాగ లేక పరపరాగ సంపర్కం చేసిన విత్తనాలను ఎ మరియు బి లను జతగా ఒక దాని తరువాత వేరొక వరుసలో వేసుకోవాలి. ఎ మరియు బి వరుసలను అవసరమైన లక్షణాల కోసం అధ్యయనం చేయాలి. ఎ వరుసలలో పరాగ రేణువులు రాల్చే మొక్కలను మరియు వాటి బి వరుస మొక్కలను తొలగించాలి. ఎ మరియు బి వరుసలలో అత్యుత్తమ లక్షణాలు కలిగిన మొక్కలను ఎంపిక చేసి విత్తనాలను అధిక మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేసి మూల విత్తనంగా ఉపయోగించాలి.

ఆర్ వరుసల నిర్వహణ :

కాలం 1 : అత్యధిక మొత్తంలో ఆర్ వరస మొక్కలను పెంచుకోవాలి. పూత సమయంలో మంచి ప్రమాణాలు కలిగిన 1000 మొక్కలను స్వపరాగ సంపర్కానికి ఉపయోగించాలి. వాటి నుండి 200 మొక్కలను ఉత్తమ లక్షణాలు కలిగిన వాటిని ఎంపిక చేయాలి.

కాలం 2 : ఎంపిక చేసిన మొక్కల నుండి ప్రతి వరుసకు ఒక మొక్క విత్తనాన్ని 2 రిప్లికేషన్లలో వేసుకోవాలి. పిల్ల మొక్కల లక్షణాలు ఆర్ వరుసల మొక్కల లక్షణాలతో విభేదిస్తే ఆ మొక్కలను తిరస్కరించాలి. పిల్ల మొక్కలలో అధిక దిగుబడి, నూనె శాతం, వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలను గుర్తించి ఎంపిక చేయాలి.

కాలం 3 : శేష విత్తనాన్ని అధిక మొత్తంలో ఎంచుకొని, వాటిని పూత దశ వచ్చిన తరువాత చేతి ద్వారా పరాగ సంపర్కం చేయాలి. విత్తనాన్ని అన్ని మొక్కల నుండి ఉత్పత్తి చేసి ఆర్ వరుసల యొక్క మూల విత్తనంగా ఉపయోగించుకోవాలి.

ఫౌండేషన్ విత్తనం ఉత్పత్తి : ప్రొద్దుతిరుగుడులో ఎక్కువగా పరపరాగ సంపర్కం జరగడం వల్ల, రకాల మధ్య దూరం కనీసం 1000 మీటర్లు ఉండాలి. నిర్ధిష్ట రకాల బ్రీడర్ విత్తనాలను పెంచాలి. మొక్కలను పరిశీలించి కావలసిన లక్షణాలు లేని వాటిని తీసివేయాలి. పంట కోత తరవాత అన్ని మొక్కల విత్తనాలను కోసి ఉంచుకోవాలి.

బ్రీడరు విత్తన ఉత్పత్తి :

మొదటి పద్ధతి : ఎ మరియు బి మొక్కల నిష్పత్తి 3:1 గా ఉండాలి. మంచి పరాగ సంపర్కానికి 2-2 గా విభజించాలి. ప్రతి 4 వరుసలకు ఒక కర్రను ఉంచుకోవాలి. ఈ వరుసలు క్రింది రకంగా ఉండాలి.

రెండవ పద్ధతి :

ఎ మరియు బి విత్తనాలను 3:1 నిష్పత్తిలో వరుసలలో వేయాలి. కేళీల ఏరివేత చేయాలి. ఎ వరుసలో నలుపు కీలం కలిగిన పసుపు పచ్చని పరాగ రేణువులను ఉత్పత్తి చేసే మొక్కలను బాహ్య కిరణ పుష్పాలు విచ్చుకున్న తరువాత తీసివేయాలి. పరాగ రేణువులు ఉత్పత్తికి ముందే కేళీలను ఏరివేయాలి. తగినంత విత్తనోత్పత్తికి కనీసం 4-6 సార్లు బి నుండి ఎ కు పరాగ సంపర్కాన్ని చేయాలి. బి వరుసలను ముందుగా కోత కోయాలి. వాటిని జాగ్రత్తగా ఎండబెట్టి నిల్వ ఉంచాలి. బి వరుస కోత తరువాత ఎ వరుసలను కూడ కోత కోయాలి. ఈ దశలో బి వరుసలు ఎ వరుసలతో కలుషితం కాకుండా చూడాలి. ఎ వరుసల నుండి వచ్చిన విత్తనం బ్రీడరు విత్తనం అవుతుంది.

బి పంక్తుల యొక్క బ్రీడరు విత్తనాల ఉత్పత్తి : బ్రీడరు విత్తనోత్పత్తికి మూల లేక న్యూక్లియస్ విత్తనాన్ని ఉపయోగించాలి. పూతకు ముందే కేళీలను ఏరి వేయాలి. మంచి విత్తనం కొరకు చేతి ద్వారా పరాగ సంపర్కం చేయాలి. పంట పక్వతకు వచ్చాక కోయాలి.

ఆర్ వరుసల బ్రీడరు విత్తనాల ఉత్పత్తి : ఆర్ వరుసల యొక్క మూల విత్తనాన్ని పెంచాలి. పూత దశలో చేతి ద్వారా పరాగ సంపర్కం చేయటం వల్ల దిగుబడిని పెంచవచ్చు. ప్రతి మొక్కను పరిశీలించి వేరే మొక్కలను తీసివేయాలి. పంట కోత తరువాత మంచి లక్షణాలు కలిగిన మొక్కలను కలుపుకోవాలి.

ఆముదంలో విత్తనోత్పత్తి

ఆముదములో సూటి మరియు సంకర రకాలు (హైబ్రిడ్) విత్తనోత్పత్తికి రబీ కాలం అనువైనది.

సూటి రకాల విత్తనోత్పత్తికి పాటించవలసిన పద్ధతులు :

1. నీటి సౌకర్యం గల ప్రదేశంలో, పొలం చుట్టూ 500 మీటర్ల వరకు ఎలాంటి ఆముదం లేని ప్రదేశంను ఎన్నుకోవాలి.
2. సెప్టెంబర్ రెండో పక్షం నుండి నవంబర్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకొనవచ్చును.
3. విత్తిన తరువాత మూడు దశలలో కేళీలను తీసి వేయవలెను.
   ఎ. విత్తిన 30-45 రోజుల శాఖీయ దశలో మొక్కలను కాండం రంగు, కణుపుల సంఖ్య, కణుపుల మధ్య దూరం, మొక్కపై గల మైనపు పూత మరియు ఆకుల ఆధారంగా గుర్తించి ఏరి వేయవలెను.
   బి. విత్తిన 60-65 రోజుల తర్వాత 2-3 రోజుల గడువులో నాలుగైదు సార్లు కణుపుల సంఖ్య మరియు ఎక్కువగా మగపూత వచ్చిన మొక్కల ఆధారంగా కేళీలను గుర్తించి తీసి వేయాలి.
   సి. విత్తిన 100-110 రోజుల దశలో కాయల లక్షణాల ఆధారంగా కేళీలను తీసివేయాలి.
4. సూటి రకపు విత్తనోత్పత్తిలో అన్ని వరుసలలోని కాయలను 2-3 సార్లు కోయవలసి వస్తుంది. సూటి రకపు విత్తనోత్పత్తి నుండి ఎకరాకు 10-15 క్వి. దిగుబడిని పొందవచ్చు.

సంకర రకాలు (హైబ్రిడ్) విత్తనోత్పత్తికి అనుసరించవలసిన పద్ధతులు :

1. నీటి సౌకర్యం గల ప్రదేశంలో పొలం చుట్టూ ఒక కిలోమీటరు వరకు ఎలాంటి ఆముదము మొక్కలు లేని ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకోవాలి.
2. విత్తుటకు సెప్టెంబరు మొదటి పక్షం నుండి అక్టోబరు మొదటి పక్షం వరకు అనుకూలమైనది.
3. ఆడ, మగ మొక్కలను 3:1 లేదా 4:1 వరుసలలో నాటుకోవాలి. విత్తిన తర్వాత నాలుగు దశలలో కేళీలను తీసివేయాలి.
   ఎ. మొదటి గెల వేయటానికి 45 రోజుల ముందు శాఖీయ దశలో వున్నప్పుడు ఆడ మరియు మగ వరుసల్లోని లక్షణాల కంటే భిన్నంగా వున్న మొక్కలను కాండం రంగు, కణుపుల సంఖ్య, కణుపుల మధ్య దూరం, మొక్కపై గల మైనపు పూత మరియు ఆకుల ఆధారంగా గుర్తించి ఏరివేయాలి.

బి. మొదటి గెల యొక్క పూత దశలో మగ వరుసలలోని మొక్కల క్రింది భాగంలో ఒకటి లేదా రెండు గుత్తుల మగ పుష్పాలు మాత్రమే ఉన్న మొక్కలను వుంచి, ఎక్కువగా మగపూత వచ్చిన మొక్కలను తీసివేయాలి. ఆడ మొక్కలలో గెల మొత్తం ఆడ పుష్పాలు వున్న మొక్కలను మాత్రమే ఉంచాలి. గెల క్రింది భాగాన మగ పుష్పాలు వస్తే అట్టి మొక్కలను పీకి వేయాలి. ఆడ మొక్కల గెలల్లో ఆడ పుష్పాల మధ్య తరచుగా మగ మొగ్గలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్టి మొగ్గలను ఎప్పటికప్పుడు విచ్చుకోకముందే తీసి వేయవలెను.

సి. రెండవ గెల యొక్క పూత దశలో మొక్క భౌతిక రూపం, పూత లక్షణాలు, కాయల లక్షణాల ఆధారంగా మరియు ఎక్కువ మగ పూలు వున్న కేళీ మొక్కలను తీసివేయాలి.

డి. మూడవ గెల యొక్క పూత మరియు కాయ దశల్లో, పూత మరియు కాయల లక్షణాల ఆధారంగా భిన్నంగా వున్న మొక్కలను పీకి వేయాలి.

ఆడ మొక్కల గెలలో ఆడ పుష్పాలు మధ్య మగ మొగ్గలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్టి మొగ్గలను ఎప్పటికప్పుడు విచ్చుకోక ముందే తీసి వేయవలెను. మిగతా యాజమాన్య పద్ధతులు మామూలుగా పాటించవలెను. ఆడ మరియు మగ మొక్కల ద్వారా వచ్చిన గెలలను వేరువేరుగా కోయాలి. ఆడ మొక్కల నుండి వచ్చు విత్తనాలను హైబ్రిడ్ విత్తనంగా వాడుకోవాలి. మేలైన యాజమాన్యంతో ఎకరానికి 4–5 క్వింటాళ్ళ హైబ్రిడ్ విత్తనం తయారు చేయవచ్చు.

వివిధ పంటలలో విత్తనోత్పత్తి సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

సంచాలకులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్తన ధృవీకరణ ఆధారిటీ., లాం, గుంటూరు – 522 034,
సెల్. నెం. 83319 34548

చెఱకు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చెఱకు పంటను సుమారు 40 వేల హెక్టారుల విస్తీర్ణములో సాగు చేస్తూ 30 లక్షల టన్నుల చెఱకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము (2023-24). చెఱకు పంట ద్వారా పంచదార, బెల్లం, ఖండసారి, మొలాసిస్, ఫిల్టర్ మడ్డి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. అధిక చెఱకు దిగుబడితోపాటు ఎక్కువ పంచదార పొందటానికి అనువైన శీతోష్ణ స్థితులు, రకములు, సాగుభూమి, సాగు పద్ధతులు, సస్యరక్షణ, సాగునీటి నాణ్యత అనే ఆరు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి.

వాతావరణం : ఎక్కువ సూర్యరశ్మి, వర్షపాతం, గాలిలో తేమ హెచ్చుగా ఉన్నప్పుడు చెఱకు ఏపుగా పెరుగుతుంది. రాత్రికన్నా పగటి వేళలు అధికంగా వుంటే (జూన్-జూలై) పెరుగుదలకు అనుకూలం. గాలిలో తక్కువ తేమ, చల్లటి పొడి వాతావరణం ఉంటే రసంలో పంచదార పెరుగుదలకు అనుకూలం. గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలకు మధ్య హెచ్చు వ్యత్యాసం (నవంబర్ నుండి మొదలవుతుంది) ఉంటే పంచదార శాతం అధికమవుతుంది.

రకాలు

నీటి పారుదల క్రింద : 81ఎ99, 84ఎ125, 86వి96, 2001ఎ63, 87ఎ298, 97ఎ85, 2003వి 46, 93ఎ145, 2003ఎ255, 2005 ఎ 128, 2009వి127, 2009ఎ 107, 2005టి 16, (స్వల్పకాలిక), 2012ఎ319, కోఎ7602, కోటి 8201, కో 7805, 98ఎ163, 2000ఎ225, 2009 ఎ 252 (మధ్యకాలిక).

వర్షాధార పరిస్థితులకు అనువైన రకాలు

జనవరి-ఫిబ్రవరిలో నాటటానికి : కోటి 8201, కోఎ7602, కో7219, 81ఎ99, 84ఎ125, 87ఎ298, 93ఎ145, 97ఎ85, 2001ఎ63, 2003ఎ255, 2005ఎ128, 2009ఎ107.

మే-జూన్ నెలల్లో నాటటానికి : కోటి 8201, 81ఎ99, 84ఎ125, 83ఎ30, 90ఎ272, 87ఎ298, 93ఎ145, 97ఎ85, 2001ఎ63, 2003ఎ255, 2005ఎ128, 2009ఎ107.

చౌడు భూములకు : 81ఎ99, 87ఎ298, 2000వి59, 99వి30, కోటి8201, 93ఎ145, 2009ఎ107, 2009వి127, 2005టి16.

నేలలు : నీటి సదుపాయం ఉన్న మెరక భూములు (తోట భూములు) మిక్కిలి అనువైనవి. తేమను, పోషకాలను ఎక్కువగా నిలుపుకోలేని తేలిక నేలలను (ఇసుక నేలలు) సేంద్రీయ పదార్థాలు (ఎకరాకు 10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేక 5 టన్నుల ఫిల్టర్‌మడ్డి) వేసి అభివృద్ధి పరచి చెఱకు నాటుకోవాలి. సారహీనమైన, లోతు తక్కువ గలిగి నేల పైపొర గట్టిపడే భూములను లోతైన దుక్కిచేసి ఎకరాకు 1 టన్ను పొడిగా చేసిన వేరుశనగ తొక్కలను

లేక వరి ఊక వేసి అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. పాల చౌడు భూముల్లో చెఱకు నాటేటపుడు, ముందుగా లవణాలను మురుగునీటి కాల్వల ద్వారా తీసివేయాలి. లవణ పరిమితి నేలలో సెంటీ మీటరుకు 2 మిల్లీ మోస్‌ల కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. క్షారభూములకు జిప్సమ్ వేసి అభివృద్ధి పరచి నాటుకోవాలి.

ప్రధమ కృషి : నేలను 25–30 సెం.మీ. లోతు వరకు ఇనుప నాగలితో దున్ని మెత్తటి దుక్కి చేయాలి. 4–6 వారాలకు ముందు ఎకరాకు 10 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా 5 టన్నుల బాగా ఆరిన పొడి ఫిల్టర్‌మడ్డి వేసి కలియదున్నాలి. చదును చేసిన తర్వాత కాలువలను, బోదెలను రిడ్జ్‌మార్ లేదా రెక్క నాగలితో వేసుకోవాలి. కాలువ వెడల్పు 30 సెం.మీ., లోతు 20 సెం.మీ. ఉండాలి. చాళ్ళ మధ్య స్వల్పకాలిక రకాలకు 80 సెం.మీ., మధ్యకాలిక రకాలకు 90 సెం.మీ., ఆలస్యంగా వర్షాధారంగా నాటే చెఱకుకు 60 సెం.మీ. ఎడం ఉండాలి. నీటి ముంపుకు గురయ్యే నల్లరేగడి మరియు ఒండ్రు నేలల్లో చెఱకు నాటటానికి ముందే ప్రతి 24 మీటర్ల దూరానికి 60 సెం.మీ. వెడల్పు, 40 సెం.మీ. లోతు గల మురుగునీటి కాల్వలను తీసుకోవాలి. లోతైన కాల్వలో చెఱకు నాటితే పీకపురుగు, కలుపు ఉధృతి తగ్గడంతో పాటు సాగు నీటిని కూడా ఆదా చేయవచ్చు. తుఫాను గాలులకు తోటలు పడిపోవు.

విత్తనం ఎంపిక : పూత పూయని చెఱకు గడల చిగురు భాగంగాని, 7–8 నెలల వయస్సుగల లేవడి తోటల చెఱకును గాని మూడు కళ్ళ ముచ్చెలుగా కొట్టి విత్తనంగా వాడాలి. ఎకరానికి 16,000 మూడు కళ్ళ ముచ్చెలను వాడాలి. మూడు కళ్ళ ముచ్చెలను 300 లీటర్ల నీటికి 150 గ్రా. ల కార్బెండిజిమ్ మరియు డైమిథోయేట్ 600 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 300 మి.లీ. కలిపిన ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ఉంచి నాటినట్లయితే పొలుసు పురుగు, అనాసకుళ్ళు తెగులును అరికట్టుకోవచ్చు. లేవడి తోటలను పెంచేందుకు ముదురు తోటల నుంచి సేకరించిన గడలను (మొదలు, చివరి 1/3 భాగాలను తీసివేసి) మూడు కళ్ళ ముచ్చెలుగా చేసి, వేడి నీటిలో (52° సెల్సియస్ వద్ద 30 నిమిషాలు) లేదా తేమతో మిళితమైన వేడి గాలిలో (54° సెల్సియస్ వద్ద 4 గంటలు) విత్తనశుద్ధి చేయాలి. వేడి నీటి విత్తనశుద్ధి ద్వారా కాటుక, గడ్డిదుబ్బు, ఆకుమాడు తెగుళ్ళను అరికట్టవచ్చు.

నాటే సమయం : కోస్తా ఆంధ్రాలో జనవరి–మార్చి మాసాల్లో, రాయలసీమ ప్రాంతంలో జనవరి, ఫిబ్రవరి లోను నాటుకోవచ్చు. చెరకు తోటలను ముందుగా (నవంబరు – జనవరి), మధ్యకాలంలో (ఫిబ్రవరి – మార్చి) మరియు ఆలస్యంగా నరుకుటకు (మార్చి – ఏప్రిల్) అనువైన రకాలను క్రమంగా జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి మాసాల్లో నాటుకోవాలి.

నాటే విధానం : ఎన్నుకున్న రకాన్ని బట్టి చాళ్ళను 80–100 సెం.మీ. దూరంలో రూపొందించాలి. చాళ్ళలో నీరుపెట్టి, నీరు భూమిలో ఇంకిన తర్వాత వెనుకకు నడుచుకుంటూ, అన్ని కళ్ళు ప్రక్కలకు ఉండేటట్లు 2.5 సెం.మీ. లోతు మించకుండా నాటాలి. జంట చాళ్ళ పద్ధతిలో నాటే పరిస్థితుల్లో కాలువల మధ్య 60 సెం.మీ., జంటల మధ్య 120 లేదా 150 సెం.మీ. ఉండేటట్లు నాటుకోవాలి.

రకాలు

రకం	విడుదలైన సంవత్సరం	తల్లి దండ్రులు	చెఱకు దిగుబడి (ట./ఎ.)	పంచదార శాతం	చెఱకులో బెండు	పూత పూయు స్వభావం	నీటి ముంపుకు తట్టుకునే శక్తి	నీటి ఎద్దడికి తట్టుకునే శక్తి	తెగుళ్ళకు నిరోధక శక్తి
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
స్వల్పకాలిక రకాలు									
81ఎ99 (అరవింద)	–	కో6304× కో1287	44-46	18-19	లేదు	పూయదు	–	తట్టుకొంటుంది.	గడ్డి దుబ్బు తెగులుకు లొంగిపోతుంది. కాటుక తెగులును తట్టుకొంటుంది. ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులుకు లొంగిపోతుంది.
84ఎ125 (మధు)	2002	కోసి671× కో6304	44-48	18-19	లేదు	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకొంటుంది	సహజ పరిస్థితుల్లో ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొనును.
85ఎ261	1996	కో6806× కో775	40-44	19-21	లేదు	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకొంటుంది	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
87ఎ298 (విశ్వామిత్ర)	2002	కో7704× కోసి 671	44	18-19	స్వల్పం	స్వల్పం	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకొంటుంది	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది. ఆకుమాడు, కాటుక తెగుళ్ళకు లోనవుతుంది.
93ఎ145 (శారద)	2006	కోటి8201× బి38192	48	18-19	స్వల్పం	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకొంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
97ఎ85 (విశాఖ)	2010	కో8212జి.సి.	45	18	లేదు	పూయదు	–	తట్టుకొంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.

2003వి46 (భరణి)	2010	86ఎ146 × 83వి15	50	18	లేదు	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
2001ఎ63 (కనక మహాలక్ష్మి)	2012	86ఎ146 జి.సి.	45	18	లేదు	పూయదు	–	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
2003ఎ255 (సింహాద్రి)	2015	కో8371× కోటి8201	50	18	లేదు	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు, కాటుక తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది.
2009వి127 (రంగ)	2018	87ఎ298 జి.సి.	47	19.77	స్వల్పం	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకొలేదు.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. కాటుక తెగులును తట్టుకొంటుంది.
2005ఎ128 (శ్రీముఖి)	2018	80ఆర్41 జి.సి.	48	18.00	లేదు	పూయదు	తట్టుకొంటుంది	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును, కాటుక తెగులును నిరోధిస్తుంది. పీక పురుగు ఉధృతికి లోనవుతుంది. కార్శికి అనుకూలం. నీటి వసతి గల ప్రదేశాలలో అనుకూలం.
2005 టి 16 (స్వర్ణముఖి)	2018	సి.ఒ.హెచ్. 110 జి.సి.	44	18.8	లేదు	స్వల్పం	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది. కొరడా తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. పీక పురుగు తాకిడికి లోనవుతుంది.
2009 ఎ 107 (వశిష్ట)	2020	87 ఎ 298 జి.సి.	50-52	20	లేదు	లేదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును కొంతవరకు నిరోధిస్తుంది. కాటుక తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. వర్షాధార సాగుకు అనుకూలం. మేలైన కార్శి నిచ్చే రకం.
2012ఎ319	–	కోఎ92082 జి.సి.	50	19.0	లేదు	పూయదు	–	–	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది. పడిపోదు. కార్శికి అనుకూలం.

మధ్యకాలిక రకాలు									
కోటి 8201	1982	కో740×కో775	44-48	17-18	స్వల్పం	స్వల్పం	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
కోఎ 7602	1976	కో 1287 × కో 775	38	16	స్వల్పం	స్వల్పం	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది. గడ్డి దుబ్బు తెగులుకు లోనవుతుంది.
కో 7805	–	కో 740 × కో 6806	36-40	19	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును కొంతవరకు తట్టుకొంటుంది. కాటుక తెగులును తట్టుకొంటుంది. ఆకుమాడు, గడ్డిదుబ్బు, మొవ్వకుళ్ళు తెగుళ్ళకు లోనవుతుంది.
86 ఎ 146	–	కో 6304 × కోటి 8201	61.2	18.5	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును సహజ పరిస్థితుల్లో తట్టుకొంటుంది.
83 వి 15 (కనకదుర్గ)	2002	కోసి 671 × కో 6806	48	19-20	లేదు	స్వల్పం	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు, కాటుక తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది.
87 ఎ 380	–	కోసి 671 × కో ఎ 7602	50	19	స్వల్పం	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది.
98 ఎ 163 (ఉత్తర)	2012	కో 7706 × కో 6904	50	20	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు, కాటుక తెగుళ్ళను తట్టుకొంటుంది.
2000 ఎ 225 (రేవతి)	2015	కో 85002 పిసి	50	20	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొంటుంది. పీక పురుగును పొలుసు పురుగును తట్టుకొంటుంది. కార్శికి మిక్కిలి శ్రేష్ఠం.
2009 ఎ252 (నవీన్)	2020	83 వి 15 జి.సి.	48	19.50	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు, కాటుక తెగులును నిరోధిస్తుంది. పీక పురుగును, కాండం తొలుచు పురుగును కొంత వరకు తట్టుకొంటుంది.

ప్రోత్సాహకరమైన స్వల్పకాలిక రకములు									
2006 ఎ 223	–	87 ఎ 298 × 87 ఎ 380	50	20.00	స్వల్పం	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును, కాటుక తెగులును నిరోధిస్తుంది. కార్శికి అనుకూలం.
2010 ఎ 229	–	81 వి 48 జి.సి.	50	19.50	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును నిరోధిస్తుంది. కాటుక తెగులును తట్టుకొంటుంది. పీక పురుగును కొంత వరకు తట్టుకోగలదు. కార్శికి అనుకూలం.
2009 టి 10	–	87 ఎ 380 జి.సి.	50	20	స్వల్పం	స్వల్పం	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును తట్టుకొనును. కార్శికి అనుకూలం.
2016 టి 7	–	కొ వి 09356	50	18	లేదు	పూయదు	తట్టుకుంటుంది.	తట్టుకుంటుంది.	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును, కాటుక తెగులును తట్టుకొనును. పసుపు ఆకు తెగులును తట్టుకొనును.
2015 ఎ 311	–	కో.జ 270 × కోహెచ్ 15	45	18.7	లేదు	పూయదు	–	–	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును, పసుపు ఆకు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
2017 ఎ 553	–	కొ.వి. 89101 × ఎన్.హెచ్. 69	45	18.21	లేదు	పూయదు	–	–	ఎఱ్ఱకుళ్ళు తెగులును, పసుపు ఆకు తెగులును తట్టుకుంటుంది.

నాటే విధానం

బోదెలు, కాలువల పద్ధతి

బోదెలు, కాలువల పద్ధతిలో మెత్తటి దుక్కి చేసి ఎత్తు, పల్లాలు లేకుండా చదును చేసి తరువాత కర్ర నాగలితో కాని, రెక్క నాగలితో గాని, ట్రాక్టరుతో నడిచే రిడ్జ్‌మార్‌తో గాని 30 సెం.మీ. వెడల్పు, 20 సెం.మీ. లోతు గల కాలువలను 80 సెం.మీ. ఎడంతో వేయాలి. నీటి ముంపుకు గురయ్యే పల్లపు భూముల్లో సుమారు 25 మీటర్ల దూరంలో 1–1.5 అడుగు లోతులో అడ్డు కాలువలు వేయడం వలన అధికంగా వున్న నీటిని తీసి వేయడానికి వీలవుతుంది. వరి తరువాత చెఱకు సాగు చేసే పరిస్థితులలో చెఱకు నాటే సమయానికి భూమి ఆరకపోతే దమ్ము చేసి తేలికపాటి బోదెలు చేసి ముచ్చెలను బోదెలపై తక్కువ లోతులో నాటి భూమి ఆరిన తరువాత కాలువలు తవ్వి ఎరువులు వేసి బోదెలపై మట్టి తీయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చెఱకు సకాలంలో నాటే వీలు కలుగుతుంది.

దూరపు చాళ్ళ పద్ధతి : ఇటీవల దూరపు చాళ్ళ పద్ధతి ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతుంది. ఈ పద్ధతిలో చాళ్ళను 4 లేదా 5 అడుగుల దూరంలో వేసి సిఫారసు మేరకు ఎకరాకు 16,000 మూడు కళ్ళ ముచ్చెలను నాటి సాగు చేయవచ్చు. దీని వలన విత్తనం ఆదా అవుతుంది. అంతర పంటల సాగుకు అనువుగా ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా సాగు నీరును సమర్ధవంతంగా, పొదుపుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఎకరాకు 16,000 మూడు కళ్ళ ముచ్చెలను 3 అడుగుల దూరంలో నాటినప్పుడు ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది. 4 లేదా 5 అడుగుల దూరంలో నాటడం వలన తోట చుట్టు ఒక్కొక్క వరుస విడివిడిగా వేయడం వలన మొక్కల మొదళ్ళకు సరైన బలం చేకూరక తోటలు పడిపోవడం గమనించడం జరిగింది. కనుక దూరపు చాళ్ళ పద్ధతి తేలికపాటి భూముల్లో అనుకూలంగా ఉండదు కాని గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో మంచి దిగుబడులను ఇచ్చింది. అదేవిధంగా యంత్రాలతో చెరకు నరికే ప్రాంతాలకు దూరపు చాళ్ళ పద్ధతి చాలా అనుకూలం.

జంట చాళ్ళ పద్ధతి : అంతర పంటలు వేసుకోవడానికి, పనిముట్లతో కలుపు తీసుకోవడానికి ఈ పద్ధతి అనువైనది. ఈ పద్ధతిలో చాళ్ళ మధ్య 2 అడుగుల దూరం వుంచి, జంటల మధ్య దూరం 4 అడుగులు వుంచినపుడు మంచి దిగుబడులు వచ్చాయి. ఈ జంట చాళ్ళ మధ్య అంతర పంటలు సాగు చేయవచ్చు. జంట వరుసలు దగ్గరగా వుండడం వల్ల జడచుట్టు వేయడం తేలిక. జంట చాళ్ళ మధ్య నీరు పారించడం వల్ల సాగు నీరు వృధా కాదు. జంట చాళ్ళ మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సూర్యరశ్మి బాగా ప్రసరించి పిలకలు బాగా తొడిగి అధిక దిగుబడి వస్తుంది. మామూలు పద్ధతిలో కంటే ఈ పద్ధతిలో బిందు సేద్యానికయ్యే ఖర్చు సుమారు 40 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. జంటల మధ్య దూరం 5 నుండి 5.5 అడుగులు ఉన్నట్లయితే యంత్రంతో అంతరకృషి కూడా సులువుగా చేసుకోవచ్చు.

రెండు చాళ్ళకు ఒక చాలు విడిచి నాటే పద్ధతి : ఈ పద్ధతిలో కాలువలను 2 లేదా 3 అడుగుల దూరంలో వేసి ప్రతి రెండు వరుసలకు ఒక కాలువ నాటకుండా ఖాళీగా వదలివేయాలి. ఇలా చేయడంవల్ల జంట చాళ్ళు ఏర్పడి పెద వెడల్పు పెరుగుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన ఖాళీస్థలంలో అంతర పంటలు సాగు చేయవచ్చు. నీటి ఎద్దడి ప్రాంతాల్లో జంట చాళ్ళద్వారా నీరు పెట్టి చాళ్ళ మధ్య చెఱకు చెత్త కప్పినట్లయితే తేమ ఎక్కువగా నిలువ ఉంటుంది. కలుపు ఉధృతి తగ్గుతుంది. సాధారణ పద్ధతితో సమానంగా దిగుబడులు వస్తాయి. ఎకరాకు ఒక టన్ను విత్తనం ఆదా అవుతుంది.

వలయపు లేదా గుంతల పద్ధతి : ఈ పద్ధతిలో 90 సెం.మీ. వ్యాసం గల గుంతలను 45 సెం.మీ. లోతు వుండేటట్లు గుంతల మధ్య దూరం 120 సెం.మీ., గుంతల వరుసల మధ్య 150 సెం.మీ. ఉండేటట్లు తవ్వాలి. గుంతల వరుసల మధ్య నున్న 150 సెం.మీ. ఖాళీలలో నీటి కాలువలు ఏర్పరచుకోవాలి. ఎకరాకు 1800 గుంతలు తీయాలి. గుంతలు త్రవ్విన తర్వాత వచ్చిన మట్టిలో పశువుల ఎరువు లేదా ఫిల్టరు మట్టి కలిపి సుమారు 15 సెం.మీ. మందం వరకు గుంతలలో నింపాలి. ప్రతి గుంతకు 16 ముచ్చెలను, 12 వలయాకారంలో నాటి మిగిలిన 4 ముచ్చెలను మధ్యలో వరుసగా నాటాలి. ముచ్చెలపై 5 సెం.మీ. మందంలో మట్టితో కప్పాలి. పంట ఎదిగే కొలది ఎరువులు వేస్తూ గోతులు మట్టితో నింపాలి. ఈ పద్ధతిలో చెఱకు నాటడం వలన 25 శాతం వరకు అధిక దిగుబడి పొందవచ్చని అంచనా. మంచి కార్శి దిగుబడులు కూడ పొందవచ్చని పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానము, అనకాపల్లిలో జరిపిన పరిశోధనలలో ఒక గుంతకు 16 రెండు కళ్ళ ముచ్చెలను, గుంతల మధ్య దూరం 1.2 మీ. మరియు గుంతల వరుసల మధ్య 1.5 మీ. దూరంలో వుండేలా నాటినపుడు అధిక దిగుబడులను నమోదు చేయడం జరిగింది.

ఎరువులు (ఎకరాకు కిలోల్లో): భూసార పరీక్ష ఫలితాలను అనుసరించి సిఫారసు చేసిన రసాయనిక ఎరువులను వాడుకోవాలి. సిఫార్సు చేసిన రసాయనిక ఎరువులతో పాటు సేంద్రియ ఎరువులైనటువంటి పశువుల గెత్తం (ఎకరానికి 10 టన్నులు) లేదా ఫిల్టర్ మడ్డి (ఎకరానికి 6 టన్నులు) లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ (ఎకరానికి 4 టన్నులు) తప్పనిసరిగా నాటే ముందు పొలం తయారీలో లేదా చాళ్ళలో కాని వేసుకోవాలి. నేలలో ముఖ్య పోషకాలైన నత్రజని, భాస్వరము, పొటాషియం పోషకాలు మధ్యస్థ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎరువులను సిఫారసు చేసిన మోతాదులో వేసుకోవాలి. ఐతే నేలలో పోషకాలు తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు సిఫారసు చేసిన ఎరువులను 30 శాతం వరకు

ప్రాంతం (జిల్లాలు)	ఎకరానికి (కిలోలు)			ఎరువు వేసే సమయం
	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్	
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలు	67	40	48	నత్రజనిని నాటిన 45, 90 రోజుల్లో రెండు సమపాళ్ళలో భాస్వరం ఎరువులను నాటేటప్పుడు మరియు పొటాషియం ఎరువులను నాటేటప్పుడు, నాటిన 90 రోజులకు రెండు దఫాలుగా వేసుకోవాలి.
ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు	67	40	48	నత్రజనిని నాటిన 45, 90 రోజుల్లో వేయాలి. నీటి ముంపుకు గురయ్యే ప్రాంతంలో నత్రజనిని రెండు సమ పాళ్ళలో నాటిన 30, 60 రోజుల్లో వేయాలి మరియు పొటాషియం ఎరువులను నాటేటప్పుడు నాటిన 90 రోజులకు రెండు దఫాలుగా వేసుకోవాలి.
కడప, కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలు	90	45	45	నత్రజనిని నాటిన 45, 90 రోజుల్లో రెండు సమపాళ్ళలో వేయాలి మరియు పొటాషియం ఎరువులను నాటేటప్పుడు నాటిన 90 రోజులకు రెండు దఫాలుగా వేసుకోవాలి.

పెంచి, ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు సిఫారసు చేసిన ఎరువులను 30 శాతం తగ్గించి వాడుకోవాలి. నత్రజనినందించే జీవన ఎరువులైన అజటోబాక్టర్ (4 కిలోలు ఎకరాకు) లేదా అజోస్పైరిల్లమ్ (4 కిలోలు ఎకరాకు); భాస్వరాన్ని అందించే ఫాస్పోబాక్టీరియా (4 కిలోలు ఎకరాకు) లేదా మైకోరైజా (5 కిలోలు) మరియు పొటాషియం రిలీజింగ్ బాక్టీరియా (4 కిలోలు ఎకరాకు) నాటినప్పుడు, నాటిన 45 రోజుల లోపు 100 కిలోల పశువుల గెత్తంలో కలిపి రెండు సార్లు వేసుకోవాలి. మొత్తం భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువుల్ని నాటే సమయంలోనే వేయాలి. తేలికపాటి నేలల్లో పొటాషియం ఎరువులను రెండు దఫాలుగా నాటేటప్పుడు మరియు 90 రోజులకు వేసుకోవాలి. నత్రజని ఎరువును రెండు దఫాలుగా మొక్క మొదళ్ళ వద్ద రెండు అంగుళాల (5 సెం.మీ.) లోతు గుంతలలో వేసి మట్టి కప్పాలి.

డ్రిప్ ద్వారా ఎరువుల యాజమాన్యం : సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో నత్రజని (యూరియా) మరియు పొటాష్ (తెల్ల పొటాష్) ఎరువులను డ్రిప్ ద్వారా వారానికి ఒకసారి చొప్పున 20 దఫాలుగా చెఱకు నాటిన 30 రోజుల నుండి 180 రోజుల వరకు అందజేసి ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం పెంచవచ్చు.

సూక్ష్మ పోషక యాజమాన్యం :

జింకు లోపం కనిపించిన మొక్కలలో ఆకుల ఈనెల వెంబడి పసుపు రంగు చారలు ఏర్పడి, లోపం ఎక్కువయినపుడు పెరుగుదల నిలిచిపోతుంది. దుబ్బు చేయడం నిలిచిపోయి, కొత్తగా ఏర్పడిన పిలకలు నిర్వీర్యమవుతాయి. లోపం కనిపించిన తోటలకు లీటరు నీటికి 2 గ్రాముల జింక్ సల్ఫేట్ (0.2 శాతం ద్రావణం) చొప్పున వారం వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి. లభ్య జింక్ కీలక పరిమితి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుటికీ ఆఖరి దుక్కిలో ముందుగానే ఎకరాకు 5 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ చొప్పున నేలలో వేసినట్లైతే అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు. జింక్ లోపం క్రమంగా కనిపించే పొలాలకు ప్రతీ రెండు, మూడు సంవత్సరాలకొకసారి ఆఖరి దుక్కిలో ఎకరానికి 20 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ వేసుకోవాలి.

ఇనుప ధాతువు లోపం వలన ఆకులు పాలిపోయి లేత పసుపు రంగు నుండి తెలుపు రంగుకు మారుతాయి. ఈ లక్షణాలు ఈనెల మధ్య భాగంలో ఏర్పడతాయి. కావున ఈనెలకు సమాంతరంగా రేఖలుగా ఆకులు పొడవునా చారలు ఏర్పడతాయి. ధాతు లోపం ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు లేత ఆకులు పూర్తిగా తెల్లగా మారతాయి. ఇనుము లోపం కన్పించిన వెంటనే ఒక శాతం అన్నబేధిని (ఫెర్రస్ సల్ఫేట్) మొక్కలపై పిచికారీ చేసి లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి. 10 లీటర్లు నీటికి 100 గ్రా. అన్నభేదితోపాటు ఒక బద్ద నిమ్మకాయ రసం లేదా 10 గ్రా. నిమ్మ ఉప్పు కలిపి వారం, పది రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేసుకోవాలి.

మాంగనీసు లోపం చెఱకు మధ్య ఆకుల్లో, పాలిపోయిన పసుపు రంగుతో కూడిన ఆకుపచ్చ లేదా తెలుపు రంగు చారలుగా ఈనెల ప్రక్కన కనబడుతుంది. ఈనెల మధ్య తెల్లగా మారిన ఆకుభాగాల్లో కుళ్ళు మచ్చలు వచ్చి, అవి పెద్దవై, ఒక దానితో ఒకటి కలిసిపోయి, చారలు చారలుగా ఆకు నిలువునా చీల్చినట్లు కనబడతాయి. మాంగనీస్ లోప నివారణకు లీటరు నీటికి 5 గ్రా. మాంగనీస్ సల్ఫేట్ కలుపుకొని సుమారు 450 లీటర్ల ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయాలి (ఎకరానికి 2.5 కిలోలు).

పంటమార్పిడి : మాగాణి భూముల్లో, తోట నేలల్లో చెఱకు మొక్కతోట, మొదటి కార్శితోట తర్వాత వరి, పెసర లేక మినుము పంటలను వేసి తదుపరి చెఱకు సాగు చేయుట శ్రేష్ఠం. రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో పెసర, మినుము లేక వేరుశనగ తర్వాత చెఱకు మొక్కతోట, కార్శి మొత్తం మూడు పంటలు పండించటం లాభదాయకం.

అంతర పంటల సాగు : చెఱకులో అంతర పంటలుగా పెసర, మినుము, సోయాచిక్కుడు, వేరుశనగ వంటి క్షేత్ర పంటలు, బెండ, క్యాబేజి వంటి కూరగాయ పంటలు సాగు చేయవచ్చు. తేలిక నేలల్లో పెసర, సారవంతమైన నేలల్లో సోయాచిక్కుడు, మినుము అనుకూలంగా ఉంటాయి. బోదెలను చదునుచేసి, చెఱకు నాటే రోజునే అంతరపంటను బోదెల మీద వరుసల్లో నాటుకోవాలి. (చాళ్ళ మధ్య 80–100 సెం.మీ. ఎడం ఉన్నప్పుడు పెసర, మినుము, సోయాచిక్కుడు, వేరుశనగ పంటలను రెండు వరుసల్లో నాటుకోవాలి). జంట చాళ్ళ పద్ధతిలో (60/120 సెం.మీ.) చెఱకును నాటినపుడు అంతర పంటల సాగు మరింత అనుకూలం. అంతర పంటల సాగువల్ల పరాన్నభుక్కుల సంఖ్య పెరిగి పీకపురుగు ఉధృతి తగ్గునని పరిశోధనలలో తేలినది. పచ్చిరొట్టనిచ్చే జీలుగ, జనుము విత్తనాలను పెడల మీద జల్లి, మొగ్గదశలో పీకి చాళ్ళలో చెఱకు మొక్కల మొదళ్ళలో వేసి మట్టి కప్పాలి.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : ముచ్చెలు నాటిన 3 రోజుల లోపు అట్రజిన్ 50% పొడి మందును ఎకరానికి 2 కిలోలు లేదా మెట్రిబుజిన్ 600 గ్రా. 200 లీ. నీటిలో కలిపి పొలమంతా పిచికారీ చేసి ఒక నెల వరకు కలుపు నివారించుకోవచ్చు. తోట నాటిన నెల తరువాత 20, 25 రోజుల వ్యవధిలో అవసరాన్నిబట్టి 2, 3 సార్లు గొర్రుతో లేదా దంతితో అంతరకృషి చేయాలి లేదా కూలీలతో కలుపు తీయించాలి. వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 2,4–డి సోడియం సాల్ట్ 1.8 కిలోలు మరియు పారాక్వాట్ ఒక లీటరు 200 లీ. నీటిలో కలిపి వరుసల మధ్య పైరుపై పడకుండా నాటిన 20, 60 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయాలి. ఈ మిశ్రమం పిచికారి చేస్తున్నప్పుడు మందు పైరుపై పడితే పంటకు నష్టం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ముచ్చె నాటిన 20వ రోజున, 90వ రోజున మెట్రిబుజిన్ 400గ్రా + 2,4–డి సోడియం సాల్ట్ 800 గ్రా. ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయటం వలన కలుపును సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. తుంగ సమస్య ఎక్కువగా ఉన్న చెఱకు తోటల్లో ముచ్చెలు / మొక్కలు నాటిన 25–30 రోజులకు హలోసల్ఫ్యూరాన్ 75% డబ్ల్యు.జి. 40 గ్రాములు ఎకరాకు 200 లీటర్లు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. తీగ జాతి కలుపు మొక్కల నివారణకు ముచ్చె నాటిన 75 రోజులకు మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ కలుపు మందును ఎకరానికి 8 గ్రా. చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి చాళ్లలో మొక్కల ప్రక్కన పిచికారి చేయాలి.

చెరకులో పెసర, మినుము, బెండ వంటి పంటలను అంతర పంటలుగా సాగు చేసేటప్పుడు పెండిమిథాలిన్ మందును ఎకరాకు 1.25 లీటర్లు 200 లీటర్లు నీటికి కలిపి విత్తిన 3 రోజుల లోపల భూమిపై పిచికారి చేయాలి.

తుఫాను గాలుల వలన తోటలు పడిపోయినపుడు చెఱకు దిగుబడి, రసనాణ్యత తగ్గుతాయి. తోట వయస్సు నాలుగు నెలలప్పుడు (జూన్–జూలై మాసాల్లో) మొక్కల వరుసల మొదళ్ళకు ఎత్తుగా మట్టిని ఎగదోయాలి.

పంట పెరుగుదలను బట్టి 2–3 సార్లు జడచుట్టు పద్ధతి ద్వారా చెఱకును నిలగట్టాలి. మొక్క తోటల్లో చెఱకు నాటిన మూడవ రోజున చెఱకు చెత్తను నేలపై పలుచగా (1.25 ట./ఎ.) పరవాలి. పరచిన చెత్త త్వరగా కుళ్ళడానికి చెఱకు చెత్తపై ఎకరానికి 2.0 కిలోల కుళ్ళబెట్టే శిలీంధ్రాల పొడి, పెడనీటిలో కలిపి చల్లితే మంచి సేంద్రీయ ఎరువుగా వినియోగపడుతుంది.

నీటి యాజమాన్యం : పంట మొదటి నాలుగు నెలల్లో (బాల్యదశ) ఆరు రోజుల కొకసారి, పక్వదశలో (నవంబర్ నుండి చెఱకు నరికే వరకు) మూడు వారాలకొకసారి నీరు పెట్టాలి. బిందు సేద్య పద్ధతి అవలంభించడం వలన పరిమిత నీటి వనరులను పొదుపుగా వాడుకోవచ్చును. జంట చాళ్ళ పద్ధతిలో (2.0'×4.0') చెఱకు సాగు చేసినప్పుడు, బిందు సేద్య పద్ధతికయ్యే ఖర్చును 50 శాతం వరకు తగ్గించుకోవచ్చును. నీటి ఎద్దడి పరిస్థితుల్లో చెఱకు నాటిన 3వ రోజున ఎకరాకు 1.25 టన్నుల చొప్పున చెఱకు చెత్త కప్పటం ద్వారా భూమిలోని తేమ త్వరగా కోల్పోకుండా నివారించడంతోబాటు కలుపు, పీక పురుగుల ఉధృతి తగ్గించవచ్చు. ఈ పరిస్థితుల్లో యూరియా, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (2.5%) ను పైరు మీద పిచికారీ చేయాలి. చెరువుల క్రింద వర్షాధారంగా సాగు చేసినపుడు, చెఱకు తోటకు బాల్యదశలో మొదటి తడిపెట్టిన 30 రోజులకు రెండవ తడిని పెట్టటం మంచిది. వర్షాకాలంలో తోటల్లో నీరు నిల్వకుండా చూడాలి. మురుగు నీటి కాల్వల ద్వారాగాని, నత్తగుల్ల లేదా ఆర్కిమెడిస్ స్క్రూ ద్వారా గాని నీటిని త్వరగా తీసివేయాలి. సాగునీటిలో లవణాల సాంద్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు (2 మిల్లీ మోస్‌లు సెం.మీ.కు) మరియు సోడియం కార్బోనేట్ అవశేషం లీటరుకు 5 మిల్లీ ఈక్వివలెంట్ల కన్నా అధికంగా ఉన్నప్పుడు పంచదార దిగుబడులు, రసనాణ్యత తగ్గుతాయి.

తోట నరకుట : పంట పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చినప్పుడే చెఱకును భూమట్టానికి నరకాలి. నరకిన చెఱకు నుండి ఎండు ఆకులు, ఆకు తొడిమలు తొలగించి శుభ్రమైన చెఱకునే గానుగ ఆడుటకు సరఫరా చేయాలి. నరికిన 24 గంటలలోపు గానుగ ఆడుకుంటే అధిక రస నాణ్యత కలిగి ఉండి పంచదార, బెల్లం రికవరీ ఎక్కువగా పొందవచ్చు.

పిలక లేదా కార్శితోటల సాగు : మొక్క తోటల కన్నా కార్శి తోటలు త్వరగా పక్వానికి వస్తాయి. సాగులో ఖర్చు తక్కువ, మొక్క తోటలకంటే కార్శి తోటలు మొదటి రోజుల్లో నీటి ఎద్దడి తట్టుకుంటాయి. పూతకు రాని, తెగుళ్ళను తట్టుకొనే రకాల నుంచి కార్శి తోటలను సాగు చేయుట లాభదాయకం. 84ఎ125, 81ఎ99, కోటి 8201, కోఎ7602, 87ఎ298, 2003వి46, 2005టి16, 2009ఎ107, 2009ఎ252, 2006ఎ223, 2012ఎ319 రకాల నుంచి కార్శి తోటలను సాగు చేయుట లాభదాయకం. 84ఎ125, 81ఎ99, 85ఎ261, కోటి 8201, కోఎ7602, 87ఎ298, 97ఎ85, 2003వి46, 2009ఎ107, 2009ఎ252, 2009వి127, 2005టి16 రకాలు మంచి కార్శితోటలనిస్తాయి. కార్శితోటల్లో దుబ్బులు మొలకెత్తేటప్పుడు కలుపు మందులను వాడరాదు. లోతైన కాలవల్లో నాటిన మొక్క తోటల నుండి పెంచిన కార్శి తోటలు అధిక దిగుబడులనిస్తాయి. పొలంలో పదును తగినంత ఉన్నప్పుడు, దుబ్బులు కదలకుండా పదునైన పారలతో వరుసలలోని మోళ్ళను చెక్కినప్పుడు భూమిలోపలి కణుపుల నుండి పిలకలు వస్తాయి. అవి సామాన్య గాలులకు పడిపోవు. వరుసలలో కార్శి చేసిన

వెంటనే మెట్రిబుజిన్ పొడి మందును ఎకరానికి 600 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసి ఆ తరువాత 45 రోజులకు గొప్పు తవ్వి కలుపును సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. 50 సెం.మీ. మించి ఖాళీలు ఉన్నప్పుడు, ఆరువారాల వయస్సు గల అదే రకపు నారు మొక్కలతో ఖాళీలను నింపుకోవాలి. వరుసల మధ్య 15 సెం.మీ. లోతు దుక్కి చేయటం ద్వారా నేలపై చల్లిన చెఱకు చెత్త నేలలో కలవడమే కాకుండా మొదళ్ళ వద్దనున్న పాత వేర్లు తెగి, క్రొత్త వేర్లు వచ్చి నీటిని, పోషకాలను బాగా తీసికొనేందుకు అవకాశముంటుంది. కార్శి తోటలకు ఎకరానికి నత్రజని ఎరువు (200 కిలోల యూరియాను) రెండు సమభాగాలుగా కార్శి చేసినప్పుడు మరియు 45 రోజులకు వేసుకోవాలి. మొత్తం భాస్వరం ఎరువును (250 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్) కార్శి చేసినప్పుడు మరియు పొటాషియం ఎరువును (80 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్) రెండు సమభాగాలుగా కార్శి చేసినప్పుడు మరియు 45 రోజులకు వేసుకోవాలి. కార్శి చేసిన వెంటనే వరుసల మధ్య ఎకరాకు 1.25 టన్నుల చెఱకు చెత్తను కప్పి, 1.25 కిలోల కుళ్ళబెట్టే శిలీంధ్రాల పొడిని పేడ నీళ్ళలో కలిపి చల్లాలి. దీనితో పాటు 10 కిలోల సూపర్‌ఫాస్ఫేట్, 8 కిలోల యూరియా కూడా చల్లితే చెత్త బాగా చివికి ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది. కలుపు మొక్కలు, పీకపురుగు వ్యాప్తి తగ్గుతుంది. ఇనుపధాతు లోప నివారణకు 1.0 శాతం అన్నభేది (లీటరు నీటికి 10.0 గ్రాములు) పైరు 45–60 రోజుల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు రెండుసార్లు పిచికారీ చేయాలి. ఎక్కువ పంచదార లేక బెల్లం పొందటానికి కార్శితోటలను 9–10 నెలలు పైబడినపుడు మాత్రమే నరకాలి.

వర్షాధారపు చెఱకు సాగు : ముదురు గడల నుండి విత్తనాన్ని సేకరించి మూడు కళ్ళ ముచ్చెలుగా తయారు చేసి వాడాలి. ఆలస్యంగా జూన్ మాసంలో నాటే పరిస్థితుల్లో ఎకరాకు 20,000 మూడు కళ్ళ ముచ్చెలు వాడాలి. నీటి ఎద్దడికి తట్టుకోవడానికి నాటే ముందు ముచ్చెలను 10 శాతం సున్నపు నీటిలో ఒక గంట సేపు ముంచాలి. రెండు వరుసల మధ్య దూరం 60 సెం.మీ. ఉండేటట్లు నాటుకోవాలి. ఎకరాకు 1.25 టన్నుల చొప్పున నాటిన మూడవరోజున, చెఱకు చెత్త కప్పాలి. నాటే ముందు కాలువల్లో ఎకరాకు 10 కిలోలు "ఫిప్రోనిల్" గుళికలు లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ గుళికలు 8 కిలోలు వేయాలి. జూన్–జూలై నెలల్లో నాటిన తోటకు ఎకరాకు 65 కిలోల యూరియాను రెండు సమ భాగాలుగా చేసి రెండు నెలలలోపు వేయాలి (నాటిన 30, 60 రోజులకు) ఎకరాకు 125 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేటు ఆఖరి దుక్కిలో వేయాలి. 35 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్‌ను రెండు సమభాగాలుగా చేసి ఆఖరి దుక్కిలో సగం, ఆఖరు వర్షాలకు ముందు (అక్టోబరు నెలాఖరు) మిగతా సగం వేసుకోవాలి.

నీటి ముంపు పరిస్థితుల్లో చెఱకు సాగు : నీటి ముంపు పరిస్థితులకు అనువైన రకాలను సాగు చేయాలి. భూమిని మెత్తగా గుల్లగా లోతు దుక్కి చేయాలి. నాటే సమయానికి ఆరకపోతే దమ్ముచేసి చాళ్ళు ఏర్పరచి, దిబ్బలపై చెఱకు ముచ్చెలు నాటాలి. నీటి ముంపు ప్రాంతాల్లో చెఱకు నాట్లు జనవరి 15కు ముందుగానే నాటాలి. నత్రజనిని రెండు దఫాలుగా నాటిన 30, 60వ రోజున వేసుకోవాలి. భూమిని తయారు చేసేటప్పుడు 40 సెం.మీ. లోతు, 60 సెం.మీ. వెడల్పుగల ఇవకతీత కాలువలను ఒక్కొక్కటి 24 మీటర్ల దూరంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తోటల్లో

నీరు నిల్వకుండా మురుగునీటి కాల్వల ద్వారా గాని లేదా లిఫ్ట పంపులు వినియోగించి తరచుగా నీటిని తీసివేయాలి. మురుగునీటిని తీసివేసిన తర్వాత భూమి ఆరినపుడు తోటలకు దగ్గర దగ్గరగా తడులు పెట్టాలి. నీటి ముంపుకు గురైన చెఱకు తోటలను వీలైనంత త్వరగా నరకాలి. ముంపునకు గురైన తోటల్లో తెల్ల ఈగ నివారణకు డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ముంపుకు గురైన తోటలను ముందుగా నరికి ఫ్యాక్టరీకి తోలడం గాని, బెల్లం తయారీకి గాని ఉపయోగించాలి.

చౌడు భూముల్లో చెఱకు సాగు : 81వి48, కోటి 8201, కో7219, 81ఎ99, 93ఎ145, 99వి30, 2009వి12, 2005టి16 రకాలను ఎన్నుకోవాలి. ఎకరాకు 18,000 ముదురు మూడుకళ్ళ ముచ్చెలను పైపైనే నాటాలి. పాల చవుడు తీసివేయడానికి, పొలాన్ని చిన్న చిన్న మడులుగా చేసి మంచినీటితో నిలగట్టి, తర్వాత తీసివేయాలి.

ఉదజని సూచిక	వేయవలసిన జిప్సం (ఎకరానికి టన్నుల్లో)		
	తేలిక భూములు	మధ్యస్థ భూములు	బరువు నేలలు
8.7	–	0.2	0.6
9.0	0.6	1.2	1.3
9.4	1.6	2.8	4.0
9.8	2.8	4.4	5.6
10.0	3.0	5.2	6.0

క్షార భూములను ఈ క్రింద తెలిపిన ఉదజని సూచికననుసరించి జిప్సమ్‌ను వాడి అభివృద్ధి పరచుకోవచ్చు.

చెఱకు చెత్త నుండి నేరుగా సేంద్రియపు ఎరువును తయారు చేసే విధానం : 1 మీటరు లోతు, 2 మీటర్ల వెడల్పు, 6 మీటర్ల పొడవు గల గోతిలో చెఱకు చెత్తను 15 సెంటీమీటర్ల మందంగా పరచి తేమగా ఉండడానికి నీటిని చిలకరించాలి. దీనిమీద పేడ నీటిని చల్లాలి. ఒక టన్ను చెఱకు చెత్త చివకడానికి 1 కిలో శిలీంధ్రపు సముదాయం (చివకడానికి దోహదపడే శిలీంధ్రం) మరియు 8 కిలోల యూరియా, 10 కిలోల సూపర్‌ఫాస్ఫేట్ ద్రావణాన్ని చల్లాలి. తర్వాత దీనిని 1–2 సెం.మీ. మందం మట్టితో కప్పాలి. ఇలా పొరలుగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేస్తే సుమారు 4 మాసాల్లో చెఱకు చెత్త కుళ్ళి, కంపోస్టుగా మారి, పొలాల్లో వేసుకోవడానికి వీలుగా తయారవుతుంది.

నారు మొక్కల ద్వారా చెఱకు సాగు : ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న సాగు ఖర్చును తగ్గించుకొని, అధిక దిగుబడి సాధించడానికి రూపొందించబడిన పద్ధతి చెఱకు కన్నుల నుండి పెంచిన నారును నాటే పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో చెఱకు విత్తనపు ఖర్చును దాదాపు నాలుగింట మూడు వంతులు తగ్గించుకోవచ్చు. సులభంగా విత్తనశుద్ధి చేసుకొని ఆరోగ్యవంతమైన నారును పొంది, ప్రధాన పొలంలో నాటి అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు.

ఈ పద్ధతిలో చెఱకు విత్తనమునకు వాడు 3 కళ్ళ ముచ్చెలకు బదులుగా చెఱకు కన్నులను మాత్రమే యంత్రం సహాయంతో వేరు చేసి విత్తనముగా వాడాలి. ఈ పద్ధతిలో విత్తనశుద్ధి చేయడం కూడా చాలా సులభం. 0.5 గ్రా. కార్బండెజిమ్ మరియు ఒక మిల్లీ లీటరు 600 ఎఫ్.ఎస్. క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. ప్లాస్టిక్ ట్రేలలో గుంతలోకి 1/3 వంతు భాగం ముందుగా కోకో పీట్ (కొబ్బరి పీచు ఎరువు) నింపుకొని తరువాత విత్తనశుద్ధి చేసిన కణుపులను కన్నులు పైకి ఉండేటట్లు గుంతలో ఉంచాలి. ఆ తరువాత గుంతలను పూర్తిగా కోకో పీట్‌తో నింపుకొని వేళ్ళతో ప్రతి గుంతను నొక్కాలి. ఈ ట్రేలను షేడ్ నెట్‌లో గాని, నీడ ప్రదేశంలో గాని వరసకు పది చొప్పున అమర్చి పాలథీన్ షీట్‌ను కప్పి గాలి చొరబడకుండా బిగుతుగా బిగించాలి. 3-4 రోజుల్లో కన్నులు మొలకెత్తుట గమనించిన వెంటనే షేడ్ నెట్‌లో ఒక దాని ప్రక్కనొకటి అమర్చాలి. రోజు విడిచి రోజు రోజ్‌కేన్‌తో గాని, స్ప్రింకర్లను అమర్చి గాని తడుపుతూ ఉండాలి. నాటిన 30 రోజులకు నారు మొక్కలు నాటడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక ఎకరా పొలం నాటడానికి 7500-8000 నారు మొక్కలు అవసరమవుతాయి.

నారు మొక్కలను నాటు విధానం :

నారు మొక్కల్ని నాటుకునే ముందు ప్రధాన పొలాన్ని 2-3 సార్లు ఇనుప నాగలితో ఇనుమారు దున్ని రొటవేటరుతో మెత్తని దుక్కి చేసి ఎత్తు పల్లాలు లేకుండా చదును చేయాలి. చెఱకు నారును నాటడానికి జంట చాళ్లను రూపొందించాలి, అంటే చాలుకు చాలుకు మధ్య 60 సెం.మీ (2') మరియు జంటకు జంటకూ మధ్య 120 సెం.మీ (4') ఉండేలా చాళ్లను కొంచెం లోతుగా (20 సెం.మీ) రూపొందించాలి. మొక్కల మధ్య 60 సెం.మీ దూరం ఉండాలి. జంట చాళ్లలో నారు మొక్కలను నాటుట వలన జంటల మధ్య ఉన్న పెడల మీద జనుము, జీలుగ వంటి పచ్చి రొట్ట పైర్లను వేసుకొని 40-45 రోజుల వయస్సులో భూమిలో కలియ దున్నినట్లైయితే భూమి ఫలదత, భూభౌతిక లక్షణాలు కొంతమేర అభివృద్ధి చెందుతాయి. అలాగే బిందు సేద్యం ద్వారా నీరు పెట్టడానికి అనువుగా ఉంటుంది. వరుసల మధ్య 120 సెం.మీ. / 150 సెం.మీ., మొక్కల మధ్య 60 సెం.మీ ఉండేటట్లు నాటినట్లైతే అంతరకృషి, బోదెలు ఎగతోయడం వంటివి మినిట్రాక్టర్ లేదా పవర్ టిల్లర్ తో చేసుకోవచ్చు. సాధారణ పద్ధతిలో వరుసల మధ్య 90 సెం.మీ ఉండేటట్లు చాళ్ళు వేసుకుని 60 సెం.మీ. దూరంలో కూడా నారు మొక్కలను నాటవచ్చు.

ప్లాస్టిక్ ట్రేలలో కొబ్బరి పీచు ఎరువును వేసి నారు మొక్కలను పెంచడం వలన నాటేటప్పుడు వేరు విడిపోకుండా చుట్టలా చుట్టుకొని వుండి తేమను కూడ పట్టి ఉంచుతుంది. అందువల్ల నారు మొక్కలను నాటేటప్పుడు కొబ్బరి పీచు ఎరువుతో సహా నాటుకోవాలి. నాటిన తరువాత ప్రతీ 3-4 రోజులకు తేలిక పాటి తడులివ్వాలి.

ఎరువుల యాజమాన్యం :

సిఫారసు మేరకు ఎరువులను వేయాలి. పూర్తి భాస్వరం ఎరువును నాటేటప్పుడు చాళ్ళలో వేయాలి. సిఫారసు చేసిన నత్రజని, పొటాషియం ఎరువులను 4 దఫాలుగా నాటేటప్పుడు, నాటిన 30, 60, 90 రోజులకు మొక్క మొదళ్ళ వద్ద చిన్న గోతుల్లో వేసి మట్టిని కప్పాలి.

ఎరువులు వేసిన ప్రతీసారి తేలిక పాటి తడులు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా ప్రతీ 30 రోజుల వ్యవధిలో నారు మొక్కలకు ఎరువులు వేసి నీరు కట్టుట వలన నారు మొక్కలు ఎక్కువ పిలకలు పెట్టి బలంగా తయారవుతాయి. మట్టిని ఎగ ద్రోసిన తరువాత ఇక క్రొత్త పిలకలు పుట్టుక, బోళ్లు ఏర్పడే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన అంతవరకు పుట్టిన పిలకలు బలిష్టంగా తయారయి పిలకలన్నీ చెఱకు గడలుగా మారతాయి. తద్వారా చెఱకు తోట కొట్టే సమయానికి చెఱకు గడల సంఖ్య పెరిగి అధిక దిగుబడి రావటానికి దోహదపడుతుంది.

సస్యరక్షణ : పురుగులు

పీక పురుగు : చెఱకు నాటిన రోజు నుండి, చెఱకు నరికే వరకు ఈ పురుగు పైరును ఆశించి బాల్యదశలో పీక పురుగుగా, నాటిన 120 రోజుల వరకు చెఱకు పైరును నష్టపరుస్తుంది. నీటి ఎద్దడి పరిస్థితులలోను, వర్షాధార పంటలో ఈ పురుగు తాకిడి అధికంగా ఉంటుంది. ఆలస్యంగా నాటిన (మార్చి–మే నెలలో) పంటలోను, కార్శి చేసిన పంటపై కూడా ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. వాతావరణంలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉండి, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు, పంట నీటి ఎద్దడికి గురైనప్పుడు ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువుగా ఉంటుంది. లోతైన కాలవల్లో ముచ్చెలను నాటాలి. నాటే ముందు, ఎకరానికి కార్బోఫ్యూరాన్ 0.3 జి 13 కిలోలు లేదా ఫిప్రోనిల్ 0.3 జి 10 కిలోలు లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 0.4 జి 9 కిలోలు చొప్పున చాళ్ళల్లో ఇసుకతో కలిపి (1:2) వేయాలి. వీలైనంత తక్కువ వ్యవధిలో దగ్గర దగ్గరగా నీటి తడులివ్వాలి. మొక్క తోటల్లో, నాటిన మూడవ రోజున, కార్శి తోటల్లో కార్శి చేసిన వెంటనే ఎకరాకు 1.25 టన్నుల చొప్పున చెఱకు చెత్త కప్పాలి. చెఱకు నాటిన 20 రోజులకు లింగాకర్షణ బుట్టలను హెక్టారుకు 5 చొప్పున పెట్టి పీక పురుగు ఉధృతిని గమనించవచ్చు లేదా హెక్టారుకు 25 చొప్పున పెట్టి అధిక సంఖ్యలో మగ పురుగులను నాశనం చేయడం ద్వారా పీక పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించవచ్చును. ఆర్థిక నష్ట పరిమిత స్థాయిని మించి పీకపురుగు ఆశించినచో నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి నాటిన 4, 6 మరియు 9 వారాల్లో పిచికారీ చేసుకోవాలి. పీక పురుగు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ./ లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి నాటిన 30 రోజులకు మరియు అవసరాన్ని బట్టి రెండవసారి 60 రోజులకు మొవ్వులో పడేటట్లు పిచికారి చేయాలి. ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ గ్రుడ్డు పరాన్నజీవిని ఎకరాకు 20,000 చొ॥న చెఱకు నాటిన 30 రోజుల నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 6–8 సార్లు విడుదల చేయాలి. పరాన్నజీవుల కార్డులు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం, అనకాపల్లి కీటకశాస్త్ర విభాగంలో లభ్యమగును.

కాండం తొలుచు పురుగు : లద్దె పురుగు చెఱకు నాటిన 120 రోజులు మొదలుకొని చెఱకు నరికే వరకు చెఱకు గెడల క్రింది భాగం నుండి పై భాగం వరకు తొలుచుకుంటూ పోవుట వలన గెడ ఎండిపోతుంది. పురుగు ఆశించిన కణుపులు గట్టిపడి, కణజాలము ఎర్రబడి, గెడల నాణ్యత, దిగుబడి తగ్గుతుంది. అధికంగా నత్రజని ఎరువుల వాడకం, ఆలస్యంగా నత్రజని ఎరువుల వాడకం, నీటి ముంపు పరిస్థితులు, తోటలు పడిపోయిన పరిస్థితులు కాండం తొలుచు పురుగు ఉధృతికి అనుకూలం. కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు ఆలస్యంగా వచ్చిన పిలకలను (వాటర్ షూట్స్) తీసివేసి, తోట పడిపోకుండా నిలగట్టి, మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యం కల్పించాలి. చెఱకు నాటిన 120 రోజుల తర్వాత లింగాకర్షణ బుట్టలు హెక్టారుకు 25 చొప్పున పెట్టి అధిక

సంఖ్యలో మగ పురుగులు నాశనం చేయటం ద్వారా కాండం తొలుచు పురుగు ఉధృతిని తగ్గించవచ్చును. ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ గుడ్డు పరాన్నజీవిని ఎకరాకు 20,000 చొప్పున 120 రోజుల నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 2–4 సార్లు పైరులో వదలాలి లేదా క్రింది ఎండుటాకులను రెలచి, క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు జూన్, జూలై మాసాలలో (పంట 120 రోజుల వయసులో) పిచికారి చేయవలెను.

పొలుసు పురుగు : కణుపు ఏర్పడినప్పటినుంచి, చెఱకు నరికే వరకు పొలుసు పురుగు ఆశిస్తుంది. నీటి ఎద్దడి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ నష్టం కల్గిస్తుంది. విత్తనపు దవ్వను పొలుసు పురుగు ఆశించని తోటల నుంచి సేకరించాలి లేదా మూడుకళ్ళ ముచ్చెలను డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.25 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపిన మందు ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ముంచి నాటాలి. పొలుసు పురుగు వ్యాప్తి అరికట్టటానికి ఎండు ఆకులు రెలచి (మొవ్వులో కనీసం 8 ఆకులు ఉంచి) డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తెల్లదోమ : పురుగు ఆకుల అడుగుభాగాన అంటుకొని ఆకుల్లోని రసాన్ని పీల్చి వేయటం వలన పైరు పెరుగుదల తగ్గిపోతుంది. ఆకులు నారింజ రంగుకు మారి మొక్కలు గిడసబారి పోతాయి. నీటి ముంపుకు గురైన, ఇవక తీత సౌకర్యంలేని, సిఫారసు మేరకు ఎరువు వేయని పొలాల్లోను, కార్శి తోటల్లోను తెల్లదోమ ఎక్కువగా వస్తుంది. దీని నివారణకు మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.25 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి రెండుసార్లు 10–12 రోజుల వ్యవధిలో అవసరాన్నిబట్టి ఆకుల క్రింది, పైభాగాలు తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.

పిండినల్లి : పురుగులు ఆకు తొడిమలకు, చెఱకు గడలకు మధ్య గుంపులు గుంపులుగా చేరి గడల నుండి రసాన్ని పీల్చివేస్తాయి. పంట పక్వానికి వచ్చునపుడు పిండినల్లి తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉధృతంగా ఉన్నపుడు మొవ్వు ఎండిపోతుంది. విత్తనపు దవ్వను నాటటానికి ముందు లీటరు నీటికి డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. కలిపిన మందు ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ముంచి నాటుకోవాలి. ఎదిగిన తోటల్లో పురుగు నివారణకు ఆకులు రెలచి, బహిర్గతమైన కణుపుల మీద లేదా డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఆకుపై ఆశిస్తున్న పిండినల్లి నివారణకు కూడా పైన సూచించిన మందులను ఆకు తడిచేటట్లుగా పిచికారీ చేసి పురుగును అదుపులో ఉంచవచ్చు.

దూదేకుల పురుగు : పురుగులు ఆకుల అడుగు భాగాన గుంపులు గుంపులుగా చేరి, ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చి వేయటం వలన ఆకులు వడలిపోయి ఎండిపోతాయి. పురుగు ఆశించిన చెఱకు నుండి తయారు చేసిన బెల్లం నల్లగాను, మెత్తగాను ఉండి నిల్వకు పనికిరాదు. డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసి ఈ పురుగును నివారించుకోవచ్చు.

వేరు లద్దె పురుగు : వేరు లద్దెపురుగు తేలిక నేలల్లో ఎక్కువగా కనిపించి మొక్కల వేళ్ళను తినివేయటం వలన మొక్కలు చనిపోతాయి. తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే పొలంలో దీపపు ఎరలు అమర్చుకోవడం ద్వారా క్రోడ పెంకు పురుగులు ఆకర్షితమై, దీపపు ఎరక్రింద అమర్చుకొన్న పురుగు మందు ద్రావణంలో పడి, చనిపోవును. తద్వారా దాదాపు 50 శాతం పురుగులను నిర్మూలించవచ్చు. ఎకరాకు ఫిప్రోనిల్ 0.3 శాతం 10 కిలోల గుళికలు

లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.4 శాతం గుళికలు 8 కిలోలు చొప్పున నాటే సమయంలో భూమిలో వేసి పురుగు వలన కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఎదిగే తోటల్లో ఈ పురుగు నివారణకు ఎకరాకు ఫిప్రోనిల్ 0.3 శాతం 10 కిలోల గుళికలు లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.4 శాతం గుళికలు 8 కిలోలు చొప్పున మొక్కల మొదళ్ళ దగ్గర గుంతలు చేసి వేయాలి. కీటక నాశక శిలీంధ్రం (ఎంటమోపాథోజెనిక్ ఫంగస్), మెటారైజియం ఎనైసోప్లి (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.–ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్.ఎమ్.ఎ. 35) ని ఉపయోగించి చెఱకులో వేరుపురుగును నివారించవచ్చు. చెఱకు నాటిన సమయంలో గాని, తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే గాని సాళ్ళలో మోటారైజియం ఎనైసోప్లి కల్చర్ 1 కిలో 100 కిలోల పశువుల ఎరువులో కలుపుకొని ఎకరం పొలంలో నెల వ్యవధిలో రెండు సార్లు వేసుకున్నట్లయితే వేరుపురుగును సమర్ధవంతంగా నివారించవచ్చును.

చెదలు : తేలికపాటి నేలల్లో చెద పురుగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. విత్తనపు ముచ్చెల కిరువైపుల నుండి ప్రవేశించి లోపలి పదార్థం, మొగ్గలు తినడం వలన మొలక శాతం తగ్గుతుంది. ఎదిగిన తోటల్లో కూడా లోపలి మెత్తని పదార్థం తినివేసి, కేవలం డొల్లలు మిగుల్చును, చెద పురుగుల నివారణకు పుట్టలను త్రవ్వి, రాణి పురుగును నాశనం చేయాలి. నాటే ముందు చెఱకు ముచ్చెలను ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. ఒక మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపిన మందు ద్రావణంలో 15 నిముషాలు ముంచి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. విత్తనశుద్ధి చేసిన చెఱకు ముచ్చెలను నాటే ముందు కాలువల్లో ఎకరాకు 100 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. ను 180 లీటర్ల నీటిలో కలిపి వేయాలి. ఎదిగిన తోటల్లో చెదల నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. ను 100 మి.లీ. మందును 180 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్క మొదళ్ళ దగ్గర వేయాలి లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 20 టి.సి. 5 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి గెడలు తడిచేటట్లు చెఱకు గడలపైన పిచికారి చేసి, మొక్క మొదళ్ళ దగ్గర కూడ మందు నీరు పోయాలి. చెదపురుగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉన్న పొలాల్లో కీటక నాశన శిలీంధ్రం, మెటారైజియం ఎనైసోప్లి (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.–ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్.ఎమ్.ఎ. 35) ను నెల తరువాత కల్చర్‌ను 1 కిలో 100 కిలోల పశువులఎరువులో కలుపుకొని ఎకరా పొలంలో చెఱకు నాటే సమయంలో వేసుకున్నట్లయితే చెదలను నివారించవచ్చు.

చెఱకు నల్లి (లక్కతెగులు) : ఈ నల్లి తాకిడి ఏప్రిల్–మే మాసాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు హెచ్చుగా ఉంటుంది. వేసవి కాలంలో వానజల్లులు పడినపుడు, ఆ జల్లుల మధ్య ఒరుపు సమయంలో లక్క తెగులు ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. ఆకు అడుగుభాగాన ఈ నల్లులు అసంఖ్యాకంగా చేరి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకు ఎర్రగా మారుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఈ నల్లి ఉధృతికి అనుకూలం. నివారణకు లీటరు నీటికి డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా 3 గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడిని కలిపి ఆకుల అడుగు భాగం తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

గూడు నల్లి : ఈ నల్లులు ఆకుల అడుగు భాగాన గుంపులు గుంపులుగా 6 నుండి 8 వరుసల్లో ఆకుమధ్య ఈనెకు సమాంతరంగా తెల్లటి గూళ్ళను చేసి, వాటి లోపల ఉంటాయి. ఇవి ఆకుల అడుగు భాగాన్ని గీకి, రసం పీల్చటం వలన పసుపు పచ్చని అండాకారపు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. క్రమేపీ ఈ మచ్చలు ఎరుపు రంగుకు మారతాయి. ఈ నల్లి ముదురు ఆకులను ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. ఇవి చెఱకు ఆకుల నుండి రసాన్ని పీల్చటం వలన ఆకులన్ని పాలిపోయి, చివరకు ఎండిపోతాయి. ఇవి ఆశించిన తోటల్లో ఎదుగుదల తగ్గి, దిగుబడి తగ్గుతుంది. ఈ నల్లి ఉధృతి ఏప్రిల్ నెల నుండి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది. మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రతలు (26 నుండి 29° సెల్సియస్)

మరియు మధ్యస్థమైన గాలిలోని తేమ (60 నుండి 75 శాతం) ఈ నల్లి ఉధృతికి అనుకూలం. ఈ నల్లి ఆశించిన క్రింది ఆకులను (మొవ్వులో 8 ఆకులు మినహా) తీసి తగులబెట్టాలి. నీటిలో కరిగే గంధకపు పొడి లీటరు నీటికి 3 గ్రాములు లేదా డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. చొప్పున కలిపి ఆకుల అడుగు భాగం తడిచేటట్లు పిచికారీ చెయ్యాలి. అవసరాన్నిబట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో మరోసారి పిచికారీ చేయాలి. ఈ నల్లి ఆశించినపుడు, గడ్డిజాతి మొక్కలపై కూడా పై మందులు పిచికారి చేయాలి.

తెల్లపేను (ఊలి ఎఫిడ్) : ఈ పురుగు యొక్క తల్లి మరియు పిల్ల పురుగులు ఆకుల అడుగుభాగంలో గుంపులుగా ఉండి, రసాన్ని పీల్చటం వలన తెలుపు, పసుపు వర్ణం మిళితమైన మచ్చలు ఏర్పడతాయి. మొదట అంచులు తర్వాత మొత్తం ఆకులు క్రమేపి ఎండిపోతాయి. ఈ పురుగులు విసర్జించిన తియ్యని జిగట పదార్థం క్రిందనున్న ఆకుల పైభాగాన పడి, దానిమీద 'సూటీమోల్ట్' అనే నల్లని శిలీంధ్రం పెరిగి ఆకు మసిబారుతుంది. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు చెఱకు దిగుబడి 26 శాతం, పంచదార దిగుబడులు 24 శాతం తగ్గిపోతాయి. వాతావరణం మబ్బుగా ఉండి, 19 నుండి 35° సెల్సియస్ వరకు ఉష్ణోగ్రత మరియు 80 నుండి 90 శాతం గాలిలో తేమ ఉన్నపుడు పురుగు బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గాలి ద్వారా 1.5 నుండి 2.0 కి.మీ. దూరం వరకు ఈ పురుగులు వ్యాప్తి చెందగలవు. విత్తనాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన తోటల నుండే సేకరించాలి. సిఫారసు చేసిన మోతాదులో నత్రజని ఎరువులు వాడాలి. పురుగు ఆశించిన ఆకులను తీసి తగుల బెట్టాలి. పురుగు ఆశించిన తోటల నుండి చెఱకును ఇతర ప్రాంతాలకు రవాణా చేయకూడదు. లీటరు నీటికి మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 1.7 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.25 మి.లీ. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి ఆకుల అడుగు భాగం తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

కాటుక తెగులు : తెగులు సోకిన మొక్కల్లో మొవ్వు పొడుగైన నల్లని కొరడాగా మారుతుంది. మొవ్వు నుండి కొరడా వచ్చిన 3–4 రోజుల వరకు తెల్లని పల్చని పొర కప్పబడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పొర చిట్లి ఒక్కో కొరడా నుండి సుమారు 50 కోట్ల తెగులు కారక శిలీంధ్ర బీజాలు గాలి ద్వారా, వర్షపు జల్లుల ద్వారా పరిసర ప్రాంతాలలోనికి వెదజల్లబడి తెగులు వ్యాప్తికి దోహదం చేస్తాయి. తెగులు సోకిన గడలు సన్నగా వుంటాయి. తెగులు మొక్క తోటల కన్నా కార్శి తోటలలో ఎక్కువగా వస్తుంది. తెగులు సోకిన కార్శి తోటలలో దుబ్బుల నుండి పిలకలు ఎక్కువ వస్తాయి. చెఱకు దిగుబడి, రసనాణ్యత తగ్గుతుంది. తెగులు విత్తనపు ముచ్చెల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. మూడుకళ్ళ ముచ్చెలను వేడినీటిలో (52° సెల్సియస్ వద్ద 30 నిమిషాలు) లేదా తేమతో మిళితమైన వేడి గాలిలో (54° సెల్సియస్ వద్ద 2½ గం॥లు) విత్తనశుద్ధి చేసి లేవడి తోటలను పెంచి వాటి నుండి వచ్చిన ముచ్చెలను నాటుకొన్నట్లయితే తెగులును నివారించవచ్చు. కొరడాలను గమనించిన వెంటనే పాలీథీన్ కవరుతో కొరడాను కప్పి క్రిందకు కత్తిరించి దూరంగా తీసుకు వెళ్ళి తగులు బెట్టాలి. తెగులు సోకిన దుబ్బులను తీసి తగులబెట్టాలి. కార్శి తోటల పెంపకం మొదటి కార్శికే పరిమితం చేయాలి. తెగులును తట్టుకొనే రకాలను సాగు చేయాలి. 87ఎ298 (విశ్వామిత్ర) రకానికి ఈ తెగులు అధికంగా రావడం గమనించడం జరిగింది. కాబట్టి, రైతులు కొత్త రకాలను వాడడం మంచిది. తెగులుకు లొంగిపోయే రకాలను సాగు చేస్తున్నప్పుడు విత్తనపు ముచ్చెలను అజాక్సీస్ట్రోబిన్ + టెబుకొనజోల్ (1.0 మి.లీ./ లీటరు) లేదా ప్రొపికొనజోల్ (0.5 మి.లీ./లీటరు) మందు

ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ముంచి నాటుకోవాలి. కార్బి తోటల్లో టెబుకొనజోల్ (1.0 మి.లీ./లీటరు) లేదా ప్రొపికొనజోల్ (1.0 మి.లీ./లీ.) మందును కార్బి చేసిన వెంటనే ఒకసారి, మరో 30–35 రోజులకు ఇంకొకసారి పిచికారీ చేయాలి. మందు ద్రావణం పిచికారీ చేసే ముందు తెగులు సోకిన దుబ్బులను తీసి తగులబెట్టాలి.

ఎర్రకుళ్ళు తెగులు : తెగులు ఆశించినప్పుడు తొలిదశలో పై నుండి 3, 4వ ఆకులు పసుపు పచ్చగా మారతాయి. ఆ తర్వాత మొవ్వంతా వడలిపోతుంది. తెగులు సోకిన గడలను నిలువుగా చీల్చితే పులిసిన పిండి పదార్థపు వాసన వస్తుంది. చెఱకు లోపల ఎర్రకుళ్ళు తెగులు సోకిన భాగం ఎర్రగా మారి అక్కడక్కడ తెల్లని అడ్డుచారలు కనబడతాయి. తెగులు సోకిన చెఱకు కొంత కాలానికి వడలి చనిపోతుంది. చెఱకు దిగుబడి, రసనాణ్యత తగ్గిపోతుంది. తెగులు సోకిన దుబ్బులను సమూలంగా తీసి కాల్చివేయాలి. తోటల్లో నీరు నిలవకుండా చేయాలి. తెగులు సోకిన మడి నుంచి ఇంకొక మడికి నీరు వెళ్ళనీయరాదు. తెగులు సోకిన తోటలను నరికి చెత్త వగైరా తీసివేసిన తర్వాత అదే భూమిలో తిరిగి చెఱకు సుమారు నాలుగు నెలల వరకు వేయరాదు. తెగులు సోకిన మొక్క తోటల నుండి కార్బి చేయరాదు. తెగులును తట్టుకొనే రకాలను సాగుచేయాలి. విత్తనపు ముచ్చెలను నాటేముందు వేడినీటిలో – 52° సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కార్బండిజిమ్ 0.5 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 30 నిమిషాలు శుద్ధి చేయాలి. ఎర్రకుళ్ళు తెగులును తట్టుకునే రకాలైన కోఎ7602, కో7706, 83ఆర్23, కోటి 8201, 87ఎ298, 93ఎ145, 97ఎ85, 2003వి46, 2001ఎ63, 2000ఎ225, 2000ఎ56, 2003ఎ255, 2005ఎ128, 2005టి16, 2006ఎ223, 2009వి127, 2009ఎ107, 2009ఎ252, 2012ఎ319 లను సాగు చేయాలి. తెగులును తట్టుకోలేని రకాలైన కో62175, కో419, కో997, కో671 వంటి రకాలను ఎట్టి పరిస్థితులలోను సాగు చేయరాదు.

గడ్డిదుబ్బు తెగులు : తెగులు ఆశించిన మొక్కల మొదళ్ళ నుండి సన్నని, కురచగా నున్న తెల్లని పిలకలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఆకులు పాలిపోయి చాలా చిన్నవిగా ఉండి, మొక్కలు గడ్డిదుబ్బుల వలె ఉంటాయి. కార్బితోటల్లో ఎక్కువగా కనబడుతుంది. తెగులు సోకిన మొక్క తోటల నుండి కార్బి చేయరాదు. తెగులు సోకిన దుబ్బులను త్రవ్వి తగుల బెట్టాలి. విత్తనపు ముచ్చెలను వేడి నీటిలో గాని, తేమతో మిళితమైన వేడిగాలిలో గాని శుద్ధి చేయాలి. తెగులును వ్యాప్తి చేసే కీటకాలను నివారించటానికి డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. పొలంలో కలుపు లేకుండా చూడాలి. తెగులును తట్టుకొనే రకాలను సాగు చేయాలి.

వడలు తెగులు : తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులు నీటి ఎద్దడికి గురైన మొక్కల ఆకుల వలె వడలిపోతాయి. చెఱకులో గుల్ల ఏర్పడటం వలన బరువు తగ్గుతుంది. నీటి ఎద్దడి, నీటి ముంపుకు లోనైన తోటల్లో ఈ తెగులు హెచ్చుగా వస్తుంది. జూన్–జూలై నెలల్లో నాటిన తోటలు ఎక్కువగా లొంగిపోతాయి. వేసవిలో దగ్గర దగ్గరగా నీరు కట్టాలి. పంట ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కావలసిన అన్ని పద్ధతులు – ఆరోగ్యవంతమైన విత్తనం, సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం, కొంత మేరకు సేంద్రీయ ఎరువులను, జీవ నియంత్రణ మందులను భూమికి చేర్చుట మరియు సకాలంలో అన్ని యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించినప్పుడు ఈ తెగులు రాకుండా పంటను కాపాడవచ్చు. ట్రైకోడెర్మా / సుడోమోనాస్‌ని 5 కిలోల చొప్పున ఏదేని సేంద్రీయ ఎరువుతో కలిపి చెఱకు ముచ్చెలు నాటే ముందుగా చాళ్ళలో వేసినట్లయితే బాగా పనిచేస్తుంది. పంట మార్పిడి ద్వారా శిలీంధ్రం ఉధృతి తగ్గించవచ్చు.

అనాసకుళ్ళు తెగులు : నల్లరేగడి నేలల్లో ఇవకతీత సౌకర్యం లేనపుడు, ముచ్చెలు నాటడం ఆలస్యమైనప్పుడు విత్తనపు ముచ్చెలు మొలకెత్తక కుళ్ళిపోతాయి. ఈ ముచ్చెల నుండి పండిన అనాసపండు వాసన వస్తుంది. ముచ్చెలను 0.05 శాతం కార్బండెజిమ్ (150 గ్రా. మందు 300 లీటర్ల నీటిలో) మందు నీళ్ళలో నాటడానికి ముందు 15 నిమిషాలు ముంచితే ఈ తెగులును అరికట్టవచ్చు.

వలయపు మచ్చతెగులు : మొవ్వులోని మూడు ఆకులు మినహా, అన్ని ఆకులు తెగులుకు లోనవుతాయి. ఆకుల మీద ముదురు ఇటుక రంగు వలయాకారపు మచ్చలేర్పడి, అవి కలిసి చివరకు ఆకు ఎండిపోతుంది. తెగులు ఆగష్టు నుండి మొదలై తోట నరికే వరకు కనబడుతుంది. కో7219, కోటి8201, 85ఎ261, 87ఎ298 రకాల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లేదా కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా. లేదా మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటిలో కలిపి మూడుసార్లు, మూడువారాల వ్యవధిలో తెగులు సోకినప్పటి నుండి పిచికారీ చేయాలి.

మొవ్వుకుళ్ళు తెగులు : వర్షాలు తొందరగా మే–జూన్ నెలల్లో ప్రారంభమై, జూలై నెలలో అధిక వర్షాలు పడినప్పుడు మొవ్వుకుళ్ళు తెగులు ఉధృతంగా వస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కల మొవ్వు ఆకుల మొదలు భాగం పాక్షికంగా తెల్లగా అవుతుంది. మొవ్వు ఆకులు చిన్నగా ఉండి సరిగా విడివడవు. ఒక్కొక్కప్పుడు చుట్టుకొని పోతాయి. ఆకుల మొదలులో పాలిపోయిన భాగంలో ఎర్రటి చారలు ఏర్పడి ఆ చార వెంబడి ఆకు చిట్లిపోతుంది. మొవ్వు కుళ్ళిపోతే మొక్క ఎదుగుదలలేక చనిపోతుంది. మొవ్వుకుళ్ళకపోతే వర్షాలు తగ్గగానే తెగులు ఉధృతి తగ్గి మొక్కలు మామూలు స్థితికి వస్తాయి.

మొవ్వుకుళ్ళు తెగులు గాలి ద్వారా, వర్షపు జల్లుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. విత్తనపు ముచ్చెల ద్వారా వ్యాప్తి చెందదు. కార్బండజిమ్ ఒక గ్రాము లేదా మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి తెగులు ఉధృతినిబట్టి 10–15 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారీ చేసి నివారించవచ్చు.

ఆకుమాడు తెగులు : ఈ తెగులు బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. ఆకుల మీద సన్నటి పొడుగాటి తెల్లటి చారలు ఏర్పడి, ఈ చారల వెంబడి ఆకుల కొన నుండి క్రిందకు ఎండడం జరుగుతుంది. తెగులు సోకిన గడలలోని కళ్ళు క్రింది కణుపుల నుండి మొదలై క్రమేపీ పై కణుపుల వైపుగా మొలకెత్తుతాయి. ఈ మొలకలు పాలిపోయి క్రమేపి ఎండి చనిపోతాయి.

ఈ తెగులు విత్తనపు ముచ్చెల ద్వారా, తోట నరికే కత్తుల ద్వారా, సాగు నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. తెగులు సోకని ఆరోగ్యవంతమైన తోటల నుండి విత్తనం వాడడం, తెగులు సోకిన దుబ్బులను సమూలంగా తీసి తగులబెట్టడం, ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కార్బి మానివేయడం, చెఱకు నరికే కత్తులను అడపాదడపా 5 శాతం ఫార్మాల్డిహైడ్ ద్రావణంలో ముంచి శుద్ధి చేయడం, విత్తనపు ముచ్చెలను వేడినీటిలో 52° సెల్సియస్ వద్ద 30 నిమిషాలు శుద్ధి చేయడం ద్వారా తెగులును నివారించవచ్చు.

తుప్పు తెగులు : ఆకుల అడుగు భాగంలో సన్నగా పసుపు లేదా నారింజ రంగులో ఉండే బొబ్బలు ఏర్పడతాయి. ఇవి క్రమంగా గోధుమ రంగుకు, ముదురు గోధుమ రంగుకు మారతాయి. దుబ్బులో ఉండే అన్ని మొక్కలకు ఈ తెగులు సోకి సుమారు 70 శాతం విస్తీర్ణానికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. తెగులు ఉధృతమైనప్పుడు ఆకుతొడిమల మీద కూడా తుప్పు తెగులు బొబ్బలు ఏర్పడి తెగులు సోకిన మొక్కలు దూరానికి ముదురు గోధుమ రంగులో కనిపిస్తాయి. ఈ తెగులు అక్టోబర్–నవంబర్ నుండి తోట నరికేదాకా ఆశిస్తుంది.

చల్లటి వాతావరణంలో గాలితో కూడి, గాలిలో తేమ హెచ్చుగా ఉన్నప్పుడు తుప్పు తెగులు వృద్ధి చెందడానికి, వ్యాప్తికి బాగా దోహదపడుతుంది. మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లేదా ప్రోపినెబ్ 2.5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసి నివారించవచ్చు.

చెఱకులో పసుపు ఆకు తెగులు : ఈ తెగులు వైరస్ వలన సోకుతుంది. తెగులు సోకిన మొక్కలపై నాల్గవ ఆకు నుండి క్రింది వైపుకు ఆకులు పసుపుపచ్చ రంగుకి మారుతాయి. చివరన ఉన్న విచ్చుకోని ఆకులు మాత్రం ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి. తర్వాత క్రమేపి ఆకుల చివరల నుండి క్రిందకి ఆకులు ఎండిపోయి చుట్టుకొని ఉంటాయి. ఆకులలోని మధ్య ఈనె మాత్రం పసుపుపచ్చగా మారి తర్వాత పసుపురంగు ఈనె రెండువైపులా విస్తరిస్తుంది. ఈ దశలో పైనున్న ఆకులు నిటారుగా కిరీటం వలె కనిపిస్తాయి. తెగులు సోకిన మొక్కలు అనుకూల పరిస్థితులలో ఆరోగ్యవంతంగా కనిపిస్తాయి, కానీ నీటి ఎద్దడి కలిగినపుడు తెగులు లక్షణాలను కనబరుస్తాయి. ఈ తెగులు పేనుబంక పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. భరణి (2003వి46), శ్రీముఖి (2005ఎ128), కనక మహాలక్ష్మీ (2001ఎ63) వంటి రకాలలో అధికంగా ఈ తెగులు కనిపిస్తుంది.

దీని నివారణ కొరకు తెగులు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే తెగులు సోకిన మొక్కలను పీకి కాల్చివేయాలి. తెగులు సోకిన మొక్క తోటల నుండి విత్తనాన్ని సేకరించరాదు. తెగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో కణజాల ప్రవర్ధనం / టిష్యూకల్చర్ ద్వారా అభివృద్ధి చేసిన విత్తనాన్ని వాడాలి. తెగులును వ్యాప్తి చేసే పేనుబంక నివారణకు డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ./లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. మొక్కజొన్నను సరిహద్దు పంటగా వేయాలి.

మొజాయిక్ తెగులు : ఈ తెగులు లక్షణాలు మొక్క తోటలోనూ మరియు కార్శి తోటల్లోనూ గమనించవచ్చు. కానీ కార్శి తోటలలో తెగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించడం జరిగింది. ఈ తెగులు ఉనికిని మొక్క లేత దశలో (3–4 నెలలు) నుండి గమనించవచ్చు. ఈ తెగులు లక్షణాలు పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉన్న మొవ్వు ఆకులపై గుర్తించవచ్చు. లేత ఆకులపై లేత ఆకుపచ్చ ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న మచ్చలను గమనించవచ్చు. తెగులు ఉధృతి ఎక్కువైనప్పుడు లేత ఆకులు పసుపు రంగుకు మారి తర్వాత ఎరుపు రంగుకి మారును. చివరికి ఆకులు ఎండి మొక్కలు గిడసబారుతాయి. తెగులు సోకిన మొక్కలలో గడల బరువు, చక్కెర శాతం బాగా తగ్గుతాయి. ఈ తెగులు సాధారణంగా ఎక్కువ శాతం విత్తన ముచ్చెల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ వైరస్ పొలంలో ఉండే గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలపై నివసించి, తరువాత చెఱకు పంట మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. ఈ తెగులు నివారణకు తెగులు సోకని, ఆరోగ్యవంతమైన తోటల నుండి మాత్రమే విత్తనాన్ని సేకరించాలి. ఈ తెగులు పొలంలో పేనుబంక పురుగుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. కనుక పేనుబంక నివారణకు మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి. వీలైనంత వరకు కలుపు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

ప్రత్యేక విత్తనపు తోటల పెంపకం : ముదురు చెఱకుల మధ్యభాగం నుండి మూడుకళ్ళ ముచ్చెలను తీసుకోవాలి. మూడుకళ్ళ ముచ్చెలను వేడినీటిలో 52° సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 30 నిమిషాలు లేదా తేమతో మిళితమైన వేడి గాలిలో 54° సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2½ గంటలు ఉంచి శుద్ధి చేయాలి. శుద్ధి చేయటం ద్వారా కాటుక, ఆకుమాడు, గడ్డిదుబ్బు తెగుళ్ళను నివారించవచ్చు. శుద్ధి చేయబడిన విత్తనాన్ని మాత్రమే లేవడి తోటల పెంపకానికి వాడాలి. డిసెంబరు–జనవరి నెలల్లో శుద్ధి చేయబడిన విత్తనాన్ని లేవడి తోటల పెంపకానికి వినియోగించాలి.

పొలుసు పురుగు నివారణకు ముచ్చెలను నాటే ముందు డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపిన మందు ద్రావణంలో 15 నిమిషాలు ముంచి నాటుకోవాలి. సిఫార్సు చేసిన నత్రజనిని నాటిన 30వ రోజున, 60వ రోజున రెండు సమపాళ్ళలో వేయాలి. ఎకరానికి 40 కిలోల భాస్వరం, 40 కిలోల పొటాష్‌లను నాటే సమయంలో వేసుకోవాలి. లేవడి తోటలు 7–8 నెలలు పెరిగిన తర్వాత జూలై–ఆగష్టు నెలల్లో కొట్టి తిరిగి నాటాలి. ఈ విత్తనానికి వేడినీటి శుద్ధి అవసరం లేదు.

విత్తన తోటల వలన ఉపయోగములు : ఒకే సంవత్సరంలో 6–7 నెలల వయస్సు గల తోటలు వరుసగా పెంచడం వలన సుమారు 12–14 నెలల అనంతరం ఒక హెక్టారు భూమిలో విత్తనపు తోట పెంపకం ద్వారా సుమారు 80–100 హె॥ భూమిలో నాటడానికి సరిపడే విత్తనం వృద్ధి చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా విత్తిన తోటల నుండి విత్తనాన్ని వాడినపుడు హెక్టారుకు 10–15 టన్నుల అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు.

చెరకు పంట – పక్వత నిర్ధారణ :

వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల్లో చేనేత తరువాత చక్కెర పరిశ్రమ రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. సుమారు 3.5 కోట్ల రైతు కుటుంబాలు చెఱకు పంటపై ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నాయి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా చక్కెరను వినియోగించే దేశం (సుమారు 20 మిలియన్ టన్నులు). మన దేశ సగటు పంచదార వినియోగం సంవత్సరానికి ప్రతి పౌరునికి 18 నుండి 20 కిలోలుగా నమోదు చేయబడినది.

మన రాష్ట్రంలో చెఱకు వంట ముఖ్యంగా పంచదార మరియు బెల్లం ఉత్పత్తి చేయుటకు వాడబడుతున్నది. చెఱకు పంట నరకుటకు పక్వత నిర్ధారణ తప్పనిసరి. చెఱకు రకాల పంట కాల పరిమితిని బట్టి (స్వల్ప, మధ్య కాలికం), రసంలో చక్కెర శాతం 18 మరియు రసశుద్ధత 85 నుండి 90 శాతం నమోదైనప్పుడు చెఱకు రకాలు పక్వతకు వచ్చినట్లుగా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. సాధారణంగా రైతుకు కావలసినది గడ బరువు లేదా ఎకరానికి అధిక దిగుబడి (టన్నులు). చక్కెర కర్మాగారానికి కావలసినది రికవరీ. ఈ రెండు అంశాలను సమన్వయంతో పరిశీలించి చెఱకు నరకడానికి పర్మిట్లు జారీ చేయవలసిన ఆవశ్యకత చక్కెర కర్మాగారాలపై ఆధారపడి ఉంది. అందుకే, పంచదార రైతు పొలంలో తయారై చక్కెర కర్మాగారంలో శుద్ధి చేయబడుతుందని చక్కెర ప్రవీణులు మరియు చెఱకు పంట అనుభవజ్ఞులు చెబుతూ ఉంటారు. చక్కెర కర్మాగారాల రికవరీ ఆధారంగా కూడా టన్ను చెఱకు ధర నిర్ధారణ చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి చెఱకు బరువు, చక్కెర శాతం అను రెండు అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని చెఱకు పర్మిట్లు జారీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది.

సాధారణంగా పక్వతకు వచ్చిన చెఱకు తోటలు, పచ్చదనం తగ్గి పసుపు రంగుకు మారుతాయి. క్రొత్తగా మొవ్వు ఆకులు పుట్టడం ఆగిపోతుంది, గడల చివర కణుపులు దగ్గరదగ్గరగా ఏర్పడి, ఆకులు కుచ్చుగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని రకాలలో పూత కనిపిస్తుంది. పూత పూసిన చెరకును వెంటనే నరికి చక్కెర కర్మాగారాలకు తరలించాలి. లేనిచో చక్కెర రికవరీ తగ్గుదల, రసక్షీణత మొదలవుతుంది. చెఱకు చివరి కణుపులలో తీపిదనము క్రింది కణుపుల తీపిదనముతో ఇంచుమించు సమానంగా ఉన్నపుడు ముదిరిన చెఱకుగా చెప్పవచ్చు. దీనికంటే బాగుగా నిర్ధారణ చేయుటకు, ప్రతి చెఱకు గడను రెండు ముక్కలుగా నరికి, వేరువేరుగా గానుగాడి, పైన కణువులలోని రసములోని తీపిదనపు ఘన పదార్ధం పరిమితులు ఇంచుమించు సమానంగా ఉన్నచో ఆ చెఱకు తోటలు పక్వతకు వచ్చినవని నిర్ధారణ చేయవచ్చు. చక్కెర కర్మాగార పరిధిలో గల చెరకు తోటల పక్వత నిర్ధారణకు "చెఱకు పక్వత సర్వే" చాలా అవసరం. దీనికొరకు చెఱకు గడలోని చక్కెర ఘనపదార్ధంను "చేతి రిఫ్రోక్టోమీటరు"

ద్వారా నిర్ధారణ చేయుదురు. చెఱకు గడలోని కొన్ని చుక్కల రసంను తీసి చేతి రిఫ్రాక్టోమీటరుతో పరీక్షించి రసంలో చక్కెర ఘనపదార్ధ పరిమాణంను నిర్ణయిస్తారు. ఆ ఘన పదార్థం పరిమాణం హెచ్చుగా నున్న తోటలను ముందుగాను, తక్కువగా నున్న తోటలను తదుపరి గానుగాడుటకు చక్కెర పరిశ్రమ పర్మిట్లు జారీ చేస్తోంది.

సాధారణంగా మన రాష్ట్రంలోని వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, చక్కెర కర్మాగారాలు 'నవంబరు–డిసెంబరు' మాసాలలో చెఱకు గానుగాడుట ప్రారంభిస్తాయి. దీనికి ముందుగా చక్కెర కర్మాగారాల పరిధిలో చెఱకు తోటల పక్వత నిర్ధారణ, 'పౌచ్ పీయర్సర్' (గడలోని రసం తీయు పరికరం) మరియు చేతి రిఫ్రాక్టోమీటరు (చెఱకు రసంలోని తీపి ఘనపదార్ధ నిర్ధారణ చేయు పరికరం) సహాయంతో చేయుదురు. నవంబరు మాసంలో పగటి ఉష్ణోగ్రత మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసం, చల్లటి పొడి వాతావరణం బట్టి చెఱకు గడలోని చక్కెర కూడిక శాతం నిర్దిష్టంగా కాక మారుతూ ఉంటుంది. చెఱకు పక్వత సర్వే పూర్తి చేయుటకు ఒక చక్కెర కర్మాగార పరిధిలో సుమారు 3 వారాల నుండి 4 వారాల సమయం పడుతుంది. మొదటిరోజు వివిధ తోటలలో నిర్ధారించిన రసంలోని ఘనపదార్ధం పరిమాణం, ఆ తదుపరి రోజు మిగిలిన తోటల రసంలోని ఘనపదార్ధ పరిమాణంతో పోల్చుట సరికాదు. ఎందుకంటే నవంబరు మాసంలో చలి మొదలైన నాటి నుండి రోజురోజుకు రసంలోని ఘనపదార్ధ పరిమాణం పెరుగుతుంది. అంటే ఆలస్యంగా రసంలోని ఘన పదార్థ పరిమాణం నిర్ణయించిన తోట కొంత ఎక్కువ పండి సహజంగానే రసంలో హెచ్చు మనపదార్ధంను చూపిస్తుంది. పరిశోధనా ఫలితాల ప్రకారం చెఱకు గడలోని రసంలోని ఘనపదార్ధం ప్రతి ఒక్కరోజు ఆలస్యానికి నవంబరు మాసంలో 0.1 యూనిట్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి చెఱకు తోటలను కాలపరిమితి మరియు పక్వత దృష్ట్యా ఏ క్రమంలో నరకవలసినదో నిర్ణయించుటకు వివిధ తోటల రసంలోని ఘనపదార్థ పరిమాణంను ప్రతి ఒక్కరోజు ఆలస్యమునకు 0.1 యూనిట్ పెరుగుననే ప్రాతిపదికమీద ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుకు సరిదిద్దుకోవాలి. అప్పుడే వివిధ తోటల రసంలోని ఘనపదార్ధం ఖచ్చితంగా పోల్చి, తోటలు ఏ వరుసలో నరకాలో నిర్ణయించుటకు సాధ్యపడుతుంది.

ఉదాహరణకు నవంబరు 1వ తేదీన చక్కెర కర్మాగార పరిధిలో ఒక తోట రసంలో ఘనపదార్ధ పరిమాణం 17.5 శాతం, నవంబరు 21వ తేదీన వేరొక తోట రసంలో ఘనపదార్ధ పరిమాణం 19.0 శాతం, ఈ రెండు తోటలలోని ఘనపదార్ధ పరిమాణం ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుకు సరిదిద్దాలి. ప్రతి ఒక్కరోజు ఆలస్యానికి రసంలోని ఘన పదార్ధ పరిమాణం 0.1 శాతం పెరుగుననే ప్రాతిపదికపై నవంబరు 1వ తేదీన (క్రిందటి తోట) నిర్ణయించిన రసంలోని ఘనపదార్ధం, 21 వ తేదికి 19.5 శాతానికి (17.5+20×0.1) మారునన్న మాట. 21వ తేదీన రెండవతోటలోని ఘనపదార్ధ పరిమాణం 19.0 శాతం కాబట్టి, అంటే రసంలోని 21వ తేదీన హెచ్చు ఘన పదార్ధ పరిమాణం గల క్రిందటి తోటను ముందుగా గానుగాడాలి. ఈవిధంగా రసంలోని ఘన పదార్ధం పరిమాణం ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుకు సరిదిద్దాక, వివిధ తోటలలోని రసంలో ఘనపదార్ధ పరిమాణం ఖచ్చితంగా పోల్చి తోటలు ఏ క్రమంలో నరకి గానుగాడాలో నిర్ధారణ చేసుకొని రైతు సోదరులకు చెరకు నరకు పర్మిట్లు జారీ చేసుకోవాలి.

చివరిగా చక్కెర కర్మాగారాల రకవరీ, దానిపై ఆధారపడి రైతాంగపు చెఱకు టన్ను ధర నిర్ధారణ ఆధారపడి ఉన్నది కావున, ఇటు కర్మాగారాలకు, అటు రైతాంగానికి చెఱకు పంట లభదాయకంగా మరియు తీపిదనంగా ఉండాలంటే చెఱకు పంట పొలంలో చెఱకు గడలో తయారైన చక్కెరను (పంచదార) బస్తాల రూపంలో వెలికి తీయుటకు "చెఱకు పక్వత నిర్ధారణ" చాలా అవసరం. చెఱకు పంటను పూర్తి పక్వతలో నరికి గానుగాడినపుడే పంచదార లేక బెల్లం ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంటుంది.

చెఱకు తోటలు నరకటం : పక్వానికి వచ్చిన తోటలను భూమట్టానికి దగ్గరగా నరకాలి. పురుగులు, తెగుళ్ళు నీటి ముంపు మరియు నీటి ఎద్దడికి గురైన తోటలను ముందుగా కొట్టాలి. చెఱకు తోటలు నరకటంలో కార్శితోటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, తోటలు నరికిన 24 గం॥లలోపు చెఱకును బెల్లం తయారీకిగాని, పంచదార కర్మాగారానికి గాని పంపాలి.

టిష్యూకల్చర్ విధానము : తక్కువ విత్తన వృద్ధి రేటు ఉన్న ఈ పంటలో మరొక ప్రత్యామ్నాయ విధానం ఈ టిష్యూ కల్చర్ విధానం. ఈ విధానం ద్వారా వేల మొక్కలను, జన్యు స్వచ్ఛత దెబ్బ తినకుండా, ఏకరీతిగా, బలమైన తేజస్సు కలిగిన, ముఖ్యమైన తెగుళ్ళు అంటే ఎర్రకుళ్ళు, గడ్డిదుబ్బు తెగులు ఆశించనటువంటి మొక్కలను ప్రయోగశాలలో పెంచి తరువాత హార్డెనింగ్ పద్ధతి ద్వారా గ్రీన్‌హౌస్‌లలో, షేడ్‌నెట్‌లలో సుమారు 2 నెలలపాటు పెరగనిచ్చి, ప్రధాన పొలంలో నాటినపుడు దిగుబడి రెట్టింపవుతుంది. కాని మొట్టమొదటిగా దీనికయ్యే ఖర్చు, శ్రమ చాలా ఎక్కువ. మనదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన వసంతదాదా షుగర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, షుగర్‌కేన్ బ్రీడింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, కోయంబత్తూరులోను మరియు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం, అనకాపల్లిలోను టిష్యూకల్చర్ మొక్కలను ఉత్పత్తి చేసి సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ విధానం వలన ప్రశస్తమైన రకములను మనం సాగునుండి కనుమరుగవకుండా నివారించవచ్చును. రైతులకు ఉపయోగపడే రకములు, ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న రకములను కూడా ఈ విధానం ద్వారా వృద్ధి చేయవచ్చు.

చెఱకులో కణజాల వర్ధనం : చెఱకు శాఖీయ పద్ధతి ద్వారా ప్రవర్ధమానం చేయబడుతుంది. దీనిలో విత్తన వృద్ధి రేటు (1:6 నుండి 1:8) చాలా తక్కువ. చెఱకులో గడల నుండి వ్యాపించే తెగుళ్ళు మరియు పురుగులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని అధిగమించడానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతి ఈ కణజాల వర్ధనం (టిష్యూకల్చర్). ఈ విధానంలో వేల మొక్కలను జన్యు స్వచ్ఛత దెబ్బతినకుండా ఏకరీతిగా బలమైన తేజస్సు కలిగిన, ముఖ్యమైన తెగుళ్ళు అంటే ఎర్రకుళ్ళు, గడ్డిదుబ్బు తెగులు ఆశించినటువంటి మొక్కలను ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా, ఫిలిప్పెన్స్ వంటి దేశాలలో ఈ పద్ధతి ద్వారా వాణిజ్యపరంగా చెఱకు మొక్కలను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది.

జీవ పదార్థాలు, కణాలు, కణజాలాలు లేదా అంగాలను ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన యానకంలో, సూక్ష్మజీవరహిత స్థితిలో పెంచినప్పుడు అవి పూర్తి మొక్కలను ఇస్తాయి. ఇది వృక్ష కణాలలో మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది. ఈ విధంగా క్రొత్త మొక్కలను తయారుచేసి ప్రయోగ పద్ధతిని కలిపి వృక్ష కణజాల వర్ధనంగా పిలుస్తున్నారు.

సజీవ వృక్షకణాలన్నీ (అవి ప్రత్యేకంగా మార్పు చెందినప్పటికీ) క్రొత్త మొక్కలను తయారుచేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ప్రయోగాత్మక వృక్షశాస్త్ర రంగంలో, కణజాల వర్ధనాన్ని ఒక వినూత్నమైన, అమూల్యమైన సాధనంగా వినియోగిస్తున్నారు. మొక్కల విభేదన, అభివృద్ధిలకు సంబంధించిన అనేక మౌలిక సమస్యల అధ్యయనంలో కణజాల వర్ధనం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంది.

వృక్షశాస్త్రంలో ఉండే వర్గీకరణ శాస్త్రం, కణశాస్త్రం, శరీరధర్మ శాస్త్రాల మాదిరిగానే వృక్షకణజాలవర్ధనం ఒక ప్రత్యేక విభాగం కాదు. నిజానికి ఇది అనేక ప్రయోగ పద్ధతుల సముదాయం. విడి కణాలను లేదా కణజాలాల్ని తీసుకొని సమర్థవంతంగా మనం కోరిన పద్ధతులలో నూతన మొక్కలను ఆవిష్కరించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. గత అర్ధ శతాబ్ద కాలంలో ఈ రంగంలో విశేషమైన కృషి జరిగి మానవునికి ఉపయుక్తమైన మొక్కల సృష్టి జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో పరిశోధనలు విశ్వవిద్యాలయాలలోను, అనేక ప్రైవేటు సంస్థలలో వాణిజ్యపరమైన అవసరాల కోసం జరుగుతున్నాయి.

వ్యవసాయ, ఉద్యానకృషి రంగాలలో – కణజాల వర్ధనం ఉపయోగం ఎంతైనా ఉంది. వీటిలో మొక్కల వ్యాప్తి అతి ముఖ్యమైంది. ఈ రంగానికి ముఖ్యంగా కావలసింది సమర్థవంతమైన, వ్యాధి రహిత మొక్కలను అతి చౌకగా తయారుచేయడం. దీనికి కణజాలవర్ధనం అన్ని విధాల తోడ్పడుతుంది. వైరస్‌తో వ్యాధిగ్రస్తమైన మొక్కల కాండం యొక్క శిఖరాగ్రాన్ని వాడి – వైరస్ రహిత, ఆరోగ్యవంతమైన మొక్కలను తయారుచేయటం దీనికి ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణ. సూక్ష్మజీవరహిత వర్ధనం ద్వారా పెంచిన ఆరోగ్యవంతమైన మొక్కలను సుదూర ప్రాంతాలకు రవాణా చేయడంలోనూ, కాలయాపన చేసే క్వారంటైన్ నియమాలను అధిగమించడంలోనూ ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది. కణజాల వర్ధనం ద్వారా అమూల్యమైన, అరుదైన వృక్షజీవ పదార్థాలను తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిలువచేయడం చాలా చౌకైన పద్ధతి, పైగా ఆచరణయోగ్యం కూడా. విడికణాల వర్ధనం ద్వారానూ, విభిన్న జాతులకు చెందిన జీవ పదార్థాల సంయోగం ద్వారానూ క్రొంగొత్త జాతుల ఆవిష్కరణ – వృక్ష జాతుల అభివృద్ధిలో ఒక కొత్త ఒరవడిగా భాసిల్లుతోంది.

కణజాల వర్ధన విధానం : తగిన యానకంలో, సూక్ష్మజీవరహిత పరిస్థితులలో మొక్క నుంచి ఎన్నుకున్న భాగాలను వర్ధనం చేస్తారు. కొన్ని కణాలను మొక్కల నుంచి తీసుకొన్నప్పుడు, వర్ధనంలో అవయవ విభేదనం లేని కాలస్ కణజాలం ఏర్పడుతుంది. దీనికి తగిన వృద్ధి కారకాలను జతచేస్తే అవయవ విభేదన ప్రేరేపించబడి, అవయావాలు ఏర్పడతాయి. ఇలా అనేక అలైంగిక పిండాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి స్వతంత్రమైన మొక్కలుగా ఎదుగుతాయి.

అలైంగిక పిండాలు ఫలదీకరణ ద్వారా ఏర్పడినవి కావు. ఇవి కృత్రిమ యానకం మీద ఏర్పడతాయి. నిజ పిండాలు ధృవ విభేదనం వల్ల ప్రధమమూలం, ప్రధమకాండం అన్న విభేదన చూపుతాయి. కాని అలైంగిక పిండాల ధృవ విభేదన ఉండదు.

కణజాల వర్ధనం ద్వారా ఏర్పడిన మొక్కలు నాజూకుగా, సున్నితంగా ఉంటాయి. వీటిపై అవభాసిన పొర ఉండదు. అందుచేత ఈ మొక్కలు జలాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేవు. వీటిని ప్రయోగశాల నుంచి సహజ వాతావరణ పరిస్థితులకు అలవాటు చేయడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. క్రమేపి ఆ పరిస్థితులను కలుగచేస్తేనే కణజాల వర్ధనం ద్వారా ఏర్పడ్డ మొక్కలు మనుగడ సాగిస్తాయి.

పరస్థానిక వర్ధనం (In Vitro Culture)

కృత్రిమయానకం మీద కణజాల వర్ధనం ద్వారా కొత్త మొక్కలను పెంచే సాంకేతిక పద్ధతులను "పరస్థానిక వర్ధనం అంటారు. పరస్థానిక వర్ధనంలో మూడు అంశాలు ముఖ్యమైనవి.

1. పోషక యానకం, 2. ఎసెప్టిక్ స్థితి, 3. వాయు ప్రసరణ

1. పోషక యానకం : కణజాలు స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారుచేసుకోలేవు. అందుచేత వీటికి పోషక పదార్థాలను కృత్రిమ యానకం ద్వారా అందచేస్తారు. ఈ పోషకయానకం అన్ని మొక్కలకు ఒకే విధంగా ఉండదు. ప్రతి మొక్కలోనూ కణజాల వర్ధనం కోసం తగిన పరిశీలనలు చేసి పోషక యానకాలను నిర్ణయించాలి. మొక్కల జాతి ననుసరించి పోషక అవసరాలు మారుతుంటాయి.

పోషక యానకంలో పిండిపదార్థం, ఐరన్, విటమిన్లు, అమైనో ఆమ్లాలు, నత్రజని మరియు వృద్ధి కారకాలైన ఆక్సిన్‌లు, సైటోకైనిన్‌లు వాడతారు. కొన్ని మొక్కల కణజాల వర్ధనంలో ప్రకృతి నుంచి లభ్యమయ్యే పోషకాలను కూడా వాడుతారు, అవి కొబ్బరిపాలు, ఈస్ట్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్, బంగాళాదుంపల ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ మొదలైనవి.

2. ఎసెప్టిక్ స్థితి : పోషక యానకంలో సమృద్ధిగా ఆహారం ఉంటుంది. కాబట్టి అనేక సూక్ష్మజీవులు దానిలో వృద్ధి చెందుతాయి. దీని ఫలితంగా ప్రయోగాలలో వర్ధనం చేసే కణాల అంగాల విచ్ఛిన్నం జరుగుతుంది. అందువల్ల సూక్ష్మజీవ రహిత స్థితిని కలుగజేయాలి. దీనినే ఎసెప్టిక్ స్థితి అంటారు.

3. వాయు ప్రసరణ : పరస్థానిక వర్ధనంలో కణజాలాలకు, అంగాలకు వాయు ప్రసరణ అవసరం. సూక్ష్మజీవ రహిత వాయు ప్రసరణ కోసం అన్ని ప్రయోగశాలల్లో, లామినార్‌ఫ్లో వాడటం పరిపాటి అయింది.

లాభాలు

- టిష్యు కల్చర్ మొక్కలు నూటికి నూరు శాతం తల్లి మొక్కలను పోలి ఉంటాయి.
- అంతరించిపోయినటువంటి నాణ్యమైన చెఱకు రకాలను మరలా ఉత్పత్తి చేయవచ్చును.
- టిష్యు కల్చర్ మొక్కలు వ్యాధిని తట్టుకోగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి మరియు మొలక శాతం చాలా అధికముగా ఉంటుంది.
- టిష్యు కల్చర్ మొక్కలు ఒకసారిగా పరిపక్వతకు వస్తాయి. అందువలన పంటను ఒక సారిగా కోసి అధిక లాభాలను పొందవచ్చును.

విత్తన వృద్ధి రేటు :

విత్తన తరగతి	నారు వాణిజ్య పద్ధతి	టిష్యూ కల్చర్ పద్ధతి
బ్రీడర్ విత్తనం	1	1
మూల విత్తనం	10	25
ధృవీకరించిన విత్తనం	100	250
వాణిజ్యపరమైన విత్తనం	1000	2500

- టిష్యు కల్చర్ మొక్కలు సంవత్సరం మొత్తము తయారు చేయవచ్చును. కావున రైతుకు ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందో అప్పుడు మొక్కలు సరఫరా చేయవచ్చును.
- విత్తన వృద్ధి రేటు సాంప్రదాయ పద్ధతి కంటే చాలా ఎక్కువ.

చెఱకు పంట సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (చెఱకు), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి - 531 001

ఫోన్ నెం. 08924-223203, సెల్ : 99896 25216

ప్రత్తి

మన రాష్ట్రంలో తెల్ల బంగారంగా భావించే ప్రత్తి ప్రధానమైన వాణిజ్య పంట. ప్రత్తి పంట సాగుకు నల్లరేగడి నేలలు అనువైనప్పటికిని, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని జిల్లాలలో ప్రత్తి పండిస్తున్నారు. అయితే, అధికశాతం విస్తీర్ణం కర్నూలు, నంద్యాల, గుంటూరు, పల్నాడు, ఎన్.టి.ఆర్., ప్రకాశం మరియు అనంతపురం జిల్లాలలో వున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2023-24 వ సంవత్సరంలో ప్రత్తి 4.2 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేయబడినది. మన రాష్ట్ర సగటు ఉత్పత్తి సుమారు 12 లక్షల బేళ్ళు (170 కిలోలు / బేలు) మరియు ఉత్పాదకత 461 కిలోల దూది / హెక్టారు. ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విద్యాలయము నుండి మన రాష్ట్రములోని ప్రత్తి పండించే ప్రాంతాలకు అనువైన వివిధ కాల పరిమితులలో, విశిష్ట లక్షణములు గల ఎన్నో మేలైన సాధారణ మరియు సంకరజాతి రకాలను విడుదల చేయడం జరిగింది.

ప్రత్తి రకాలు - లక్షణాలు : కాయతొలిచే పురుగుల ఉధృతి నేపధ్యంలో గత ఒకటిన్నర దశాబ్దాల నుండి రైతులు ఎక్కువగా బిటి సంకర రకాలనే ఆదరించడం జరుగుతోంది. కానీ, గత ఐదు, ఆరు సంవత్సరాలుగా, గులాబి రంగు పురుగు బిటి ప్రత్తి లోని విష పదార్థానికి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడంతో ఈ పురుగు ఉధృతి తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. పంట మార్పిడి లేకుండా, ఏళ్ళ తరబడి ఒకే పంటను వేయడంతో, వివిధ పోషక లోపాలను కూడా ప్రత్తి పంటలో గమనించడం జరుగుతోంది.

రకాలు	విడుదలైన సంవత్సరం	లక్షణాలు
దేశవాళి రకాలు		
యాగంటి (ఎన్.డి.ఎల్.ఎ. 2933)	2010	ఇది రాయలసీమలోని ముంగారీ, హింగారీ ప్రాంతములకు అనువైనది. ఇది 150 రోజుల కాలపరిమితి గల స్వల్ప కాలిక రకము. పింజ పొడవు 22 మి.మీ. వుండి 37 వరకు దూది శాతము వుంటుంది. 20వ నెంబరు నూలు వడకటానికి అనువైనది.
నంద్యాల కాటన్ 27	2023	పంట కాలము 150 రోజులు. హెక్టారుకు 17-19 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి నిస్తుంది. ప్రత్తిలో దూది శాతం 36.8. పచ్చదోమను మరియు బాక్టీరియా ఆకుమచ్చలను తట్టుకునే రకం. బెట్ట పరిస్థితులకు కూడా అనుకూలమైన రకం.
నంద్యాల కాటన్ 28	2023	పంట కాలము 150 రోజులు. హెక్టారుకు 17-18 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి నిస్తుంది. ప్రత్తిలో దూది శాతం 36.3. పచ్చదోమ, మజ్జిగ తెగులును మరియు బెట్టను కూడా తట్టుకొనగలిగిన రకం. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర మరియు గుజరాత్ రాష్ట్రాలకు అనుకూలమైన రకం.

అమెరికన్ రకాలు		
ఎల్.కె. 861	1993	తెల్లదోమను, నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొంటుంది. అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. 160–170 రోజులు పంటకాలము కలిగి హెక్టారుకు సుమారు 25–26 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినివ్వగలదు. ఈ రకము 29 మి.మీ. పింజ పొడవు కలిగి 34 శాతం దూదినిస్తుంది. 50వ నెంబరు వరకు నూలు వడకుటకు వీలుగా వుంటుంది. పచ్చదోమను తట్టుకొనలేదు. దీని పింజ గట్టిదనం బాగా ఉంటుంది.
ఎల్. 389	1993	160–170 రోజులు పంట కాలము. అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. హెక్టారుకు 25 నుండి 30 క్వింటాళ్ళ ప్రత్తి దిగుబడినిస్తుంది. ప్రత్తిలో దూది శాతము 35.5 మరియు పింజ పొడవు 29 మి.మీ. 50వ నెంబరు నూలు వరకు వడకవచ్చును. బ్లాక్ ఆర్మ్ (నల్లమచ్చ) తెగులును పూర్తిగా తట్టుకొనగలదు. తెల్లదోమ వున్న పరిస్థితులలో యం.సి.యు 5 కన్నా ఎక్కువ దిగుబడినిస్తుంది.
నరసింహ (ఎన్.ఎ. 1325)	1994	నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొంటుంది. అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. పచ్చదోమను కొంత వరకు తట్టుకొంటుంది. ఈ రకము ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా విశ్వ విద్యాలయం, నంద్యాల పరిశోధనా స్థానము నుండి విడుదల చేయబడినది. 160 రోజుల పంటకాలము కలిగి, హెక్టారుకు 25–28 క్వింటాళ్ళ వరకు దిగుబడినిస్తుంది. పింజపొడవు 26 మి.మీ. ప్రత్తిలో 36 శాతము దూది కలిగి, 40వ నెంబరు నూలు వడకవచ్చును.
లాం. 604	1997	అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. పంటకాలము 150–160 రోజులు. హెక్టారుకు 25 నుండి 30 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. ప్రత్తిలో దూది శాతము 36 మరియు పింజ పొడవు 27 మి.మీ. కలిగి 40వ నెంబరు నూలు వడకవచ్చును. పచ్చదోమను, నల్లమచ్చ తెగులును తట్టుకుంటుంది.
శివనంది (ఎన్.డి.ఎల్.హెచ్. 1755)	2009	ఇది 160–170 రోజుల కాలపరిమితి కలిగి, హెక్టారుకు 16 నుండి 17 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. 28–29 మి.మీ. పింజ పొడవుండి, 36 శాతం దూదినిస్తుంది. 50వ నెంబరు నూలు వడకవచ్చును.
ఎన్.డి.ఎల్.హెచ్. 1938 (శ్రీరామ)	2015	రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. దీని కాలపరిమితి 160–170 రోజులు. కాయ బరువు 4.0 నుండి 4.5 గ్రా. వుంటుంది. హెక్టారుకు 22–23 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. 28–30 మి.మీ. పొడవు కలిగి 38 శాతం వరకు దూదినిస్తుంది. 40–60 నెంబరు వరకు నూలు వడకటానికి వీలుగా వుంటుంది. పచ్చదోమను కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది.

ఎల్.హెచ్.డి.పి. ప్రత్తి - 1	2018	అధిక సాంద్రతలో విత్తుకోవడానికి అనుకూలంగా రూపొందించబడిన రకము. పంట చెట్టు చేయకుండా శాఖీయ కొమ్మలు లేకుండా ఉంటుంది. పంట కాలము 145-155 రోజులు, జిన్నింగ్ శాతము 38.6, గింజ పొడవు 28 మి.మీ. పచ్చదోమను, బాక్టీరియా ఎండు తెగులును మరియు బూజు తెగులును తట్టుకుంటుంది. హెక్టారుకు 25-26 క్వింటాళ్ళ ప్రత్తి దిగుబడి నిచ్చే రకము.
ఎన్.డి.ఎల్.హెచ్. 2051-1	2021	తక్కువ వర్షపాతము గల రాయలసీమ జిల్లాలకు అనువైన రకము. పంట కాలము 160 రోజులు కలిగి, హెక్టారుకు 25-26 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. గింజ పొడవు 28.1 మి.మీ. మరియు ప్రత్తిలో 36 శాతము దూది కలిగి ఉండి 50 వ నంబరు నూలును వడకవచ్చును.
ఎల్.హెచ్.డి.పి. ప్రత్తి-5	2022	అధిక సాంద్రతలో విత్తుకోవడానికి అనుకూలంగా రూపొందించిన సూటి రకం. పంట చెట్టు చేయకుండా, శాఖీయ కొమ్మలు లేకుండా ఉంటుంది. జిన్నింగ్ శాతము 37.6, పింజ పొడవు 27.5 మి.మీ., 140-150 రోజుల పంటకాలం కలిగి హెక్టారుకి 26-27 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. పచ్చ దోమ మరియు బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులును తట్టుకునే రకము.
నంద్యాల ప్రత్తి - 25 (ఎన్.డి.ఎల్.హెచ్. 2035-5)	2022	తక్కువ వర్షపాత ప్రాంతాలకు అనువైన రకము. పంట కాలం 160 రోజులు మరియు హెక్టారుకు 17-18 క్వింటాళ్ళ ప్రత్తి దిగుబడి నిచ్చే రకము. రసం పీల్చే పురుగులను మరియు బెట్టను తట్టుకుంటుంది.
నంద్యాల కాటన్ 26	2023	పంట కాలము 160 రోజులు. హెక్టారుకు 15-16 క్వింటాళ్ళ దిగుబడిని ఇచ్చే రకము. ప్రత్తిలో దూది శాతము 36.5. పచ్చదోమను మరియు బెట్టను తట్టుకుంటుంది.
సంకర రకాలు		
లాం కాటన్ హైబ్రిడ్ - 5 (ఎల్.ఎ.హెచ్.హెచ్. 5)	2002	అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. 35 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగి, 35 శాతము దూది నిస్తుంది. 29 మి.మీ. పింజ పొడవు కలిగి నల్లమచ్చ తెగులును తట్టుకుంటుంది.
లాం కాటన్ హైబ్రిడ్ - 7 (ఎల్.ఎ.హెచ్.హెచ్. 7)	2006	అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. 160-180 రోజులు పంట కాలము. 30-35 క్వింటాళ్ళ దిగుబడినిస్తుంది. 30-32 మి.మీ. పింజ పొడవు ఉంటుంది. పచ్చదోమ మరియు కొంతవరకు నల్లమచ్చ తెగులును తట్టుకుంటుంది.
ఎన్.డి.ఎల్.హెచ్.హెచ్. - 240	2006	అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. 160 రోజుల కాలపరిమితి కలిగిన సంకర రకం. హెక్టారుకు 27 నుండి 28 క్వింటాళ్ళ ప్రత్తి దిగుబడినిస్తుంది. పింజ పొడవు 29 నుండి 30 మి.మీ. వుండి 37 శాతము దూదినిస్తుంది. 40వ నెంబరు నూలు వడకవచ్చును.

ఎల్.ఎ.హెచ్.బి. ప్రత్తి - 1	2019	ఇది ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా విశ్వవిద్యాలయం నుండి రూపొందించబడిన మొట్టమొదటి అంతర జాతుల సంకర రకము. పంట కాలము 185-195 రోజులు. దిగుబడి 20-22 క్వింటాళ్ళు/హె. జిన్నింగ్ శాతము 30.1, పింజ పొడవు 37.1 మి.మీ., పింజ అధిక దృఢత్వము, నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది. పచ్చ దోమను కొంత వరకు తట్టుకుంటుంది.

విత్తనం - విత్తే పద్ధతి :

ప్రాంతం / రకం	విత్తే సమయం	విత్తన మోతాదు (కి/ఎకరాకు)	విత్తే దూరం (సెం.మీ.)		విత్తే పద్ధతి
			వరుసల మధ్య	మొక్కల మధ్య	
1	2	3	4	5	6
దేశవాళీ రకాలు					
ముంగారీ (రాయలసీమ)	మే ఆఖరి వారం నుండి జూన్ మొదటి వారం	4-5	60	22	గొర్రుతో విత్తాలి
హింగారీ (రాయలసీమ)	ఆగష్టు మధ్య నుండి సెప్టెంబరు మధ్య వరకు	4-5	60	22	గొర్రుతో విత్తాలి
అమెరికన్ రకాలు					
కోస్తా ప్రాంతం మరియు రాయలసీమ నల్ల నేలలు	జూన్ - ఆగష్టు	2.5-3.5	90-105	45-60	అచ్చుతోలి విత్తాలి.
కోస్తా ప్రాంతం మరియు రాయలసీమ ఎర్ర నేలలు	జూన్ మధ్యలో	3-4	75-90	30-45	అచ్చుతోలి విత్తాలి.
సంకర రకాలు					
కోస్తా ప్రాంతం మరియు రాయలసీమ నల్ల నేలలు	జులై - ఆగష్టు	0.9-1	105-120	45-60	అచ్చుతోలి విత్తాలి.
నీటి సదుపాయం గల ఎర్ర నేలలు	జూన్ మధ్య వరకు	1.5-1.75	90-105	30-45	అచ్చుతోలి విత్తాలి.

గమనిక : దేశవాళీ మరియు అమెరికన్ రకాలు పాదుకు 2 మొక్కలు, సంకర జాతి రకాలకు పాదుకు ఒక్క మొక్క చొప్పున ఉంచాలి. విత్తిన 10 రోజుల్లో ఖాళీలు ఉన్న చోట మరల విత్తాలి. విత్తిన 3 వారాలకు ఒత్తు మొక్కలను పీకి వేయాలి.

విత్తనశుద్ధి : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 9 మి.లీ. / కిలో విత్తనం + సూడోమోనాస్ ఫ్లోరోసెన్స్ 10 గ్రా./కిలో విత్తనం లేదా ట్రైకోడెర్మా విరిడె 8 గ్రా. / కిలో విత్తనం లేదా కార్బాక్సిన్ 75 డబ్ల్యూ.పి. 2 గ్రా. కిలో విత్తనానికి పట్టించి విత్తనశుద్ధి చేసుకోవాలి.

ఎరువులు యాజమాన్యం (ఎకరాకు కిలోల్లో) :

విత్తన రకం	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్
దేశవాళి రకాలు	8	8	–
అమెరికన్ రకాలు	24-36	18-24	18-24
బి.టి. సంకర రకాలు	48-60	24-30	24-30
వేసే పద్ధతి : అన్ని ప్రాంతాలకు సిఫారసు చేసిన భాస్వరం ఎరువును ఒకేసారి ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి. కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అమెరికన్ రకాలకు మరియు సంకరజాతి రకాలకు సిఫారసు చేసిన నత్రజని మరియు పొటాష్ ఎరువులను మూడు సమభాగాలుగా చేసి విత్తిన 30, 60, 90 రోజులకు మొక్క మొదళ్ళకు 7-10 సెం.మీ. దూరంలో పాదులు తీసి వేయాలి. రాయలసీమలోని అమెరికన్ రకాలు మరియు సంకర జాతి రకాలకు సిఫారసు చేసిన నత్రజనిని రెండు సమభాగాలుగా చేసి విత్తిన 30, 60 రోజులకు పై తెల్పిన విధంగా వేయాలి.			

నీటియాజమాన్యం : ప్రత్తి పైరు ఎక్కువ నీటిని తట్టుకోలేదు. కనుక నీరు ఎక్కువగా పెట్టరాదు. భూమిలో వున్న తేమను బట్టి 20-25 రోజులకోసారి నీరు పెట్టాలి. నీటి ఎద్దడికి కీలక దశలైన గూడ ఏర్పడే దశ, పూత దశ మరియు కాయ వృద్ధి చెందే దశల్లో నీరు పెట్టాలి. ఖరీఫ్‌లో 2-3 తడులు, రబీలో ఆరు తడులు అవసరం ఉంటుంది. నీరు కట్టి, రసాయన ఎరువులు వేసి పంట కాలంను 6 నెలలకు మించి పొడిగించరాదు. గులాబి రంగు పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉండటంతో రబీ / వేసవి పంటను వేయకపోవడమే మంచిది.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి : పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి. ఎకరాకు 1.3 నుండి 1.6 లీ. విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజున గాని పిచికారి చేయాలి.

విత్తిన 25-30 రోజులప్పుడు అంతరకృషి చేయడానికి అవకాశం లేనప్పుడు గడ్డి జాతి మొక్కల నివారణకు ఎకరాకు 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% ఇ.సి. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. వెడల్పాటి ఆకు కలుపు సమస్య ఎక్కువగా వున్నట్లైతే ఎకరాకు 250 మి.లీ. పైరిథయోబ్యాక్ సోడియం 10% ఇ.సి. ను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. ఖరీఫ్‌లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండి అంతరకృషి కుదరనప్పుడు ఎకరానికి ఒక లీటరు పెరాక్వాట్ 24% ఎస్.ఎల్. మందును 200 లీ. నీటిలో కలిపి ప్రత్తి పంట మీద పడకుండా వరుసల మధ్య కలుపు మీద మాత్రమే పడేటట్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

సూక్ష్మధాతు లోపాలు – సవరణ

మెగ్నీషియం : ముదురు ఆకులు, అంచుల నుండి మధ్య భాగానికి పసుపు రంగుకు మారి ఆకుల ఈనెలు మాత్రం పచ్చగా వుంటాయి. లోప తీవ్రత పెరిగినపుడు ఆకులు ఎర్రబారి ఎండిపోయి రాలిపోతాయి. సాధారణంగా ఈ లోపం పొటాషియం ఎక్కువగా ఉన్న నేలల్లో కనిపిస్తుంది. మెగ్నీషియం లోప నివారణకు లీటరు నీటికి 10 గ్రా. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్‌ను పంట విత్తిన 45 మరియు 75 రోజుల తరువాత 7–10 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి.

జింకు : ఈ ధాతు లోపం, మొక్కలో లేత మరియు మధ్య వయస్సు ఆకుల మీద కనిపిస్తుంది. ఆకుల ఈనెలు ఆకుపచ్చగా వుండి, ఈనెల మధ్య భాగం మాత్రమే పసుపుపచ్చగా మారుతుంది. కొమ్మ చివరి ఆకులు చిన్నవిగా వుండి ముడతలు పడి, కణుపుల మధ్య దూరం తగ్గుతుంది. జింకు లోపం వున్న నేలల్లో ఎకరాకు 20 కిలోల జింకు సల్ఫేట్‌ను ఆఖరు దుక్కిలో వేసుకోవాలి లేదా జింకు సల్ఫేట్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపిన ద్రావణాన్ని మొక్కల మీద లోప లక్షణాలు గమనించినప్పుడు 7–10 రోజుల వ్యవధితో 2 సార్లు పిచికారి చేయటం ద్వారా లోపాన్ని సవరించుకోవచ్చు.

బోరాన్ : ఈ సూక్ష్మ ధాతు లోపమున్నప్పుడు ఆకర్షక పత్రాలు లోపలకు కుచించుకుని ముడుచుకుపోయి పూల ఆకారం మారుతుంది. ఆకుల కాడలు ఒకే రీతిన వుండక కొంత లావుగాను, కొంత సన్నగాను వుండి ఆక్కడక్కడ నల్లటి వలయాలు ఏర్పడటంతో పాటు, ఆకుల మీద రాగి రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈ లోపం బాగా ఎక్కువగా వున్నప్పుడు పూత గూడ దశలో ఎండిపోవడం, చిన్న కాయలు రాలిపోవడంతో పాటు, మొక్కలు గిడసబారి ప్రధాన కాండంపై పగుళ్ళు కూడా ఏర్పడతాయి. కాయలు సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందక ఆకారం కోల్పోతాయి. ఒక్కోసారి పెరిగే దశలో కాయలపై నిలువుగా పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. బోరాన్ లోపం మన రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో గమనించడ మయినది. సున్నం ఎక్కువగానున్న నేలల్లోనూ, వర్షాభావం మరియు అధిక వర్షపాతం ఉన్న పరిస్థితులలో ఈ లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బోరాన్ లోప నివారణకు పైరు వేసిన 60 మరియు 90 రోజుల తరువాత లీటరు నీటికి 1–1.5 గ్రా. బోరాక్స్ ద్రావణాన్ని (సోడియం టెట్రాబోరేట్) వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి.

జీవన ప్రక్రియ సంబంధిత రుగ్మతలు :

పూత, పిందె రాలటం : ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మొక్కల జీవన ప్రక్రియలలో వచ్చే మార్పులు లేదా కాయ తొలుచు పురుగుల ద్వారా వాటిల్లే నష్టం వలన ప్రత్తిలో దాదాపు 60 నుండి 70 శాతం వరకు పూత, పిందె రాలటం జరుగుతుంది. ప్రతికూల పరిస్థితులలో పూత, పిందె రాలటాన్ని పోషక పదార్థాలు మరియు హార్మోన్ల పిచికారి ద్వారా కాని, సరైన నీటి యాజమాన్యం ద్వారా గాని కొంత వరకు అరికట్టవచ్చు. నాఫ్తలీన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ 10 పిపిఎమ్ ద్రావణాన్ని ఒకటి లేదా రెండుసార్లు, 10–15 రోజుల వ్యవధిలో అవసరాన్ని బట్టి పిచికారి చేయటం ద్వారా పూత, పిందె రాలటాన్ని కొంత వరకు నివారించవచ్చు.

అధికంగా రొట్ట పెరగడం : సాగునీటి వసతి వున్న పరిస్థితుల్లో అధిక వర్షాలతో పాటుగా నత్రజని ఎరువులు అధిక మోతాదులో వేయడం వలన, ఎక్కువగా గొడుగు కొమ్మలు మరియు కాయ కొమ్మలు ఏర్పడటం, మొక్కలో తయారయ్యే పిండి పదార్థంలో ఎక్కువ భాగం, ఈ కొమ్మల అభివృద్ధికే ఉపయోగపడి, పూత, పిందె, కాయలు రాలటం జరుగుతుంది. సైకోసెల్‌ను 60 పిపిఎమ్ మోతాదులో పిచికారి చేసినట్లయితే, మొక్కల్లో అదనపు శాఖీయ పెరుగుదల ఆగిపోయి, మొక్కలో తయారైన పిండి పదార్థాలు, పూత, పిందె అభివృద్ధికి ఉపయోగపడటంతో పూత, పిందె రాలటం తగ్గుతుంది.

పక్వానికి రాకముందే ఆకులు వడలి రాలిపోవడం : బి.టి. ప్రత్తి సాగులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రత్తి పంటలో ఆకులు పక్వానికి రాకముందే వడలిపోయి రాలిపోవడం ఎక్కువగా గమనించడమైనది. దీనిని విశ్లేషించినప్పుడు నేలలో పొటాష్ లభ్యత అధికంగా వున్నప్పటికిని, మొక్కలో పొటాషియం లోపం వలన ఆకులు పక్వానికి రాకముందే రాలినట్లుగా నిరూపించబడినది. దీనిని అధిగమించుటకు లీటరు నీటికి 20 గ్రా. పొటాషియం నైట్రేట్ ద్రావణాన్ని, ప్రత్తి పంట కాయ దశలో ఉన్నపుడు 4-5 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి.

బెట్ట లేదా నీటి ముంపునకు గురైనపుడు : బెట్ట లేదా నీటి ముంపునకు ప్రత్తి పొలం గురైనప్పుడు, పూత, పిందె, కాయలు రాలి పోవడం, ఆకులు వాడిపోవడం జరుగుతుంది. తగు యాజమాన్య చర్యలను సకాలంలో చేపట్టడం ద్వారా పూత, పిందె రాలటాన్ని అరికట్టవచ్చు. నీటి ముంపుకు గురైనపుడు, మురుగు నీటిని తీసివేయడంతో పాటుగా, ఎండ ఉన్న సమయంలో లీటరు నీటిలో పొటాషియం నైట్రేటు లేదా యూరియాలను 20 గ్రా. చొప్పున కలిపిన ద్రావణాన్ని మార్చి మార్చి పిచికారి చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంది.

పండాకు తెగులు : ప్రత్తిలో ఆకులు ఎర్రబడటాన్ని పండాకు తెగులు లేదా ఎర్రాకు తెగులు అంటారు. మొదట, ఈ సమస్య ముదురు ఆకులలో కనపడి, ఆ తరువాత లేత ఆకులకు కూడా వ్యాపిస్తుంది. ఈ సమస్య విత్తన రకం, పండించే ప్రాంతం వాతావరణంలో మార్పులు, నత్రజని సరఫరాలపైన లేదా వీటన్నింటి మధ్య జరిగే పరస్పర చర్య ప్రతిచర్యలపై ఆధారపడి రావచ్చు. మొదట ఆకులు ముదురు గులాబిరంగుకు మారి ఆ తరువాత పూర్తిగా ఎర్రబారి, ఎండిపోయి రాలిపోతాయి. పండాకు తెగులు పంట తొలిదశలో వచ్చినట్లయితే నష్టం అధికంగా వుంటుంది. చివరి దశలో వచ్చినపుడు కలిగే నష్టం పరిమితంగా వుంటుంది.

ప్రత్తి అధికంగా కాపు వున్న సమయంలో పోషక పదార్థముల ఆవశ్యకత ఎక్కువగా ఉండటం, అదే సమయంలో మొక్క వివిధ వాతావరణ ఒత్తిడులకు లోనవ్వడం వలన ఈ పండాకు తెగులు ఎక్కువగా కనపడడం జరుగుతుంది.

కారణాలు :

1. మొక్కలలో నత్రజని, పొటాషియం మరియు భాస్వరం పోషక పదార్థాల లోపం ఏర్పడటం
2. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21^0 సెం. కంటే తగ్గిపోవటం
3. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడటం (అధిక తేమ లేదా బెట్ట)
4. గాలి వేగం అధికంగా వుండటం

నివారణ : పండాకు తెగులు నివారణకు లీటరు నీటికి 10 గ్రా. మెగ్నీషియం సల్ఫేటుతో పాటుగా, 20 గ్రా. యూరియా లేదా 10 గ్రా. డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ కలిపి 5–7 రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేయాలి.
గమనిక : సాధ్యమయినంత వరకు పోషక పదార్థాలు మరియు హార్మోన్ల పిచికారిలో మంచి నీటిని ఉపయోగిస్తూ, సాయంత్రం సూర్యరశ్మి అధికంగా లేని సమయంలో పిచికారీ చేసినట్లయితే మొక్కలు వాటిని బాగా గ్రహిస్తాయి. నీటి ముంపునకు గురైన ప్రత్తి పొలాలమీద పోషకపదార్థ పిచికారీ మధ్యాహ్న వేళల్లో మాత్రమే చేయాలి.

సస్య రక్షణ

పురుగులు :

సాధారణంగా ప్రత్తి విత్తిన 50–60 రోజుల వరకు రసం పీల్చే పురుగులైన పేనుబంక, పచ్చదోమ, తామర పురుగులు ఆశించేవి. కాని మారిన సాగు పద్ధతులు మరియు వాతావరణ పరిస్థితులు వలన పేనుబంక మరియు పచ్చదోమ దాదాపు పంట చివరి కాలం వరకు ఆశించి నష్టపరుస్తున్నాయి. అలాగే పైరు గూడ, పూత, పిందె మరియు కాయ మీద పొగాకు లద్దెపురుగు ఆశించి ఎక్కువ నష్టం కలుగజేస్తుంది.

రసం పీల్చేపురుగులు (ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి) : పేనుబంక ఆశించిన మొక్కలు 10–20 శాతం, పచ్చదోమలు ఆకుకు 2, తెల్లదోమ తల్లి పురుగులు ఆకుకు 6, పిల్ల పురుగులు 20, తామర పురుగు తల్లి పురుగులు ఆకుకు 10 ఉన్న యెడల ఆయా పురుగుల వలన పంటకు నష్ట పరిమితి స్థాయి కలిగించే దశకు చేరుకుంటాయి.

రసం పీల్చే పురుగుల యాజమాన్యం : పచ్చదోమను తట్టుకొనే రకాలను సాగుచేయాలి. కిలో విత్తనానికి 9.0 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 యఫ్.యస్. లేదా 5.0 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ 70 డబ్ల్యూ.యస్. తో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తితే 30 రోజుల వరకు రసంపీల్చే పురుగులను నివారించవచ్చు. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 200 యస్.యల్ మరియు నీరు 1:20 (60 రోజులప్పుడు) నిష్పత్తిలో (పురుగు నష్ట పరిమాణం దృష్టిలో వుంచుకొని) మొక్క లేత కాండానికి బ్రష్‌తో పూస్తే రసం పీల్చే పురుగులను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఈ పద్ధతి వలన పురుగు మందు ఖర్చు తగ్గటమే కాక వాతావరణ కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. చివరగా అవసరాన్ని బట్టి లీటరు నీటికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 యస్.యల్ 0.4 మి.లీ. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 20 ఎస్.పి. 0.2 గ్రా. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 25 డబ్ల్యు.జి. 0.2 గ్రా. లేదా ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.పి. 1.5 గ్రా. లేదా 5% వేపగింజల కషాయం లేదా ఫిప్రోనిల్ 5 ఎస్.సి. 2.0 మి.లీ. లేదా డైఫెన్‌థియురాన్ 50 డబ్ల్యూ.పి. 1.25 గ్రా. లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబ్ల్యూ.జి. 0.3 గ్రా. మోతాదులో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ప్రత్యేక సూచనలు :

- ఇమిడాక్లోప్రిడ్‌తో విత్తనశుద్ధి చేసిన విత్తనాలను విత్తటానికి ముందు నీళ్ళలో నానబెట్టరాదు.
- రసంపీల్చే పురుగుల నివారణకు తొలిదశలో ఎక్కువసార్లు పురుగు మందులు పిచికారి చేయరాదు.
- తెల్లదోమ ఉధృతి ఎక్కువగా వుంటే పసుపు రంగు జిగురు అట్టలను ఉంచితే తెల్లదోమలు ఆకర్షించబడి జిగురుకు అంటుకుంటాయి.

- తెల్లదోమ ఆశించినప్పుడు పైరిత్రాయిడ్ మందుల వాడకాన్ని వెంటనే నిలిపి వేయాలి.
- తెల్లదోమను అదుపులో వుంచటానికి లీటరు నీటికి 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.సి. లేదా 2 మి.లీ. ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి. లేదా 1.25 గ్రా. డైఫెన్‌థియురాన్ 50 డబ్ల్యూ.జి. లేదా 5 మి.లీ. వేపనూనె లేదా 5% వేపగింజల కషాయం కలిపి ఆకుల అడుగు భాగాన పడేటట్లు పిచికారి చెయ్యాలి.
- డైఫెన్‌థియురాన్ పచ్చదోమ మరియు తెల్లదోమను అదుపు చేస్తుంది.
- ఎర్రనల్లిని ఆదుపులో ఉంచడానికి లీటరు నీటికి 3 గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకం 80 డబ్ల్యూ.పి. కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- మొదటి 60 రోజుల వరకు నియోనికోటినాయిడ్ తరగతికి చెందిన మందులైనటువంటి ఇమిడాక్లోప్రిడ్, ఎసిటామిప్రిడ్ లేదా థయోమిథాక్సామ్ మందులను పంటపై పిచికారి చేయకూడదు.
- ఒకే పురుగు మందును కాకుండా పురుగు మందులను మార్చి వాడుకోవాలి.

పిండినల్లి : ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్నటువంటి బిటి ప్రత్తిని పిండినల్లి ఆశించి నష్టం కలుగచేస్తున్నది. ప్రత్తి పంట నాశించే పిండి పురుగు యొక్క తల్లి, పిల్ల పురుగులు, కొమ్మలు, కాండం, మొగ్గలు, పువ్వులు మరియు కాయలనుండి రసాన్ని పీలుస్తాయి. ఈ పురుగు ఆశించిన మొక్కలు ఎదగక గిడసబారి పోతాయి. కణుపుల మధ్య దూరం తగ్గిపోయి ఆకులు గుబురుగా కనిపిస్తాయి. పురుగు ఆశించిన మొక్కలు చిన్న చిన్న కాయలను తక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాయ పక్వానికి రాకుండా పగిలిపోయి దిగుబడులు తగ్గుతాయి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే మొక్కలు పూర్తిగా చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

పిండినల్లి ముఖ్యంగా కాలువగట్లు, పనికిరాని భూములలో ఉండే కలుపు మొక్కల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ పురుగు ప్రత్తి కట్టెలను తీసిన తరువాత పంటలేనప్పుడు ఇతర కలుపు మొక్కలకు వ్యాపిస్తుంది. అంతేకాకుండా పురుగు సహజంగా గాలి, పక్షులు, పశువుల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ పురుగు ఆశించిన ప్రాంతం నుండి ఆశించని ప్రాంతానికి మనుష్యులు సంచరించటం ద్వారా సహజంగా వ్యాపిస్తుంది.

నివారణ చర్యలు :

1. కలుపు మొక్కలు ముఖ్యంగా, వయ్యారిభామ, తుత్తర బెండ మరియు పాయలాకు లాంటి వాటిని పీకి తగుల బెట్టాలి.
2. ప్రత్తి తీసిన తరువాత మోడులను పీకి తగుల బెట్టాలి.
3. ప్రత్తిని కార్శిపంటగా సాగుచేయకూడదు.
4. తొలిదశలో ఆశించే పిండినల్లిని ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు నీరు 1:20 నిష్పత్తిలో కలిపిన ద్రావణాన్ని 60 రోజులప్పుడు మొక్క లేత కాండానికి బ్రష్ ద్వారా పూయడం వలన పిండి పురుగును సమర్ధవంతంగా అరికట్టుకోవచ్చును.
5. పురుగు ఉధృతిని బట్టి ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి 3.0 మి.లీ లేదా ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.పి. 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయవలెను.

6. పురుగు ఎక్కువగా ఆశించి ఎండిపోయిన మొక్కలను పీకి తగులబెట్టాలి.

7. మందులను పిచికారి చేసేటప్పుడు ఒక లీటరు మందు నీటికి 0.5 గ్రా. సర్ఫ్ కలిపి వాడాలి.

గమనిక : ఈ పురుగు మొదట పంటలో అక్కడక్కడ ఆశించి, తరువాత ఎక్కువ మొక్కలకు వ్యాపిస్తాయి. ఈ దశలో సస్యరక్షణ చర్యలను చేపట్టి పొలం అంతా వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తపడాలి. పురుగు ఆశించిన మొక్కలను గమనించినప్పుడు అక్కడే పిచికారి చేస్తే సరిపోతుంది.

కాయతొలుచు పురుగులు (ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి) : 10 శాతం పూతకు నష్టం వాటిల్లినప్పుడు, మొక్కకు ఒక పచ్చపురుగు గ్రుడ్డు లేదా లార్వా వున్నప్పుడు, 10 మొక్కలకు ఒక లద్దె పురుగు గుడ్ల సముదాయం గమనించినప్పుడు, 10 శాతం గులాబి రంగు పురుగు ఆశించిన గుడ్డి పూలు గుర్తించినప్పుడు కాయతొలిచే పురుగుల వలన పంటకు నష్టం అధికంగా వుంటుంది.

కాయతొలుచు పురుగుల సమగ్ర సస్యరక్షణ :

- పంట మార్పిడి పద్ధతి అవలంబించాలి.
- వేసవి దుక్కులు లోతుగా దున్నాలి.
- 25 శాతం సేంద్రియ ఎరువులు, 75 శాతం రసాయన ఎరువులు వాడాలి.
- బొబ్బర (అలసంద), కొర్ర, సోయాచిక్కుడు, పెసర, మినుము, గోరుచిక్కుడు 1:2 నిష్పత్తిలో అంతర పంటలుగా వేయాలి. చేను చుట్టూ నాలుగు వరుసల జొన్న లేక మొక్కజొన్న కంచె పంటగా వేయాలి.
- లద్దెపురుగును ఆకర్షించటానికి ఎకరాకు 50 ఆముదపు మొక్కలు చేనులో అక్కడక్కడ నాటుకొని, ఆముదపు మొక్కలపై పెట్టిన లద్దెపురుగు గుడ్లను, జల్లెడ ఆకులను ఏరి నాశనం చేయాలి.
- శనగపచ్చ పురుగును ఆకర్షించటానికి ఎకరాకు 100 పసుపురంగు పూలు పూచే బంతి మొక్కలు పెట్టి మొగ్గలు, పూలలో వున్న పురుగులను ఏరివేయాలి.
- శనగపచ్చ పురుగు, లద్దెపురుగుల ఉనికిని, ఉధృతిని అంచనా వేయటానికి ఎకరాకు 4 లింగాకర్షణ బుట్టలు పెట్టాలి. ప్రతి బుట్టలో మూడు రోజులు వరుసగా రోజుకు గులాబి రంగు పురుగులు 8, శనగపచ్చ పురుగులు 10, పొగాకు లద్దె పురుగులు 20, మచ్చల పురుగులు 15 చొప్పున పడిన యెడల సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- విత్తిన 80-100 రోజుల మధ్యకాలంలో మొక్కల తలలు త్రుంచాలి.
- పురుగు గుడ్లను, మొదటి దశ పిల్ల పురుగులను, నివారించటానికి 5 శాతం వేప గింజల ద్రావణాన్ని (10 కిలోల వేపగింజల పొడి 200 లీటర్ల నీళ్ళలో 24 గంటలు నానబెట్టి వడపోసిన ద్రావణం) పిచికారి చేసుకోవాలి.
- పురుగులను తినే పక్షులు వాలటానికి వీలుగా 'టి' ఆకారపు కర్రలను లేక పంగల కర్రలను ఎకరాకు సుమారు 15-20 పెట్టాలి.

- పురుగుల నష్ట పరిమాణం దృష్టిలో ఉంచుకొని లీటరు నీటికి క్వినాల్‌ఫాస్ 25 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 75 ఎస్.పి. 1.5 గ్రా. చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. పచ్చ పురుగు గుడ్లు ఎక్కువగా వుంటే ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి. 2 మి.లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఒకే పురుగు మందును ఎక్కువసార్లు పిచికారి చేయకుండా మందులు మార్చి మార్చి వాడుకోవాలి.
- పచ్చ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మూడవ దశ దాటిన పచ్చపురుగును చేతితో ఏరివేయాలి. పురుగు నివారణకు లీటరు నీటికి ఇండాక్సీకార్బ్ 15.8 ఇ.సి. 1 మి.లీ. లేదా స్పైనోసాడ్ 45 ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.జి. 0.5 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 48 ఎస్.సి. 0.2 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5 ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- పొగాకు లద్దెపురుగును నియంత్రించుటకు సమగ్ర సస్యరక్షణ పాటిస్తూ, ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లీటరు నీటికి నొవాల్యూరాన్ 10 ఇ.సి. 1 మి.లీ. లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.జి. 0.5 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండియమైడ్ 48 ఎస్.సి. 0.2 మి.లీ. లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 ఎస్.సి. 0.3 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి. మూడవ దశ దాటిన లద్దెపురుగును అదుపుచేయటానికి విషపు ఎరను వాడాలి (ఎకరానికి 10 కిలోల తవుడు మరియు 2 కిలోల బెల్లంతో పాటు 750 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ జోడించి ఈ మిశ్రమానికి తగినన్ని నీళ్ళు కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని సాయంత్రం సమయంలో పొలమంతా వెదజల్లాలి).

గులాబి రంగు కాయతొలచు పురుగు సమగ్ర యాజమాన్యం

ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయిని గుర్తించే విధానం :

- గులాబి రంగు పురుగు ఉనికిని గుర్తించడానికి పంటపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలి.
- పొలంలో అక్కడక్కడా 50 పువ్వులను గమనించినప్పుడు వాటిలో 5 గుడ్డి పూలు ఉన్నట్లయితే లేదా పొలంలో అక్కడక్కడ ఒక మొక్కకు ఒక కాయ చొప్పున 20 కాయలను సేకరించి కోసి చూసినప్పుడు, 20 కాయలకు రెండు గొంగళి పురుగులను గమనించినట్లయితే, నష్టపరిమితి స్థాయిగా నిర్ధారించుకొని సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టవలసి ఉంటుది.

పురుగు ఉనికిని నిర్ధారించే లక్షణాలు :

- గుడ్డి పూలు
- కాయ పై భాగంలో పురుగు బయటకు వచ్చే గుండ్రటి చిన్న రంధ్రం మరియు కాయ తొనల మధ్య గోడలపై గుండ్రటి రంధ్రం
- గుడ్డి ప్రత్తి మరియు రంగు మారిన ప్రత్తి

సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు :

సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించి గులాబి రంగు పురుగును సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చును.

ప్రధానంగా పంట తీసిన తర్వాత, పంటలేని సమయాన, విత్తడానికి ముందు మరియు పంటకాలంలో వివిధ చర్యలు చేపట్టాలి.

పంట తీసిన తర్వాత చేపట్టవలసిన పద్ధతులు :

- ప్రధాన ప్రత్తి పంట పూర్తైన వెంటనే పంట విరామ సమయాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి.
- నీటి వసతి ఉన్నప్పటికీ, ప్రత్తిని ఆరు నెలలకు మించి పొడిగించకుండా తీసివేయాలి. పంటకాలము పొడిగించుట ద్వారా రాబోయేపంటలో పురుగు ఉధృతి పంట తొలి దశలోనే ఎక్కువయ్యే అవకాశముంటుంది.
- ప్రత్తి తీతల తర్వాత చేనులో గొర్రెలు, మేకలు మరియు పశువులను మేపాలి.
- ప్రత్తి మోళ్ళను ట్రాక్టరు రోటావేటరుతో భూమిలో కలియదున్నాలి.
- నీటి వసతి ఉన్నచోట రెండో పంటగా ఇతర ఆరుతడి పంటల్ని సాగుచేసుకోవాలి.
- ప్రత్తి తీసిన తర్వాత ఎండిన మోళ్ళను, విచ్చుకోని కాయలను భూమిలో కలియ దున్నుట ద్వారా పురుగు కోశస్థదశలను నాశనం చేయవచ్చును.
- గులాబి రంగు పురుగు ఆశించిన ప్రత్తిని రైతుల ఇళ్ళ వద్ద గాని లేదా జిన్నింగ్ మిల్లుల వద్దగాని నిల్వ ఉంచకూడదు.
- ప్రత్తి మిల్లులలో ప్రత్తి జిన్నింగ్ అయిన తర్వాత వచ్చే గుడ్డి ప్రత్తి మరియు పురుగు ఆశించిన దూది విత్తనాలను నాశనము చేయాలి. లింగాకర్షణ బుట్టలను ప్రత్తి జిన్నింగ్ మిల్లులలో అమర్చడం ద్వారా మగ పురుగులను ఆకర్షించి తదుపరి సంతతిని నివారించవచ్చు.
- గులాబి రంగు పురుగు అధికముగా ఆశించిన ప్రాంతాల నుండి ప్రత్తిని లేదా విత్తనాన్ని వినియోగించడం కోసం తరలించరాదు.

పంటలేని సమయాన చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు :

- ఎండాకాలంలో లోతు దుక్కులు చేసుకొనుట ద్వారా పురుగు యొక్క కోశస్థదశలను సమర్థవంతంగా నాశనం చేయవచ్చును.
- ఒకే ప్రాంతములో బి.టి. ప్రత్తిని పండించే రైతులందరూ సామూహికంగా లింగార్షక బుట్టలను అమర్చి మగ పురుగులను ఆకర్షించడం ద్వారా పురుగు యొక్క మొదటి తరాలను తద్వారా పంటకాలంలోని పురుగు యొక్క ఉనికిని తొందరగా రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
- ప్రత్తి మోళ్ళను పొలము లేక ఇళ్ళ వద్ద వంట చెఱకుగా వాడేందుకు నిల్వ చేయరాదు.
- ఒక ప్రాంతములో ప్రత్తిని దఫదఫాలుగా కాకుండా ఒకే సమయంలో విత్తడం వలన పురుగు ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు.

ప్రత్తి విత్తడానికి ముందు మరియు పంటకాలంలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు :

- పంట మార్పిడి పద్ధతిని రెండు – మూడు సంవత్సరాలకొకసారి విధిగా పాటించాలి.
- తక్కువ కాల పరిమితి గల రకాలను ఎంపికచేసుకొని సకాలంలో విత్తుకోవటం ద్వారా గులాబి రంగు పురుగు ఉధృతిని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చును.
- ప్రత్తి పొలంలో మరియు చేను చుట్టూ తుత్తురు బెండ, ఉమ్మెత్త లాంటి ఆతిథ్య మిచ్చే కలుపు మొక్కలు లేకుండా చేయడం మరియు ప్రత్తి పంట దగ్గరలో బెండ పంట లేకుండా చూసుకోవాలి.
- పంటకు సంబంధించి సకాలంలో సమగ్రవంతమైన యాజమాన్య పద్ధతులు ముఖ్యంగా సేంద్రియ ఎరువులు మరియు నత్రజని ఎరువుల సమతుల్యత పాటించి ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు.
- ప్రత్తి పంట విత్తిన 45 రోజుల నుండి గులాబి రంగు పురుగు ఉనికిని గమనించడానికి ఎకరానికి 4 లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి, వరుసగా బుట్టలలో మూడురోజులు, రోజుకు 8 రెక్కల పురుగులను పడటం గమనించినట్లయితే వెంటనే సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- గులాబి రంగు పురుగు ఆశించిన గుడ్డిపూలు, రాలిన పూత మరియు పిందెలను పంటకాలములో గమనించినట్లయితే వెంటనే సేకరించి సమూలంగా నాశనం చేయాలి.
- ట్రైకోగ్రామా పరాన్నజీవులను ఒక ఎకరానికి 60,000 చొప్పున మూడు విడతలుగా, వారం రోజుల వ్యవధిలో పూత పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు విడుదల చేయడం వలన గుడ్ల దశలోనున్న పురుగును నివారించవచ్చు.
- గులాబి రంగు పురుగు ఉధృతి ఆర్థిక నష్టపరిమితిస్థాయి దాటిన వెంటనే నివారణకు ఈ క్రింది రసాయనిక మందులను పిచికారి చేసుకోవాలి.
- క్వినాల్‌ఫాస్ 25 ఇ.సి. 2.0 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 20 ఇ.సి. 2.5 మి.లీ. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 50 ఇ.సి. 2 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
- పంట ఆఖరిదశ కాలంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు మాత్రమే సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులైన సైపర్‌మెత్రిన్ 25 ఇ.సి. 1.0 మి.లీ లేదా లామ్డాసైహలోత్రిన్ 5.0 ఇ.సి. 1.0 మి.లీ. లేదా బైఫెన్‌త్రిన్ 10 ఇ.సి. 1.6 మి.లీ. చొప్పున ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవచ్చు.

గమనిక : సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులు ప్రత్తి పంటపై ఎక్కువ సార్లు పిచికారి చేయరాదు. చేసినట్లయితే రసం పీల్చే పురుగులైన పేనుబంక మరియు తెల్లదోమ యొక్క ఉధృతి పెరిగే అవకాశమున్నది.

ప్రత్యేక సూచనలు

- మొక్క లేత ఆకులు మరియు మొగ్గలపైన పెట్టే పచ్చపురుగు గుడ్లను గుర్తించి నాశనం చేయాలి.
- మూడవ దశ దాటిన పచ్చపురుగు మీద పురుగు మందులు ఆశించినంత సమర్థవంతంగా పని చెయ్యవు కాబట్టి చేతితో ఏరివేసి సస్యరక్షణ చేపట్టాలి.

- పచ్చపురుగు మరియు తెల్లదోమ ఆశించినప్పుడు సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులు పిచికారి చేయరాదు.
- మందు ద్రావణాన్ని సిఫారసు చేసిన మోతాదులో సిఫార్సు చేసిన సస్యరక్షణ పరికరాలతో సరియైన పద్ధతిలో పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

వేరుకుళ్ళు తెగుళ్ళు : భూమిలో తేమ అధికంగా వున్నప్పుడు ఈ తెగులు పైరు అన్ని దశల్లో కనబడుతుంది. లేత మొక్కలు అర్ధాంతరంగా ఎండిపోయి చనిపోతాయి. వడలిపోయిన ఆకులు చాలా కాలం వరకు చెట్టుపై నుండి క్రిందకి వ్రేలాడుతూ వుంటాయి. కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. ట్రైకోడెర్మాతో విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. రెండు కిలోల ట్రైకోడెర్మా పొడిని 90 కిలోల పశువుల ఎరువు మరియు 10 కిలోల వేప పిండితో కలిపి ట్రైకోడెర్మా వృద్ధి అయిన మిశ్రమాన్ని ఆఖరి దుక్కిలో మరియు అవసరాన్ని బట్టి పైపాటుగా వేయాలి. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపిన ద్రావణాన్ని తెగులు సోకిన మొక్కల పాదుల చుట్టూ వేరు మండలము తడిచేలా పోయాలి.

వడలు తెగులు

ఫ్యుజేరియం వడలు తెగులు : వడలు లక్షణాలు ఏ దశలోనైనా కన్పించవచ్చు. మొలక దశలో ఆశించినపుడు నానుడు తెగులు లక్షణాలు కన్పిస్తాయి. ఎదిగిన మొక్కలలో పుష్పించే దశలో ఈ తెగులు ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకులు వాడిపోయి మొదట ఈనెల మధ్య పసుపు రంగుగా, తదుపరి ఎర్రగా మారి ఆకుల క్రింది నుండి పైకి ఎండుకుంటూ రాలిపోతాయి. కొమ్మలను చీల్చి చూస్తే లోపల నల్లని బూజుతో కూడిన గోధుమ రంగు చారలుగా కన్పిస్తాయి.

వర్టిసీలియం వడలు తెగులు : ఈనెల మధ్య భాగము పసుపు రంగుకు మారి, తెగులు తీవ్రమైనపుడు కణజాలం చనిపోయి పెద్ద పెద్ద నల్లని మచ్చలు ఏర్పడి ఆకులపై పులి చారల వలె కన్పిస్తాయి. ఆకులు కొంత కాలం వేలాడి, పూర్తిగా రాలాక క్రింద భాగంలో వున్న మొగ్గలు క్రొత్త ఆకులను, కొమ్మలనిస్తాయి, కాని కాయలు ఏర్పడవు. కాండము మరియు వేరును చీల్చి చూస్తే లోపలి కణజాలం గోధుమ రంగుకు మారి ఉంటుంది. వేరుకుళ్ళు తెగులు నివారణకు సూచించిన చర్యలను పాటించాలి. సిఫార్సు మేరకు పొటాష్ ఎరువులను తప్పక వాడాలి.

కోణాకార ఆకుమచ్చ / నల్ల కొమ్మ ఎండు తెగులు / బాక్టీరియా ఆకుమాడు తెగులు : ముందుగా ఆకులపై కోణాకారంలో నూనె రంగు మచ్చలు ఏర్పడి తర్వాత నల్లగా మారి మూడవ దశలో ఆకుల ఈనెల ద్వారా తెగులు వ్యాపించి నల్లగా మారుతాయి. తెగులు ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు కొమ్మలకు కూడా వ్యాపించి కొమ్మలు నల్లగా మారి ఎండిపోతాయి. దీనినే బ్లాక్ ఆర్మ్ అని పిలుస్తారు. పైరు వివిధ దశల్లో ఈ తెగులు కనిపిస్తుంది. వర్షాకాలంలో మబ్బులు పట్టినపుడు ఈ తెగులు బాగా వ్యాపిస్తుంది. కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. సూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్‌తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. ఉధృతిని బట్టి 3-4 పర్యాయాలు 15 రోజుల వ్యవధితో 10 లీటర్ల నీటికి కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 30 గ్రాముల చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళు : ఆల్టర్నేరియా వలన ఆకుల మీద గోధుమ రంగు మచ్చలు వలయాకారపు సుడులుగా, రింగులుగా ఏర్పడతాయి. సెర్కోస్పొరా వలన ఆకుల మీద ముదురు గోధుమ రంగులో గుండ్రని మచ్చలు ఏర్పడి చుట్టూ ఎరుపు వర్ణం కల్గి మధ్యభాగం తెల్లగా వుంటుంది. హెల్మింతోస్పోరియమ్ వలన ఆకుల మీద తేలికపాటి గోధుమ రంగు గుండ్రని మచ్చలు ఏర్పడి మధ్యభాగం బూడిదరంగుతో చుట్టూ ఎర్రటి అంచులు ఏర్పడతాయి. కొర్నోస్పొరా ఆకుమచ్చలు లేత పసుపు / ఆకుపచ్చ అంచులు కలిగి మచ్చ మధ్య భాగం చిన్న గుంటలుగా కన్పిస్తాయి. ఈ తెగుళ్ళ నివారణకు సూడోమోనాస్ కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. లేదా కార్బాక్సిన్ + థైరమ్ 4.5 గ్రా. కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి నాటాలి. లీటరు నీటికి కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1 మి.లీ. లేదా కాప్టాన్ + హెక్సాకొనజోల్ 1 గ్రా. లేదా ప్రోపినెబ్ 2.5–3.0 గ్రా. లేదా క్రిసాక్సిమ్ మిథైల్ 1 మి.లీ. 2–3 పర్యాయాలు 15 రోజుల వ్యవధితో పిచికారి చేయాలి.

బూజు (గ్రే మిల్డ్యూ) తెగులు : ఆకుల అడుగు భాగం (అభిక్షేపణం) మీద కోణాకారపు తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి, బూజు తెగులు శిలీంధ్ర బీజాలు ఆకుల అడుగుభాగాన ఏర్పడతాయి. ఉధృతిని బట్టి ఆకు పైభాగాన కూడా వ్యాపించి ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి పండు బారి రాలిపోతాయి. నివారణకు నీటిలో కరిగే గంధకం 3 గ్రా. లేదా క్రిసాక్సిమ్ మిథైల్ 1 మి.లీ. లేదా అజాక్సీస్ట్రోబిన్ + డైఫెన్‌కొనజోల్ మిశ్రమం 1.0 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

తుప్పు తెగులు : తుప్పు తెగులు ఎక్కువగా కాయ పక్వ దశలో ఆశిస్తుంది. ముదురు ఆకుల భాగాన తుప్పు మచ్చలు ఏర్పడి క్రమంగా లేత ఆకులకు వ్యాపిస్తాయి. తెగులు ఉధృతి పెరిగే కొద్దీ ఆకుల పైభాగాన ఈ తుప్పు మచ్చలు గుంటలు ఏర్పడినట్లుగా కన్పిస్తాయి. నవంబరు – ఫిబ్రవరి మాసాల్లో ఈ తెగులు ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. అధిక తేమ వుండి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ తెగులు నివారణకు 3 గ్రా. సల్ఫెక్సు లేదా 1 మి.లీ. ప్రొపికొనజోల్ లీటరు నీటికి కలిపి 10–15 రోజుల వ్యవధితో 3–4 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

కాయకుళ్ళు తెగులు : ప్రత్తి పంట కాయదశలో ఉన్నప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువగా పడితే అనేక రకాలైన శిలీంధ్రాలు ఆశించి కాయలు కుళ్ళి పోతాయి. ఈ శిలీంధ్రాలు ఎక్కువగా కాయతొలుచు పురుగుల వల్ల ఏర్పడిన రంధ్రాల ద్వారా కాయలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. నివారణకు సాధారణంగా వాడే పురుగు మందులతో పాటు కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్‌ను 3 గ్రా./లీ. మోతాదులో కలిపి 10 రోజుల వ్యవధితో పిచికారి చేయాలి.

టొబాకో స్ట్రీక్ వైరస్ తెగులు : ఈ వైరస్ తెగులు తామర పురుగుల ద్వారా ప్రత్తిని ఆశిస్తుంది. వైరస్ సోకిన మొక్కల్లో కొమ్మల చివరి ఆకులు కొద్దిగా పసుపు వర్ణానికి మారి చిన్నవిగా ఉంటాయి. కొంత భాగం ఆకులు మాడిపోతాయి. కొత్త చిగురు, పూత ఏర్పడదు. వయ్యారిభామ, గడ్డి చేమంతి, ఉత్తరేణి మొదలగు కలుపు మొక్కల ద్వారా ఈ వైరస్ వ్యాపిస్తుంది. కావున ఈ మొక్కలను నాశనం చేయాలి. తామర పురుగుల నివారణకు అవసరాన్ని బట్టి లీటరు నీటికి ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 25 డబ్ల్యూ.జి. 0.2 గ్రా. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8

ఎస్.ఎల్. 0.4 మి.లీ. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 20 ఎస్.పి. 0.2 గ్రా. చొప్పున వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు మందులను మార్చి పిచికారి చేయాలి.

ప్రత్తి తీయటంలో జాగ్రత్తలు : ఎండిన ఆకులు, ఇతర చెత్త కలవకుండా తీయాలి. తీసిన ప్రత్తిని నీడలో ఆరబెట్టి నిల్వచేయాలి. నిల్వచేసిన ప్రత్తికి గాలి తగిలేటట్లు తేమ తగలకుండా చూడాలి. ప్రత్తి నాణ్యత ముఖ్యంగా పింజ పొడవు, పింజ గట్టితనం, పింజ మృదుత్వం మరియు పింజ పరిపక్వత మీద ఆధార పడి ఉంటుంది. ప్రత్తి నాణ్యత అనేది జన్యు సంబంధమైనది. అయితే దీని మీద పోషక పదార్థాల యాజమాన్యం, వాతావరణ మరియు చీడపీడల ప్రభావం కొంత మేరకు వుంటుంది.

ప్రత్తిలో పూత దఫ దఫాలుగా రావటం వల్ల ప్రత్తిని కనీసం రెండు – మూడు సార్లు తీయవలసి వస్తుంది. బాగా ఎండినటువంటి ప్రత్తిని మాత్రమే గుల్లల నుండి వేరు చేయాలి. సాధారణంగా ప్రత్తి డిసెంబరు, జనవరి నెలల్లో తీతకు రావడం, అదే కాలంలో మంచు కురియడం వలన ప్రత్తి తడిసి ముద్దగా అవుతుంది. కాబట్టి ప్రత్తిని ఉదయం ఎనిమిది గంటల తరువాత మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటలోపల, మరల సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల లోపల తీసుకోవాలి. వేడి ఎక్కువగా వున్న సమయంలో ప్రత్తి తీస్తే వాటితోపాటు గుల్లల వద్ద వున్న తొడిమలు, ఎండిన ఆకులు పెళుసెక్కి ముక్కలై ప్రత్తికి అంటుకుంటాయి.

ప్రత్తి తీయగానే నీడలో మండెలు వేయాలి. ఈవిధంగా చేయటం వలన ప్రత్తి గింజ బాగా గట్టిపడటమే కాకుండా, తేమ తగ్గి ప్రత్తి శుభ్రంగా ఉంటుంది. అలా చేయనట్లయితే దానిలో వున్న తేమ వలన వేడి ఎక్కువై గింజలు ముడుచుకుపోయి ప్రత్తి తూకం తగ్గటమే కాకుండా, ముక్కు పురుగు ఆశించి నాణ్యత తగ్గుతుంది.

ప్రత్తి పంటపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

"ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ప్రత్తి), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు-522 034"

ఫోన్ : 99896 25207

గోగు

నార పంటల్లో జనుము తర్వాత గోగు అతి ముఖ్యమైన వాణిజ్య పంట. గోగు పండించే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 5 వ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో ఈ పంట ఎక్కువగా విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో నార కొరకు సాగు చేయబడుతుంది. సాలీన 22,000 బేళ్ళ నార (180 కిలోలు ఒక బేలుకి) ఉత్పత్తి అవుతుంది. రాష్ట్ర సరాసరి నార దిగుబడి ఎకరాకు 7.91 క్వింటాళ్ళు.

గోగు పంటను నార కొరకే కాకుండా ఇతర పరిశ్రమల్లో కూడ ఉపయోగిస్తున్నారు. గోగు మొక్కల నుండి తీసిన గుజ్జు వార్తా పత్రికల ముద్రణకు అవసరమయ్యే కాగితాన్ని తయారుచేయటానికి శ్రేష్ఠమైనది. గోగు పువ్వుల పత్రదళాలు (కేలిక్స్) సహజరంగుల తయారీలో వినియోగింపబడుతున్నాయి. గోగు విత్తనాల నుండి తీసిన నూనెను సబ్బుల పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. శుభ్రపరచిన నూనెను వంట నూనెగా కూడా వాడవచ్చు. గోగునారను ఎక్కువగా జనపనారతో కలిపి తివాచీలు, గోనె సంచులు, పురి, ప్యాకింగ్ క్లాత్, సీలింగ్‌కు పనికివచ్చే కార్డు బోర్డులు మరియు గృహాలంకరణ వస్తువుల తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నారు.

నేలలు: గోగును అన్ని రకాల నేలల్లో సాగుచేయవచ్చు. తేలిక రకపు గరపనేలలు, ఎర్రనేలలు, మురుగు నీరుపోయే వసతి గల నేలలు అనుకూలం. ఆమ్ల భూములకు భూసార పరీక్షననుసరించి ఎకరాకు 1 టన్ను వరకు సున్నం వేయాలి.

విత్తన మోతాదు మరియు విత్తనశుద్ధి : ఎకరానికి ఎర్ర గోగు (హైబిస్కస్ సబ్దారిఫా) 5 కిలోలు, తెల్ల గోగు (హైబిస్కస్ కెన్నాబినస్) 6 కిలోలు అవసరం. కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 4 గ్రా. థయోమిథాక్సిమ్ తరువాత 2 గ్రా. మెటలాక్సిల్ యం.జెడ్ లేదా 3 గ్రా. మెటలాక్సిల్ లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేస్తే పంట తొలిదశలో ఆశించు రసం పీల్చు పురుగులను, విత్తనం మరియు భూమి ద్వారా సంక్రమించు ఇనుప తెగులును నివారించవచ్చు.

రకాలు :

రకం (విడుదలైన సంవత్సరం)	పంటకాలం (రోజుల్లో)	దిగుబడి (క్వి./ఎ.)	గుణగణాలు
తెల్లగోగు (హైబిస్కస్ కెన్నాబినస్)			
భీమిలి – 1 (ఎ.ఎమ్.సి. –108) (1989)	120–130	5	నార నాణ్యత కలిగి అలంకరణ వస్తువుల తయారీకి అనువైన రకం.
ఎర్రగోగు (హైబిస్కస్ సబ్దారిఫా)			
ఎ.ఎమ్.వి. –3 (సూర్య) (1989)	150	7.5	అన్ని ప్రాంతాలకు అనువైనది. నీటి ఎద్దడిని మరియు ఇనుప తెగులును తట్టుకొంటుంది.

ఎ.ఎమ్.వి. -4 (కళింగ) (1991)	150	8.0	నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొంటుంది. వర్షాధార పంటగా అనుకూలమైనది. పురుగులు, తెగుళ్ళను ఓ మోస్తరుగా తట్టుకొంటుంది.
ఎ.ఎమ్.వి. -5 (దుర్గ) (2006)	135-140	10	అధిక నార దిగుబడి నిచ్చు రకం. పురుగులు, తెగుళ్ళను ఓ మోస్తరుగా తట్టుకొంటుంది.
ఎ.ఎమ్.వి. -7 (జనార్ధన్) (2011)	130-135	12	అధిక నార దిగుబడినిస్తుంది. వర్షాధార పంటగా అనుకూలమైనది. పురుగులు, తెగుళ్ళను ఓ మోస్తరుగా తట్టుకొంటుంది.
ఎ.ఎమ్.వి. -8 (2019)	140-145	12.0	వర్షాధార పంటగా అనుకూలమైనది. అధిక నార దిగుబడితో పాటుగా నాణ్యమైన నారనిస్తుంది. రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఇనుప తెగులును తట్టుకొంటుంది.
ఎ.ఎమ్.వి. -9 (2019)	140-145	12.0	గోగు సాగు చేసే అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్షాధార పంటగా అనువైనది. నార మంచి నాణ్యత ప్రమాణాలు కలిగి ఉంటుంది. పురుగులు మరియు తెగుళ్ళను ఓ మోస్తరుగా తట్టుకొంటుంది.
ఎ.ఎమ్.వి. -10 (2021)	140-150	12.0	వర్షాధార పంటగా గోగు సాగు చేసే అన్ని ప్రాంతాలకు అనుకూలమైనది. అధిక నార దిగుబడితో పాటు నాణ్యమైన నారనిస్తుంది. రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఇనుప తెగులును తట్టుకుంటుంది.

విత్తే కాలం : ఖరీఫ్‌లో మే మొదటి పక్షం నుండి జూన్ మొదటి పక్షం వరకు విత్తుకుంటే అధిక నార దిగుబడి వస్తుంది. వర్షాలు ఆలస్యమైనప్పుడు, జూలై మొదటి పక్షం వరకు వేసుకోవచ్చు. విత్తనము మొలకెత్తిన 25 రోజులకు లీటరు నీటికి 10 గ్రా. (1%) పొటాషియం నైట్రేట్ పిచికారి చేసుకోవాలి. నీటి వనరులు గల మాగాణి భూములలో వరి కోసిన తరువాత రెండవ పంటగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలో వేస్తారు.

విత్తడం : సాంప్రదాయంగా వెదజల్లే పద్ధతిలో సాగు చేస్తారు. వరుసల్లో వేసినట్లయితే గొర్రుతో 30×10 సెం.మీ. దూరంతో విత్తాలి. వెదజల్లుట పద్ధతికన్నా వరుసలలో వేయుట చాలా ఉత్తమం.

నీటి యాజమాన్యం : ఎర్రగోగును వర్షాధారంగా పండిస్తారు. తీవ్రమైన వర్షాభావములో ఒకటి లేదా రెండు నీటితడులు ఇచ్చుకోవాలి.

ఎరువులు : ఎకరాకు 5 టన్నుల పశువుల ఎరువు వేసుకోవాలి. ఆమ్ల భూములకు భూసార పరీక్షననుసరించి ఎకరాకు 1 టన్ను వరకు సున్నం విత్తనం వేయుటకు పక్షం రోజులు ముందుగా వేసి కలియదున్నాలి. ఆఖరి దుక్కిలో 26 కిలోల యూరియా, 75 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్, 20 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ వేయాలి. పైపాటుగా మరో 26 కిలోల యూరియాను విత్తిన 3 వారాలకు మొదటి గొప్పులో వేయాలి. పైపాటుగా వేయలేని పక్షంలో మరియు నీటి ఎద్దడి పరిస్థితిలో లీటరు నీటికి 20 గ్రా. (2%) యూరియాను మరియు 10 గ్రా. (1%) మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్‌ను కలిపి విత్తిన 40 నుండి 60 రోజులలో వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు ఆకులు తడిసేటట్లు ఎకరాకు 200 లీటర్ల ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయాలి.

అంతర కృషి : విత్తిన 3 నుండి 5 వారాలకు గొప్పు, కలుపు తీయడం చేయాలి. వరుసలలో వేసిన పంటలో విత్తిన 20 నుండి 25 రోజులలో గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి. కలుపు తీవ్రతను బట్టి విత్తిన 7 వారాలలోపు

రెండవ సారి గొప్పు త్రవ్వాలి. సకాలంలో అంతరకృషి చేయకపోతే నార దిగుబడి దాదాపు 30 శాతం తగ్గుతుంది. మొదటి గొప్పు బదులుగ, కలుపు నివారణ మందు ఎకరాకు 720 మి.లీ. ప్రిటిలాక్లోర్ 50% ఇ.సి. విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజు గాని పిచికారి చేసి కలుపును సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. పైరులో గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే కలుపు లేత దశలో, ఎకరానికి 480 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5 ఇ.సి. + 200 మి.లీ. థనువిట్ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

పంటల సరళి : సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒకే పంట కాకుండా వివిధ రకాలైన పంటలు, అంతర పంటలుగా, వరుస క్రమ పంటలుగా వేయటం రైతులకు లాభదాయకం. ఈ విధానం వలన నేల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా గోగు పంటలో వివిధ చీడ పీడల ఉధృతి కొంత వరకు తగ్గించవచ్చును.

వర్షాధారపు మెట్ట భూములకు, గోగు పంటలో అంతర పంటలుగా మొక్కజొన్న (2:1), వేరుశనగ (3:4), గోరు చిక్కుడు (3:4) వేయుట లాభదాయకమని తేలినది. గోగు తరువాత వరుస క్రమ పంటలుగా మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, జొన్న పంటలు వేయటం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.నీటి వసతి గల మాగాణి భూములలో గోగు–వరి–పెసర/వేరుశనగ పంటల వరుస క్రమ సరళి రైతుల ఆదాయాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

సస్యరక్షణ : పురుగులు

పిండినల్లి : గోగు పంటను ఆశించే పిండినల్లి రెండు రకాలు. ఇందులో మొదటిది శరీరం ఎర్రగా ఉండి పైన తెల్లని మైనం పూతతో కప్పబడి గుండ్రంగా ఉంటుంది. దీన్ని రైతులు గులాబి రంగు పిండినల్లి పురుగుగా పిలుస్తారు. రెండో రకం లేత పసుపు వర్ణంలో ఉండి తెల్లని మైనంతో కప్పబడి నూలు కండె ఆకారంలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రెండో రకం పిండినల్లి పురుగులే ఎక్కువగా పంటను నష్టపరుస్తాయి. తల్లి పురుగు 200 నుండి 300 వరకు గుడ్లను సముదాయంగా మొక్క కణుపుల వద్ద పెడుతుంది. ఈ గుడ్లు పొదిగి 7 రోజులలో గోధుమ రంగు పిల్ల పురుగులు బయటకు వచ్చి 24 గంటలలో కణుపుల వద్ద చేరతాయి. తల్లి, పిల్ల పురుగులు మైనం వంటి తెల్లని పొడితో కప్పబడి మొక్క కొన భాగాన లేత కణుపుల వద్ద చేరి రసాన్ని పీల్చడం వలన కణుపులు దగ్గర దగ్గరగా ఏర్పడి మొక్క చిగురు భాగం ముద్ద బంతి ఆకారంగా తయారవుతుంది. పిండినల్లి ఎక్కువగా ఆగష్టు–సెప్టెంబరు నెలలో ఆశిస్తుంది. పిండినల్లి గాలి ద్వారా లేదా చీమల వలన లేదా పక్షులు లేదా మనుష్యుల వలన ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్కకు వ్యాపిస్తుంది. పిండినల్లి ఆశించిన మొక్కలను సేకరించి కాల్చి వేయాలి. గట్ల వెంబడి మరియు పొలములో కలుపు మొక్కలు (వయ్యారిభామ, తుత్తరబెండ, నానుబాలు) ఏరివేయాలి. దీనిని నివారించుటకు 5 మి.లీ. వేపనూనె లేదా 5 మి.లీ. కానుగనూనె లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా డైమిథోయేట్ 2 మి.లీ. మరియు శాండోవిట్ లేదా టీ ఫాల్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి. పై మందులను మొక్క బాగా తడిచేటట్లు మరియు మొక్క మొదళ్ళ దగ్గర నేలపై పిచికారి చేయడం వలన సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు.

పచ్చగొంగళి పురుగు : తల్లి పురుగు ఆకుల భాగాన పసుపు రంగు గుడ్లు పెడుతుంది. ఈ గుడ్లు 3 రోజుల్లో పొదిగి గొంగళి పురుగు బయటకువస్తుంది. ఈ గొంగళి పురుగు ఆకుపచ్చని రంగులో ఉండి పైన 2 తెల్లని చారలు వుంటాయి. ఈ పురుగు ఆకులను తిని ఈనెలు మాత్రమే మిగులుస్తుంది. గొంగళి పురుగు దశ 22 రోజుల వరకు ఉండి కోశస్థ దశకు మారుతుంది. ఈ దశలో 7 రోజులు ఉండి సీతాకోక చిలుక బైటకు వస్తుంది.

ఈ పురుగు జీవిత కాలం 30-32 రోజులు. ఈ పురుగు పైరును ఏ దశలోనైనా ఆశించవచ్చు. కాని పైరు తొలి దశలో అనగా జూలై నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువ. దీని నివారణకు గొంగళి పురుగులు, గుడ్లు ఆకులపై కన్పించిన వెంటనే ఏరివేయాలి. లీటరు నీటికి ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా థయోడికార్బ్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి ఆకుల చివరలు తడిచేటట్లు పిచికారీ చేయాలి.

దీపపు పురుగులు : ఇవి లేత పసుపు రంగులో ఉండి ఆకుల ఈనెలలో గుడ్లు పెడతాయి. ఈ గుడ్ల నుండి 3-4 రోజులలో పిల్ల పురుగులు బయటకు వస్తాయి.ఈ పిల్ల పురుగులు గోధుమ రంగులో ఉండి తల్లి పురుగును పోలి 14 రోజులలో తల్లి పురుగులుగా మారతాయి. పిల్ల, తల్లి పురుగులు ఆకు అడుగుభాగంలో ఉండి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు క్రమేపి ఎర్రబారి ముడుచుకొని పోతాయి. ఈ పురుగు తాకిడి ఎక్కువైతే మొక్కలు ఎదగక గిడసబారుతాయి. దీపపు పురుగులు మే నుండి జూలై నెలాఖరు వరకు ఎక్కువగా ఆశిస్తాయి. వీటి నివారణకు గాను 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 0.25 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 0.2 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ లేదా 0.2 గ్రా. అసిటామిప్రిడ్ లీటరు నీటికి కలిపి ఆకుల ఆడుగుభాగం బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

పేనుబంక : గోగుతో పాటు ఈ పేనుబంక ప్రత్తి, వంగ, బెండ, మిరప పంటలను కూడా ఆశిస్తుంది. లేత పసుపు రంగులో రెక్కలు లేని పిల్ల పురుగులు క్రమేపి వారంలో మెరిసే నల్లని పెద్ద పురుగులవుతాయి. ఆకుల ఆడుగుభాగాన గుంపులుగా వుండే ఈ పేలు లేత ఆకుపచ్చ శరీరంతో అండాకృతితో ఉంటాయి. ఇవి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఆకులు లోపలి వైపుకు ముడతపడి ఆకారము కోల్పోతాయి. పిందెల రక్షక పత్రాల నుండి కూడా రసాన్ని పీలుస్తాయి. ఈ పురుగు ఆశించిన ఆకులు, పిందె రక్షకపత్రాలు వాడి రాలిపోతాయి. మొక్క ఎదుగుదల, దిగుబడి, నాణ్యత తగ్గుతాయి. దీనిని నివారించుటకు 2.0 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 0.25 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 0.2 గ్రా. థయోమిథాక్సామ్ లేదా 0.2 గ్రా. అసిటామిప్రిడ్ లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొత్తం బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

తెగుళ్ళు

ఇనుప తెగులు : ఈ తెగులు ఫైటోప్తరా పేరసైటికా అనే శిలీంధ్రం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. నార గోగు పంటకు ఎక్కువ నష్టం కలిగించే తెగుళ్ళలో అతి ముఖ్యమైనది. తెగులు సోకిన మొక్కల భూమికి దగ్గరలో కాండంపై తెలుపు మరియు నీలి వర్ణంతో కూడిన పొడలు ఏర్పడతాయి. క్రమేపి ఈ శిలీంధ్రాలు ఒక దానితో ఒకటి కలిసి నలుపు లేదా ఊదారంగు ఏర్పడుతుంది. ఈ తెగులు భూమిని ఆనుకొని ఉన్న మొదలు పై నుండి 60 సెం.మీ. ఎత్తు వరకు వ్యాపిస్తుంది. ఈ తెగులు సోకిన మొక్కల భూమికి దగ్గరలో కాండం మీద ఇనుప రంగు తుప్పు మచ్చలు ఏర్పడి కాండం కుళ్ళిపోతుంది. తెగులు సోకిన మొక్కలు తేలికగా ఉండి, నార తీసేటప్పుడు పీచులుగా, ముక్కలుగా తెగిపోయి నార నాణ్యత, దిగుబడి తగ్గుతుంది. ఈ తెగులు మొక్కకు ఏ దశలోనైనా ఆశించవచ్చు. అధిక తేమ ఉన్నప్పుడు తెగులు ఉధృతి కూడా ఎక్కువ. దీని నివారణకు తెగులును తట్టుకొనే ఎ.ఎమ్.వి.-7, 8, 9, 10 రకాలను వేసుకోవాలి. చేలో మురుగు నీరు పోయేటట్లు చేయాలి. లోతట్టు ప్రాంతాలు, భూమిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ తెగులు ఉధృతి ఎక్కువ కావున ఈ నేలలు గోగు సాగుకు పనికిరావు. వేసవిలో లోతు దుక్కి చేసిన ఎడల శిలీంధ్రం నశిస్తుంది. కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. మోటలాక్సిల్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పంట మార్పిడి చేయాలి. తెగులు సోకిన మొక్కలను పీకి కాల్చాలి. తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మెటలాక్సిల్ ఎమ్.జడ్. లేదా 3 గ్రా. మాంకోజెబ్ కలిపి తెగులు సోకిన

ప్రాంతం మరియు మొక్క మొదళ్ళు తడిచేట్లు పిచికారీ చేయాలి. సేంద్రీయ ఎరువును తప్పనిసరిగా వాడాలి.

ఆకు ఎండు తెగులు : ఈ తెగులు ఫిల్లోస్టిక్టా అనే జాతికి చెందిన శిలీంధ్రము వలన వస్తుంది. తెగులు సోకిన మొక్కల యొక్క ఆకుల చివరలలో లేదా ఆకు కొనలలో చిన్న గోధుమ రంగుతో కూడిన మచ్చలు ఏర్పడతాయి. అవి క్రమేపి పెరిగి ఆకు మధ్య ఈనెకు ఇరువైపుల సగభాగము వరకు వ్యాప్తి చెందును. కొన్ని సందర్భాలలో ఆకు తొడిమ నుండి మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపి పెద్దవై ఆకుల చివరల వరకు వ్యాపించును. తెగులు సోకిన ప్రదేశము లేత గోధుమ వర్ణము నుండి ముదురు గోధుమ వర్ణములోకి మారును. తెగులు ఉద్రిక్తత ఎక్కువైనపుడు మొక్కల ఆకులు ఎండి రాలిపోవును. ఈ తెగులు ఎర్ర గోగు రకాల కన్నా తెల్ల గోగు రకాలలో అధికము. దీని నివారణకు 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ లేదా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ ఒక లీటరు నీటికి కలిపి వారం రోజుల వ్యవధిలో 2 సార్లు పిచికారి చేయవలెను.

పల్లాకు తెగులు : ఇది జెమిని విరెడే జాతికి చెందిన వైరస్ తెగులు. ఈ తెగులు తెల్లదోమ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ తెగులు సోకిన మొక్కల ఆకుల ఈనెలు పసుపు రంగుకు మారును. ఈనెల మధ్య భాగము లేత మరియు ముదురు రంగు మిశ్రమములో కూడిన పసుపు పచ్చని మచ్చలు ఏర్పడతాయి. తదుపరి ఆకులు పూర్తిగా పత్రహరితము కోల్పోయి తెలుపు వర్ణములో మారును. మొక్క ఎదుగుదల తగ్గి గిడసబారును. ఈ తెగులు లేత దశలో ఆశించిన, నార దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గిపోవును. ఈ తెగులు వ్యాప్తి చేయు తెల్లదోమ నివారణకు లీటరు నీటికి 5% వేపగింజల కషాయము లేదా 2 మి.లీ. ట్రైజోఫాస్ లేదా 2 మి.లీ. ప్రొఫెనోఫాస్ లేదా 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ పిచికారి చేసి నివారించుకోవచ్చును. ఇవే కాకుండా ఆకుపచ్చ, చిగురు ఎండు, బూడిద, గజ్జి తెగుళ్ళు ఆశిస్తాయి. కాని వాటివలన ఎక్కువగా నష్టము ఉండదు.

పంటకోత : ఎర్ర గోగును 50 శాతం పూత దశలోను, తెల్ల గోగు రకాలను చిన్న పిందె ఏర్పడే దశలలోను కోయుట మంచిది. గోగు కర్రలను వ్రేళ్ళతో సహా పీకడం కన్నా నేల మట్టానికి కోయడం మంచిది. దీని వల్ల కర్ర త్వరగా ఊరి, నాణ్యమైన నార వస్తుంది. కోసిన కర్రలను నేలమీద వేసి, 2–3 రోజుల తరువాత చిన్న చిన్న కట్టలుగా కట్టి ఊరవేతకు సిద్ధం చేసుకోవాలి.

పంట కోత తర్వాత నష్టాలు : నీటి కొరత వలన పంట కోతకు, ఊరవేయటానికి మధ్య కాల వ్యవధి వున్నట్లయితే కర్రను చెదలు నష్టపరుస్తాయి. అట్టి పరిస్థితుల్లో చెదలను నివారించటానికి కర్రలపై కార్బరిల్ పొడిని చల్లాలి లేదా 2 మి.లీ. క్లోరిపైరిఫాస్ లీటరు నీటికి కలిపి మొదళ్ళపై పిచికారీ చేయాలి.

గోగు ఊరవేయటం మరియు నారతీత : గోగు కర్ర ఊరి నారతీసేందుకు సాధారణంగా 3 వారాలు పడుతుంది. ఊరేందుకు పట్టే సమయం, నీటి ఉష్ణోగ్రత, నీటి ఉదజని సూచిక, ఊరుటకు అవసరమయ్యే సూక్ష్మజీవులు, నీటిలో ఆమ్లజని, గోగు కర్రల పరిపక్వత మొదలగు అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.

గోగు కర్రలను చిన్న చిన్న కట్టలుగా కట్టి ఊరవేసేందుకు ముందు కర్రలపై 1.25 శాతం యూరియా ద్రావణం (ఒక లీటరు నీటికి 12.5 గ్రా. యూరియా కలిపి) లీటరు నీటిలో కలిపి కాండము పూర్తిగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన కర్ర వారం నుండి పదిరోజుల ముందు ఊరుతుంది. ఈ విధంగా వీలు కాని పక్షంలో 3–4 కిలోల యూరియాను బడ్డీలుగా వేయునపుడు కట్టలపై వెదజల్లడం వలన కూడా నార త్వరగా ఊరుతుంది. గోగు కర్రల మొదళ్ళు 2–3 అడుగులు మునిగేటట్లు 4–5 రోజులు నిటారుగా నిలబెట్టాలి. తరువాత బడ్డీలు వేసి మునుగుటకు రాళ్ళను లేదా సిమెంటు దిమ్మలను ఉంచాలి. ఈ ఊరిన కర్రల నుండి నారతీసి శుభ్రమైన నీటిలో ఉతికి ఎండలో ఆరబెట్టాలి.

ఆధునిక పద్ధతులలో గోగునార తీయు విధానాలు : ఈ విధానాలలో అతి తొందరగా ఊరటానికి కావలసిన సూక్ష్మజీవుల సముదాయాన్ని ఉపయోగించుట వలన నార ఊరు కాలం చాలా వరకు తగ్గటమే కాకుండా, కావలసిన నీటి పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఈ విధానాలను అనుసరించుట వలన వాతావరణ కాలుష్యం బాగా తగ్గి నాణ్యమైన నార లభించి ఎక్కువ ధర పలుకుతుంది. ఇవి రెండు విధాలు.

1) యంత్ర సహాయ సూక్ష్మజీవుల సముదాయ ఊరవేత : గోగు కాండము నుంచి నారనిచ్చే పై తొడుగును యంత్ర సహాయాలతో తీయవచ్చును. మానవశ్రమతో (కాళ్ళతో తొక్కే) నడుచు యంత్రం ద్వారా గంటకు 15 కిలోల నార తొడుగు తీయవచ్చును. అదే విధంగా విద్యుత్‌తో నడుచు (1 హెచ్.పి.) యంత్రం ద్వారా గంటకు 25 కిలోల నార తొడుగు తీయవచ్చును. ఈ విధంగా తీసిన అకుపచ్చని నార తొడుగు మీద ఒక కేజీ సూక్ష్మజీవులు కలిగిన పొడిని చల్లవలెను. నార తొడుగును ఒక గంట కాలం పాలిథిన్ షీటుతో కప్పవలెను. ఈ నార తొడుగులను, పాలిథీన్ లైనింగ్ కలిగిన ఒక మీటరు పొడవు, ఒక మీటరు వెడల్పు, ఒక మీటరు లోతు గలిగిన తొట్టి నందు గల నీటిలో, ఫ్రేముల మీద వేళ్ళాడదీయాలి. ఐదు నుండి ఏడు రోజులలో నార తొడుగు ఊడి గోగు నారగా తయారగును. ఈ నారను బయటికి తీసి మంచి నీటితో బాగా కడిగి ఆరవేయవలెను.

2) చిరు చెరువుల సూక్ష్మజీవుల సముదాయ ఊరవేత : ఈ పద్ధతిలో ఒక మీటరు లోతుతో 6.5 మీటర్లు అడుగు భాగం, 7.5 మీటర్లు పైభాగం చుట్టు కొలత గలిగిన చిన్న చెరువుల లాంటి గుంటను తయారు చేయవలెను. గుంట చుట్టూ మీటరు వెడల్పుతో గట్టు వేయవలెను. ఈ విధంగా తవ్విన గుంటలో 30×27 అడుగుల పరిమాణం కలిగిన 800-1000 గేజి పాలిథీన్ షీటును గట్టు మీదకు వచ్చే విధంగా పరచవలెను.

ఈ గుంతలో నేలమట్టానికి కోసిన గోగు మొక్కలను చంద్రాకారంగా అమర్చవలెను. దాదాపు మూడో వంతు ఎకరం మొక్కలను, ఈ పరిమాణం గల గుంటలో ఊరవేయవచ్చును. గోగు కర్రలను మూడు దొంతర్లుగా పేర్చవలెను. ప్రతి దొంతర మీద ఒక కేజీ సూక్ష్మ జీవుల పొడిని చల్లవలెను. ఈ విధంగా సుమారు 10 కిలోల పొడి, ఒక ఎకరం గోగు కర్రలను ఊరవేయుటకు సరిపోవును. ఈ గోగు కర్రలు పూర్తిగా మునిగేవరకు నీటితో ఈ గుంటను నింపవలెను. కర్రలు పైకి తేలకుండా ఇసుకతో నింపిన పాలిథీన్ గోతాలు పైన వుంచవలెను. సుమారు 12-15 రోజులు ఊరడంతో మంచి నాణ్యతతో కూడిన గోగునార తయారుకాగలదు. నార తయారు కాగానే, సగం మురిగిన నీటిని తీసివేసి మంచినీటితో గుంటను నింపవలెను. తయారైన నారను ఈ నీటిలోనే బాగా కడిగి గుంట గట్టుమీద ఆరవేయవలెను.

గోగుతో అదనపు విలువలు గల ఉత్పత్తులు : పురి, గోనె సంచులు, తివాచీలు, కాగితపు ప్లేట్లు, గ్లాసులు, ప్యాకింగ్ సామాగ్రి, గోంగూరతో పచ్చళ్ళు, చెట్నీలు, రక్షక పత్రాల నుండి సహజరంగులు, స్క్వాష్‌లు, గృహాలంకరణ వస్తువులు, న్యూస్‌ప్రింట్లు మరియు డ్రాయింగ్ పేపర్, సీలింగ్‌కు పనికివచ్చే కార్డ్‌బోర్డులు, పాదరక్షలు, టేబుల్‌మేట్స్, డోర్‌మేట్స్, హాండ్ బ్యాగ్స్. విత్తనం నుండి తీసిన నూనెను సబ్బుల పరిశ్రమలలోను, చెక్కపిండి, పశువుల దాణాగాను ఉపయోగపడుతుంది. గోగు కర్రలు వంట చెఱకుగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ మధ్య కాలంలో గోగు కట్టెల నుంచి నాణ్యమైన క్రియాశీలక బొగ్గు పొడి తయారు చేస్తున్నారు. దీనిని భూమిలో వేయటం వలన భూ ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుందని తేలినది.

గోగు సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

"ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ప్రత్తి), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు-522 034"

ఫోన్ : 99896 25207 మరియు సెల్ : 95050 70206 (ఎ.ఆర్.ఎస్. ఆమదాలవలస).

కలప వృక్షాలు – వాటి పెంపకం

అడవుల నుండి లభించే ప్రధాన ముడి సరకుల్లో కలప ఒకటి. కలపను ప్రధానంగా భవన నిర్మాణం, ఫర్నీచర్, ప్లైవుడ్, క్రీడా వస్తువులు, ప్యాకింగు పెట్టెల తయారీల్లో వాడతారు. కలప గుజ్జు పేపరు తయారీలో ఒక ప్రధాన ముడిపదార్థం.

కలపకు అనువైన వృక్షాలు : టేకు, నల్లమద్ది, తెల్లమద్ది, జిట్రేగి, సీసం, వేప, పెద్దమాను, నీలగిరి, యేపి, సరుగుడు, తుమ్మ, చింత, వెదురు, మాంజియం, ఎర్రచందనం, శ్రీగంధం, సాల్ మరియు సిల్వర్ ఓక్ మొదలైన చెట్లను మనరాష్ట్రంలో బాగా పెంచవచ్చు.

టేకు

టెక్టోన గ్రాండిస్, కుటుంబము : వర్బినేసి

రూపు రేఖలు : సాధారణంగా నవంబరు నుండి మే వరకు ఆకులు రాల్చి, ఏప్రిల్ నుండి జూన్‌లో క్రొత్త ఆకులు తొడుగుతాయి. ఆకులు పెద్దవిగా, దళసరిగా గుమ్మడి ఆకులవలె గరుకుదనం కలిగి ఉంటాయి. జూలై–ఆగస్టులో పూతకు వచ్చి, నవంబరు–జనవరి మధ్యన విత్తనాలు తయారవుతాయి.

సిల్వికల్చర్ గుణాలు : టేకు చెట్టుకు ఎక్కువ సూర్యరశ్మి అవసరం. అనావృష్టిని మరియు ఎక్కువ చలిని తట్టుకునే శక్తి లేదు. ఒక మాదిరిగా గాలి వేగాన్ని తట్టుకొంటుంది. టేకు మొక్కలను పశువులు మేయవు కాని, విరిగినట్లయితే ఈ చెట్టుకు ప్రక్క నుండి పిలకలు పెట్టే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిలో బలమైన ఒక పిలక నుంచి మిగిలిన వాటిని తీసి వేయాలి.

అనువైన ప్రదేశాలు : ఉష్ణమండలాల్లో మరియు శీతోష్ణమండలాల్లో పెరుగుతాయి. సముద్ర మట్టం నుండి 1100 మీ. ఎత్తు వరకు పెంచవచ్చు. మన రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పెంచుకోవచ్చు. ఎర్రనేలలు, ఒండ్రునేలలు అనువైనవి. మెట్ట భూముల్లో, చేలగట్ల మీద మరియు కంచెల చుట్టూ పెంచవచ్చు. నీటి ముంపు ప్రదేశాల్లో ఇవి పెరగవు.

పెంచే విధానం

పునరుత్పత్తి : విత్తనాలు లేదా పిలకల నుండి సహజ పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు. స్టంపు (రెండు కణుపుల కాండం, 7–8 అంగుళాల వేర్లు) లేదా టిష్యూకల్చర్ మొక్కల ద్వారా కృత్రిమ పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు.

విత్తనాల సేకరణ : పక్వానికి వచ్చిన పండ్ల నుండి విత్తనాలను సేకరించాలి. భూమిపైన రాలిన విత్తనాలను పోగుచేసి శుభ్రం చేయాలి.

విత్తన శుద్ధి : విత్తనాలను వేడి నీటిలో 2–4 గం॥ల వరకు ఉంచి, ఆపై విత్తనాలు చల్లబడ్డాక విత్తుకోవాలి లేదా విత్తనాలను ప్రతిరోజు రాత్రి నానబెట్టి పగలు ఎండబెట్టాలి. ఇలా 15–20 రోజులు చేసి ఆ తర్వాత నారుమడిలో విత్తుకోవాలి లేదా విత్తనాలను ఒక గోనె సంచిలో వేసి గుంతలో పూడ్చి 10 రోజుల వరకు ప్రతిరోజు నీరు పోసి ఆ తర్వాత నారుమడిలో విత్తుకోవాలి లేదా విత్తనాలను పేడనీళ్ళ పేస్ట్‌లో 15 రోజులు ఉంచి ఆ తర్వాత

విత్తుకోవాలి. లేదా విత్తనాలను 2-3 వారాల వరకు ఎండలో మరియు నీటిలో ఉంచి ఆ తర్వాత విత్తుకోవాలి లేదా విత్తనాలను సల్ఫ్యూరికామ్లంలో 15 ని॥లు ఉంచి తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి విత్తుకోవాలి.

నారుమడుల తయారి మరియు నాటే విధానం : శుద్ధి చేసిన విత్తనాలను 6 మీ. పొడవు మరియు 1 మీ. వెడల్పు గల నారుమడుల్లో ఫిబ్రవరి-మే మధ్య కాలంలో విత్తుకోవాలి. అలా మొలిచిన మొక్కలను ఒక సంవత్సరం పాటు పెరగనీయాలి. మొక్కలను పీకి స్టంపులను తయారు చేయాలి. వేరుభాగాల్లోని ప్రక్కవేర్లను పదునైన కత్తితో తీసివేయాలి. స్టంపులను జూలై నెలలో 3 × 1.3 మీ దూరంలో వాలుకు అడ్డంగా నాటాలి లేదా స్టంపులను పాలిథీన్ సంచుల్లో 6 నెలలు పెంచి నాటవచ్చు. ఎకరాకు 1000 మొక్కలు నాటాలి.

ఎరువులు : ప్రతి పాదులో స్టంపు నాటిన 2 నెలల తర్వాత 4 కిలోల పశువుల ఎరువు వేయాలి. అలాగే సంచుల్లో పెంచిన మొక్కలు నాటే గుంతల్లో 4 కిలోల పశువుల ఎరువుతోపాటు 50 గ్రా. 3 శాతం లిండేన్ పొడిని వేసి నాటుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ క్రింది పట్టిక ప్రకారం ఎరువులు వాడాలి.

వయస్సు	ఎరువు	మోతాదు	దఫాలు	సమయం
మొదటి సంవత్సరం	డి.ఎ.పి.	150గ్రా.	2	జూలై మరియు డిసెంబరు
రెండవ సంవత్సరం	డి.ఎ.పి.	300గ్రా.	2	జూలై మరియు డిసెంబరు
మూడవ సంవత్సరం	డి.ఎ.పి.	400గ్రా.	1	జూలై

నీటి యాజమాన్యం : స్టంపులు / మొక్కలు నాటగానే 4 రోజులు రోజు విడిచి రోజు నీరు పోయాలి. ఆ పైన వర్షాలు లేనపుడు 15-20 రోజులకొకసారి నీరు ఇవ్వాలి. వేసవి కాలంలో 0-15 రోజుల కొకసారి నీరు ఇవ్వాలి. ఇలా కనీసం 2-3 సం॥ వరకు వేసవిలో నీరు ఇవ్వాలి. డ్రిప్ పద్ధతిలో కూడా నీరు పెట్టవచ్చు.

కలుపు నివారణ, అంతర కృషి : మొదటి సంవత్సరం చెట్ల మధ్య లోతుగా దున్నాలి. పాదుల్లో కలుపు మొక్కలను దున్నిన తర్వాత మిగిలిన వాటిని తీసివేసి పాదులను బాగు చేయాలి.

పలుచన చేయటం : ముందుగా క్రింద కొమ్మలను కొంత ఎత్తు వరకు కత్తిరించాలి. 5-6వ సంవత్సరానికి పెద్దవాసం సైజు మొక్కలు అవుతాయి. 6 సం॥ల తర్వాత మొక్కకు మధ్య 2.6 మీ ఎడం ఉండేటట్లు మధ్యనున్న మొక్కను తీసివేయాలి. 12 సం॥ల తర్వాత మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 5.2 మీ. ఎడం ఉండేటట్లు మధ్యనున్న మొక్కను తీసివేయాలి. మిగిలిన మొక్కలు మరో 15-18 సం॥లకు మంచి కలవనిస్తాయి.

అంతర పంటలు : మొదటి 2 సంవత్సరాల వరకు వ్యవసాయ పంటలు, ముఖ్యంగా పప్పుదినుసు జాతి పంటలు, పెసలు, మినుములు, అలసందలు, ఉలవలు, కూరగాయలు, లాభసాటిగా పెంచుకోవచ్చు. తరువాత పశుగ్రాస పైర్లు - స్టైలో, అంజన్‌గడ్డి పెంచుకోవచ్చు.

సస్యరక్షణ : తేకును ఆశించే చీడపీడలను సరయిన పురుగుమందులను పిచికారీ చేసి నివారించుకోవచ్చు. 2 చ.మీ.కు 1 టీ చెంచా కార్బోఫ్యూరాన్ గుళికలు వేయడం ద్వారా వేరు పురుగును, లీటరు నీటికి 2.5 మి.లీ. మోనోక్రోటోఫాస్ కలిపి పిచికారీ చేసి బెరడు తొలుచు పురుగును, వడ్రంగి పురుగును నివారించవచ్చు. లీటరు నీటికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్ పిచికారీ చేయడం ద్వారా ఆకుమచ్చ, తుప్పు తెగుళ్ళను అరికట్టవచ్చు.

దిగుబడులు

25–30 సం॥ల టేకు చెట్టు నుండి లభించే కలప.....	=	20 ఘ.అ.
ఎకరాకు కలప దిగుబడి	=	3200 ఘ.అ.
ఎకరాకు ఆదాయం సుమారు (30 సం॥లకు గాను)	=	32 లక్షలు
అంటే సంవత్సరాదాయం సుమారు.....	=	ఒక లక్ష ఆరువేలు
ఎకరాకు ఖర్చు సంవత్సరానికి	=	రూ. 8,000
ఎకరాకు సంవత్సర నికరాదాయం	=	రూ. 98,000

ఉపయోగాలు : టేకు కలప ప్రపంచంలో అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఈ కలపలో భౌతిక మరియు యాంత్రిక గుణాలు సక్రమంగా సంధించబడి ఉన్నాయి. అందుచేత ఈ కలపను ముఖ్యంగా గృహనిర్మాణాల్లోను, ఫర్నిచర్ తయారీలోను విరివిగా వాడవచ్చు.

యూకలిప్టస్ (నీలగిరి)

యూకలిప్టస్ టెరిటికారనిస్, కుటుంబము : మిర్టియేసి

యూకలిప్టస్ (నీలగిరి) లేదా జామాయిల్ లేదా మైసూర్‌గమ్ అని అంటారు. పెద్దగా కొమ్మలు లేక దాదాపు 25 మీటర్లు ఎత్తు వరకు చాలా త్వరగా పెరగగల చెట్టు. బెరడు తెల్లగా లేక గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. సామాజిక వన విస్తరణ ఉధృతమైనందున జామాయిల్ చెట్టు చూడని వారు లేరు.

పరివ్యాప్తి : ఆస్ట్రేలియా పుట్టుక స్థలం. ఇప్పుడు అన్ని దేశాలలో విస్తరించింది. యూకలిప్టస్‌లో అనేక జాతులు ఉన్నాయి. ఒకేజాతి అన్ని చోట్ల పెరగదు. ఊటిలాంటి ఎత్తైన ప్రదేశములలో, యూకలిప్టస్ గ్లాబులస్ పెంచుతారు. దీని నుండే "జామాయిల్" అనే నూనె కూడా తీస్తారు.

అనుకూల పరిస్థితులు : నిస్సారవంతమైన భూములకు అనువైన చెట్టు. గడ్డు సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో దిట్ట. భూమిని దున్ని మొక్కలను నాటినట్లయితే, వర్షలేమిని ఎక్కువ కాలం భరించగలదు. 3 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు వేడి గల ప్రదేశాములలో, సముద్ర మట్టము నుండి 1200 మీ.ల ఎత్తు ప్రదేశములో మరియు 400 మి.మీ. నుండి 1250 మి.మీ. వర్షపాతం గల ప్రాంతాలలో పెరుగగలదు. నీరు నిలువ ఉండే ప్రాంతాలలో పెరుగదు.

నీలగిరి ప్రత్యేకత :

1. మేకలు ఇతర పశువులు జామాయిల్ ఆకులను మేయవు. మిగతా ఏ మొక్కలకైనా ఈ బెడద తప్పదు.
2. నిస్సారవంతమైన భూములలో మరియు గడ్డు పరిస్థితులలోనైనా త్వరితంగా పెరిగి తక్కువ కాలంలోనే వంట చెఱకు, చిన్న కలప నివ్వగలదు.
3. ఏ కారణం చేతనైనా కొట్టబడిన చెట్టు తిరిగి పిలకలు వేసి పెరుగును.

4. శిఖరము ఎక్కువ కొమ్మలతో వ్యాపించక వేర్లు భూమిలో లోతుకు పోవుట వలన నీలగిరిని వ్యవసాయ భూముల్లో పంటలతో పాటు వేయవచ్చును. పంటలకు నీలగిరితో నీడ, భూసార అపహరణల భయం లేదు.

5. గట్లపైన పెరిగే నీలగిరి చెట్లు పంట భూములను గాలి తాకిడి నుండి కాపాడుతాయి.

ఉపయోగములు :

1. ఆరిన కొయ్య శ్రేష్ఠమైన వంట చెఱకుగా ఉపయోగపడుతుంది. దీని సాంద్రత 0.6 వరకు ఉంటుంది. ఒక కిలో చెక్క 4,800 కిలో కేలరీల ఇంధనశక్తి కలిగి ఉంటుంది.

2. చిన్న కలప: గుడిసెలు, గృహ నిర్మాణములు, ఫర్నీచర్ తయారీ, కరెంటు, టెలిఫోన్ స్తంభములుగా వాడుతారు.

3. పంట భూములను గాలి తాకిడి నుండి కాపాడేందుకు గాలి నిరోధకాలుగా పెంచుతారు.

4. కలప పేపరు మరియు రేయాన్ తయారీలో గుజ్జుగా వాడతారు. నీలగిరి తోటను కొట్టి వేసిన తరువాత మొదట్లో పిలకలు వేస్తాయి. అవే పెరిగి తోటగా అవుతాయి. ఆ విధంగా తిరిగి నాటకుండానే నాలుగుసార్లు దిగుబడి తీయవచ్చును.

నర్సరీ విధానము : ఒక కిలోగ్రాముకు 1.5 లక్షల విత్తనాల వరకు వస్తాయి. నవంబరు, డిసెంబరు మాసములలో విత్తనములను ఇసుకతో కలిపి బెడ్లపై చల్లవలెను. 8 నుండి 10 రోజులలో విత్తనములు మొలకెత్తును. మొక్కను రెండు జతల ఆకులు వచ్చినప్పుడు (దాదాపు 40–45 రోజుల తర్వాత) నారుమడి నుండి తీసి 4"×7" 150 గేజి పాలిథిన్ సంచుల్లో నాటాలి. సంచులలో నాటడం ఫిబ్రవరి నెలాఖరుకు పూర్తి చేయాలి. మే నెల నుండి వేరు భాగము భూముకి తగిలినప్పుడల్లా సంచులు మార్పిడి మరియు అధికంగా ఎత్తు పెరగకుండా మొక్కలను దాదాపు 45–50 సెం.మీ. ఎత్తులో కత్తిరించడం చేయాలి. ఈ విధంగా పెంచిన మొక్కలు అటవీశాఖ వారి నర్సరీలలో పంపిణీకై జులై నెలలో సిద్ధంగా ఉంటాయి.

నాటే పద్ధతి : నీలగిరి తోటలకు నీరు, సేద్యం, ఎరువులు అనవసరం అనే భావన చాలా మంది రైతులకుంది. పై మూడు నీలగిరి తోటలకు తప్పనిసరి కాకపోవచ్చు. కానీ అధిక దిగుబడులు ఆశించే రైతులు విధిగా మొదటి సంవత్సరంలో వర్షాలు లేనప్పుడు వారానికొకసారి నీరు కట్టడం మంచిది. సాధారణంగా నిస్సారవంతమైన భూములలో నీలగిరి తోటలుగా పెంచువారు మొదటి, రెండవ సంవత్సరంలలో అంతర సేద్యం చేయాలి. నీలగిరి పెరుగుదలకు అది ఎంతో తోడ్పడుతుంది. అందుకే అటవీ శాఖ వారు రైతులకు 3 మీ × 1.5 మీ ఎడమలో నాటుట సూచించారు. ఇకపోతే వర్షాకాలంలో రసాయనిక ఎరువుల వాడకం నీలగిరి అధిక పెరుగుదలకు ఎంతో మంచిది. రైతులు వారి స్వలాభము, వసతిననుసరించి సారవంతమైన భూములలో తోటలుగా పెంచుచున్నారు గానీ, అటవీ శాఖవారు నీలరిగి పొలాల గట్లపైన, నిస్సారవంతమైన భూములలో నాటుటకు మాత్రమే ప్రచారం చేయుచున్నారు.

తోటను 2 మీ × 2 మీ ఎడమ లేక 3 మీ × 1.5 మీ ఎడమలో పెంచాలి. రెండవ పద్ధతిలో నాటితే తోటలో నాగలిదున్నే అవకాశం వస్తుంది. భూమి రెండుసార్లు దున్ని నాటితే మంచి లాభాలు ఉంటాయి. సాధ్యపడని యెడల 30 ఘ.సెం.ల గోతులను త్రవ్వి నాటే ముందు మొక్కకు చెదలు పట్టకుండా కొంచెం బి.హెచ్.సి.

10 శాతం పొడిని వేయాలి. బాగా పెరిగితే 5 లేక 6వ సంవత్సరాంతములో కొట్టి వేయవచ్చును. గట్లపై మీటరు దూరములో నాటవచ్చును. నాటు ప్రదేశములు పొలాల గట్లపై, నిస్సారవంతమైన భూములు, అటవీ ప్రాంతములలో తోటలుగా, స్కూలు, ఆఫీసులు, పరిశ్రమల ఆవరణలలోనూ నాటవచ్చును.

అధిక దిగుబడినిచ్చు యూకలిప్టస్ క్లోనల్ రకాలు :

ఆధునిక క్లోనల్ టెక్నాలజీ ద్వారా అధిక దిగుబడినిచ్చు యూకలిప్టస్ క్లోనల్ రకాలను అభివృద్ధి పరచడం జరిగింది. ఇవి త్వరితంగా పెరిగే స్వభావము కలిగి అధిక కలప గుజ్జును చీడ పీడలను తట్టుకొనే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. నాటిన తర్వాత క్లోనల్ రకాలు సుమారు 90-95 శాతం వరకు బ్రతికే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. 8-23 మె.ట / ఎకరానికి / కలప దిగుబడిని ఇస్తాయి. అటవీ జన్యు ప్రజనన పరిశోధనా సంస్థ (ఐ.ఎఫ్.జి.టి.బి), కోయంబత్తూర్ వారు అధిక దిగుబడితో పాటు గొట్టాల పురుగు వలన జరుగునష్టాన్ని తట్టుకొనే శక్తి కలిగి ఉన్న క్లోనల్ రకాలను (ఐఎఫ్‌జిటిబి - 1, 2, 3 మరియు 4) అభివృద్ధి చేశారు.

నీలగిరిపై నిజాలు :

- 1000 కిలోల జామాయిల్ చెట్టు 235 టన్నుల నీరు ఉపయోగించుకుంటే అదే బరువుగల ఇతర స్వజాతి చెట్టు 900 టన్నుల నీరు వినియోగించుకొంటుంది.
- క్షామ పరిస్థితుల వల్ల అధికంగా వేసే గొట్టపు బావుల వల్ల భూగర్భ నీటి మట్టము దిగిపోతుందేగాని జామాయిల్ వల్ల కాదు.
- జామాయిల్ చెట్టు శిఖరము ఎక్కువగా వ్యాపించదు. అందుకే నీడ ఎక్కువ ఇవ్వదు. మొదటి రెండు సంవత్సరములు నిరాటంకముగా అంతర పంటలను పండించవచ్చును.
- భూములను నిస్సారవంతము చేయదు. జామాయిల్ తోటలపై డెహ్రాడూన్‌లో జరిపిన ప్రయోగములలో ఒక హెక్టారులో 7 సం॥లకు 73 కిలోల కాల్షియం, 59 కిలోల నైట్రోజన్, 31 కిలోల పొటాషియం, 9 కిలోల మెగ్నీషియం మరియు 3.9 కిలోల భాస్వరం ఆ నేలకు సరిపోవునని తేల్చారు.
- సారంవంతమైన భూములలో జామాయిల్ తోటలకు ప్రోత్సాహమివ్వడం లేదు. నిస్సారవంతమైన బంజరు భూములు మరియు గట్లపై లేదా పంటతో పాటు వేయాలి.
- ఏ రైతు అయిన తన అవసరానికి ఉంచుకొని మిగిలినవి అమ్మడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గిరాకి ఉన్నది మరియు మొదలు అమ్మిన చిన్నచిన్న కొమ్మలు, బెరడు, చివర్లు వంట చెఱకు అవసరాన్ని తీరుస్తాయి.

యూకలిప్టస్ చెట్లు అన్ని మాసాలలో ఆకులు రాల్చే గుణము కలిగి ఉన్నవి. రాలిన ఆకులు మందము కలిగి ఉండుట వలన నేలపైన చాలా కాలము ఎండి తరువాత కూడా చీకకుండ అలాగే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రాలిన ఆకులను పోగుచేసి వర్మిటెక్నాలజీ ద్వారా మంచి సేంద్రియపు ఎరువును తయారుచేయవచ్చును. కేవలం 130 రోజులలో వానపాముల ద్వారా వర్మికంపోస్ట్ ఎరువును తయారుచేయవచ్చునని నిరూపించబడినది. తయారైన సేంద్రియ ఎరువులో పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించడమైనది.

సుబాబుల్

సుబాబుల్ అతిత్వరగా పెరిగే బహువార్షిక మొక్క. వంటచెరుకు, పశుగ్రాసం, పనిముట్లకు కలప మరియు కాగితపు గుజ్జు లాంటి అవసరాలను తీర్చగలదు. విత్తనాలలో 24 శాతం మాంసకృత్తులు కల్గి ఉంటాయి. విత్తనాలు సులభంగా మొలకెత్తుతాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో కూడా బాగా పెరుగుతుంది. గాలిలో ఉన్న నత్రజనిని ఉపయోగించుకునే శక్తిగల బాక్టీరియాను వేరుబుడిపెలందు కలిగి ఉంటుంది. ఎక్కువసార్లు పిలకపంట తీసుకోవచ్చు. ఉష్ణమండలాల్లో బాగా పెరుగుతుంది. వర్షపాతం 600–1700 మి.మీ. ఉన్న ప్రాంతాల్లో బాగా పెరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో బాగా పెరుగుతుంది.

రకాలు : మెట్టనేలల్లో హవాయిన్ కామన్, హవాయిన్ జెయింట్, కె–8, కె–740 మరియు కె–28 రకాలను, నీటి వసతిగల నేలల్లో హవాయిస్ జెయింట్, కె–636 రకాలను సాగుచేయవచ్చు. కె–636 అను రకము తక్కువ విత్తన వ్యాప్తి చెందగల లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కె–740 అను రకము అన్నిటికంటే అధిక పశుగ్రాసము దిగుబడి ఇవ్వగలదు.

నేలలు : అన్ని రకాల తటస్థ నేలల్లో పెరుగుతుంది. క్షార మరియు ఆమ్ల నేలల్లో పెరగదు. లోతైన, సారవంతమైన మరియు ఎక్కువ తేమ లభ్యమయ్యే నేలలు అనుకూలమైనవి. బంజరు భూముల్లోను, చెరువు గట్లపైన, పశువుల తాకిడి లేని కాలువ గట్లపైన, పొలాల గట్లపైన పెంచవచ్చు. అటవీ వ్యవసాయంగా పంట పొలాల్లో కూడా పెంచవచ్చు.

నారు మొక్కల పెంపకం : రెండు సం॥లు ఆపై బడిన చెట్లనుండి విత్తనాలను సేకరించాలి. ఒక కిలోకు 16,000–20,000 విత్తనాలుంటాయి. విత్తన శుద్ధికిగాను ఈ విత్తనాలను సుమారు 30° సెల్సియస్ వేడి నీటిలో 5 ని॥లు ఉంచి, తీసిన విత్తనాన్ని చల్లని నీటిలో 12 గంటలు నానబెట్టి విత్తుకోవాలి. విత్తన శుద్ధి తర్వాత నారుమళ్ళలో నేరుగా విత్తటానికి వరుసల మధ్య 20 సెం.,మీ. వరుసలలో 4 సెం.మీ. దూరంలో 1.5 సెం.మీ. లోతుగా విత్తనాలు విత్తుకోవచ్చు లేదా 22 × 10 సెం.మీ. పాలిథీన్ సంచుల్లో పేడ, ఎరువులను కలిపిన మట్టిని నింపి ఒక సంచికి 2 విత్తనాలు చొప్పున విత్తుకోవాలి. ఈ విత్తనాలను మార్చి / ఏప్రిల్‌లో విత్తినట్లయితే జూలై కల్లా మొక్కలు నాటటానికి తయారవుతాయి.

నాటే పద్ధతి : వేసవిలో 30 × 30 × 45 సెం.మీ. పరిమాణం గల గుంతలను త్రవ్వితే నేల గుల్లబారి మొక్క నాటటానికి అనువుగా ఉంటుంది. వర్షాకాల ప్రారంభంలోనే మట్టినింపిన గుంతల్లోను, సంచుల్లోను మొక్కలను నాటాలి. మొక్కల మధ్య దూరం 2 × 2 మీ గాని, 2 × 3 మీ. గాని ఉంచాలి. ఎకరాకు 666 నుండి 1000 మొక్కల వరకు నాటుకోవచ్చు.

అంతర కృషి : మొదటి సంవత్సరం మొక్కల మధ్య అంతర సాగు చేయాలి.

అంతర పంటలు : మొదటి సంవత్సరం పప్పు దినుసు జాతి పైర్లను లాభసాటిగా పెంచుకోవచ్చు. రెండవ సంవత్సరం నుండి పశుగ్రాస పైర్లను పెంచుకోవచ్చు.

యాజమాన్య పద్ధతులు : కలుపు నివారణ మొదటి 2 సం॥ల వరకు చేయాలి. అవసరాన్ని బట్టి 2–5 సం॥ల మధ్య చెట్లను నరకవచ్చు. వంట చెరుకు కయితే 2–3 సం॥ల మధ్య నరకవచ్చు. పశుగ్రాసానికయితే ప్రతి 2–3

నెలలకు 10–15 సెం.మీ. ఎత్తులో నరకాలి. కాగితపు గుజ్జుకయితే 4–5 సం॥ మధ్య నరకవచ్చు. చెట్ల ప్రక్క కొమ్మలను ఎప్పటికప్పుడు నరికి చెట్లు ఎత్తుగా పెరిగేటట్లు చేస్తే 10–15 సం॥ల వరకు కలప ఉత్పత్తి అవుతుంది.

దిగుబడి : సుబాబుల్ 6 సం॥లలో 20 మీ. ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. వర్షాధార ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా కలప దిగుబడి ఎకరాకు సంవత్సరానికి 4–8 ఘ.మీ. వస్తుంది. నీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ప్రకాశం జిల్లాలో 2–3 రెట్లు అధికంగా కలప దిగుబడి వస్తుంది. పశుగ్రాసం ఎకరాకు వర్షాధార ప్రాంతాల్లో 5–10 టన్నులు, నీటివసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో 32–36 టన్నులు వస్తుంది.

లాభాలు : కలప గట్టిగా, నాణ్యంగా ఉంటుంది. భవన నిర్మాణానికి, ఫర్నీచర్ తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. గుంజలు, కంచె స్థంభాలుగా ఉపయోగపడతాయి. కొమ్మలు వంట చెరుకుగా పనికివస్తాయి. ఆకులు పశు గ్రాసంగా ఉపయోగపడతాయి. మొక్కలను 8 మీ. ఎడంగా రెండు ఉమ్మడి వరుసల్లో (వరుసల మధ్య దూరం 60 సెం.మీ.) నాటి, వాటిని భూమినుండి 30 సెం.మీ.ల ఎత్తుకు కోస్తే ఎకరాకు 0.8 టన్నుల వరకు ఎండు మేత, అర టన్ను వంట చెరకు లభిస్తాయి. సుబాబుల్‌ను పచ్చిరొట్టగా ఉపయోగిస్తే ఖరీదైన నత్రజని ఎరువులపై ఆధారపడటం తగ్గించవచ్చు. పచ్చిరొట్టగా ఉపయోగిస్తే ఎకరాకు 8–12 కిలోల నత్రజని లభిస్తుంది. అంతర పంటగా నత్రజని అవసరాన్ని 50 శాతం తగ్గించవచ్చు. కాగితం తయారీకి కావాల్సిన శ్రేష్ఠమైన గుజ్జు సుబాబుల్ నుండి లభిస్తుంది.

సమస్యలు – పరిష్కారం : పశుగ్రాసానికి పనికివస్తుంది కనుక మొదటి సం॥లో మొక్కలను పశువులు, మేకల బారి నుండి కాపాడాలి. లేత ఆకుల్లో మైమోసిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వలన సుబాబుల్ ఆకులను వేరే పశుగ్రాసంతో కలిపి మేపుకోవాలి. ఈ చెట్లకు సహజ పునరుత్పత్తి ఎక్కువగా ఉండటం వలన చివరకు కలుపు మొక్కలుగా మిగలవచ్చు. దీన్ని నివారించడానికి తరచు అంతర కృషి చేయాలి. వ్యాపార పంటలు నష్టాల పాలయినపుడు ప్రకాశం జిల్లా రైతులు సుబాబుల్ తోటలను విరివిగా నాటి అధిక లాభాలను పొందుచున్నారు. అంతేకాకుండా సుబాబుల్‌తో పాటు జొన్న, ఆముదం, కంది మొదలైనవి కలిపి లాభసాటిగా పండించవచ్చు.

వెదురు

వెదురును 'పచ్చ బంగారం' (Green Gold) అని కూడా అంటారు.

రూపురేఖలు : వెదురు బహువార్షికం, సన్నగా పొడవుగా ఎదుగుతుంది, గడలు కణుపులు కలిగి గుండ్రంగా, సాఫీగా ఉంటాయి. భూమిలోని దుంప నుండి పెరుగుతుంది. అనుకూల పరిస్థితుల్లో చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది.

ప్రతి సంవత్సరం దుంపనుండి పెరిగే గడల సంఖ్య మరియు పరిమాణం మారుతూ ఉంటుంది. వెదురు చాలా పనులకు వినియోగ పడుతుంది. అందుచేత దీనిని "బీదవాని కలప" అని కూడా అంటారు. కాకపోతే అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వర్షపాతం వున్న ప్రదేశాల్లో ప్రకృతి సహజంగా విస్తరించివున్నాయి.

రకాలు

1. గట్టి వెదురు (డెండ్రోకాలమస్ స్ట్రిక్టస్) : ఈ వెదురులో గుల్ల ఉండదు.

2. మామూలు వెదురు (బాంబూస ఆరండినేసియ) : వెదురులో గుల్ల వుంటుంది. వంకర లేకుండా నిటారుగా ఉండి తేలికగా ఉంటుంది. గుల్లగా ఉండటం వలన సన్నగా చీల్చి వివిధ పనులకు వినియోగిస్తారు.

వాతావరణం : వెదురు ఉష్ణమండలం మరియు సమశీతోష్ణ మండలాల్లోను పెరుగుతుంది. గాలిలో తేమ ఎక్కువగా గల పరిస్థితుల్లో బాగా పెరుగుతుంది. సముద్ర మట్టం నుండి 1200 మీ. ఎత్తు గల ప్రాంతాల్లో పెంచవచ్చు.

నేలలు : వెదురు అన్ని రకాల నేలల్లో పెరుగుతుంది. గరప నేలలు శ్రేష్ఠం, చవుడు లేదా ఆమ్ల గుణాలు కలిగిన నేలలు పనికి రావు. ఉదజని సూచిక 6.5 నుండి 7.5 వరకు గల నేలలు అనుకూలం.

పెంచే ప్రదేశాలు : పంట భూముల్లో గట్ల చుట్టూ 4 మీ. ఎడంలో నాటవచ్చు. 5 × 5 మీ. ఎడంలో నాటి తోటగా కూడా పెంచవచ్చు.

నాటటం : 30 × 30 × 30 సెం.మీ. గుంతలు తీసి, మట్టి, 4 కిలోల పశువుల ఎరువు కలిపి నింపాలి. ప్రతి గుంతలోను 50 గ్రాముల ఫాలిడాల్ 3 శాతం పొడిని చల్లాలి. తొలకరి వర్షాలకు నాటుకోవాలి. నీరు మొక్క మొదలుకు తగలకుండా మొక్క మొదట్లో మట్టి కొంచెం ఎత్తుగా వేయాలి.

వెదురు నరకటం : నాటిన 7 సంవత్సరాలలకు వెదురును మొదటిసారి నరకవచ్చు. భూమట్టం నుండి 50–75 సెం.మీ. మొదలు వదిలి వెదురు గడలను నరకాలి. నరికిన తర్వాత దుబ్బులు శుభ్రంగా బాగుచేయాలి.
సూచన : 7 సం॥లకు ముందుగానీ లేదా చిగురు ఎండే ముందు గడలు నరకరాదు.

అంతరకృషి : వరుసల మధ్య ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు దుక్కిచేసి మెట్ట పంటలు పండించవచ్చు. వెదురు ఒకేసారి పూతకొచ్చి, విత్తనాలనిచ్చి కుదురు చనిపోతుంది.

ఉపయోగాలు : గుడిశెల నిర్మాణానికి, తెప్పలుగా కట్టి చేపలు పట్టటానికి కంచె స్థంభాలుగా, నిచ్చెనలుగా, నడిచే కర్రగా కాగితపు పరిశ్రమలో ముడిపదార్థంగా మరియు పలు ఇతర మేదరి పనులకు వెదురును ఉపయోగిస్తారు. బుట్టల, ఆట బొమ్మల, పనిముట్ల మరియు గొట్టాల తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. లేత చిగుళ్ళను ఊరగాయగా కూడా నిల్వ చేస్తారు.

నర్సరీ పద్ధతి : కిలో బరువుకు సుమారు 32,000 విత్తనాలు తూగుతాయి. విత్తనాలను డిసెంబరు, జనవరి నెలల్లో నారుమళ్ళలో వేసి మొలకెత్తిన తర్వాత 4" × 7" సంచుల్లో ఫిబ్రవరి నెలలో నాటాలి. నాటిన సంచి మొక్కలను నర్సరీలో జూన్ ఆఖరు వరకు పెంచి, జులై నెల మొదటి వర్షాలకు నాటుకోవాలి. వెదురును నారు మొక్కలుగా కూడా పెంచి నాటవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యం : ఎక్కువ వర్షపాత ప్రాంతాల్లో ఒక్కో కుదురుకు 20–25 గెడలు కూడా వస్తాయి. నీటి సౌకర్యం వున్నచోట్ల వేసవి కాలంలో నెలకోసారి తడి ఇచ్చినట్లయితే దిగుబడి పెరుగుతుంది.

దిగుబడి – ఆదాయం : ఒక ఎకరంలో 150 కుదుళ్ళు వరకు ఉంటాయి. 7–8వ సం॥ నుండి కుదురుకు సంవత్సరం విడిచి సంవత్సరం 10 గెడల చొప్పున 1500 గెడలు వస్తాయి. గెడకు రూ. 5 చొప్పున ఎకరానికి రూ. 7500/– ఆదాయం వస్తుంది. 20–25 సం॥ వరకు అధికంగా దిగుబడినిస్తాయి.

కలప వృక్షాల సాగు పద్ధతులు

చెట్టు రకం	గుంతలు, తయారీ విధానం (పొడవు×వెడల్పు×లోతు)	నారు పెంచే విధానం సమయం	నాటే సమయం	చెట్ల మధ్య దూరం	నీరుకట్టే సమయం, ఎరువుల మోతాదు (గ్రా./మొక్క)	చెట్టు కాల పరిమితి, కలప దిగుబడి/ఎకరానికి
1	2	3	4	5	6	7
టేకు	45×45×60 సెంమీ గుంతలు వేసవిలో	స్టంపులు/టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు/ పాలిథీన్ సంచుల్లో, ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-ఆగష్టు	మొదట 3×1.3మీ చివరకు 3×5.2మీ	నీరు 10-20 రోజులవ్యవధిలో	20-30 సం॥లలో 10-20 ఘ.అ.
ఎర్రచందనం	45×45×60 సెంమీ గుంతలు వేసవిలో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-జూలై	5×5 మీ.	నీరు 15-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి.:కె=500:500:500	30-40 సం॥లలో 10-15 ఘ.అ.
చందనం / శ్రీగంధం	45×45×60 సెంమీ గుంతలు వేసవిలో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-జూలై	4×4 మీ.	నీరు20-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=400:500:500	30 సం॥లలో 10 ఘ.అ.
తెల్లమద్ది	45×45×60 సెంమీ గుంతలు వేసవిలో	పాలిథీన్ సంచుల్లో మార్చి-మే	జూన్-జూలై	6×6 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:400:500	40 సం॥లలో 20-30 ఘ.అ.
జిట్రేగి	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు వేసవిలో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-జూలై	5×5 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=400:400:400	30-40 సం॥లలో 20 ఘ.అ.
దిరిశెన	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు మార్చి-ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో జనవరి-మే	జూన్-జూలై	6×6 మీ.	నీరు 20-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:400:400	25-30 సం॥లలో 20 ఘ.అ.
వేప	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-జూలై	5×5 మీ.	నీరు 20-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	25-30 సం॥లలో 20 ఘ.అ.
నీలగిరి	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-ఆగష్టు	2×2 మీ.	నీరు 20-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	4-5 సం॥లలో, 30-40 టన్నులు ఎకరానికి
సుబాబుల్	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూన్-ఆగష్టు	3×2 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=250:500:500	4-5 సం॥లలో,

చెట్టు రకం	గుంతలు, తయారీ విధానం (పొడవు×వెడల్పు×లోతు)	నారు పెంచే విధానం, సమయం	నాటే సమయం	చెట్ల మధ్య దూరం	నీరుకట్టే సమయం, ఎరువుల మోతాదు (గ్రా./మొక్క)	చెట్టు కాల పరిమితి, కలప దిగుబడి/ఎకరానికి
1	2	3	4	5	6	7
యేపి	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	5×5 మీ.	నీరు 10-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:400:400	25 సం॥లలో 25 ఘ.అ.
తుమ్మ	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	6×6 మీ.	నీరు 20-30 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:400:400	30-40 సం॥లలో 30 ఘ.అ.
సరుగుడు	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో నవంబర్-డిసెంబర్	జూన్-జూలై	4×4 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:500:500	30-40 సం॥లలో 25 ఘ.అ.
ఆస్ట్రేలియన్ తుమ్మ (మాంజియం)	45×45×60 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	4×4 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=300:500:500	15-20 సం॥లలో 10 ఘ.అ.
సాల్	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	5×5 మీ.	నీరు 15-20 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	15-20 సం॥లలో 10-15 ఘ.అ.
సిల్వర్‌ఓక్	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	5×5 మీ.	నీరు 10-15 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	15-20 సం॥లలో 10-15 ఘ.అ.
వెదురు	30×30×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	5×5 మీ.	నీరు 10-15 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	ప్రతి 3 సం॥లకు 12 గెడలు
సీమరూబా	45×45×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	5×5 మీ.	నీరు 10-15 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	10 సం॥లలో 1000-2000 కిలోలనూనె దిగుబడి ఒక హెక్టారుకు
విప్ప / ఇప్ప	45×45×45 సెం.మీ గుంతలు ఏప్రిల్‌లో	పాలిథీన్ సంచుల్లో ఫిబ్రవరి-మే	జూలై-ఆగష్టు	9×9 మీ.	నీరు 10-15 రోజుల వ్యవధిలో ఎన్:పి:కె=500:500:500	10 సం॥లలో 15-20 కిలోల విత్తనాలు ఒక చెట్టుకు

గమనిక : ఎన్ - నత్రజని; పి. - భాస్వరం; కె - పొటాష్

చింత

రూపురేఖలు : బెరడు ముదురు బూడిద రంగులో ఉండి గరుకుగా ఉంటుంది. విస్తరంచిన ఎత్తైన శిఖరం, పొట్టిగా దృఢంగా ఉన్న మొదలు, బెరడు మీద నెర్రెలు, బుడిపెలు ఉంటాయి. దాదాపు 24 మీ. ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. 10–20 చిన్న ఆకులతో రెమ్మలు నిండి, ఆకులు, కొమ్మల చివర తొడిమలు, పూలు అక్కడక్కడ వెదజల్లినట్లు ఉంటాయి. పెచ్చుగల కాయల నిండా ఈనెలు గల పులుపు గుజ్జు, ముదురు గోధుమ రంగులో ఉండి, 3–12 గింజలుంటాయి. కాయ నవంబరు, డిసెంబరులో పండుతుంది.

నర్సరీ తయారి : విత్తనాలను జనవరి–ఫిబ్రవరి నెలల్లో సేకరించుకొని, ఒక సంవత్సరం వరకు నిల్వ వుంచుకోవచ్చు. కిలో బరువుకు 1800 నుండి 2000 గింజలుంటాయి. విత్తనాలను చల్లని నీటిలో 24 గం॥లు నానబెట్టి 5” × 9” సంచుల్లో నాటాలి. వారం రోజుల్లో విత్తనం మొలకెత్తుతుంది. ఫిబ్రవరిలో విత్తినట్లయితే, జూలై నెలకు మొక్కలు నాటటానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి.

నాటే సమయం : జూన్–జూలై మాసాలు అనుకూలం. నీరున్నచోట్ల సెప్టెంబరు వరకు నాటుకోవచ్చు.

నాటటం : ఎకరాకు 40 (10 మీ. × 10 మీ.) నుండి 50 (9 మీ. × 9 మీ.) మొక్కలు వరకు నాటుకోవచ్చు. చింత అంట్లు కూడా నాటుకోవచ్చు. రోడ్ల ప్రక్కన 10 మీ. – 12 మీ. ఎడంలో నాటుకోవాలి. ఒక సంవత్సరం వయసు కలిగిన మొక్కలను రోడ్ల వెంట వర్షాకాలం ఆరంభంలో నాటాలి.

అంతర కృషి : మొక్కలు పెట్టే ముందు నేలను లోతుగా దున్నుకోవాలి. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలంలో లోతుగా దున్నినట్లయితే కలుపు నివారణేగాక వర్షపు నీరు భూమిలో నిలువ వుండి మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి.

నీటి యాజమాన్యం : నీరువున్న ప్రదేశాలలో మొదటి వేసవి కాలంలో మొక్కలకు 3 వారాలకోసారి నీటితడి ఇవ్వాలి.

అంతర పంటలు: మొదటి 4, 5 సంవత్సరాల వరకు వ్యవసాయ పంటలు లాభసాటిగా పెంచుకోవచ్చు. చెట్లు బాగా పెరిగాక పశుగ్రాస పైర్లను పెంచుకోవచ్చు.

దిగుబడి : 7–8 సంవత్సరాల నుండి చెట్టు కాపుకొచ్చినప్పటికీ 15వ సం॥ నుండి అధిక దిగుబడినిస్తుంది. చెట్టుకు 30–40 కిలోల కాయ దిగుబడినిస్తుంది.

ఉపయోగాలు : బాటల ప్రక్కన నాటేందుకు, చింతపండుకు, కలపకు, వంట చెఱకుకు అనువైన చెట్టు. దీని వలన వచ్చే బొగ్గు కంసాలులు వాడతారు. కలప గట్టిది కావున పనిముట్లు, రోకళ్ళు, గానుగలు తయారుచేస్తారు. నిస్సారవంతమైన, తక్కువ తేమగల ప్రాంతాల్లో పెరగగలదు.

ప్రత్యేక వివరాలు : ఏ ఖర్చు లేకుండానే చెట్టుకు రూ. 1000/– దిగుబడి వస్తుంది. రెండు సం॥ల కొకసారి చొప్పున 80 సంవత్సరాలు కాస్తుంది. 15 సం॥ల వయసు గల చెట్టు సగటున 220 కిలోల పండిన కాయలనిస్తుంది. దీనిలో 55 శాతం గుజ్జు, 34 శాతం గింజలు ఉంటాయి. గింజలు పిండి పదార్థాలకు చౌక ప్రత్యామ్నాయం, వాటిని సరిచేసి నూలు, జనుపనార, ఉన్ని లాంటి వాటికి పూస్తారు.

వేప

వేప శాస్త్రీయ నామం 'అజాడిరక్టా ఇండికా'. వేప వంట చెరుకుగాను, పశుగ్రాసంగాను, పనిముట్లకు కలపగాను మరియు క్రిమిసంహారక మందుగాను ఉపయోగపడుతుంది.

నేలలు: ఎటువంటి నేలలోనైనా పెరుగుతుంది. రాతి నేల, లోతు తక్కువ నెలల్లో కూడా పెరుగుతుంది. ఇసుక నేలలు, నీరు నిలువ వుండే నేలలు, నీటి ముంపుకు గురయ్యే నేలలు, చౌడు భూములు అనుకూలం కావు. ఉదజని సూచిక 6.2-8.0 వరకు వున్న భూముల్లో బాగా పెరుగుతుంది.

వాతావరణం : సముద్ర మట్టానికి 50-1500 మీ. ఎత్తు వున్న ప్రాంతాలలో వేప ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. వర్షపాతం సంవత్సరానికి 450-1200 మి.మీ. వరకు అవసరమవుతుంది. దీర్ఘ వర్షాభావ పరిస్థితులను కూడా తట్టుకుంటుంది.

ప్రవర్ధనం : విత్తనం ద్వారా ప్రవర్ధనం చేయవచ్చు. విత్తనాలు మొలక శక్తిని 2-3 వారాలలో కోల్పోతాయి. కాయలు పండుటకు కొద్ది రోజుల ముందే, పసుపు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నప్పుడు కొమ్మలను విదిల్చి రాల్చి ఏరాలి. విత్తనాలను కాయల నుంచి వేరుచేసి, నీటిలో కడిగి, 4-5 రోజులు ఆరబెట్టాలి. విత్తనాలను నేరుగా నాటిగాని, నారు పెంచిగాని లేదా పాలీథీన్ సంచుల్లో పెంచిగాని నాటవచ్చు. విత్తనాలు 1-2 వారాలలో మొలుస్తాయి. మొక్కలు 15-30 సెం.మీ. పెరిగిన తర్వాత పొలంలో కావల్సిన చోట నాటుకోవచ్చు.

నాటే దూరం, అంతర పంటలు : నేల స్వభావం, ప్రాంతం యొక్క వాతావరణాన్ని బట్టి మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 6 నుండి 8 మీ. దూరంలో, మొక్కల మధ్య వరుసలలో 6 నుండి 8 మీ. దూరంలో నాటుకోవచ్చు. మొదటి సంవత్సరం మొక్కలు ఎక్కువ కాలం నీటి ఎద్దడికి గురికాకూడదు. మొదటి సంవత్సరం పెరుగుదల తక్కువ. రెండవ సంవత్సరం నుంచి పెరుగుదల రేటు అధికంగా వుంటుంది. చెట్లు పూర్తిగా పెరుగుటకు 8-10 సంవత్సరాలు పడుతుంది. చెట్ల మధ్యన తక్కువ కాలపరిమితిగల ఆహార ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, అలాగే కూరగాయలు పండించుకోవచ్చు.

దిగుబడి : వేప మొక్క వేసిన 3-5 సంవత్సరాలు తర్వాత కాపునిచ్చినా 10 సంవత్సరాల తర్వాత గాని లాభసాటి దిగుబడి రాదు. 10 సంవత్సరాలు ఆపైబడిన చెట్టు సంవత్సరానికి 50-100 కిలోల కాయలు కాస్తుంది. విత్తనం కాయ బరువులో 60 శాతం వరకు ఉంటుంది. ప్రతి కిలో విత్తనం నుండి 200 గ్రా. నూనె, 800 గ్రా. చెక్క (పిండి) వస్తుంది. కిలో విత్తనాల ధర రూ. 4-5/- ఎకరాకు 80-100 చెట్ల నుండి విత్తనం ద్వారా 16 వేల మించి ఆదాయం వస్తుంది. పెరిగిన చెట్ల నుండి ఎకరాకు 16 టన్నుల వరకు కలప లభిస్తుంది. టన్ను ఒకటికి రూ. 1000 చొ॥న 40 వేల వరకు కలప మీద ఆదాయం వస్తుంది.

ఉపయోగాలు : వేప నూనె క్రిమిసంహారక మందుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటివరకు వేపనూనె నుండి 60 రకాలయిన క్రిమిసంహారక మూల పదార్థాలను వేరు చేయడం జరిగింది. అవి మెలామిన్ ట్రియాల్, సెలవిన్, అజాడిరాక్టిన్ వేప నూనెను సబ్బులు, ఔషధాల తయారీలో వాడతారు. వేప కాండం, ఆకులు, ఫలాలు, వేర్లు, పూలు, విత్తనాలు, బెరడులను యునాని ఆయుర్వేదం వైద్యాలలో వాడతారు. వేప ఆకులు పశుగ్రాసంగా ఉపయోగ

పడగాయి. మేకలు వేపను ఇష్టంగా తింటాయి. నాణ్యమైన కలపనిస్తుంది. దీనిలో కీటక నాశిని రసాయనాలు ఉండటం వలన దీనికి పుచ్చు పట్టడంగాని చెదలు పట్టడం గాని జరుగదు. వేప కాండం నుండి బంక కూడా లభిస్తుంది. దీనిని ఈస్ట్ ఇండియాగమ్ అని అంటారు.

వేప విత్తనాలలో అజాడిరక్టిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉంటుంది. దీని వలన వేపకు క్రిమి సంహారక శక్తి మరియు ఇతర ఔషధ గుణాలు వస్తాయి.

బంజరు భూముల్లో సామాజిక అడవుల పెంపకం

ఏ ప్రాంతంలోనైనా సాగులో లేని చౌడు, రాతి, నీటి ముంపునకు మరియు నీటి కోతకు గురి అయ్యే భూములను బంజరు భూములుగా పరిగణించవచ్చు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో వీటి విస్తీర్ణం 159 మి.హె. ఇలాంటి భూముల్లో నేల రకాన్ని బట్టి మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి సరియైన మొక్కలను ఎంచుకొని సాంకేతిక యాజమాన్య పద్ధతులతో పెంచితే ఆయా భూముల దిగజారిన భూసార పరిస్థితిని పునర్నిర్మించవచ్చు.

ప్రస్తుత పరిస్థితి : ప్రస్తుత అంచనాలను బట్టి భారతదేశంలో అడవులు 78.9 మిలియన్ల హెక్టార్లలో విస్తరించివున్నాయి. వాతావరణ సమతుల్యాన్ని రక్షించడానికి అడవుల విస్తీర్ణం, భూభాగంలో 33 శాతం ఉండవలసి ఉన్నది. కానీ వీటి విస్తీర్ణం ఇప్పుడు భూభాగంలో 24.0 శాతం మాత్రమే ఉన్నది. బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే సాలీనా మన దేశంలో 47,500 హెక్టార్లలో అడవులు నరకబడుతున్నాయని అంచనా. ఇంత విస్తీర్ణంలో అడవులు నరకడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి. అధిక శాతం గ్రామీణ ప్రజలు వంట చెరుకు కోసం అడవులపై ఆధారపడటం వలన దేశంలో వాడుతున్న వంట చెరుకులో 75 శాతం అడవుల నుండి మాత్రమే సేకరించబడుచున్నది. నిషిద్ధమయిన అడవుల్లో పశువుల సంచారం కూడ వాటి నాశనానికి తోడ్పడుతున్నది.

అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గడం వలన ఆయా నేలలు నిస్సారమగుచున్నాయి. ఈ విధంగా నిర్వీర్యమైన అడవుల మూలంగా వంట చెఱకు కొరత ఏర్పడటమే గాక పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడు కలపకు కూడా కొరత ఏర్పడుచున్నది. అంతేగాక, దీని మూలంగా వాతావరణం కూడా కలుషితమవుతున్నది.

సామాజిక అడవుల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం

సామాజిక అడవుల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం సామాజిక ప్రయోజనం సాధించుటయే గాక మానవతా ఉద్దేశ్యం కూడా కలిసి ఉన్నది. దేశంలో పశువుల మేత, వంట చెరుకు మరియు కలప అవసరాల్లో స్వయం సమృద్ధిని సాధించటం. అటవీ ఉత్పత్తుల మూలంగా ఉద్యోగ అవకాశాలను పెంచి తద్వారా గ్రామీణ రుగ్మతలను నివారించటం. ప్రజల్లో చెట్ల పెంపకాన్ని గురించిన చైతన్యం తీసుకొని రావటం. ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించడంలో ఉపయోగపడే చెట్లను పెంచడంలో ప్రజలకు సహాయ పడటం. గ్రామీణ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి వివిధ అటవీ వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించటం. పట్టణాల్లో చెట్ల పెంపకం ద్వారా నానాటికీ పెరిగిపోతున్న కాలుష్య నివారణకు దోహదపడటం. అనుబంధ పరిశ్రమలకు కావలసిన ముడి పదార్థాలను సరఫరా చేయటం. నిరుపయోగమయిన క్షార భూములను వ్యవసాయ యోగ్యం చేయటం. నేల కోతకు గురయిన భూముల్లో చెట్లు పెంచి వాటిని వ్యవసాయ యోగ్యం చేయటం.

సామాజిక అడవుల అంతర్భాగాలు

1. **అటవీ క్షేత్రాలు :** వ్యవసాయ భూముల గట్లపైన మరియు ఇతర వ్యవసాయేతర భూముల్లోను చెట్లు పెంచటం.
2. **గాలి అడ్డంకులు :** పెనుగాలులు వీచేటపుడు సారవంతమైన పైమట్టి కొట్టుకొని పోకుండా నివారించవచ్చు. వీటి ద్వారా భూసారాన్ని పరిరక్షించవచ్చు.
3. **అటవీ వ్యవసాయం :** పంటల వ్యవసాయంతో చెట్ల పెంపకాన్ని జతపరచి వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి వలన పంటల నుండి ఆదాయమేగాక, చెట్ల నుండి కూడా వివిధ రకాల లాభాలను పొందవచ్చు.
4. **చెట్లు-పశుగ్రాస వ్యవసాయం :** చెట్లను మరియు పశుగ్రాస మొక్కలను జతపరిచి పెంచటం. దీని వలన కూడా బహుళ ప్రయోజనం ఉంది.
5. **పట్టణ అడవులు :** చెట్లను పట్టణ ప్రాంతాల్లో పెంచి, తద్వారా పట్టణాలకు శోభను చేకూర్చి వాతావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించటం.
6. **మనోల్లాస అడవులు :** చెట్లు పెంచడం ద్వారా ప్రజలకు వినోదాన్ని, ఉల్లాసాన్నిచ్చే విధంగా పర్యాటక ప్రదేశాలను అభివృద్ధి చేయటం.

చెట్ల పెంపకంలో కొన్ని సాంకేతిక సూచనలు

ముందుగా చెట్లు నాటవలసిన బంజరు భూముల్లోగల వివిధ రకాలైన ముళ్ళ పొదలను, కలుపు మొక్కలను, శుభ్రం చేసి వీలయిన చోట్ల దున్నాలి. మొక్కలు నాటటానికి ముందు మే-జూన్ మాసాల్లో ఎన్నుకొన్న భూముల్లో గుంతలు (30 × 30 × 45 సెం.మీ.) త్రవ్వుకోవాలి. ఎకరాకు ఎన్ని గుంతలు తీయాలన్నది పెంచే మొక్కలను బట్టి ఉంటుంది.

ప్రతి గుంత సుమారుగా ఎటుచూసినా 2 నుండి 4 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. త్రవ్విన ప్రతి గుంతలో 4 కిలోల పశువుల ఎరువు, తగినంత నల్లమట్టి, వీలయినచోట్ల అరకిలో వేపపిండి, 50 గ్రా. డి.ఎ.పి. మరియు 50 గ్రా. 3 శాతం లిండేన్ కలిపి వేయాలి. తదుపరి జూన్-జూలై మాసాల్లో ఎన్నుకొన్న మొక్కలను నాటాలి.

మొక్కలను నాటిన తర్వాత తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

ఎరువులు : వర్షాకాలంలో వర్షం కురిసిన తర్వాత మొక్కకు 100 గ్రా. చొప్పున డి.ఎ.పి. రెండుసార్లు మొదట జూలైలోను, ఆపైన డిశంబరులోను వేయాలి. మొదటి రెండు సంవత్సరాలు వేస్తే సరిపోతుంది.

- **నీటియాజమాన్యం :** చెట్లు నాటిన మొదటి సంవత్సరం బెట్ట 2 లేక 3 వారాలు ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా నీరు పెట్టాలి. కుండలతో నీరు పోయటం ద్వారా నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోవచ్చు. మొక్కలు పెట్టిన మొదటి వేసవి కాలంలో 15 నుండి 20 రోజులకొకసారి 7 నుండి 8 సార్లు అవసరాన్ని బట్టి నీరు పోయాలి. ఈ విధంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటే ఎక్కువ శాతం మొక్కలు బ్రతికి చెట్ల పెంపకం లాభసాటిగా ఉంటుంది.
- **కలుపు తీయటం :** మొక్కలు ఏపుగా పెరగటానికి కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి. మొక్కల మొదళ్ళలో కలుపు మొక్కలను 2 నుండి 3 సార్లు తీసి పాదులుచేసినట్లయితే మొక్కలు ఏపుగా పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది.

- **కొమ్మలు కత్తిరించటం :** బాల్యదశలో పిల్లలకు క్రమశిక్షణ అలవర్చినట్లు, చిన్నగా ఉన్న మొక్కల ప్రక్క కొమ్మలను తగిన రీతిలో కత్తిరించి పెంచినట్లయితే చెట్లు పెరిగిన కొద్ది నిటారుగా పెరుగుతాయి.
- **తేమ నిలువ చేసే పద్ధతులు :** అడవులను పెంచే భూముల్లో అధికశాతం తేలిక నేలలు మరియు నిస్సారవంత మయిన భూములు కనుక, వాటిలో తేమ ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండదు. కనుక తేమ ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంచే పద్ధతులు పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది. మనకు చౌకగా లభించే వరిపొట్టు ద్వారానూ, జలశక్తి అనే రసాయనం లేదా మట్టికుండల ద్వారా నీరు బొట్లుగా పడేటట్లు చేయటం ద్వారా తేమ అధిక శాతంలో ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉండేటట్లు చేయవచ్చు.

వరిపొట్టు అతి చౌకగా లభించటం వలన దీనిని మొక్కల మొదళ్ళలో 8 సెం.మీ. మందంలో వేయాలి. అట్లా చేయటం ద్వారా తేమ ఎక్కువకాలం నిలువ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వరిపొట్టు వేసిన మొక్కలకు 3 వారాలకు ఒకసారి నీరు పోయాల్సి ఉంటుంది. వరిపొట్టు వేసే ముందు చెదలు పట్టకుండా 50 గ్రా. 3 శాతం లిండేన్ పొడిని పాదుల్లో తప్పనిసరిగా వేయాలి. వరిపొట్టు వేయటం ద్వారా తడి నిలవ ఉంచడమే గాక కలుపు మొక్కలను అతి సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. అంతేగాక ఈ వరిపొట్టు మలి సంవత్సరానికి కుళ్ళి నేలలో సేంద్రీయ పదార్థ పరిమాణం పెరగటానికి తోడ్పడుతుంది.

జీవ ఇంధన వృక్షాలు - వాటి పెంపకం

జట్రోఫా (లేదా) అడవి ఆముదం

జట్రోఫా కర్కస్-అమెరికాలోని ఉష్ణమండల ప్రాంతానికి చెందిన చిన్నపాటి పొదలాంటి చెట్టు. ఇది విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెరుగుతుంది. మనరాష్ట్రంలో జట్రోఫా తూర్పుకనుమల్లో సహజసిద్ధంగా కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో గల కొండ ప్రాంతాల్లో కనబడుతుంది.

ఉపయోగాలు : జట్రోఫా గింజలనుండి తీసిన నూనెను కొవ్వొత్తులు, సబ్బులు, వార్నిష్‌ల తయారీ పరిశ్రమల్లో వాడతారు. ఈ నూనెను జీవ ఇంధనంగా తయారు చేసినట్లయితే డీజిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా వుపయోగపడుతుంది. చెట్టు బెరడులోనుండి వచ్చే పాలలాంటి ద్రవంలో జట్రోపిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ క్యాన్సర్ చికిత్సకు వుపయోగపడుతుంది. దీనిని చర్మరోగాల నివారణకు, రూమాటిజం, పశువుల గాయాల నివారణకు కూడా వుపయోగిస్తారు. వేళ్ళను పాముకాటుకు మందుగా ఉపయోగిస్తారు. జట్రోఫా విత్తనాల ద్వారా నూనెతీసిన తర్వాత మిగిలిన చెక్కలో నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం ఎక్కువ శాతం వుంటాయి. కాబట్టి సేంద్రీయ ఎరువుగా వుపయోగపడుతుంది. జట్రోఫా ఆకులను టస్సర్ పట్టు పురుగులకు ఆహారంగా వుపయోగిస్తారు.

లక్షణాలు : చిన్నపాటి పొద. సుమారు 3-5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. మంచిసారవంతమైన భూముల్లో, సరిపడినంత నీటి పారుదలవున్న నేలల్లో 8-10 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. బెరడు బూడిద రంగులో వుండి, దీని మీద గాటు పెట్టినపుడు తెల్లటి పాలలాంటి ద్రవం కారుతుంది. వీటి ఆకులు 3-5 భాగాలుగా విస్తరించి లేత ఆకుపచ్చ నుండి ముదురు ఆకుపచ్చరంగులోకి మారుతాయి. ఆకుకాడ పొడవు 6-23 మి.మీ. వుంటుంది. కొమ్మ చివరలో పూలగుత్తులు వుంటాయి. ఆకురాలే కాలంలో (చలికాలం) కాయలు కాయడం

మొదలవుతుంది. ఎక్కువ వేడి వున్న ప్రదేశాల్లో తేమ వున్నప్పుడు ఎక్కువసార్లు కాపుకొచ్చే ఆస్కారం వుంది. వర్షాధార పరిస్థితుల్లో ఒక్కో పూలగుత్తి నుండి సుమారు 10 కాయలు కాస్తాయి. అదే పరిమిత నీటి వసతి వున్న ప్రదేశాల్లో ఒక్కో పూలగుత్తి నుండి 20–25 కాయలు కాసేవీలుంది. ఒక్కోకాయలో 2–3 గింజలుంటాయి. కాయలు ఆకుపచ్చరంగు నుండి ముదురు పసుపురంగుకు, ఆపై నల్లరంగుకు మారినప్పుడు విత్తనాలు తయారయినట్లు భావించాలి. విత్తనం అభివృద్ధి చెందటానికి 2–4 నెలలు పడుతుంది. విత్తనాలు ఆముదం విత్తనాలను పోలివుండి పైపొర నల్లగా వుంటుంది.

వాతావరణం : అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెరుగుతుంది. వర్షాభావ పరిస్థితులను కూడా తట్టుకొంటుంది. వర్షపాతం సుమారు 400–900మి.మీ. వుండాలి. ఎక్కువ వర్షపాతం వున్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది.

నేలలు: ఇసుక, గట్టి ఎర్రనేలలు, బంజరు భూముల్లో బాగా పెరుగుతాయి. లోతైన నేలలు బాగా అనుకూలం.

పునరుత్పత్తి : విత్తనాలు లేదా కాండపు ముక్కల ద్వారా పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు. కాండపు ముక్కల ద్వారా వచ్చిన మొక్కలకు తల్లివేరు వుండదు. పక్క వేళ్ళుంటాయి. కాబట్టి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పెరుగుదల తగ్గుతుంది.

నర్సరీ యాజమాన్యం : నాణ్యమైన విత్తనాలను ముందుగా సేకరించాలి. నర్సరీ మొక్కలు పెంచడానికి 9" × 5" సైజు కలిగి 200 గేజీ పాలిథీన్ సంచులు అనుకూలం. ఈ సంచుల్లో 3:2:1 నిష్పత్తిలో మట్టి, ఇసుక, పేడ, ఎరువుల మిశ్రమాన్ని జల్లెడపట్టి నింపాలి. సంచులను వరుసల్లో అమర్చి నీటితో తడపాలి. నీరు అడుగువరకు చేరాలంటే 4, 5 సార్లు తడపాలి. జట్రోఫా విత్తనాలను ముందుగా చల్లని నీటిలో 12 గంటలు నానబెట్టి బరువుగా వున్న వాటినే ఎంపిక చేయాలి. ఫిబ్రవరి–మార్చి మాసాల్లో ఒక్కో సంచిలో 2 గింజలను సుమారు 2 సెం.మీ. లోతుగా వేసి మట్టిని కప్పాలి. విత్తిన మొదటి వారం రోజుల్లో 2 సార్లు నీరు పోయాలి. 5–6 రోజుల్లో విత్తనం మొలకెత్తుతుంది. తర్వాత 4వ వారం వరకు రోజుకోసారి నీరు పోయాలి. 2వ నెల నుండి 2 రోజులకోసారి నీరు పోయాలి. మొక్కలు సాధారణంగా 3–4 నెలల కాలంలో 35–45 సెం.మీ. ఎత్తు వరకు పెరుగుతాయి. మొక్కలు పెరిగే దశలో సంచుల క్రింద నుండి వేర్లు వచ్చినపుడు వాటిని కత్తిరించి యధాతధంగా వరుసల్లో అమర్చుకోవాలి. ఆపై 10–15 రోజులకు మొక్కలను పొలంలో నాటుకోవచ్చు. అలాగే కొమ్మ కత్తిరింపులను కూడా సంచుల్లో పెట్టి రోజూ నీరు ఒకసారి పోయాలి. కొమ్మల కత్తిరింపుల ద్వారా మొక్కలు 3 నెలలకు తయారవుతాయి. మొక్కలు జూన్ మాసానికల్లా తయారయి నాటటానికి సిద్ధమవుతాయి.

పొలాన్ని తయారు చేయడం : జట్రోఫాను బంజరు భూముల్లో పెంచుతాము కాబట్టి ముందుగా పొలంలో వున్న ముళ్ళ పొదలను శుభ్రం చేయాలి. ఆపై వాలుకడ్డంగా లోతుగా పొలాన్ని దున్నాలి. దీని మూలంగా నేలగుల్లబారి, వర్షపునీరు లోపలికి ఇంకుతుంది.

గుంతలను త్రవ్వడం : గుంతలను 30×30×45 సెం.మీ. పరిమాణంలో త్రవ్వుకోవాలి. వర్షాధారంగా సాగు చేసేటప్పుడు 2×2 మీ. దూరంలో గుంతలు తీసి హెక్టారుకు 2500 మొక్కలు నాటాలి. అదే గనుక మధ్యలో అంతర పంటలు వేయాలనుకొంటే హెక్టారుకు 1666 మొక్కలు అంటే 3×2 మీ. దూరంలో నాటాలి. అదే పొలంగట్ల మీద వేయాలనుకొంటే 3 మీ. దూరంలో మొక్కలను నాటాలి. నీటి వసతి వున్నచోట్ల 3×2 మీ. దూరం అనువైనది.

మొక్కలు నాటడం : ముందుగా గుంతలను 3 కిలోల పేడ ఎరువు, 50 గ్రా డి.ఏ.పి. ప్రతి గుంతకు వేసి మట్టితో నింపాలి. మొక్కలను గుంతకొకటి చొప్పున వర్షాకాలంలో నాటాలి.

నీటి యాజమాన్యం : నాటిన తర్వాత వర్షం వచ్చినట్లయితే నీరు పోయాల్సిన అవసరం వుండదు. వర్షంలేక పోతే ఒకసారి నీటి తడిని ఇవ్వాలి. నీటి వసతి వున్న చోట్ల 3 వారాలకోసారి నీటి తడినివ్వాలి. మొదటి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో నీటి తడిని తప్పని సరిగా నెలకోసారి ఇవ్వాలి.

అంతరకృషి : మొదటి సంవత్సరం మొక్కలు నాటాక వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టేటప్పుడు ఒకసారి లోతుగా మొక్కల మధ్య దున్నాలి. దీనివలన కలుపు మొక్కల నాశనమవడమే కాక చివరి వర్షపు నీరు కూడా భూమిలోనికి ఇంకి తర్వాత వచ్చే వేసవికాలంలో నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొంటుంది.

అంతర పంటలు : మొదటి 2, 3 సంవత్సరాలు, వ్యవసాయ పంటలను (పెసలు, మినుములు, ఉలవలు, అలసందలు) లను లాభసాటిగా పెంచుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత జట్రోఫా చెట్ల నీడ వలన పంటలు పెరగవు. అప్పుడు స్టైలో అనే పశుగ్రాస పంటను వేసుకోవచ్చు.

సస్యరక్షణ : మామూలుగా జట్రోఫా మొక్కలకు చీడపీడల బాధ అంత ఎక్కువగా వుండదు, చీడపీడలకు అనువైన వాతావరణంలో రసం పేల్చే పురుగులు, అలాగే కాయతొలుచు పురుగులు ఆశించవచ్చు. వీటి నివారణకు లీటరు నీటికి 1.5 మి.లీ. డేసిస్‌ను కలిపి పిచికారీ చేయాలి. చలికాలంలో బూడిద తెగులు ఆశించే వీలుంది. దీని నివారణకు లీటరు నీటికి 0.5 నుండి 1 మి.లీ. హెక్సాకొనాజోల్ (కాంటాఫ్) లేదా డైనోకాప్ (కేరథేన్) కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పంట దిగుబడి : వర్షాధార పరిస్థితుల్లో 3వ సంవత్సరం నుండి దిగుబడి మొదలయినప్పటికి 6వ సంవత్సరానికి గాని పూర్తిస్థాయి విత్తనోత్పత్తి జరుగదు. నీటి వసతి వున్నచోట్ల 2వ సంవత్సరం నుండి దిగుబడి మొదలయినప్పటికి 5వ సంవత్సరానికి పూర్తిస్థాయి విత్తనోత్పత్తి జరుగుతుంది. వర్షాధారంగా వేసుకొన్నప్పుడు 6వ సంవత్సరానికి హెక్టారుకు 4 టన్నుల గింజలు వస్తాయి. అదే నీటివసతి వున్నప్పుడు 6వ సంవత్సరానికి హెక్టారుకు కనీసం 5–6 టన్నుల గింజలు వస్తాయి. కిలో విత్తనాలకు షుమారు 1700 నుండి 1800 గింజలుంటాయి. వర్షాధారంగా వేసుకొన్నప్పుడు, పూత వచ్చాక మరియు ఆపై గింజతయారయ్యేటప్పుడు వర్షం వున్నట్లయితే 2 రెట్ల దిగుబడి వస్తుంది. 15–20 సంవత్సరాల వరకు మంచి దిగుబడి వస్తుంది.

నూనె దిగుబడి : గింజల్లో 29–35 శాతం నూనె వుంటుంది. నీటి వసతి వున్నప్పుడు హెక్టారుకు 1500 నుండి 1600 కిలోల నూనె వస్తుంది.

ఖర్చు– విశ్లేషణ : హెక్టారుకు వర్షాధారంగా – ఖర్చు 24 వేలు, ఆదాయం 38 వేలు, నికరాదాయం 14 వేలు అలాగే నీటివసతి క్రింద – ఖర్చు 30 వేలు, ఆదాయం 48 వేలు మరియు నికరాదాయం 18 వేల రూపాయలు వస్తుంది. (కనీస మద్దతు ధర టన్నుకు 6 వేల రూపాయలు ప్రకటించిన ఎడల).

కానుగ

మన రాష్ట్రంలో కానుగ మొక్కలు ముఖ్యంగా విజయనగరం, శ్రీకాకుళం మరియు చిత్తూరు జిల్లాల్లో విస్తారంగా వున్నాయి.

ఉపయోగాలు : దీనిని వంట చెఱకుగా వుపయోగించవచ్చు. కిలో వంట చెఱకు నుండి 4,600 కి. క్యాలరీల శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీని కలప గట్టితనాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల బండి చక్రాలు మరియు ఫర్నీచర్ తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది. కలప గుజ్జును కాగితం తయారీకి, చెట్టు బెరడుతో తాళ్ళు, ఆకులను పశువుల జీర్ణశక్తిని పెంచడానికి మేతగా వాడవచ్చు. వరి, కాఫీ, వక్క, చెఱకు మరియు వివిధ పంటలకు పచ్చిరొట్టలా వేసుకోవచ్చు. దీని ఆకులను పచ్చిరొట్టలా వాడినప్పుడు టమాట పంటలో నులి పురుగుల నివారణ జరుగుతుంది. నిల్వ వుంచిన ధాన్యం నాణ్యత కోల్పోకుండా, ఎండిన ఆకులను వేసి పురుగుల బారి నుండి కాపాడుకోవచ్చు. నీటి ఎద్దడి ప్రాంతాల్లో దీని పచ్చి కాయలను పశువుల మేతగా వేసుకోవచ్చు. మహారాష్ట్రలో పచ్చి కాయలను పశువుల మేతగా వాడుతున్నారు. గింజల్లో వంటకు పనికిరాని నూనె 30 నుండి 40 శాతం వుంటుంది. దీని నూనెను సబ్బులు, వార్నీష్, రంగుల తయారీల్లో మరియు జీవ ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు. నూనె తోళ్ళ పరిశ్రమకు ఉపయోగపడుతుంది. మనుషులు, జంతువులకు వచ్చే చర్మవ్యాధుల నివారిణి (సూక్ష్మక్రిముల సంహారిణి)గా నూనెను వాడుకోవచ్చు. ఇది మంచి జీవ ఇంధనం, దీపాలని వెలిగించడానికి, ఇంజన్ మరియు ట్రాక్టర్‌లకు ఇందనంగా వుపయోగపడుతుంది. విత్తనంలో నూనెని తీసిన తర్వాత మిగిలిన చెక్కను ఎరువుగా వాడవచ్చు. చెక్కను కోళ్ళ దాణాలో కలిపి కోళ్ళకు ఆహారంగా కూడా వాడవచ్చు.

భౌతిక స్వరూపం : చెట్టు మధ్యస్థంగా పెరుగుతుంది. పైభాగం గుబురుగా, శాఖలు చాలా బలంగా పెరుగుతాయి. ఆకులు రాలుతాయి. బెరడు పలుచగా, మృదువుగా, పసుపు మరియు బూడిద రంగులు కలిగి ఉంటుంది. అసమాన సంయుక్త పత్రాలు కలిగి వుంటుంది. ఆకులు అభిముఖంగా ఉండి 2–3 జతలుగా శక్తివంతంగా పెరిగి కోడిగ్రుడ్డు ఆకారాన్ని పోలి వుంటాయి.

పూత, కాపు : ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకు పూతకొస్తాయి. పూలు తెలుపు, వంగ రంగుల్లో పూస్తాయి. రక్షణ పత్రాలు గిన్నె ఆకారంలో, ఆకర్షక పత్రాలు ఎరుపురంగులో వుండి, కాయ దీర్ఘచతురస్రాకారంగా మందంగా కొద్దిగా గట్టిగా వుండి చిన్నముక్కు కలిగి వుంటుంది. కాయలు డిసెంబర్, జనవరి మాసాల్లో పండుతాయి. కాయల్లో 1 లేక 2 విత్తనాలు ముడుచుకుని వుంటాయి. విత్తనాలు ఎరుపు, గోధుమ రంగుల్లో వుంటాయి.

చెట్టు లక్షణాలు : నీటి ఎద్దడిని, మంచును తట్టుకొని మధ్యస్థంగా పెరుగుతుంది. అధికంగా పిలకలు వేస్తుంది. నీడను బాగా తట్టుకొంటుంది. చౌడు భూముల్లో సైతం బాగా పెరుగుతుంది.

వాతావరణం: విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెరుగుతుంది. 1 నుండి 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకొని, సముద్ర మట్టానికి 1200 మీటర్ల ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో మరియు సంవత్సరానికి 500 నుండి 2500 మి.మీ. వర్షపాతం కల ప్రాంతాల్లో కూడా పెరుగుతుంది. నీటి ఎద్దడిని తట్టుకొని ప్రతికూల ప్రదేశాల్లో పెరుగుతుంది.

నేలలు : ఇసుక, నల్లరేగడి, చౌడు, క్షార భూముల్లో బాగా పెరుగుతుంది. లోతైన, తేమ ఎక్కువగా వుండే భూములు అనువైనవి.

పునరుత్పత్తి : విత్తనాలు లేదా కాండపు ముక్కలు మరియు పిలకల ద్వారా పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు. అంటు కట్టటం ద్వారా కూడా పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు.

మొక్కలను పెంచడం :

విత్తన సేకరణ : డిసెంబర్ – జనవరి నుండి మే వరకు పండిన కాయలను సేకరించి భద్రపరచుకోవాలి.

విత్తటం : విత్తనాలను నారుమడుల్లో విత్తటం మంచిది. 15×20 సెం.మీ. దూరంలో, 1.5 నుండి 2 సెం.మీ.లోతుగా విత్తాలి. ఇవి సంవత్సరం వరకు మొలిచే శక్తి కలిగి, ఎక్కువ మొలక శాతం కలిగి ఉంటాయి. తాజా విత్తనాలతో మంచి ఫలితాలుంటాయి. విత్తనాలను 9" × 5" సైజు కలిగిన 200 గేజీ పాలిథీన్ సంచుల్లో నాటాలి లేదా నారుమడిలో మొలచిన మొక్కలను నెలరోజుల తర్వాత సంచుల్లోకి మార్చుకోవాలి.

విత్తే సమయం : మే, జూన్ మాసాలు విత్తడానికి మంచి సమయం. ఋతుపవనాల ఆరంభదశలో విత్తనాలను విత్తవచ్చు. విత్తిన తర్వాత నారుమళ్ళలో గాని, సంచులకు గాని నీరు పోయాలి. సాధారణ పరిస్థితుల్లో విత్తనాలు 10 నుండి 15 రోజుల్లో మొలకెత్తుతాయి. ప్రతి 2 రోజులకోసారి నీరు పోయాలి. విత్తిన తర్వాత 10 నుండి 12 నెలల్లో మొక్కలు నాటడానికి సిద్ధమవుతాయి.

కాండపు ముక్కల ద్వారా మొక్కల పెంపకం : జనవరి – ఫిబ్రవరి మాసాల్లో కాండపు ముక్కలను సేకరించాలి. కాండపు ముక్కలను 25 సెం.మీ. పొడవు, 1–1.5 సెం.మీ. వ్యాసం కలిగినవిగా తయారు చేసుకొని పాలిథీన్ సంచుల్లో నాటుకోవాలి. కాండపు ముక్కలను 10 నిమిషాలు, 3000 పి.పి.యమ్. ఐ.బి.యం. ద్రావణంలో త్వరగా ముంచి తీసే విధానం ద్వారా శుద్ధి చేసుకోవాలి. వేళ్ళకు ప్రతి 2 రోజులకోసారి నీరు పోయాలి. 8 వారాల వ్యవధిలో 50 నుండి 75 శాతం వృద్ధి అయి, వేరు నిర్మాణం పూర్తి అవుతుంది. పాలథీన్ సంచుల్లో నాటిన కాండపు ముక్కలను నీడలో 3 వారాల పాటు పాక్షికంగా వుంచి అటు తర్వాత సూర్యరశ్మిలో వుంచాలి. ఈ విధంగా పెరిగిన మొక్కలను వర్షాకాలంలో నాటుకోవాలి. పిలకలతో మొక్కల తయారీ చేపట్టవచ్చు. వేర్లతో పాటు పిలకలను నేరుగా లేదా పాలిథీన్ సంచుల్లో పెంచిన మొక్కలను వర్షాకాలంలో నాటవచ్చు.

అంటు మొక్కల తయారీ : ముందుగా కానుగ మొక్కలను పాలిథీన్ సంచుల్లో 5, 6 నెలలు పెంచాలి. ఆ తర్వాత బాగా కాయలు కాసేచెట్ల కొమ్మలను తెచ్చి పాలిథీన్ సంచుల్లో పెరిగే మొక్కలకు అంటుకట్టాలి. అంటు కట్టాక 4–5 నెలలకు మొక్కలు నాటడానికి తయారవుతాయి.

మొక్కలు నాటడం :

గుంతలను త్రవ్వడం : గుంతలను 30×30×45 సెం.మీ. పరిమాణంలో త్రవ్వుకోవాలి. పొలం చుట్టూ 6–8 మీటర్ల ఎడంలో నాటాలి. అదే పొలంలోనయితే 5×4 మీటర్లు లేదా 5×5 మీటర్ల ఎడంలో నాటాలి. ఎకరాకు 160 నుండి 200 మొక్కల వరకు నాటుకోవచ్చు.

నాటే విధానం : ముందుగా పొలాన్ని లోతుగా దున్నాలి. దీని మూలంగా కలుపు మొక్కలు నాశనం కావడమే గాక వర్షపు నీరు భూమిలో బాగా ఇంకుతుంది. ఒక సంవత్సరం వయస్సుగల మొక్కలను నాటవచ్చు. కాండపు ముక్కల ద్వారా పెంచిన మొక్కలను మరియు పిలకల ద్వారా పెంచిన మొక్కలను కూడా నాటుకోవచ్చు.

నాటే సమయం : జూలై నుండి ఆగష్టు వరకు అనుకూల సమయం.

నీటి యాజమాన్యం : మొక్క పెట్టాక, వర్షం కురవక పోతే, నీటి తడిని ఇవ్వాల్సి వుంటుంది. మొదటి వేసవి కాలంలో నెలకోసారి నీటి తడినివ్వాలి.

ఎరువులు : దీర్ఘకాలం కాపుకు సేంద్రీయ ఎరువు శ్రేష్ఠం. నాటిన మొదటి 2 సంవత్సరాల్లో 100 గ్రాముల డి.ఎ.పి. సరిపోతుంది. మూడవ సంవత్సరం నుండి 200-250 గ్రాముల డి.ఎ.పి. ఎరువు వేస్తే చెట్టు త్వరగా వృద్ధి అవుతుంది.

అంతర కృషి : ప్రారంభదశలో మొక్క పెరిగేటప్పుడు కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించాలి. లేకపోతే ఎదుగుదల క్షీణిస్తుంది. మొదటి సంవత్సరం నవంబరులో మరోసారి లోతుగా మొక్కల మధ్య దున్నాలి. సంవత్సరానికి 2 సార్లు కలుపు తీయాలి. దీనివల్ల మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి.

కత్తిరింపులు : లేత మొక్కలకు అవసరాన్ని బట్టి వెదురు బొంగులతో ఉతమివ్వాలి. చెట్లు ఎత్తుగా పెరగడానికి చిన్న మొక్కల ప్రక్క కొమ్మలను తగిన రీతిలో కత్తిరించాలి. మొక్కలు అధికంగా వుంటే తీసెయ్యాలి.

సస్యరక్షణ : ఆకుముడత, రసం పీల్చు పురుగులు, తేనెటీగలు ఆశిస్తాయి. లేత మొక్కలపై, చెట్లపై వివిధ శిలీంద్రాలు ఆశిస్తాయి. లేత కొమ్మలను ఆకులను పెలిలోమా అనే శిలీంద్రం ఆశించి ఆకులను రాల్చివేస్తుంది. విత్తనాలను నిల్వ చేసే సమయంలో కూడా ఆశిస్తుంది. వీటి నివారణకు లీటరు నీటికి 1.5 గ్రా. బావిస్టిన్ కలిపి పిచికారీ చేయాలి. విత్తనాలను నిల్వచేసే ముందు కిలో విత్తనాలకి 3 గ్రా. థైరామ్‌తో కలిపి నిలువ చేయాలి.

పంట దిగుబడి : చెట్లకు 6-7 సంవత్సరాలకు కాయలు కాయడం మొదలయినప్పటికి 10వ సంవత్సరానికి స్థిరమైన దిగుబడి వస్తుంది. అదే అంటు మొక్కల ద్వారా అయితే 4వ సంవత్సరం నుండి దిగుబడి మొదలయినప్పటికి 7వ సంవత్సరానికి స్థిరమైన దిగుబడి వస్తుంది. విత్తనలను కోయడం కాని లేదా కాయ రాలాక ఏరడం గాని చేయాలి. కాయలు ఎండిన తరువాత పగల కొట్టి విత్తనాలను సేకరించాలి. హెక్టారుకు మొక్కల ద్వారా 10వ సంవత్సరానికి 6 టన్నుల గింజలు వస్తాయి. అయితే అంట్ల ద్వారా 7వ సంవత్సరానికే 6 టన్నుల గింజలు వస్తాయి. మొక్కల ద్వారా వేసిన తోటలు ఒక సంవత్సరం బాగా కాస్తే రెండవ సంవత్సరం తక్కువ కాస్తాయి. అదే అంటు పద్ధతి ద్వారా వేసిన మొక్కలు ప్రతి సంవత్సరం కాయలు కాస్తాయి. 70 సంవత్సరాల వరకు దిగుబడి వస్తుంది.

నూనె దిగుబడి : గింజల్లో 26-30 శాతం నూనె వుంటుంది. హెక్టారుకు 1500-1600 కిలోల నూనె వస్తుంది.

ఖర్చు - విశ్లేషణ : వర్షాధారంగా హెక్టారుకు ఖర్చు 40 వేలు, ఆదాయం 61 వేలు మరియు నికరాదాయం 21 వేలు లభిస్తుంది. (కనీస మద్దతు ధర టన్నుకు 6 వేల రూపాయలు ఉన్న ఎడల).

సర్కారీ తుమ్మ

క్రీ.శ. 1877వ సంవత్సరంలో క్యూబా దేశం నుంచి సేకరించిన విత్తనాల ద్వారా సర్కారీ తుమ్మ భారతదేశంలో ప్రవేశించింది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో వున్న అన్ని మెట్ట ప్రాంతాల్లో వ్యాపించి పెరుగుతోంది.

ఉపయోగాలు : కిలో సర్కారీ తుమ్మ నుంచి 4,800 కిలో కేలరీల శక్తి ఉత్పత్తి కావడం వలన దీనిని వంట చెఱకుగా వాడవచ్చు. తక్కువ మోతాదులో బూడిద ఉత్పత్తి (29 శాతం) అవ్వడమే కాకుండా, నాణ్యమైన బొగ్గు తయారవుతుంది. వంట చెఱకు నుంచి అతి తక్కువగా పొగ వెలువడుతుంది.

వీటి ఆకులు పశువులు తినడానికి యోగ్యం కానప్పటికీ, కాయల్లో రుచి వుండటం వల్ల మేతగా

వుపయోగపడుతుంది. వీటి కాయల్లో మాంసకృత్తులు 17 శాతం, చక్కెర 25 శాతం మరియు తగినంత నత్రజని వుంటాయి. విత్తనాలు మంచి పోషక విలువలతో మాంసకృత్తులు 30–40 శాతం, నూనె 7–8 శాతం వుండటం వల్ల మేతగా దీనికెంతో వుపయోగం వుంది. పశుదాణాలో దీని కాయలను 30–40 శాతం వరకు మిశ్రమంగా వేసుకోవచ్చు.

అమెరికాలో కేకులు, బ్రెడ్‌ల తయారీలో తుమ్మకాయల పిండిని ఉపయోగిస్తారు. మత్తు పానీయాల తయారీకి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఈ చెట్టు చిన్న మొద్దులను ప్రహరీగోడ, వ్యవసాయ పరికరాలు మరియు పనిముట్లు తయారీకి వుపయోగిస్తారు.

ఈ చెట్టు బెరడులో, వేళ్ళలో టానిక్స్ (6.7 శాతం) లభ్యమవుతాయి. ఈ టానిక్స్ తోళ్ళ పరిశ్రమల్లో తోళ్ళను శుభ్రపరడానికి వాడతారు. బెరడు నుంచి వెలువడే జిగురును కాగితపు పరిశ్రమ, సౌందర్య కాస్మోటిక్స్, కుండల తయారీల్లోని వివిధ పరిశ్రమల్లో వాడుతారు. దీని పువ్వులు, నాణ్యమైన తేనెని ఉత్పత్తి చెయ్యడంలో తేనెటీగలకు ఎంతో ఉపకరిస్తాయి. ఆకులు నాణ్యమైన సేంద్రియ ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి. వాతావరణంలోని నత్రజనని స్థిరీకరిస్తుంది. వడగట్టిన ఆకుల రసాన్ని సూక్ష్మక్రిముల నిరోధానికి వాడవచ్చు. ఆకులను బెల్లంతో నూరి ఆ మిశ్రమాన్ని తేలు కాటుకు వినియోగిస్తే సత్వర ఉపశమనం కలుగుతుంది.

భౌతిక స్వరూపం : ముళ్ళు కలిగి వుండి, ఎప్పుడూ పచ్చదనంతో లోతైన పొదలా త్వరగా పెరుగుతుంది. పది మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. బెరడు బూడిద లేక ముదురు మట్టి రంగులో వుంటుంది. ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో వుంటాయి. ఆకు అడుగు భాగాన ఒక జత ముళ్ళు వుంటాయి.

పూత, కాపు : దీని పూలు, చిన్నవిగా తెలుపు లేక పసుపు పచ్చరంగుతో, దట్టమైన స్పైక్‌లా అమర్చబడి, సువాసనని వెదజల్లుతాయి. పండు పసుపుపచ్చ రంగులో వుండి, పూర్తి చదునుగా లేక సిలిండర్ ఆకారంలో, కొద్దిగా వంపు తిరిగి, ఒక్కొక్క దానిలో 12–34 విత్తనాలు మెరుస్తూ అమరి వుంటాయి. ఏడాది పొడవునా పూలు, పండ్లు ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. కాయలు జనవరి–ఫిబ్రవరి మాసాల నుండి మే వరకు వస్తాయి.

సర్కారీ తుమ్మ లక్షణాలు : దట్టంగా పెరుగుతూ, ముళ్ళు కలిగి వుండటం వల్ల కంచెగా ఉపయోగిస్తారు. గాలికి అడ్డంకులుగా, నిస్సారమైన భూముల పునరుద్ధరణకు దీని సాగు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. నేల సంరక్షణకు ఎంతో అనుకూలమవడం వల్ల ఎడారుల్లో, తీరప్రాంతాల్లో పెంచవచ్చు. ముంపుకు గురయ్యే చౌడు భూముల్లో కూడా పెంచవచ్చు. పిలకల శక్తి ఎక్కువగా ఉండి, విస్తారంగా వ్యాపిస్తాయి. ఏక పంటగా ఎంతో లాభదాయకం.

వాతావరణం : ఉష్ణ ప్రాంతాల్లో పెరుగుదలకు అనుకూలం. సముద్ర మట్టం నుంచి 1500 మీ. ఎత్తులో కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. వర్షాభావాన్ని, ఒక మోస్తరు మంచుని తట్టుకొని, ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా పెరుగుతుంది. 500 మి.మీ. సగటు వర్షపాతం అనుకూలం.

నేలలు : ఏ రకం భూమిలోనైనా పెరుగుతుంది. పోషకాలు లేని నిస్సార భూముల్లో కూడా పెరుగుతుంది. చౌడును మరియు క్షారత్వాన్ని (పి.హెచ్. 10 వరకు) తట్టుకొంటుంది.

ప్రవర్ధనం : విత్తనాల ద్వారా (పిలకలు మరియు మోడులు), శాఖీయ ఉత్పత్తుల ద్వారా (కొమ్మ మరియు వేరు కత్తిరింపులు, వేర్లు తొడిగిన పిలకలు మరియు అంటు మొక్కలు తొడగడం) ప్రవర్ధనం చేయవచ్చు.

విత్తనాల సేకరణ : పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చిన కాయలను సేకరించి వీటి నుండి విత్తనాలను పొందాలి. నిండుగా విత్తనాలున్న కాయలను సేకరించాలి. ఒక కిలోకు 400–500 కాయలు, 10,000–20,000 విత్తనాలు తూగుతాయి.

విత్తనశుద్ధి : విత్తనాలను 5 నుండి 10 నిమిషాలు గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో శుద్ధి చేసిన తర్వాత నీటితో శుభ్రపరచాలి. విత్తనశుద్ధి ద్వారా విత్తనములో నిద్రావస్థను తొలగించవచ్చు. 36 నుండి 48 గంటల వరకు చల్లని నీటిలో లేక 5 నుండి 7 నిమిషాల వరకు వేడినీటిలో విత్తనాలను నానబెట్టాలి. గొర్రెలకు, మేకలకు ఈ కాయలను మేతగా ఉపయోగించి, వాటి జీర్ణకోశం ద్వారా, మల మూత్రాల ద్వారా వెలువడిన విత్తనాలను సేకరించాలి. ఇటువంటి విత్తనాలలో మొలకశాతం అధికంగా వుంటుంది.

నారుమడి యాజమాన్యం : నారుమడిలో 15×10 సెం.మీ. దూరంలో, 2 సెం.మీ. లోతున, జూన్–జూలై మాసాల్లో విత్తనాలను విత్తుకోవాలి. విత్తనాలను ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో కూడా విత్తుకోవచ్చు. ప్రధాన పొలంలో నేరుగా విత్తవచ్చు. 10 రోజుల్లో విత్తనం మొలకెత్తుతుంది. 3–4 నెలల్లో నారు మొక్కలు తయారవుతాయి. నారు మడిలో తరచూ నీటి తడులు అవసరం.

నాటటం : 2×2 మీ. ఎడం వుండేలా, 30×30×45 సెం.మీ.ల గుంతలను తవ్వాలి. యాంత్రికంగా అంతరకృషి చెయ్యడానికి 3×1.3 మీ. ఎడం వుండాలి. గుంతలను సారవంతమైన మట్టితో నింపుకోవాలి. 3–4నెలల వయస్సు గల నారు మొక్కలను నాటుకోవాలి. మొక్క కాండం చుట్టూ 1 మీ. వెడల్పు, 15 సెం.మీ. లోతు గల పాదులను చేయాలి. కొండ ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటిని ఆపడానికి వాలుకు అడ్డంగా 15 సెం.మీ. ఎత్తులో, అర్ధ చంద్రాకారపు బోదెలను నిర్మిస్తే, నీటి లభ్యత పెరిగి, మొక్కల పెరుగుదల, అభివృద్ధి వేగంగా వుంటుంది.

నీటి యాజమాన్యం : నాటిన తర్వాత వర్షాలు లేకపోతే నీటి సరఫరా అవసరం. బాగా నిలదొక్కుకోవడానికి మొక్కలకు నీటి తడులు అవసరం.

కలుపు నివారణ : వర్షాకాలంలో, అంతరకృషి చేయడం వలన కలుపు మొక్కలు నివారించబడి నేలలోని తేమ సంరక్షింపబడుతుంది.

కత్తిరింపులు : శుభ్రమైన కాండం రావడానికి ప్రక్క కొమ్మలను కత్తిరించాలి.

సస్యరక్షణ : ఎలుకలు మరియు చెదలు, విత్తనాలకు మరియు చెట్లకు హాని చేస్తాయి. కావున వీటిని నివారించాలి. విత్తనాలు విత్తే ముందు లేక నారునాటే ముందు, విషపు ఎరల ద్వారా ఎలుకలను నివారించవచ్చు. గుంతల్లో, గుంతల ప్రక్క, గోడలపై 3 శాతం ఫాలిడాల్ పొడి చల్లి చెదలను నివారించవచ్చు.

కోత : వర్షాధారపు పరిస్థితుల్లో 5 సంవత్సరాలకు చెట్టును నరకవచ్చు. తద్వారా హెక్టారుకు 60 టన్నుల వంట చెఱకు లభిస్తుంది. అధిక వర్షపాతం లేక నీటి వసతి వున్న ప్రాంతాల్లో చెట్టును 4 సంవత్సరాలకే నరకవచ్చు. తద్వారా హెక్టారుకు 70 టన్నుల వంట చెఱకు లభిస్తుంది.

ఆదాయం : వర్షాధార పరిస్థితుల్లో హెక్టారుకు 5 సం॥ల తుమ్మ చెట్ల సాగు ఖర్చు రూ. 14 వేలు అయితే, నికరాదాయం రూ. 50 వేలు కాగా, ప్రతి సంవత్సరానికి రూ. 10 వేలు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. అధిక వర్షపాత ప్రదేశాల్లో హెక్టారుకు 4 సంవత్సరానికి తుమ్మ చెట్ల సాగు ఖర్చు రూ. 18 వేలు అయితే, నికరాదాయం రూ. 60 వేలు కాగా, ప్రతి సంవత్సరానికి రూ. 15 వేల అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.

సీమరుబా (సర్కారీ తంగేడు)

చెట్టు లక్షణాలు : సీమరూబా చెట్టు మధ్యస్తముగా ఉండి 7 నుండి 15 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది. ఈ చెట్లలో 4–6 సంవత్సరాల వయసులో దిగుబడి ప్రారంభమౌతుంది. డిసెంబరు నెలలో పూతకు వచ్చి ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగుతుంది. కాయలు ఊదా రంగులో ఉండి ఏప్రిల్–మే నెలలో కోతకు వస్తాయి.

సీమరూబా చెట్టులో అన్ని భాగాలు ఏదో విధంగా ఉపయోగపడతాయి. విత్తనాల్లో 50 నుండి 75 శాతం నూనె కలిగి ఉండి, కొవ్వు పదార్థాల ఉత్పత్తిలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ నూనెను సబ్బులు, రంగులు మరియు ఇతర మందుల తయారీలోనూ ఉపయోగించవచ్చు. నూనె తీయగా వచ్చిన చెక్కలో 7.7 శాతం నత్రజని, 1.07 శాతం భాస్వరం మరియు 1.24 శాతం పొటాష్ కలిగి మంచి ఎరువుగా ఉపయోగపబడుతుంది. సీమరూబా చెట్టు నుండి ప్రతి సంవత్సరము 20 కి.లోల ఆకులు వస్తాయి. ఈ ఆకులను ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చును. ఈ చెట్ల నుండి వచ్చే కలపతో కర్రసామాను (ఫర్నీచర్) కూడా తయారు చేయవచ్చు. విత్తనాల్లో 11 శాతం చక్కెర కలిగి ఉండటం వలన పానీయాల తయారీకి ఉపయోగించవచ్చు.

అనుకూల పరిస్థితులు : సముద్ర మట్టము నుండి 1000 అడుగుల ఎత్తు వరకు గల ఉష్ణప్రదేశాలు అనుకూలం. ఈ చెట్లకు అన్ని రకాల నేలలు అనుకూలమే. నేలలో ఉదజని సూచిక 5.5కు తక్కువగాని, 8.5కు మించి గానీ ఉండరాదు. సగటు వర్షపాతం 500–1000 మి.మీ. గల ప్రాంతాల అనువైనవి.

నాటు పద్ధతులు మరియు తదుపరి జాగ్రత్తలు : బంజరు భూముల్లోనూ, వర్షాధార భూముల్లోను వర్షాకాలంలో నాటుకుంటే మంచిది. అంట్లు చేసిన మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుటకు అవకాశం ఉంది. నీటివసతి ఉన్న ప్రాంతాలలో సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా నాటుకోవచ్చు.

మొక్కలను 5×5 మీటర్ల ఎడంతో నాటుకోవాలి. నాటుటకు తీసిన 45×45×45 సెం.మీ. వైశాల్యం గల గుంతలను 2 కిలోల కంపోస్ట్, 20 గ్రాముల భాస్వరం మరియు 20 గ్రాముల నత్రజని ఎరువులను తవ్విన మట్టితో కలిపి నింపాలి. మొక్కలు నిలదొక్కుకునే దశలో ఒక్కొక్క మొక్కకు వారానికి 2 నుండి 4 లీటర్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది. పాదులో ఉన్న కలుపు మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు తీయుట చాలా ఉపయోగకరం.

అంతర పంటలు : మొక్కలు నాటిన 3–4 సంవత్సరాల వరకు ఆయా ప్రాంతాలకు అనువైన అంతర పంటలను పండించి కొంత ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

చీడపీడలు : ఈ చెట్లను పశువులు గాని, మేకలు, మరియు గొఱ్ఱెలు కాని తినవు. చెట్లను ఆశించే పురుగులలో పేను మరియు బెరడు తినే పురుగులు ముఖ్యమైనవి.

దిగుబడి : పది సంవత్సరాల వయస్సు గల చెట్ల నుండి దిగుబడి ఒక హెక్టారుకు ఈ క్రింది విధంగా ఉండ వచ్చునని అంచనా. చెట్లు 60 సంవత్సరాల వరకు దిగుబడినిస్తూనే ఉంటుంది.

నూనె – 1000 – 2000 కి.గ్రా.

చెక్క – 1000 – 2000 కి.గ్రా.

విత్తనాల గుజ్జు – 6000 – 8000 కి.గ్రా.

రాలిన ఆకులు – 6000 – 8000 కి.గ్రా.

మంచి దిగుబడి వచ్చుటకు మరియు సరియైన సంపర్కము (Pollination) కొరకు పుప్పొడిదాతలు (Pollen donors) ను ఆడజాతి చెట్లలో 60 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున నాటుకోవడం మంచిది లేదా కొన్ని ఆడ మొక్కలకు పుప్పొడి దాతల (Pollen donors) కొమ్మలతో అంట్లు కట్టిన మంచిది. అలా చేసినట్లయితే ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చుటకు అవకాశం ఉంది. చెట్ల పూతదశలో తలలు నరికిన ఎడల మగచెట్లను ఆడ చెట్లుగా మార్చుటకు వీలుంటుంది.

కాయలకోత : కాయలున్న చెట్ల కొమ్మలను గట్టిగా కదిలించిన లేక గట్టిగా ఊపినట్లయితే కాయలు రాలి క్రింద పడతాయి. అలా క్రింద పడిన కాయలను ఏరుకొని విత్తనాన్ని వేరుచేసి, ఎండలో ఎండబెట్టి తరువాత నిల్వ ఉంచవలయును.

ఇప్ప (విప్ప)

ఇప్ప చెట్లను ఇంగ్లీషులో మధుకా లాంగిఫోలియా అని పిలుస్తారు. ఈ చెట్లు భారత దేశంలోని మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఒరిస్సా రాష్ట్రాలలో విరివిగా కనబడుతాయి. మన రాష్ట్రంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన చింతపల్లి, శ్రీకాకుళం మొదలగు ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా గమనించడమైనది.

ఇప్పచెట్లను కలపకంటే కూడా, పూలు, పండ్లు మరియు నూనె గురించి సాగు చేస్తారు. ఈ చెట్ల ఆకులు మంచి పోషక విలువలు కలిగి పశుగ్రాసంగా ఉపయోగపడతాయి. విప్ప పూల నుండి మరియు కలప గుజ్జు నుండి సారా తయారు చేస్తారు. పూలను వెనిగర్, జామ్స్, మరియు జెల్లీస్ తయారీలో వినియోగిస్తారు.

గింజలలో నూనె 20–30 శాతం వరకు వుంటుంది. నూనెను సబ్బులు, గ్రీసులు, క్యాండిల్స్ మరియు మందుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. బాగా వడకట్టిన నూనెను చాక్లెట్లు తయారీలో మరియు వంట నూనెగా ఉపయోగిస్తారు.

ఈ చెట్లు అన్ని రకాల నేలల్లోనూ పెంచవచ్చును. తేలికపాటి ఇసుక నేలల్లోనూ మరియు సారవంతమైన లోతు తక్కువ నేలల్లోనూ పెంచవచ్చు.

నర్సరీ యాజమాన్యం : నాణ్యమైన విత్తనాలను సేకరించాలి. నర్సరీ మొక్కల నాటడానికి, పొలంను మడులుగా విభజించాలి. నాటిన విత్తనాన్ని 2 సెం.మీ. మందం మట్టితో కప్పాలి. రోజూ నీటి తడులు ఇవ్వాలి. నాటిన విత్తనాలు పది రోజులలో మొలకెత్తుతాయి. మడుల తయారీ అనుకూలం కానిచో మట్టి తోటల్లో లేక పాలిథీన్ సంచులలో నాటుకోవాలి.

మొక్కలు నాటడం :

గుంతలను త్రవ్వడం : గుంతలను 45×45×45 సెం.మీ. పరిమాణంలో త్రవ్వుకోవాలి. పొలం చుట్టూ 9 నుండి 10 మీటర్ల ఎడంలో నాటుకోవాలి. మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 8 మీ. దూరం వుండాలి. ఎకరాకు 60–70 మొక్కలు నాటుకోవచ్చు.

నాటే విధానం : ముందుగా పొలాన్ని లోతుగా దున్నాలి. దీని మూలంగా కలుపు మొక్కలు నాశనమవడమేగాక

వర్షపు నీరు భూమిలో బాగా ఇంకుతుంది. నర్సరీలో తయారైన ఒక సంవత్సరము వయస్సు గల మొక్కలను నాటుకోవాలి. నేరుగా విత్తనం కూడా విత్తుకోవచ్చు. కాని 60 శాతం మొక్కలు మాత్రమే నిలదొక్కుకుంటాయి.

నాటే సమయము : జూలై నుండి ఆగష్టు వరకు అనుకూల సమయము.

నీటి యాజమాన్యం: మొక్క పెట్టిన తరువాత వర్షాభావ పరిస్థితి ఏర్పడితే నీటి తడులు ఇవ్వాలి. మొక్క నాటిన తరువాత మొదట వేసవిలో నెలకొకసారి నీటి తడి ఇవ్వాలి.

ఎరువులు: దీర్ఘకాల కాపుకు సేంద్రియ ఎరువు శ్రేష్ఠం ఎరువులు గురించి పరిశోధన చేయవలసి వుంది.

అంతర కృషి : ప్రారంభ దశలో మొక్క పెరిగేటప్పుడు కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించాలి లేకపోతే ఎదుగుదల క్షీణిస్తుంది. మొదటి సంవత్సరము నవంబరులో మొక్కల మధ్య లోతుగా దున్నాలి. సంవత్సరానికి రెండుసార్లు కలుపు తీయాలి. దీని వల్ల మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి. నేరుగా విత్తిన పద్ధతిలో బలంగా వున్న మొక్కను ఒక దానిని వుంచి మిగిలినవన్నీ తీసివేయాలి.

అంతర పంటలు : మొదటి 3-4 సంవత్సరాల వరకు వ్యవసాయ పంటలను (పెసలు, మినుములు, ఉలవలు, అలసందలు) అంతర పంటలుగా వేసికొని కొంత ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

సస్యరక్షణ : లేత మొక్కలపై విత్తనాలు, ఆకులపైన వివిధ రకాల పురుగులు ముఖ్యంగా ఆకులు తినే పురుగులు మరియు రసం పీల్చే పురుగులు ఆశిస్తాయి. వీటి నివారణకు లీటరు నీటికి 1.5 మి.లీ. డేసిస్ మందును పిచికారీ చేయాలి.

ఆకుమచ్చ తెగులు, తుప్పుతెగులు, మరియు ఎండు తెగులు సాధారణంగా ఆశిస్తాయి. దీని నివారణకై బావిస్టిన్ మందును 1 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

దిగుబడి-ఖర్చు విశ్లేషణ : విప్ప చెట్లను 10×10 మీటర్ల ఎడంలో వేసుకొని మద్యలో 2.5×2.5 మీటర్ల ఎడంలో నీలగిరి మొక్కలు నాటినచో మంచి ఆదాయం వస్తుంది. విప్ప చెట్లు కాపుకు వచ్చే సరికి నీలగిరి మొక్కల వలన ప్రతి 4 సంవత్సరముల కొకసారి ఆదాయం పొందవచ్చును.

ఇప్ప చెట్ల దిగుబడి విషయానికి వస్తే 10 సంవత్సరములు వయస్సు గల చెట్టుకు సుమారు 15-20 కిలోల విత్తనాలు వస్తాయి. విత్తనాల్లో 50 శాతం నూనె ఉంటుంది.

మలబారు వేప (మిలియ దూబియ)

కలప జాతి వృక్షాలలో వేగంగా పెరిగే ఒకటయిన మలబారు వేప ప్రస్తుతం రైతుల పాలిట కల్ప వృక్షంగా మారినది. ఈ మలబారు వేప మొక్కలను సాగు చేసిన 6-7 సంవత్సరాలలో ఎకరానికి 3-6 లక్షల వరకు నికర ఆదాయాన్ని పొందవచ్చును.

మలబారు వేప 25-35 అడుగుల ఎత్తు వరకు నిటారుగా పెరిగి దీని కైవారము (చుట్టు కొలత) సుమారు 3-4 అడుగులు ఉంటుంది. మలబారు వేప బహుళ ప్రయోజనకారి. చెట్టులోని ప్రతి భాగం విలువైనదే. ఈ కలపను గృహ నిర్మాణ సామాగ్రి, ఫర్నిచరు, ప్లైవుడ్, బయోమాస్, కర్ర బొగ్గు, ప్యాకింగ్, వంట చెఱకు గాను ఉపయోగిస్తారు. బరువు కలిగి వాటరు ప్రూఫ్ కావడం వలన మంచి గిరాకీ ఉంది.

ఈ మొక్కలను పశువులు, జీవాలు తినలేవు. 2 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న చెట్టు అగ్గి పుల్లల తయారీకి, 4 సంవత్సరాల వయస్సు చెట్టు కాగితపు పరిశ్రమకు, చివరగా 7 సంవత్సరాలు దాటిన తరువాత ప్లైవుడ్ తయారీకి వాడవచ్చు.

సాగు విధానం

మలబారు వేపను 2 విధాలుగా సాగు చేయవచ్చును.

సాగు అంశాలు	నీటి వసతి	వర్షాధారం
నాటే సమయం	జూన్ నుండి మార్చి వరకు ఎప్పుడైనా నాటవచ్చును.	జూన్–ఆగష్టు వరకు నాటవచ్చును
మొక్క ఎంపిక/ ఎత్తు	పాలీ సంచిలో మొక్క ఒక్క అడుగు ఎత్తు ఉండాలి.	పాలీ సంచిలో మొక్క $1^{1/2}$ అడుగుల ఎత్తు ఉండాలి.
గుంతలు	$1^{1/2} \times 1^{1/2} \times 1^{1/2}$ అడుగుల పొడవు × వెడల్పు × లోతు	$1^{1/2} \times 1^{1/2} \times 1^{1/2}$ అడుగుల పొడవు × వెడల్పు × లోతు
మొక్క నాటే విధానం	మెత్తటి ఎర్రమట్టి 5–10 కిలోలు, పశువుల ఎరువు 5 కిలోలు, వర్మి కంపోస్టు 2 కిలోలు, సూపర్ ఫాస్ఫేట్ 1 కిలో అన్నీ కలిపి గుంతలు నింపు కోవాలి. పాలీకవర్ చింపి మట్టి గడ్డ తో పాటు గుంత మధ్యలో నేరుగా నాటుకోవాలి.	ఎర్రమట్టి 5 కిలోలు, పశువుల ఎరువు 5 కిలోలు, వర్మి కంపోస్టు 1 కిలో, అన్ని కలిపిన మిశ్రమాన్ని గుంతలో నింపుకోవాలి. పాలీకవర్ చింపి మట్టి గడ్డతో పాటు గుంత మధ్యలో నేరుగా నాటుకోవాలి.
మొక్కల సంఖ్య	3 మీ.×3 మీ. దూరంలో ఎకరానికి 460 మొక్కలు	3 మీ.×3 మీ. దూరంలో ఎకరానికి 460 మొక్కలు
ఎరువుల యాజమాన్యం	8–10 కిలోల పశువుల ఎరువు, 2 కిలోల వర్మి కంపోస్టు కలుపుకుని డిసెంబరు – జనవరి మాసాలలో ఒకసారి, జూన్–జూలై మాసాలలో రెండవసారి వేయవలెను.	8–10 కిలోల పశువుల ఎరువు, 2 కిలోల వర్మి కంపోస్టు కలుపుకుని డిసెంబరు – జనవరి మాసాలలో ఒకసారి, జూన్–జూలై మాసాలలో రెండవసారి వేయవలెను.
నీటి యాజమాన్యం	డ్రిప్ పద్ధతి ద్వారా నీరు పెట్టవచ్చును. నీరు ఇస్తే మొక్క పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది.	ఏప్రిల్ నుండి జూలై వరకు తప్పనిసరిగా నీటి తడులు ఇవ్వవలెను.

అంతర పంటలు

మొక్కల మధ్య ఖాళీ స్థలము ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారంభదశలో 3-4 సంవత్సరాల వరకు అంతర పంటలు వేసి వాటి నుండి ఆదాయం పొందవచ్చును.

సాగు ఖర్చులు ఎకరానికి

మొదటి సంవత్సరం ఖర్చు	**రూపాయలు**
దుక్కి నేల తయారీ	10,000/-
మొక్కల గుంతలు తవ్వకము, మట్టి ఎరువు మిశ్రమము	15,000/-
నాటడం, నింపడం, బేసిన్ చేయడం	2,000/-
నీటి తడులు, ట్యాంకర్ మోటారు ఖర్చు	10,000/-
పశువుల ఎరువు, వర్మి కంపోస్టు, కూలీల ఖర్చు (2 దఫాలు)	6,000/-
కలుపు తీయడం, ఊత కర్రలు కట్టడం, అంతర సేద్యం మరియు ఇతర ఖర్చులు మిగతా 6 సంవత్సరాలకు అయ్యే ఖర్చు	50,000/-
మొత్తం ఖర్చు (7 సంవత్సరాలకు)	1,00,000/-

మలబారు వేపను ఉపయోగించే విధానాన్ని కలప కోత సమయాన్ని బట్టి ఆరు సంవత్సరాలకు ఎకరానికి సుమారు రూ. 3 నుండి 6 లక్షల వరకు నికర ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చును.

ఎర్ర చందనం (టీరోకార్పస్ శాంటాలినస్)

ఎర్ర చందనం బహువార్షిక పెద్ద చెట్టు. సుమారు 10 మీ. పెరుగుతుంది. కాండం చుట్టుకొలత 1-1.5 మీ. వరకు ఉంటుంది. బెరడు పగుళ్ళుబారి ఎండి మొసలి చర్మంలా కనిపిస్తుంది.

నేలలు : సముద్ర మట్టానికి 500-600 మీ. ఎత్తులో పొడిగా ఉన్న వాతావరణం అనుకూలం. సున్నపురాయితో కూడిన లేటరైట్ నేలల్లో 100 మి.మీ. కు తక్కువ కాని సగటు వర్షపాతంలో బాగా పెరుగుతుంది. రాళ్లు, గులకరాళ్లతో కూడిన నేలల్లో పెరిగి చెట్ల నుండి వచ్చే కలప మంచి నాణ్యతతో కూడినదై ఉంటుంది.

విత్తన మోతాదు (ఎకరాకు) : ఈ మొక్కలు విత్తనాల ద్వారా త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. డిసెంబరు-ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో విత్తనం సేకరించాలి. కాయలు తయారీ అయ్యేందుకు 10-11 నెలల కాలం పడుతుంది. కాయలు పలుచగా రెక్కలతో సహా 3-4 సెం.మీ. పరిధిలో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క గింజ 1-1.5 సెం.మీ. పొడవుతో ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. ఎకరానికి రెండు కిలోల విత్తనం కావాలి.

విత్తనశుద్ధి : విత్తనాన్ని 3 రోజుల పాటు చల్లని నీటిలో నానబెట్టి గాని లేదా ఆవు పేడ ద్రావణంలో 48 గంటలు నానబెట్టి కానీ విత్తుకున్నట్లయితే మొలక శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

విత్తే దూరం : 3.5 మీ. × 3.5 మీ. లేదా 4.5 మీ. × 4.5 మీ.

నారుమడి యాజమాన్యం : నారుమడిలో పెంచిన మొక్కలను 4–10 అంగుళాల ఎత్తు పెరిగినప్పుడు పాలిథీన్ సంచులలోకి మార్చుకోవాలి. 4 నెలల తరువాత ఈ పాలిథీన్ సంచులను నెమ్మదిగా నీడ నుండి ఎండ పడే ప్రాంతాలకు మార్చి 3–4 నెలల వరకు నీటి తడి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. వేరు వ్యవస్థ 20–60 సెం.మీ. పెరిగినప్పుడు నాటుకోవచ్చును.

నీటి యాజమాన్యం : మొదటి రెండు సంవత్సరాల పాటు నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి.

దిగుబడి : 15 సంవత్సరాల వయస్సు చెట్ల నుండి ఒక ఎకరానికి 12 టన్నుల కాయ దిగుబడి వస్తుంది. 20–25 సంవత్సరాల వయస్సు చెట్ల నుండి బెరడు, కలప తీయడానికి ఉంటాయి. బెరడును సాధారణంగా ప్రత్యేకమైన స్ట్రిప్ పద్ధతిలో వేరు చేయడం జరుగుతుంది. కలప కోసమైతే నరికిన చెట్ల నుండి లేత కలపను, చేవదేరిన కలపను వేరు చేస్తారు. లేత, చేవదేరిన మరియు బెరడు నుండి శాంటాలిన్–ఎ, శాంటాలిన్–బి అనే రెండు రకాల రంగులను తీస్తారు. చేవదేరిన కలప ముదురు ఎరుపు రంగులో 1.10 సాంద్రతతో చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. ఈ చెట్ల నుండి ఐసోటిల్ కార్పోలిన్, టిరోకార్ప్ ట్రయోల్, ఐసోటీరోకార్పిన్, టీరో కార్బోడైయాన్, ఎసిటైలియానోలిన్ ఆమ్లాలను వేరు చేసి మందుల తయారీలో వాడుతున్నారు. ఇది విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంది.

మహోగని

మహోగని అనేది ఎర్రటి గోధుమ రంగు కలిగిన కలపనిచ్చు వృక్షము. మహోగని అనేది మూడు జాతుల క్రింద వర్గీకరించబడినది.

1. స్వీటెనియా మాక్రోఫిల్లా
2. స్వీటెనియా మహోగని
3. స్వీటెనియా హుమిలిస్

నిజమైన మహోగని వాణిజ్య పరంగా విలువైనది ముఖ్యంగా కలప దాని మన్నిక, అందం, రంగు మరియు ప్యానలింగ్, ఫర్నిచర్, పడవలు, సంగీత వాయిద్యాలు మరియు ఇతర వస్తువుల తయారీలో వినియోగిస్తారు.

ఉష్ణమండల అమెరికా, ఆసియా మరియు ఆఫ్రికాలో సహజంగా పెరిగే మహోగని చెట్టు రెడ్‌వుడ్ రంగు, బలం, మన్నిక, నీటి నిరోధకత మరియు సౌందర్య ఆకర్షణ దీని గుణాలు. మహోగని చెట్టు 60 నుండి 70 అడుగుల ఎత్తు మరియు 4 నుండి 5 అడుగుల వ్యాసం వరకు పెరుగుతుంది. మహోగని భారతదేశంలోని

అత్యంత విలువైన కలప చెట్టు. ఇది దాదాపు పొడి వాతావరణం గల ఉత్తర ప్రాంతాలలో తప్ప అన్ని ప్రాంతాలలో పెరుగుతుంది. మంచి పారుదల లోతైన ఒండ్రు మట్టి గల నేలల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

భూమి తయారీ : మహోగని నాటడానికి ముందు, ఎంచుకున్న ప్రదేశంలో కలుపు మొక్కలు పూర్తిగా తొలగించుకొని, 1.5×1.5×1.5 అడుగుల పరిమాణంలో గొయ్యిలు తీసుకోవాలి. త్రవ్విన సమయంలో కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి. పిట్ మిశ్రమంలో బాగా చివికిన సేంద్రియ ఎరువు, వేప చెక్క మరియు మట్టిని సమ భాగాలుగా కలిపి ఉంచుకోవాలి.

గొయ్యి త్రవ్వి 1–2 వారాలు తెరిచి ఆరనివ్వాలి. ప్రతి గంటకు 0.5 కిలోల ఎరువు వేసి నారును నాటుకోవాలి. నారు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటే విరిగిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రతి గొయ్యిని స్థంభాన్ని మద్ధతుగా ఉపయోగించాలి. నాటిన వెంటనే నీరు పారగట్టాలి.

పిట్‌ఫిల్లింగ్ మరియు మొక్కల మధ్య దూరం : పిట్లను వీలైనంత ఎక్కువగా సిద్ధం చేసిన పిట్ మిశ్రమాన్ని మాత్రమే నింపాలి. పై మట్టి సరిపోకపోతే నది ఇసుకను ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు. నాటడానికి కనీసం 2 వారాల ముందు గుంటలు నింపడం వలన పిట్ మిశ్రమం స్థిరపడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మొక్క కోసం సిఫారసు చేయబడిన అంతరం 6.0×6.5 అడుగులు లేదా 8 అడుగుల × 8 అడుగులు లేదా 10×10 అడుగుల పరిమాణంతో చదరపు లేదా త్రిభుజాకార గ్రిడ్ ఆకారంలో నాటవలెను.

నీటి పారుదల : నాటిన వెంటనే మరియు మొదటి రెండు వారాల్లో నీటి పారుదల చేయాలి. తదనంతరం నేల మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి 3 నుండి 4 రోజులకు ఒకసారి నీటి పారుదల చేయవచ్చు. నీటి పారుదల లేని భూములలో సూక్ష్మ నీటి పారుదల వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

ఎరువుల మోతాదులు : మొదటి సంవత్సరం నిద్రాణస్థితి (డిసెంబరు–జనవరి) కాలం మినహా ప్రతి నెల ఒక మొక్కకి నత్రజని : భాస్వరం : పొటాష్ (17:17:17) 200 గ్రా. వేయాలి. ప్రతి నెల దీనిని విభజించి ఎరువు ద్వారా వేయాలి. మొక్కలకు ఒక అడుగు దూరంలో 1 అడుగు లోతు గుంత చేసి అందులో వేసి మట్టితో కప్పాలి. సంవత్సరానికి 15 రోజుల కొకసారి సూక్ష్మ పోషకాలు 1 గ్రా. లీటరు నీటిలో కలిపి పై పాటుగా పిచికారి చేయాలి.

నిర్వహణ : మొక్క చుట్టూ ఉన్న కలుపు మొక్కలను తప్పని సరిగా శుభ్రం చేయాలి మరియు మొక్క చుట్టూ ఉన్న మట్టిని వదులుగా గాలి తగిలేలా ఉంచాలి. మహోగని వివిధ రకాల నేలల్లో పెరుగుతుంది. అయితే దాని పెరుగుదల, నాణ్యత నేల యొక్క లోతు, నిర్మాణం, సచ్ఛిద్రత పారుదల మరియు తేమ నిలుపుకునే సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది లోతైన బాగా పారుదల మరియు సారవంతమైన నేలల్లో ఉత్తమంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహోగని తేమ, వెచ్చని ఉష్ణమండల శీతోష్ణస్థితిని ఇష్టపడుతుంది. ఇది ఉష్ణోగ్రత తీవ్రతలను

తట్టుకోగలదు. అయితే గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ నీడ ఉష్ణోగ్రత 25–44^0 సెంటీగ్రేడ్ దీని పెరుగుదలకు అత్యంత అనుకూలమైనది. ఇది 1200–2500 మి.మీ. వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలలో బాగా పెరుగుతుంది. ఇది లోతైన సారవంతమైన నేలలను ఇష్టపడుతుంది. ఇసుక నేల ఈ చెట్టుకు ఉత్తమమైన నేలగా పరిగణించవచ్చు. ఇది 6.5 కంటే తక్కువ పి.హెచ్. ఉన్న మట్టిలో పెరగడం కష్టం. మట్టిలోని కాల్షియం లోపం ఉన్న ఎడల మహాగని పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది.

హార్వెస్టింగ్, దిగుబడి & రాబడి : 10 సంవత్సరాల వయస్సులో ఎత్తు పెరుగుదల 23.1 మీ. మరియు వ్యాసం 28.7 సెం.మీ. వరకు నమోదుకు అవకాశము ఉంది.

ఎకరానికి చెట్ల సంఖ్య 1200–1500 కాండం కలప మొక్క మొత్తం దిగుబడి 36,000 సి.ఎఫ్.టి. కలప వస్తుంది. నాణ్యమైన పద్ధతులు అవలంభిస్తే 10 సంవత్సరాలలో ఒక చెట్టు గరిష్ఠంగా 20 సి.ఎఫ్.టి. కలపను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఎకరానికి గరిష్ఠంగా 1500 చెట్లు ఉండవచ్చు.

ఒక ఎకరం మహాగని సాగు ఖర్చు వివరాలు :

దూరం (ఎకరంలో)	6×6 మీ.	
నారు (భూమిలో)	1000 మొక్కల ధర = 1000×80 = 80,000/–	
ఎరువులు	–	10,000
మొత్తం సాగు ఖర్చు	–	90,000

ఆదాయం : 12 వ సంవత్సరంలో, 20 క్యూబిక్ ఫీట్ చెట్టుకు 1000×20 = 20,000 క్యూబిక్ ఫీట్ అడుగులు. ధర 250/– ప్రతి క్యూబీక్ ఫీట్, 20,000×250 = 50,00,000/–

ఒక ఎకరం మహాగని సాగుతో రూ. 50,00,000/– వరకు రాబడి ఉంటుంది.

శ్రీగంధం

శాంటాలమ్ ఆల్బమ్ **కుటుంబం : శాంటాలేసి**

శ్రీగంధం వివిధ ప్రాంతాలలో తెల్ల చందనం, సఫేద్ చందన్, అరిష్టఫలం, గందసార, తైలవర్ణ అనే పేర్లతో ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఈ చెట్లు సుమారు 10 మీ. ఎత్తు వరకు పెరుగుతాయి. ఈ చెట్లు యొక్క కైవారము (చుట్టుకొలత) సుమారు 0.9 మీ. నుండి 1.5 మీ. వరకు అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముదురు చందనం చెట్ల నుండి వచ్చే కలప (హార్ట్ వుడ్) ఎక్కువ బరువు కలిగి, ఆకర్షణీయమైన మంచి సువాసనను కలిగి ఉంటుంది. చందనపు చెక్క ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కలపగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఖరీదైన ఈ చెట్ల కలప కోసం దళారులు చట్ట విరుద్ధంగా నరికి వేయడాన్ని అరికట్టాలి.

ఉపయోగాలు : చందనము ఒక ప్రసిద్ధి ఔషధ మరియు చికిత్సా చెట్టు దీని ప్రత్యేక సువాసన మరియు వైద్య లక్షణాలకు బహు ప్రసిద్ధి చెందింది. చందనం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కలప. ఈ కలప వివిధ రూపాలలో చెక్కి వివిధ పరికూలత, అలాగే సంగీత సాధనాల తయారీలోను వినియోగిస్తారు. అలాగే చెక్క నుండి ఉత్పత్తి అయే నూనెను సుగంధ ద్రవ్యాలు, సుగంధ పరిమళాల తయారీలోనూ మరియు వివిధ ఉత్పత్తుల్లో వినియోగిస్తారు.

గంధపు చెట్టు యొక్క ఎదుగుదల మరియు పంట కోసం తీసుకోవలసిన కొన్ని సాంకేతిక అంశాలు.

నేలలు : ఇసుక నేలలు, ఎర్రబంక మట్టి నేలలు మరియు బంకమట్టి అధికంగా ఉండే నేలలో సహా వివిధ రకాల నేలలు గంధపు సాగుకు అనుకూలము. ఇవి రాతి నేల లేదా కంకర నేల రకాలకు సర్దుబాటు అవ్వగలవు అయితే పి.హెచ్. మాత్రం 6.0 నుండి 7.5 మధ్యలో ఉండాలి. సరైన నేలలు హార్డ్‌వుడ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి.

వాతావరణం : చందనపు చెట్లు పెరగడానికి సుమారు 625 నుండి 1625 మి.మీ. వర్షపాతం అవసరం. ఈ చెట్ల సాగుకు ఉష్ణమండలం మరియు ఉప ఉష్ణమండలాలు అనుకూలం. వేడి మరియు తేమతో కూడిన వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతాయి. అనువైన ఉష్ణోగ్రత $12-40^0$ సెం.గ్రే.

విస్తరణ : చందనపు చెట్లు ప్రధానంగా భారతదేశంలోని పొడి ఉష్ణమండల ప్రాంతాలు మరియు కర్ణాటక, తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలు మరియు కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన కొన్ని ప్రాంతాలలో విస్తరించబడ్డాయి.

ఉత్పత్తి : గంధపు మొక్కలను విత్తనాలు విత్తడం ద్వారా లేదా కణజాల సంస్కృతి ద్వారా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. వేర్లు బయట పడిన లేదా తల్లి చెట్టు నుండి వేరు చేయబడినప్పుడు రూట్ నక్కర్ ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

విత్తనాలను నర్సరీ బెడ్లలో విత్తుకోవాలి. విత్తనం నాటిన ఒకటి నుండి మూడు నెలల్లో అంకురోత్పత్తి జరుగుతుంది. 25-40% వరకు సాధ్యత ఉంటుంది.

చెట్ట పెంపకంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

చందనపు చెట్ల సాగుకు (హోస్ట్) చెట్ల అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఉదా : కానుగ, సరుగుడు, వేప, నల్లజీడి వంటి చెట్లు అనుకూలము.

సూర్యరశ్మి తాకిడిని తట్టుకోవడానికి తేలిక పాటి నీడను ఇచ్చే చెట్లను పెంచుకోవాలి.

నాటడం మరియు అంతరం : 15-20 ఏళ్ళ వయసున్న చెట్ల నుండి సేకరించిన విత్తనాలను ఎంచుకోవాలి. ప్రధాన పొలంలో నాటడానికి 30-35 సెం.మీ. ఎత్తు ఎదిగి, సుమారు 7-8 నెలల వయస్సు గల మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

పిట్ / గుంత పరిమాణం - 45×45×45 సెం.మీ.

మొక్క నుండి మొక్కకు దూరం - 10 అడుగులు

మొక్కల రక్షణ : గంధపు చెట్లు పెరుగుతున్న దశలో తక్కువ నీరు అవసరం. వేసవి కాలంలో 2-3 వారాల

వ్యవధిలో నీటి పారుదల అవసరం. వర్షాకాలంలో తరచుగా నీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వేసవి కాలంలో మంటల నుండి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.

వేసవిలో గడ్డి తక్కువై జింకలు, పశువులు మొదలగునవి ఈ చెట్ల ఆకులను మేతగా ఉపయోగించడం వలన ఈ చెట్లు ప్రమాదానికి గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ చెట్లు విలువైనవి కావున ఎల్లప్పుడు అక్రమ నరికివేతకు గురవుతాయి. స్పైక్ వ్యాధి తీవ్రమైన నష్టానికి కారణమవుతుంది. ఇది వైరస్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. నివారణకై విత్తన ఎంపికలో ప్రమాణాలు పాటించాలి. కొంతవరకు తాత్కాలిక కరువును తట్టుకునే గుణం కలిగి ఉంటుంది. **ఎరువులు** – ఇది ఔషధ మొక్కగా పరిగణించబడుతుంది. కావున రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గించి సేంద్రీయ ఎరువులను వాడాలి.

పంట కోత మరియు దిగుబడి : చందనపు చెట్ల కలపను బరువుతో విక్రయిస్తారు కావున మార్కెట్లో కిలో 3 వేల నుండి 7 వేల రూపాయల వరకు విక్రయిస్తారు. నాణ్యత బాగున్న యెడల రూ. 10 వేల వరకు ధర పలుకుతుంది.

నాటిన తరువాత 12–15 సంవత్సరాలకు ఈ చెట్టు (గుండె కలప) కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. భారత, విదేశీ మార్కెట్లో చందనపు చెక్కకు ఎకలేని డిమాండ్ ఉంది.

ఎకరం భూమి నుండి 5000 కిలోల వరకు గంధాన్ని తీయవచ్చు. ఈ చెట్ల సాగుకు ఎకరాకు సగటు ఖర్చు 8–10 లక్షల రూపాయలు.

నికర ఆదాయాలు

విశేషాలు	**ఖర్చులు** (రూ.)
హార్ట్‌వుడ్ (420 చెట్లు × 5.8 కి./చెట్టు @ రూ. 7500/– /కిలో)	1,82,79,000/–
సాప్‌వుడ్ (420 చెట్లు × 3.0 కి./చెట్టు @ రూ. 1100/– /కిలో)	1,61,70,000/–
మొత్తం రాబడి	3,44,49,000/–
మొత్తం ఖర్చు	7,60,000/–
మొత్తం లాభం	33,689,000/–

గంధపు చెట్ల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఇది సరైన సమయము అని నిపుణులు మరియు పెంపకదారులు అంటున్నారు. రైతాంగం పైన చెప్పిన మెళకువలను పాటించి లబ్ధిపొందగలరని ఆశిద్దాం.

అటవీ వ్యవసాయం

అటవీ వ్యవసాయం లేదా అగ్రోఫారెస్ట్రీ అనేది చెట్లను పంటలు లేదా పచ్చికతో అనుసంధానించే భూవినియోగ వ్యవస్థ. ఇది వ్యవసాయ మరియు అటవీ సాంకేతికతలను మిళితం చేస్తుంది. పాలీకల్చర్ వ్యవస్థగా అటవీ వ్యవసాయం కలప మరియు కలప ఉత్పత్తులు, పండ్లు, కాయలు, ఇతర తినదగిన మొక్కల ఉత్పత్తులు, ఔషధ మొక్కలు, అలంకారమైన మొక్కలు, జంతువులు మరియు జంతు ఉత్పత్తులు మరియు పెంపుడు మరియు అడవి జాతుల నుండి ఇతర ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

అటవీ వ్యవసాయాన్ని ఆర్థిక, పర్యావరణ మరియు సామాజిక ప్రయోజనాల కోసం అభ్యసించవచ్చు. స్థిరమైన వ్యవసాయంలో భాగం కావచ్చు. ఉత్పత్తి కాకుండా, వ్యవసాయ అటవీ శాస్త్రం నుండి మెరుగుపడిన వ్యవసాయ ఉత్పాదకత ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం, రైతులకు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం, అందం మరియు సౌందర్యం, వ్యవసాయ లాభాలు పెరగడం, నేలకోత తగ్గడం, వన్యప్రాణుల ఆవాసాలను సృష్టించడం, తక్కువ కాలుష్యం, జంతు వ్యర్థాల నిర్వహణ, పెరిగిన జీవ వైవిధ్యం, మెరుగైన నేల నిర్మాణం మరియు కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ మొదలగు ప్రయోజనాలు ఉన్నవి.

అగ్రోఫారెస్ట్రీ పద్ధతులు ముఖ్యంగా ఉష్ణమండలంలో ప్రత్యేకించి జీవనాధారమైన చిన్న కమతాల ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. దాని బహుళ ప్రయోజనాల కారణంగా ఉదాహరణకు పోషక చక్రప్రయోజనాలు మరియు కనుమలను తగ్గించే సంభావ్యతలో మన దేశంలో స్వీకరించబడినది.

1. మూలకాలు : వైవిధ్యం

వివరణ : అగ్రోఫారెస్ట్రీ వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో జీవవైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించే మరియు సంరంక్షించే చెట్లతో పంటలు మరియు పశువుల వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది.

2. సహసృష్టి మరియు జ్ఞానం యొక్క భాగస్వామ్యం

వివరణ : స్థానిక అగ్రోఫారెస్ట్రీ పరిజ్ఞానం దేశంలో సంవత్సరాలుగా పేరుకు పోయింది. ఇటీవలి కాలంలో వ్యవసాయ అటవీ వ్యవస్థలపై శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్ని సమీకరించే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

3. సినర్జీలు

వివరణ : చెట్లు, పంట మరియు పశువుల కలియికలను కలిగి ఉన్న భూవినియోగ పద్ధతులు వనరుల – వినియోగ సామర్థ్యం పరంగా సినర్జిస్టివ్ : పోషకాల సైక్లింగ్ మరియు వాతావరణ మార్పుల తగ్గింపు మరియు అనుసరణ ప్రయత్నాలను సమీకృతం చేసే వారి సామర్థ్యం ద్వారా ఇది కార్బన్ సీక్వెస్ట్రేషన్ మరియు వాతావరణ ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి రైతులకు సహాయం చేయడం ద్వారా జరుగుతుంది.

4. సమర్థత

వివరణ : అగ్రోఫారెస్ట్రీ ఇతర వ్యవసాయ వ్యవస్థల కంటే ఎక్కువ క్లోజ్డ్‌న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్‌కు దారి తీస్తుంది. తద్వారా పోషకాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించవచ్చు.

5. రీసైక్లింగ్

వివరణ : అటవీ వ్యవసాయం ప్రధానంగా నత్రజని స్థిరీకరించే చెట్లు లేదా సహజీవన ఫిక్రర్‌లను ఉపయోగించినప్పుడు పోషకాలను సమర్థవంతంగా పునరుద్ధరించవచ్చు మరియు ఉపయోగించవచ్చు.

6. స్థితి స్థాపకత

వివరణ : ఈ సమగ్ర సాగు పద్ధతి వలన రైతులను సామాజిక – ఆర్థికంగా మరియు వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో మరింత స్థితి స్థాపకంగా చేస్తుంది.

7. మానవ మరియు సామాజిక విలువలు

వివరణ : అటవీ వ్యవసాయం దాని పర్యావరణ, సామాజిక మరియు ఆర్థిక విధుల కోసం శతాబ్దాలుగా మానవ మరియు సామాజిక విలువలలో దృఢంగా పాతుకుపోయింది. ఇది సమీపములోని ఆహార వనరు, ఇంధనం మరియు మేత అందించడం, ఎక్కువ దూరం నడవాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గించడం మరియు వారి జీవనోపాధికి అనుబంధంగా ఉండటం వలన మహిళలు దీనిని మనోహరంగా భావిస్తారు.

8. సంస్కృతి మరియు ఆహార సంప్రదాయాలు

వివరణ : అగ్రోఫారెస్ట్రీ వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో జీవవైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించే మరియు సంరక్షించే చెట్లతో పంటలు మరియు పశువుల వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది.

అగ్రోఫారెస్ట్రీ అనేది భారతదేశంలో ఒక సాంప్రదాయిక అభ్యాసం. జీవనోపాధి, పోషకాహారం, శక్తి మరియు పర్యావరణ భద్రతకు దాని సహకారం కారణంగా ఇది కోరబడిన భూవినియోగ వ్యవస్థ.

అడవుల వెలుపల ఉన్న చెట్లు దేశం యొక్క చెట్లను పెంచుతాయి మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థ సేవలను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది కలప కోసం దేశం యొక్క డిమాండ్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని కూడా కలుస్తుంది. ప్రస్తుతం అటవీ వ్యవసాయ దేశంలోని ఇంధన కలప అవసరాలలో దాదాపు సగం, చిన్న కలపలో మూడింట రెండువంతులు, ప్లైవుడ్ 70–80 శాతం, కాగితం గుజ్జు కోసం ముడి సరుకులో 60 శాతం మరియు పచ్చిమేత అవసరాలలో 9–11 శాతాన్ని తీరుస్తుంది. పశువులు అలాగే ఆహారం, పండ్లు, పీచు, ఔషధం మొదలైన వాటికోసం గృహావసరాలను తీర్చడం చెక్క ఆధారిత పరిశ్రమలు అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

కావున రైతులందరూ పై ఉపయోగాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అటవీ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించి తద్వారా లబ్ధిపొందగలరని ఆశిద్దాం.

వివిధ కలప వృక్షాలు మరియు ఇతర వృక్షాల సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి,
తిరుపతి జిల్లా, సెల్ నెం. : 98495 63052

వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నిల్వ పద్ధతులు మరియు నిల్వలో నష్ట నివారణ చర్యలు

అందరికీ, అన్నివేళలా, సరిపడునంత పోషకాహారం అందుబాటులో ఉండటమే "ఆహారభద్రత" అని ఆహార మరియు వ్యవసాయ సంస్థ (FAO) నిర్వచిస్తున్నది. ప్రపంచంలో 130కి పైగా దేశాలు తమ ప్రజలకు ఆహారభద్రత కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యముగా కల్గియున్నాయి. భారతదేశంలో ఆహార భద్రతను సరియైన విధంగా అమలు పరచవలెనంటే ప్రజల ముఖ్య ఆహారమైన ధాన్యాలు, పప్పులు, నూనెగింజలను మరిన్ని ఉత్పత్తి చేయవలసి ఉంటుంది. ఆయితే ఆయా పంటల ఉత్పాదకత పంట పెరుగుదల సమయంలో, కోత మరియు కోత అనంతరం కలిగే వివిధ జీవ మరియు వాతావరణ ఒత్తిడుల మూలంగా దెబ్బతింటుంది. ముఖ్యంగా మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు అనగా అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక వర్షపాతం, దీర్ఘకాల బెట్టపరిస్థితులు, తుఫానులు, వరదలు, కుదింపబడిన వర్షాకాలం, అసాధారణ అత్యధిక మరియు అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు పంటలకు నష్టము కలుగజేయడమే గాక, కొన్ని పరిస్థితులలో చీడపీడలు అధికంగా వృద్ధి చెంది, వ్యాపించడానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. దాని వలన సస్యరక్షణ మరియు సాగు ఖర్చులు ఎక్కువ అవడమే గాక ఉత్పాదకత పడిపోవుచున్నది. ఇదిగాక, కీటకాలు, శిలీంధ్రాలు మరియు కలుపు మొక్కల కారణంగా వివిధ పంటలలో కోతకు ముందే సుమారు 20–35 శాతం ఉత్పత్తి నష్టము కావించబడుచుండగా, కోత అనంతర చర్యలలో 10–25 శాతం ఉత్పత్తి నష్టము జరుగుచున్నది.

పంటకోతలు సకాలంలో చేపట్టకపోవడం, నీటిని సకాలంలో పెట్టకపోవడం, సుదీర్ఘ బెట్టపరిస్థితులు, ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, నిలువ సమయంలో ఆశించే చీడపీడలు, ప్యాకేజింగు మరియు రవాణా చేయునపుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొనకపోవడం, ప్రాసెసింగ్ మెళుకువలు పాటించకపోవడం వంటివి కోత అనంతర నష్టాలకు కారణభూతమవుచున్నాయి. పంటకాలంలో అననుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు కోత అనంతర అశాస్త్రీయ నిల్వ పద్ధతులు ఉమ్మడిగా చిన్న, సన్నకారు రైతుల ఆర్థిక మరియు ఆహార భద్రత అంశాలపై తీవ్ర దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్తితులలో నీరు అతివిలువైన సహజ వనరు. ఉదాహరణకు, ఒక కిలో ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి సుమారు 3000 లీటర్లు సాగు నీటిని వినియోగించవలసి వస్తుంది. ఈ విధంగా నీరు, భూసారం, సౌరశక్తి మరియు ఇతర సహజ వనరులను వినియోగించుకోవడంతోపాటు, అనేక వ్యయప్రయాసలకోర్చి పండించిన ధాన్యాన్ని, ఇతర పంట ఉత్పత్తులను ఉద్దేశించబడినవారు ఆహారంగా ఉపయోగించుకొనేంత వరకు వాటి పరిమాణము, నాణ్యత మరియు పోషకవిలువలను కోల్పోకుండా సంరక్షించుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది. మనదేశంలో ఏటా సుమారు యాభైవేల కోట్ల రూపాయల విలువైన 12–16 మిలియన్ టన్నుల ఆహారధాన్యాలను శాస్త్రీయ కోత అనంతర ప్రక్రియలను పాటించకపోవటం వలన నష్టపోతున్నాము. వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న, జొన్నలు, పప్పులు, నూనెగింజలు మొదలగు ఆహారధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేసినది మొదలుకొని

వినియోగించుకొనేంత వరకు వివిధ స్థాయిలలో, వివిధ పరిమాణములలో, స్వల్ప లేదా దీర్ఘకాలం పాటు నిల్వ చేసినపుడు వివిధ కారణముల చేత నష్టపరచబడుచున్నవి.

నిల్వ ధాన్యాలకు నష్టము కలిగించే కారకాలను స్థూలంగా భౌతిక, జీవ, రసాయనిక మరియు యాంత్రిక కారకాలుగా విభజించవచ్చు. భౌతిక కారకాలలో ఉష్ణోగ్రత, తేమ, ధాన్యాగారాలు ముఖ్యమైనవి. ఎప్పుడైతే తేమ మరియు ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు జీవన ప్రక్రియ ఎక్కువగా ఉండి ధాన్యము యొక్క జీవితకాలం తగ్గుతుంది. కావున ధాన్యము యొక్క జీవిత కాలాన్ని పెంచాలంటే తేమ మరియు ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండేటట్లు నియంత్రించుకోవాలి.

కీటకాలు మరియు శిలీంద్రాలు త్వరగా అభివృద్ధి చెందడానికి తేమ ఉత్ప్రేరకముగా పనిచేస్తుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రత ధాన్యంలో రసాయనిక మార్పులు తెచ్చి తద్వారా ధాన్యమును నాశనము చేస్తుంది. కాబట్టి వర్షపాతము, ఉష్ణోగ్రత, గాలిలో తేమ, గింజలలో ఉన్న తేమ మొదలగు అంశాలు కూడా ధాన్యం నిల్వను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువలన, నష్ట శాతం అనేది ఆయా ప్రాంతాన్నిబట్టి, ఆయా ఉత్పత్తులను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అధిక తేమ, ఉష్ణోగ్రత ఉండే కోస్తా ప్రాంత వాతావరణంలో కోత అనంతర నష్టం కాస్త అధికంగానే ఉంటుంది. అదేవిధంగా చల్లగా ఉండే ఎత్తైన ప్రాంతాలలో ఆహార ధాన్యాలను ఎక్కువ కాలం సురక్షితంగా నిల్వచేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, నిలువకు ముందు ధాన్యాన్ని ఎండలో ఆరబెట్టుట, చల్లటి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయుట ముఖ్యమైనవి. ధాన్యాగారాల నుండి వేడి గాలి బయటకు వెళ్ళుటకు గాలి వదిలే పంకాలను ఏర్పాటు చేయుట, శాస్త్రీయంగా నిర్మించబడిన మంచి గాలి, వెలుతురు గల ధాన్యాగారాలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకొనుట, క్రమబద్ధమైన విరామ సమయాలలో ధాన్యపు బస్తాలను తిరగ త్రిప్పుట వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నేల ద్వారా చెమ్మ రాకుండా చెక్కలు, పి.వి.సి. మరియు వెదురు చాపలను డన్నేజిగా ఉపయోగించాలి, గిడ్డంగిలోకి ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని చేరనివ్వకూడదు. వర్షాకాలం లీకేజీల నుండి రక్షించుకోవడానికి సరిపడా టార్పాలిన్‌లను సమకూర్చుకోవాలి.

ధాన్యాగారములో ఆహార ధాన్యాల నిల్వ

సాధారణంగా ఆహార ధాన్యాలను గోనె సంచులలో పోసి గిడ్డంగులలో నిలువ ఉంచుతారు. గిడ్డంగుల నిర్మాణం శాస్త్రీయత ఆధారంగా నిర్దేశిత ప్రమాణాలకు లోబడి చేపట్టాలి. గిడ్డంగుల పునాది నేల మట్టమునకు 1 మీ. ఎత్తుగా ఉండేలా నిర్మాణం చేయాలి. అలాగే కిటికీలకు వైర్‌మెష్‌లు, వెంటిలేటర్లు, వర్షపు మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయుట, తడి చేరని విధంగా గిడ్డంగుల గచ్చు నిర్మాణం, ఎలుకలను, పక్షులను నియంత్రించుట, ధాన్యపు బస్తాలను తరలించటానికి వీలుగా రైలు, రోడ్డు రవాణా సౌకర్యం, ధాన్యం తడిచినట్లయితే, ఆరుదల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, ఉష్ణాన్ని నిరోధింపగల పైకప్పు, గోడలకు, గచ్చుకు ఎటువంటి పగుళ్ళు గాని సందులుగాని లేకుండుట, గిడ్డంగులలోనికి గాలి ధారాళంగా ప్రసరించే విధంగా ఎదురెదురు ద్వారాలు మొదలైన సౌకర్యాలు శాస్త్రీయంగా నిర్మించే గిడ్డంగులలో ఉండాలి.

సుమారు 5000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం నిల్వకు గిడ్డంగులను కట్టడానికి 2 ఎకరాల ఖాళీ స్థలం అవసరమవుతుంది. ప్రామాణిక డిజైన్ ప్రకారం గిడ్డంగి పొడవు 126 మీ., వెడల్పు 21.8 మీ. కలిగి మూడు కంపార్ట్‌మెంట్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఇటువంటి గిడ్డంగికి 8 లేక 10 ద్వారాలు కల్గి, తలుపులు మూయుటకు 1.86 మీ. × 2.48 మీ. రోలింగ్ షట్టర్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వీలైతే రోలింగ్ షట్టర్ల క్రింది భాగంలో మెటల్ షీటు లైనింగ్ కాని రబ్బరు షీటు కాని అమర్చవచ్చు. పైకప్పు సరిగ్గా అమరటానికి స్టీల్ ట్యూబులర్ ట్రసెస్‌ను 21.5 మీ. నిడివి తోటి 22.5^{O} వాలుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలాగే గిడ్డంగి డ్రైయిన్‌లను ఇనుప జాలీలతో మూసివేయాలి. బయటగల చెట్ల కొమ్మలు, వైర్లు గిడ్డంగుల పైకి వాలకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

ధాన్యం నిలువ చేయటానికి ముందస్తుగా స్టాక్ ప్లాన్, డన్నేజీల వినియోగం, కీటక నివారణ చర్యల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. ద్వారాలకు ఎదురుగా సరైన స్థలం వదిలి స్టాకింగ్ చేయవలెను. స్టాకింగ్‌ను బ్లాక్ పద్ధతి ద్వారా లేదా క్రిస్ క్రాస్ పద్ధతి ద్వారా గోనె సంచుల మూతులు లోనికి ఉండేలా చేయవలెను. ప్రతి స్టాక్ క్రింద డన్నేజీని 1.5 మీ. × 0.9 మీ. సైజులుగా నేల పైనుండి 20 సెం.మీ. ఖాళీ ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వాతావరణం సరిగ్గా ఉన్న సమయాలలో కిటికీలు మరియు వెంటిలేటర్లు తెరిచి ఉంచవలెను. ప్రామాణిక స్టాక్ అనగా 30 అడుగుల పొడుగు, 20 అడుగుల వెడల్పు కలిగి, 15 పై వరుసలలో బస్తాలు ఉండాలి.

జీవకారకాలైన శిలీంధ్రాలు, క్రిమి కీటకాలు, ఎలుకలు, పక్షులు ఆహార ధాన్యాలను ఆశించుటవలన కలిగే ప్రత్యక్ష నష్టములే గాక వాటి విసర్జకాలు, అవయవ భాగాలు, అఫ్లోటాక్సిన్స్ మొదలగు వాటివలన నాణ్యతను కోల్పోవడం, వాసనతో ఆహారయోగ్యంగా లేకపోవడం వంటి పరోక్ష నష్టాలుకూడా సంభవిస్తాయి.

ధాన్యాన్ని ఆశించే కీటకాలను గింజల లోపలనుండి తినే కీటకాలు మరియు గింజ బయటనుండి తినే కీటకాలు అని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చును. వరి, మొక్కజొన్న, చిరుధాన్యాలను ఆశించే ముక్కుపురుగు, నుసిపురుగు, అపరాలను ఆశించే పుచ్చుపురుగు, వేరుశనగ పుచ్చుపురుగు, ప్రాసెస్ చేయబడిన పదార్థాలు, సుగంధద్రవ్యాలు, పసుపు, కారం, సాంబారుపొడి వంటి పదార్థాలను ఆశించే పొగాకు పురుగులు మొదటికోవకు వస్తాయి. బియ్యం తుట్టుపురుగు, ఇండియన్ మీల్‌మాత్, ఆల్మండ్ మాత్, ఎర్ర పెంకుపురుగు వంటివి గింజ బయట ఉండి తినే కీటకాల కోవకు వస్తాయి.

కొన్ని కీటకాలు క్షేత్రస్థాయిలోనే అనగా గోదాము నుండి ఎగిరి వెళ్ళి పొలంలో ఆశించుట ద్వారా తిరిగి గోదాములోనికి తీసుకురాబడతాయి. ఉదాహరణకు కేవలం 1-2 శాతం ఉండే క్షేత్రస్థాయి పుచ్చుపురుగు 6-8 నెలల్లో అపరాలను 80 శాతం లేదా పూర్తిస్థాయిలో నష్టపరచవచ్చును. అనేక సందర్భాలలో కీటకములను మనం గుర్తించే సమయానికే ఆహారధాన్యాలకు కొంతమేర నష్టము కలిగించి ఉంటుంది. కాబట్టి, అవి ఆశించక మునుపే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొనుట అవసరము.

రైతు స్థాయిలో గృహ నిల్వ

పంట కోసిన అనంతరం ధాన్యాన్ని ఎండలో బాగా ఆరబెట్టి (వరిలో 11-12 శాతం, అపరాలలో

10 శాతం మరియు నూనెగింజలలో 7–8% తేమ ఉండేటట్లు) నిల్వఉంచితే పురుగు పట్టకుండా 6 నుండి 12 నెలల వరకు కాపాడవచ్చు. ఆహార పదార్థాలపై రసాయనిక కీటకనాశినులను వాడలేము కాబట్టి వాటిని ఆశించు కీటకాలను నియంత్రించుటకు గాను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. వృక్ష సంబంధిత పదార్థాలైన వేపాకు, వేపనూనె, వేపగింజల పొడి, సీతాఫలం గింజల పొడి, వసకొమ్ముల పొడి (2%) ధాన్యంలో కలిపి 6 నెలల వరకు పురుగుల ద్వారా నష్టం కలగకుండా కాపాడవచ్చు. నిల్వ ధాన్యంలో ఉత్తేజ పరచబడిన బంకమన్ను (యాక్టివేటెడ్ క్లే), సముద్రపు నాచు పొడి (డయాటమేషియస్ ఎర్త్), ఇసుక, వరి పొట్టు లేదా పిడకలు కాల్చగా వచ్చిన బూడిద వంటివి కలుపుకొని చాలా వరకు పురుగు పట్టకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఇండ్లలో నిల్వ చేసుకొనే డబ్బాలలోని పురుగులను రంధ్రాలు కల్గిన చిన్న చిన్న పరికరాల ద్వారా ఆకర్షించి తొలగించవచ్చును లేదా వాటి ఉనికిని గమనించి తగిన చర్యలు చేపట్టవచ్చు. వంటింటి పదార్థాలన్ని గాలి చోరని సీసాలలో లేదా ప్యాకెట్లలలో భద్రపరుచుకోవాలి. ఇటీవల అధిక సాంద్రత కల్గిన పాలిథీన్, పి.వి.సి.లతో తయారుచేయబడి, గాలి మరియు తేమ చోరని సంచులు వివిధ సైజులలో అనగా 25 కిలోల నుండి కొన్ని టన్నుల పరిమాణంలో ధాన్యాన్ని నిల్వబెట్టటకు గాను అందుబాటులో కలవు. దీనిలో ధాన్యం నిల్వ చేసినప్పుడు సంచి లోపలి వాతావరణంలో కీటకాలుగాని, శిలీంధ్రములు గాని పెరగవు. అయితే తప్పని సరిగా గింజలలో తేమ తగుమాత్రమే ఉండాలి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పండించబడే అపరాలలో కంది, శనగ, మినుము, పెసర ముఖ్యమైనవి. అపరాల నిల్వలో ప్రధాన సమస్య పుచ్చుపురుగు. ఇది ఆశించిన 3–4 నెలలలోనే నిల్వ చేసిన పప్పు గింజలను ఆహారంగా ఉపయోగించుటకు గాని, విత్తనముగా గాని, పశువుల దాణాగాగాని పనికి రాకుండా చేస్తాయి. రైతులు తమ ఆహార అవసరాల కొరకు, తరువాతి సీజనుకు కావల్సిన విత్తనము కొరకు లేదా గిట్టుబాటు ధర కొరకు వేచియుండునప్పుడు వివిధస్థాయిలలో వివిధ పరిమాణములలో నిల్వ చేస్తారు. సాధారణంగా పుచ్చుపురుగులు, డబ్బాలలో లేదా సంచులలోని ఉపరితలంలో ఉన్న గింజలను ఆశిస్తాయి. అంతేగాక క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన పురుగులు అవి ఎక్కడి నుండి ఏపొరలో ఉన్న గింజలనుండి వెలువడినప్పటికీ గింజల ఉపరతలానికి వచ్చి, ఆడ, మగ పురుగులు స్వేచ్ఛగా తిరుగాడుతూ కలిసిన తర్వాత ఆడపురుగులు తిరిగి క్రొత్త గింజలపై గుడ్లను పెడతాయి.

అపరాల గింజలపై 3 సెం.మీ. ఇసుకపొరను ఉంచడం అనేది అపరాలకు పుచ్చుపురుగు ఆశించకుండా ఉంచేందుకు చక్కటి ఉపాయం. డబ్బాల్లో లేదా పాలిథిన్ సంచులలో ఉంచిన అపరాల గింజలపై జల్లించిన నది ఇసుకను వేసి డబ్బా ప్రక్కల వెంబడి నెమ్మదిగా తట్టినచో గింజల మధ్య ఉన్న ఖాళీ పూరింపబడి, పుచ్చుపురుగుల కదలికలకు అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఆపైన 3 సెం.మీ. ఇసుకపొర ఉపరితలంపై ఉండేలా ఏర్పాటు చేస్తే బయటి నుండి వచ్చే పుచ్చుపురుగులు కూడా నిల్వచేసిన అపరాలను ఆశించలేవు. ఈ విధంగా 9–12 నెలల వరకు గింజల మొలక శాతం కూడా దెబ్బతినకుండా సంరక్షించుకోవచ్చు. ఇంతకుముందే 1–2 శాతం ఆశించి ఉన్నట్లయితే, వెలువడిన పురుగులు గింజల మధ్య ఉన్న ఇసుక వత్తిడికి చనిపోతాయి. పెద్ద సైజు బాన/మంచినీటి

మట్టి కుండలలో కూడా విత్తనం కొరకు ఉంచే అపరాలను పోసి పైన మూతి భాగంలో 3 సెం.మీ. ఇసుక పొరను ఉంచి కూడా నిల్వచేసుకొనవచ్చు. రసాయన క్రిమి సంహారక మందులను వాడకుండా పుచ్చుపురుగును నియంత్రించుటకు ఇది చక్కని ఉపాయం.

ఇటీవల కాలంలో చిరుధాన్యాలను ఆహారంగా వినియోగించుచున్న వారి సంఖ్య విరివిగా పెరుగుట వలన వివిధ స్థాయిలలో వాటిని నిల్వ చేయుచున్నారు. చిరుధాన్యాలను ఎక్కువ కాలము నిల్వచేయాలంటే వాటిని ప్రాథమిక ప్రోసెసింగ్ చేయకుండా అంటే పొట్టు తీయకుండా నిల్వ ఉంచితేనే మేలు. జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్ర, సామ, ఊద, వరిగ మరియు అరికెలు పొట్టుతీయకుండా నిల్వఉంచినప్పుడు జొన్న, సజ్జలకు ఆశించినంతగా మిగిలిన ధాన్యాలకు కీటకాలు ఆశించవు. అనేక పొరలు కల్గిన విత్తన కవచము గుండా గింజను ఆశించే పురుగులు లోపలికి ప్రవేశించలేవు, అంతేగాక గింజల పరిమాణం చిన్నగా ఉండటం వలన గింజలోపల ఉండి తినే ముక్కు పురుగులు ఆశించవు. పొట్టు తీసిన పిదప పిండిపురుగు, తుట్టుపురుగులు త్వరగా ఆశించడం వలన, శిలీంధ్రములు చేరి వాటి నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయి. అంతేగాక పొట్టు తీసిన బియ్యం బయటి వాతావరణానికి బహిర్గతమవుటవలన రసాయనికచర్యలు జరిగి క్రమేణ పాడైపోతాయి.

ఇతర ధాన్యాలతో పోల్చుకుంటే, చిరుధాన్యాలలో ఎక్కువ మొత్తంలో కొవ్వు పదార్థాలు ఉండడం మరియు అల్యురోన్ పొర, బీజములలోని లైపేజ్ ఎంజైమ్ వలన ట్రై-గ్లిజరైడ్స్ జలవిశ్లేషణ ప్రక్రియ ద్వారా ఆక్సీకరణ చెందడం వలన మర ఆడించిన బియ్యం మరియు పిండి ఉత్పత్తులు త్వరగా నాణ్యతను కోల్పోయి చెడువాసనను విసర్జిస్తాయి. చిరుధాన్యాల బియ్యం యొక్క నిల్వ కాలమును పెంచుటకు వాక్యూమ్ ప్యాకేజింగ్, మిశ్రమ వాయు సహిత ప్యాకేజింగ్ మరియు గాలి చోరని సంచులు/పాత్రలలో నిల్వ ఉంచవలెను.

గోదాములలో నిల్వ

నూర్పిడి చేసే యంత్రాలను, నూర్పిడి చేసే ప్రాంతాలను, రవాణాకు ఉపయోగించే వాహనాలను వాడే ముందు శుభ్రపరుచుకోవాలి. పాత గోనె సంచులను నిల్వచేయడానికి ఉపయోగించేటట్లయితే, వాటికి చిరుగులు లేకుండా చేసి మలాథియాన్ 50 ఇ.సి. 2 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపిన ద్రావణంలో 10 నిమిషాలు ముంచి ఆరబెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలి. నిల్వ చేసే గోదాములను ముందుగా శుభ్రం చేసి గోదాముల పైకప్పు, గోడలు, నేలలో పగుళ్ళు, రంధ్రాలు లేకుండా సిమెంట్‌తో పూడ్చాలి. తర్వాత నేలపై, గోడలకు, పైకప్పుకు మరియు గోనె సంచులపై మలాథియాన్ 50 ఇ.సి. 10 మి.లీ. లేదా డెల్టామెత్రిన్ 2.5 డబ్ల్యూ.పి. 40 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపి 100 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణానికి 3 లీటర్ల చొప్పున పిచికారి చేసుకోవాలి. ధాన్యపు బస్తాలకు తేమ చేరకుండా ఉండేందుకు చెక్క దిమ్మెలపై వాటిని అమర్చాలి. గోదాముల్లో ప్రక్క గోడలకు, పైకప్పునకు తగలకుండా బస్తాలను అమర్చాలి. స్టాక్ (నెట్టు) చుట్టూ రెండు అడుగుల స్థలం వదిలితే అప్పుడప్పుడు ధాన్యాన్ని గమనించేందుకు మరియు మందుల పిచికారికి వీలుకలుగుతుంది.

ధాన్యంలో పురుగు ఆశించినపుడు గాదెల్లోగాని, పాత్రల్లోగాని, గోదాముల్లోగాని అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ బిళ్ళల ద్వారా ఊదరబెట్టి పురుగులను నివారించవచ్చు. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో ఉండి 55 శాతం అల్యూమినియమ్ ఫాస్ఫైడ్ మరియు 45% అల్యూమినియమ్ కార్బొనేట్ కల్గి ఉంటుంది. ఒక్క టాబ్లెట్ సుమారు 3 గ్రాములు ఉండి తేమతో కలసినపుడు 1 గ్రా. ఫాస్ఫైడ్ వాయు రూపంలో బయటికి వెలువడుతుంది. దీనికి అన్ని దశలలోని కీటకాలను నశింపజేయు శక్తి ఉంటుంది. ఫాస్ఫైడ్‌తో పాటు కార్బన్‌డై ఆక్సైడ్ మరియు అమ్మోనియా వెలువడి ఫాస్ఫైడ్ యొక్క మంటలంటుకునే గుణాన్ని తగ్గిస్తుంది. కవరుతో కప్పినట్లైతే మెట్రిక్ టన్ను ధాన్యానికి 3 ట్యాబ్లెట్లు వాడాలి. షెడ్ ఫ్యూమిగేషన్ కొరకు 100 క్యూ.మీ. లకు 120 ట్యాబ్లెట్లు వాడాలి. ఈ విధంగా ఏడు రోజులు ఊదరబెట్టిన తర్వాత నెమ్మదిగా పట్టాలు తీసివేసి 2 రోజులపాటు ఏరేషన్ (గాలి ప్రవేశం కొరకు) చేయాలి. ఊదరబెట్టడం కేవలం సుశిక్షితుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేపట్టాలి.

ఎలుకల యాజమాన్యం

నిల్వ చేసిన ధాన్యంలో ఎలుకలు ఆశించుటవలన కూడా గణనీయమైన నష్టం కలుగుచున్నది. ఎలుకలు పొలంలో వివిధ దశలలో ఉన్న పంటలను మాత్రమేగాక నిల్వ చేసిన ధాన్యాలను తిని, వాటి విసర్జితాల వలన కలుషితం చేస్తాయి. సాధారణంగా ఎలుకలు తినేవాటి కన్నా 5–10 రెట్ల వరకు పదార్థాన్ని నిరుపయోగ పరుస్తాయి. ముందుగా ఎలుకల ఉనికిని గ్రహించుకొని సకాలంలో నివారణ మరియు నిర్మూలన చర్యలను చేపట్టినట్లయితే ధాన్యం నిల్వలలో ఎలుకలను సమర్ధవంతంగా నివారించవచ్చును. ఎలుకల విసర్జితాలు, గుర్తులు, బొరియలు, అవి కొరికిన వస్తువులు, నడిచిన దారులు, నూనె చారలు, మరియు వాటి కదలికలను బట్టి వాటి ఉనికి గ్రహించవచ్చు. గిడ్డంగులలో ఎలుకల ఉనికిని గ్రహించగానే యాజమాన్య పద్ధతులను అవలంభించాలి. ఈ ప్రక్రియలో రెండు పద్ధతులు కలవు. అవి రసాయనేతర మరియు రసాయనిక పద్ధతులు.

రసాయనేతర పద్ధతులు : ఇవి రసాయనిక విషపు ఎరలు వాడకుండా ధాన్యపునిల్వలలో చేపట్టే జాగ్రత్తలు. ఎలుకలు ఎక్కువగా ఆహార లభ్యతగల ప్రదేశాలలోనే నష్టం కలుగజేస్తాయి. ఈ ప్రదేశాలలో పరిశుభ్రత పాటించినట్లయితే ఎలుకలను నివారించుకోవచ్చు. గిడ్డంగుల లోపలేగాక బయట కూడా శుభ్రపరుచుకోవాలి. చెత్తా చెదారం లేకుండా బయట, లోపల రోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి. బయట గడ్డి, కలుపు లేకుండా నివారించాలి. ఎప్పటికప్పుడు గోదాములోనికి వెళ్ళుటకు తాత్కాలిక మెట్లను ఏర్పరచుకోవాలి గాని స్థిరమైన మెట్లను నిర్మించరాదు. పై కప్పుకు ఆస్‌బెస్టాస్ షీటుగాని కారుగేటెడ్ షీటుగాని వాడినప్పుడు, జాయింట్ల మధ్య వైర్ నెట్‌తో గోడ మరియు పైకప్పును మూసివేయాలి. అలాగే గిడ్డంగి డ్రైయిన్‌లను ఇనుప జాలీలతో మూసివేయాలి. గిడ్డంగి షట్టర్లు మరియు కిటికీల జాయింట్లకు టిన్ ప్లేట్లను అమర్చడం ద్వారా మధ్య ఖాళీలు లేకుండా చేయాలి. ఎలుకలు గిడ్డంగులలోనికి చేరకుండా ఉండే విధంగా మెటల్ షీట్‌లు, ఐరన్ మెష్‌లు తలుపులకు, కిటికీలకు అమర్చుకోవాలి. బయట గల చెట్లకొమ్మలు, వైర్లు మేడపైకి, గిడ్డంగుల పైకి వాలకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

వివిధ రకాల ఎర బుట్టలను ఎలుక దారులలో, నూనె చారలు కనబడినచోట, బొరియల వద్ద ఏర్పాటు చేసుకొని, రోజు గమనించుకొని బుట్టలలో పడిన ఎలుకలను వెంటనే చంపివేయాలి. లేకపోతే, ఇతర ఎలుకలకు ఎరబుట్టలతో బిడియం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. గోదాము పరిసరాలలోగల ఎలుక బొరియలలోకి బ్రోహ్యూమిగేటర్ సహాయంతో పొగబారించినట్లయితే కన్నంలోగల తల్లి మరియు పిల్ల ఎలుకలు ఊపిరాడక చనిపోతాయి. పొగను వదిలేటప్పుడు కన్నంచుట్టూ ఉన్న పగుళ్ళను మట్టితో మూసివేసి, పొగను కనీసం మూడు నిమిషాలు పదలాలి.

రసాయన పద్ధతులు :- ఎలుకల నివారణలో రసాయనికాలదే ముఖ్య పాత్ర. తగు జాగ్రత్తలు పాటించి ఉపయోగిస్తే గిడ్డంగులలో ఎలుకల నివారణ సాధ్యం అవుతుంది. ధాన్యం నిల్వలలో ఎలుకల నివారణకు ఉపయోగించే రసాయనికాలు రెండు రకాలు : 1. విషపు ఎరలు, 2. విషపు బిళ్ళలు (అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ బిళ్ళలు). ప్రస్తుత మార్కెట్‌లో విషపు ఎరలకు గాను రెండు మందులు వాడుకలో కలవు. అవి జింక్ ఫాస్ఫైడు మరియు బ్రోమోడయలోన్.

జింక్ ఫాస్ఫైడు : ఈ విషపు ఎరను తిన్న ఎలుకలు వెంటనే ఒక్క రోజులో కడుపు మంటతో చనిపోతాయి. కావున ఇతర ఎలుకలకు ఎర బిడియం ఏర్పడుతుంది. ఈ బిడియం మందు మోతాదు, ఎలుక జాతిని బట్టి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు. అందువల్ల ఈ జింక్‌ఫాస్ఫైడు విషపు ఎరను వాడేటప్పుడు ముందుగా 3-4 రోజుల పాటు ఎలుకలను మామూలు విషంలేని ఎరతో మచ్చిక చేసుకోవాలి. అలాగే అవసరాన్నిబట్టి ఈ మందును కేవలం ఆరు నెలలలో ఒక్కసారి మాత్రమే వాడుకోవాలి. జింక్‌ఫాస్ఫైడు విషపు ఎరలను కేవలం ఎర స్థావరాలలో మాత్రమే వాడుకోవాలి. ఇళ్ళలో ఈ ఎరను వాడడం పెంపుడు జంతువులకు, మనుషులకు ప్రమాదకరం. ఈ ఎరను తిన్న ఎలుకలు 4-6 రోజులలో రక్తహీనతతో చనిపోతాయి, కాబట్టి, ఎలుకల మరణం సహజంగా అనిపించి ఎలుకలలో భీతి ఏర్పడదు. కావున అవవసరాన్ని బట్టి ఈ ఎరను 3-4 సార్లు వాడుకోవచ్చు.

బ్రోమోడయలోన్ : బ్రోమోడయలోన్ ఎర మందు కేక్, పౌడర్ రూపాలలో లభస్తుంది. విషపు ఎరకు గాను 100 శాతంలో 2 శాతం మందు, 2 శాతం నూనె, 96 శాతం వరి నూకలు ఉండేలా తయారు చేసుకోవాలి. మిగిలిపోయిన ఎరను, చనిపోయిన ఎలుకలను భూమిలో పాతి పెట్టాలి.

అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ బిళ్ళలు : ఊదరబెట్టుట (ఫ్యూమిగేషన్) ద్వారా ధాన్యాన్ని ఆశించు కీటకాలు మరియు ఎలుకలను నశింపజేయవచ్చు. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ ఊదరబెట్టునప్పుడు సుశిక్షితులైన కఠిన పర్యవేక్షకులు ఉండాలి. ఒక టన్ను ధాన్యానికి 3 గ్రా. బిళ్ళలను 3 చొప్పున వాడాలి. గోదాము ప్రధాన ద్వారములు, కిటికీలు మరియు వెంటిలేటర్లను ఆమోదించిన మందం గల పేపర్లు మరియు టేపు సహాయంతో ఎక్కడా లీకేజీలు లేకుండా సీల్ చేయాలి. వారం తర్వాత తిరిగి తెరిచిపుడు విషవాయువు పూర్తిగా బయటకు పోయేవరకు 24 గంటలు వేచివుండాలి. నైపుణ్యం కలిగిన వారే ఈ ప్రక్రియను చేపట్టాలి.

ప్రస్తుతం ఊదరబెట్టుటకు అందుబాటులోవున్న తక్కువ ఖరీదైన రసాయనం అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ మాత్రమే. ఇప్పటికే అనేక దేశాలలో వివిధ కీటకములు అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ నుండి వెలువడే 'ఫాస్ఫీన్' విష

వాయువును తట్టుకునే శక్తిని సంతరించుకున్నప్పటికీ సరైన మోతాదులో, సరైన కాల వ్యవధితోపాటు ఎటువంటి లీకేజీలు లేకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతులననుసరించి గోదాములలో ఊదరబెట్టుటను చేపట్టినట్లైతే మరి కొంతకాలంపాటు ఈ రసాయనమును నిల్వధాన్యాల యాజమాన్యంలో వాడుకొనుటకు అవకాశం ఉంటుంది.

సాంప్రదాయ నిల్వలో ఉపయోగించు వివిధ రకాల సాధనాలు

నిల్వచేయవలసిన ధాన్యము, దాని పరిమాణమును బట్టి మట్టి కుండలు, ఎండిన సొరకాయ బుర్రలు, వెదురుతో అల్లిన బుట్టలు, అడ్డాకులతో తయారుచేసిన పాత్రలను వాడుకొనేవారు. ఇవి ఆదివాసీ తెగలు నివసించే కొన్ని ఏజన్సీ ప్రాంతాలలో ఇప్పటికీ అందుబాటులో గలవు.

వెదురుతో నిర్మించినవి : వెదురు బుట్టలను అల్లి స్థూపాకారంలో అడుగున వెడల్పు ఉంచి పైన మూతి సన్నగా ఉండేటట్టు నిర్మిస్తారు. దీనిలో సాధారణంగా వరి, గోధుమ, జొన్నలను నిల్వ చేసుకొనవచ్చును. దీని సామర్థ్యం 500 కిలోల వరకు ఉండును. దీని జీవితకాలం 4-5 సం॥ వరకు ఉంటుంది.

మట్టితో కట్టడం : దీనిని బంకమన్ను, వరిగడ్డి మరియు ఆవుపేడలను 3:3:1 నిష్పత్తిలో కలిపి తయారుచేసి ఎండబెట్టి కాల్చెదరు. వరి, గోధుమ, నూనె గింజలు మరియు అపరాలను నిల్వ ఉంచుకొనవచ్చును. దీనిలో 5 నుండి 10 క్వింటాల వరకు నిల్వ చేసుకొనవచ్చును. దీనిని 10 సం॥ వరకు ఉపయోగించు కొనవచ్చును. పగుళ్ళు ఏర్పడినప్పుడు వర్షాకాలంలో బయటి వాతావరణం నుండి తేమను గ్రహించడం వలన పురుగులు, శిలీంధ్రాలు లోపలికి ప్రవేశించి ధాన్యం చెడిపోవుటకు అవకాశం కలదు.

కలపతో నిర్మించే నిర్మాణాలు : పరిసర ప్రాంతాలలో దొరికే కలపతో నిర్మించి నల్లటి రంగు పూసెదరు. పైన 30 సెం.మీ. × 20 సెం. మీ. (పొడవు × వెడల్పు) తో లోపలికి ప్రవేశించుటకు మార్గం ఏర్పాటు చేయబడివుంటుంది. అదేవిధంగా అడుగున 30 సెం.మీ. × 15 సెం.మీ. ఉత్పత్తులను బయటకు తీయుటకు మార్గం ఏర్పాటు చేసి ఉండును. సాధారణంగా వరి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయుటకు వాడుదురు. నిల్వ సామర్థ్యం 10 క్వింటాళ్ళు.

ఇటుకలతో నిర్మించే నిర్మాణాలు : దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో సిమెంట్ మరియు ఇటుకలతో గోడ మందం 40-50 సెం.మీ. ఉండునట్లు నిర్మించెదరు. పైన 50×50 సెం.మీ. లోనికి ప్రవేశించుటకు మార్గం, క్రింద 15×15 సెం.మీ. నిల్వ ధాన్యాన్ని తీయుటకు మార్గం ఏర్పాటు చేయుదురు. వరి, గోధుమ మరియు జొన్నలను నిల్వచేయుటకు ఉపయోగించెదరు. నిల్వ సామర్థ్యం 25-30 క్వి. 25-30 సంవత్సరాల వరకు చెక్కుచెదరకుండా వాడుకొనవచ్చును.

భూమి లోపల నిర్మాణాలు : భూమి లోపల వృత్తాకారంలో 100-400 సెం.మీ. లోతులో 50-100 సెం.మీ. వ్యాసం భూమిపైన, భూమిలోపల 250-300 సెం.మీ. వ్యాసం ఉండేవిధంగా త్రవ్వి, అడుగు భాగంలో గడ్డి మరియు ఊకను పరచి నిర్మించెదరు. ఉత్పత్తులను నిల్వ చేసిన పిదప పైన గడ్డి మరియు రాళ్ళతో మూసివేయవలెను. దీనిని అపరాల నిల్వకు ఉపయోగించెదరు. 100-200 క్వి. వరకు నిల్వచేయవచ్చును. పురుగుల నుండి ఉత్పత్తులను కాపాడుకోవచ్చును, కాని విత్తన మొలక సామర్థ్యము తగ్గును.

పుసా బిన్ : మట్టితో నిర్మించిన కట్టడంను ఆధునీకరించబడినది. తేమ, గాలి లోపలికి చొరబడనీయకుండా ఏర్పాటు చేయబడినది. 700 గేజ్ మందముగల పాలిథీన్ పొర అన్నివైపులా మరియు ఉపరిభాగములోను అమర్చి బురద మట్టితో మూసివేయబడి ఉంటుంది. బయటి గోడలు కాల్చిన ఇటుకతో 45 సెం.మీ. ఎత్తు నిర్మించబడి వుండుటవలన ఎలుకలు చొరబడవు.

మెటల్ బిన్ : స్టీలు లేదా అల్యూమినియమ్ రేకుతో తయారు చేయబడిన బిన్‌లలో ఆహార ధాన్యాలను నిల్వచేసినచో వేడి మరియు చెమ్మనుండి కాపాడుకోవచ్చును. అత్యధిక మన్నిక కలిగి, 1 నుండి 10 టన్నుల సామార్థ్యం కలిగిన బిన్‌లు మార్కెట్‌లో అందుబాటులో కలవు.

సైలో : సిమెంటు కాంక్రీటు లేదా గాల్వనైజ్డ్ ఇనుప రేకు లేదా అల్యూమినియం రేకులచే స్థూపాకారంలో నిర్మించబడి లోడింగ్ మరియు అన్‌లోడింగ్‌కు తగిన యాంత్రిక సదుపాయాలు కల్గి అధికనిల్వ సామర్థ్యం కల్గిన సైలో నిర్మాణాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

శాస్త్రీయంగా నిర్మించబడిన గిడ్డంగులుకాక, అందుబాటులో ఉన్న ఏదో ఒక కట్టడాన్ని నిల్వ కొరకు ఉపయోగించడం పలు నష్టాలకు దారి తీస్తుంది. దీనితోపాటు తక్కువ నాణ్యత కల్గిన గోనెసంచులు వాడడం, సులభతర హాండ్లింగ్ కొరకు కూలీలు కొక్కెములు వాడడం, లోడింగ్ మరియు అన్‌లోడింగ్ సమయాలలో టార్పాలిన్ పట్టాలు వాడక పోవడం, గిడ్డంగి (షట్టర్‌లు, వెంటిలేటర్‌లు, పైకప్పు, గచ్చు) నిర్మాణ లోపాలు, అపరిశుభ్ర పరిసరాలు, గోదాములలో ఉన్న పురుగులు మరియు శిలీంధ్రాలు ఆశించిన పాత సరుకులు మొదలైనవి ఆహార నిల్వలో అధిక నష్టాలకు కారణభూతమౌతున్నాయి. గోదాములలో ఆహారధాన్యాల నిల్వ మరియు హ్యాండ్లింగ్‌లో గల నిర్వహణ మరియు యాజమాన్య లోపాలను అధిగమించడానికి సైలో పద్ధతి చక్కటి ప్రత్యామ్నాయం.

ఇందులో వివరించిన విధంగా పంటకోతల ముందు మరియు కోతల సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని, ధాన్యాన్ని సూర్యరశ్మితో తగుతేమ వచ్చేంతవరకు ఆరబెట్టి మరల చల్లబరచి, హ్యాండ్లింగ్‌లో జాగ్రత్తలు వహించి, ఇళ్ళలోగాని, ఆధునీకరించిన ధాన్యాగారాలలోగాని ఉష్ణోగ్రత, తేమ, కీటకాలు, శిలీంధ్రములను పర్యవేక్షించుకొంటూ తగు నివారణా చర్యలు తీసుకొంటూ శాస్త్రీయ నిల్వ పద్ధతులను ఆచరించినట్లయితే ఆహార ధాన్యాలను సంరక్షించుకోవచ్చు, తద్వారా ఆహారభద్రతకు తోడ్పడవచ్చును.

వ్యవసాయోత్పత్తుల సద్వినియోగంపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

అసోసియేట్ డీన్, డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఆర్.ఇ.ఇ.)

బాపట్ల - 522 101, సెల్ : 99896 25205

మెట్ట వ్యవసాయంలో మెళకువలు

మన దేశంలోని మొత్తం సాగు భూమిలో 67 శాతం వర్షాధారంగా సాగవుతుంది. పంటల దిగుబడిలో 43 శాతం మెట్ట సాగు నుండి వస్తుంది. కనుక దేశ ఆహార భద్రతలో మెట్ట వ్యవసాయం ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 67.19 లక్షల హెక్టార్ల సాగుభూమిలో, సుమారుగా 58.20 శాతం అంటే 39.15 లక్షల హెక్టార్లలో వ్యవసాయం వర్షాధారంగానే జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యల్ప వర్షపాత మండలము (16.50 లక్షల హెక్టార్లు), కృష్ణా మండలము (8.68 లక్షల హెక్టార్లు), దక్షిణ మండలము (5.85 లక్షల హెక్టార్లు) మరియు ఉత్తర కోస్తా మండలములో (5.35 లక్షల హెక్టార్లు) వివిధ పంటలను వర్షాధారంగా సాగు చేస్తున్నారు.

వ్యవసాయ వాతావరణ మండలము	వర్షాధార భూమి (లక్షల హెక్టార్లు)	వర్షాధార భూమి శాతం
అత్యల్ప వర్షపాత మండలము : అనంతపురము, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీసత్యసాయి	16.5	42.1
దక్షిణ మండలము : చిత్తూరు, తిరుపతి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, వై.ఎస్.ఆర్. కడప, అన్నమయ్య.	5.85	15.0
కృష్ణ మండలము : ప్రకాశం, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, మచిలీపట్నం, ఎన్.టి.ఆర్.	8.68	22.1
గోదావరి మండలము : ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ	2.77	7.0
ఉత్తర కోస్తా మండలము : అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం	5.35	13.7

మెట్ట సాగులో అనేక ప్రతికూలతలున్నాయి. వీటిలో అనిశ్చిత వాతావరణం, తక్కువ వర్షపాతంతో పాటుగా పడిన వర్షం కూడా సకాలంలో పడకపోవడం, నిస్సారమైన, నీటిని నిల్వ ఉంచలేని లోతు తక్కువ నేలలు, తరచుగా నేల కోతకు గురికావడం, వీటి మూలంగా పంటల దిగుబడులలో పెరుగుతున్న వ్యత్యాసం, కష్టతరమైన ప్రకృతి వనరుల యాజమాన్యం, నానాటికీ తగ్గిపోతున్న భూసారం, అడుగంటుతున్న భూగర్భ జలాలు ప్రధానమైనవి.

వర్షాధార ప్రాంతాలలో వర్షం సకాలంలో పడినప్పుడు పంటల దిగుబడి ఒక మోస్తరుగా లభిస్తుంది. కరువు సంభవించిన సంవత్సరాలలో రైతులు పెట్టిన పెట్టుబడులకంటే తక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. ఈ నేపధ్యంలో

రైతులు మెట్ట సాగులో ఉత్పత్తి ఖర్చులు తగ్గించుకుంటూ, నాణ్యమైన మరియు స్థిరమైన పంటలను పండిస్తేనే మెట్ట ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. మెట్ట సాగులో రైతులు అధిక దిగుబడి, ఆదాయం పొందడానికి ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేసి అనేక మెళకువలు రూపొందించారు.

వీటిలో ముఖ్యమైనవి :

1. భూ సంరక్షణ
2. వర్షపు నీటి యాజమాన్యము
3. మేలైన పంటలు / రకాలు మరియు పంటల సరళి
4. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు
5. అనువైన యాజమాన్య పద్ధతులు
6. మెట్ట వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణ
7. సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం
8. సమగ్ర సస్యరక్షణ
9. సమగ్ర వ్యవసాయ పద్ధతులు
10. ప్రత్యామ్నాయ భూవినియోగం – మెట్ట పొలాలకు అనువైన పండ్ల తోటలు

1. భూ సంరక్షణ : వర్షం తక్కువగాను, సకాలంలోను పడకపోవడం వలన పంటల దిగుబడిలో చాలా వ్యత్యాసముంటుంది. మెట్టసాగులో భూసంరక్షణ మరియు ఆధునిక మెట్ట వ్యవసాయ సాగు పద్ధతులననుసరించి అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు.

a. ఎర్ర నేలలు : ఎర్రనేలల్లో లోతు మరియు నీటి నిల్వ వుంచుకొనే శక్తి కూడా తక్కువ. కావున వర్షం ద్వారా లభించేటటువంటి నీరు ఒరవడి రూపంలో కొట్టుకుపోవడం వలన పైపొరల్లో ఉన్నటువంటి సారవంతమైన మట్టితో పాటు విలువైన పోషక పదార్థాలను నష్టపోవడం జరుగుతుంది. నీటి ఒరవడిని అరికట్టడానికి కాంటూరు గట్లు, జీవగట్లతో పాటు వాలుకు అడ్డంగా సేద్యం చేయడం వలన మెట్ట వ్యవసాయాభివృద్ధిలో భూసంరక్షణ చేయవచ్చు.

- వాలుకడ్డంగా దుక్కిదున్నటం, విత్తటం, అంతరకృషి చేయటం వలన నీటి ఒరవడిని ఎక్కడిక్కడే అరికట్టి, ఎక్కువ నీటిని భూమిలోనికి ఇంకింపచేయవచ్చు.
- రెండు శాతం వాలు కలిగిన నేలల్లో ప్రతి 50 మీటర్ల దూరానికి 0.63 ఘనపు మీటర్ల పరిమాణంలో కాంటూరు గట్లు వేయాలి.
- వేరుశనగలో అంతరపంటగా కందిని వేసేటప్పుడు కందితోపాటు ఉలవ, అలసంద కలిపి విత్తడం వలన, ఒరవడి అరికట్టటమే కాకుండా, అధిక నికరాదాయం పొందవచ్చు.

- పొలంలో అనువైన పంటలు వేసిన తరువాత నీరు సమానంగా ఇంకేందుకు నాగలితో భూమి వాలును బట్టి సుమారు 1 నుండి 3 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున తల్లి చాళ్ళను లోతుగా, పంట విత్తిన తరువాత 30–40 రోజులకు తీయవలెను. ఈ తల్లి చాళ్ళు సాధారణ వర్షం కురిసినప్పుడు వర్షపు నీటిని అడ్డగించి భూమిలోనికి ఇంకునట్లు చేసి పంటకు ఎక్కువ కాలం తేమను అందజేస్తాయి. అధిక వర్షం కురిసినప్పుడు నీటి ప్రవాహం వలన మట్టి కొట్టుకొని పోకుండా మురుగునీటి కాలువ లాగా కూడా పనిచేస్తాయి. ఈవిధంగా చేయడం ద్వారా రైతుల పొలాలలో ఏర్పాటుచేసిన ప్రదర్శనా క్షేత్రాలలో వర్షాభావ పరిస్థితులలో సుమారు 20 శాతం అధిక దిగుబడి వచ్చింది.

- సబ్ సాయిలర్ (ఛిజిల్ నాగలి) తో 45 – 70 సెం.మీ. మేర లోతు, 2 మీ. దూరంలో లోతు దుక్కులు (ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి) చేయడం వల్ల భూమిలోపల ఉన్న గట్టి పొర చీల్చుకుని విరిగిపోయి వర్షపు నీరు లోపలికి బాగా ఇంకి మెట్ట పంటల (వేరుశనగ, కంది, ఆముదం) దిగుబడులు పెరుగుతాయి. పంట వేరు వ్యవస్థ నేల లోపలి పొరల లోనికి వ్యాపించి, అక్కడ ఉండే తేమ మరియు పోషకాలను పీల్చుకుంటుంది.

b. **నల్ల నేలలు :** నల్ల నేలలకు నీటిని నిల్వ ఉంచుకొనే శక్తి అధికం. (వర్షపు నీరు త్వరగా ఇంకనందు వలన ఎక్కువ శాతం నీరు, మట్టి కొట్టుకొనిపోతుంది.) ఈ నేలల్లో అధిక దిగుబడి సాధించడానికి భూమిని దున్నడంలో కొత్త సాంకేతిక పద్ధతులను అవలంబించాలి.

- ఎర్రనేలలకు కాంటూరు గట్ల మాదిరిగా నల్ల నేలలకు 0.8 ఘనపు మీటర్ల గ్రేడెడ్ గట్లు వేయాలి. ఈ గట్ల పైభాగాన 0.1 – 0.25 శాతం వాలుతో నీరు పోవడానికి కాలువ ఏర్పరచి, ఈ కాలువలను పెద్ద కాలువలతో కలిపి, నేల కోత లేకుండా, నీటిని బయటికి పోయేలా చేయాలి.

- **వెడల్పాటి బోదెలు :** కాలువలుగా నేలను తయారుచేసి, వెడల్పాటి బోదెలపైన విత్తుకోవాలి. కాలువలు ఎక్కువ నీటిని బయటికి పంపడానికి ఉపయోగపడతాయి. లోతైన నల్లరేగడి నేలలకు ఈ పద్ధతి అనుకూలం లేదా మూడు మీటర్ల వెడల్పుతో 20 సెం.మీ. ఎత్తుగల వెడల్పాటి బోదెలు వేసి విత్తుకొన్న మంచి దిగుబడులు వస్తాయి. బోదెల ప్రక్కన కాలువలు తక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు నీరు ఇంకడానికి, ఎక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు నీరు బయటకు పోవడానికి ఉపయోగపడతాయి.

ఎర్ర మరియు నల్ల నేలల్లో :

- ఎకరానికి 8 టన్నులు బాగా చివికిన పశువుల ఎరువు వేస్తే నీరు బాగా ఇంకుతుంది.

- ప్రతి 5 సంవత్సరాల కొకసారి, బెలుకు (షేల్)ను 300 టన్నులు ఒక హెక్టారుకు పొలాలకు ఆచ్ఛాదన (మల్చింగ్) లాగా వేసుకోవడం వలన, భూమి లోపలి పొరల్లో తేమ సంరక్షింపబడి, వర్షాధార పంటల్లో దిగుబడి పెరుగుతుంది.

2. వర్షపు నీటి యాజమాన్యం : మెట్ట ప్రాంతాలలో పంటకాలంలో 10 నుంచి 40 రోజుల వరకు వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనవచ్చు. ఒక్కోసారి ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం కురవడం వలన పొలం నుండి నీరు పొంగి ప్రవహిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రవహించే నీటిని నీటికుంట (Farm Pond) లో నిలువచేసి, పైరు పది రోజులకు మించి వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు, స్ప్రింకర్ల ద్వారా గంటసేపు ఒక తడి ఇస్తే, మెట్ట ప్రాంతాల్లో 20–30% దిగుబడి పెరుగుతుంది. నీటి కుంటలను 150–400 ఘ.మీ. పరిమాణంలో తయారుచేసుకోవచ్చు. నీటి కుంటలు 10 మీ. పొడవు, 10 మీ. వెడల్పు, 2.5 మీ. లోతు తవ్వుకోవాలి. నీటి కుంటలలో నీరు నిల్వ ఉండడానికి 6 భాగాలు మట్టి, ఒక భాగం సిమెంటు కలిపి పూత పూయడం వలన నీటి కుంటలలో నీరు రెండు నెలల వరకు నిల్వ వుంటుంది. నీటి కుంటలలో నిల్వచేసిన నీటిని వినియోగించి ఒక తడి (20 మి.మీ. లేదా 30 మి.మీ.) నీటిని బిందు సేద్యం (డ్రిప్) ద్వారా పంట సున్నిత దశలో తడిని ఇచ్చినప్పుడు దిగుబడి పెరుగుతుంది. వర్షాధార వేరుశనగ పంటలలో కాయ వూరే దశలో బెట్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు 1 లేక 2 తడులు (20 మి.మీ.) తుంపర సేద్యము ద్వారా ఇవ్వడం వలన దిగుబడులు ఘననీయంగా పెరుగుతాయి. కంది, ప్రత్తి, ఆముదము మరియు జొన్న పంటలకు నీటి కుంటలలో నీటిని పంట కీలక దశలో ఒక తడి ఇచ్చినచో దిగుబడి పెరుగుతుంది. వేసవిలో పడిన వర్షపు నీరు నీటి కుంటలలో నిల్వ ఉంటే జూన్ నెలలో విత్తుకున్న ప్రత్తి పంట బెట్టకు గురి అయినప్పుడు నిల్వ ఉన్న నీటిని బిందెల ద్వారా పంటకు అందించిన ఎడల విత్తిన పంట నెల రోజుల వరకు బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకోగలదు.

3. మేలైన పంటలు / రకాలు మరియు పంటల సరళి : సాధారణంగా మన రాష్ట్రంలో వర్షాధారపు పంటలు పండించే కాలము జూన్ రెండవ వారంలో ప్రారంభమై, అక్టోబరు చివరి వరకు ఉంటుంది. ఆయా ప్రాంతాలలో కురిసే వర్షము, భూమిలో నిల్వ వుండే తేమను బట్టి, పంటల కాల పరిమితి వర్షాధారపు ఎర్రనేలలో 90–150 రోజులు, నల్ల నేలల్లో 150–180 రోజులు ఉంటుంది. పంటల పెరుగుదల కాలాన్ని అనుసరించి రైతులు అనువైన పంటలు, పంటల సరళిని ఎంపిక చేసుకొన్నట్లయితే, వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

a. అంతర పంటలు :

వేరుశనగలో కందిని అంతర పంటగా సాగు చేసుకోవడం : అనంత ఆటోమేటిక్ వేరుశనగ విత్తు పరికరంతో 8 వరుసల వేరుశనగ, 1 వరుస కంది ఒకేసారి విత్తుకోవచ్చు. విత్తిన 30 రోజులప్పుడు, ప్రతి వరుసలో తేమ సంరక్షణ సాళ్ళు వేసుకోవడం వల్ల వేరుశనగ మరియు కంది పంటల్లో దిగుబడి పెరుగుతుంది.

b. ఇంద్రధనస్సు కూర్పుగల బహుళ పంట సాగు / రెయిన్ బో క్రాపింగ్ : మెట్ట సాగులో అనిశ్చిత వాతావరణము, తక్కువ వర్షంతో పాటుగా పడిన వర్షం కూడా సకాలంలో పడకపోవడము, పంట కాలములో 10 నుండి 30 లేదా 40 రోజుల వరకు కూడా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ఉండడము వలన మెట్ట నేలల్లో ప్రధాన పంటలు అయిన వేరుశనగ (ఎర్ర నేలలు) మరియు పప్పుశనగ (నల్ల రేగడి నేలలు) లో రైతులు నష్టాలు చవి చూస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితుల నుండి బయట పడటానికి రెండు లేదా మూడు ప్రత్యామ్నాయ పంటలను (పట్టీలు) వరుసలుగా వేసుకుంటే ఒక పంటలో బెట్ట వల్ల దిగుబడి రాక పోయినప్పటికీ మరొక పంటలో దిగుబడి వచ్చే

అవకాశం ఉంది. పైన తెలిపిన సమస్యలను అధిగమించడానికి యాంత్రీకరణకు అనువైన **ఇంద్రధనస్సు కూర్పు గల బహుళ పంట సాగు / రెయిన్ బో క్రాపింగ్** ను వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానము, అనంతపురం వారు రూపొందించడం జరిగింది.

రైతులు అనాదిగా పాటిస్తున్న నవధాన్య పద్ధతి కంటే కూడా ఇంద్రధనస్సు కూర్పు గల బహుళ పంట సాగు /రెయిన్ బో క్రాపింగ్‌లో యాంత్రీకరణ ద్వారా విత్తనాన్ని విత్తడము నుంచి కోత చేపట్టడము వరకు రైతుకు కూలీల ఖర్చు తగ్గి నవధాన్య పంటల కంటే మెరుగైన ఆదాయం లభిస్తుంది.

రెయిన్ బో క్రాపింగ్ పద్ధతిలో వివిధ ధాన్య పంటలను వాటి పంటల యొక్క ఎత్తుని అనుసరించి ఆరోహణ క్రమములో ఒక నిర్ణీత వెడల్పుతో కూడిన వరుసలుగా యాంత్రీకరణ ద్వారా విత్తనాన్ని విత్తుతారు. పంటలను స్ట్రిప్స్ / పట్టీల విత్తడము వలన, అంతర కృషికి, పురుగు మందులు పిచికారి చేయడానికి మరియు కోతకు సులువుగా ఉంటుంది. రెయిన్ బో పంటల సరళిలో పంటల యొక్క ఎత్తుని అనుసరించి ఆరోహణ క్రమములో మొదట కంది (1.8 మీ.), ఆముదము (1.8 మీ.), జొన్న (2.4 మీ.), సజ్జ (2.4 మీ.), కొర్ర (2.4 మీ.), అలసంద (2.4 మీ.), వేరుశనగ (2.4 మీ.) వెడల్పుతో కూడిన వరుసలుగా యాంత్రీకరణ ద్వారా విత్తుకోవాలి.

యాంత్రీకరణ ద్వారా దాదాపు అన్ని పనులు చేయడానికి అనువుగా ఉండడం వలన కూలీల వాడకము తక్కువగా ఉండి నికర ఆదాయము ఎక్కువగా వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ పద్ధతిలో కూడా అన్ని పంటలను సాగు చేసుకోవచ్చు. కనుక బెట్ట పరిస్థితుల వలన కాని, చీడపీడల ద్వారా ఏదైనా ఒక పంట నష్ట పోయినప్పటికీ ఇతర పంటల ద్వారా దిగుబడి రావడము వలన రైతు నష్టపోవడము జరగదు. అంతే కాకుండా వివిధ రకాలైన పంటలను వేయడము ద్వారా వివిధ రకాలైన పశుగ్రాసము కూడా రైతులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. పంటలను వరుసలలో వేయడం వలన పెద్ద యంత్రాలు / కోత పరికరాలు వినియోగించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఇంద్రధనస్సు కూర్పు గల బహుళ పంట సాగు / రెయిన్ బో క్రాపింగ్ లో మంచి దిగుబడులు పొందవచ్చు.

4. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు :

a. వేరుశనగ పంటకు ప్రత్యామ్నాయ పంటగా ఆముదం : విస్తీర్ణం దృష్ట్యా వేరుశనగ పంట వర్షాధార ఎర్ర నేలల్లో ప్రధానమైన పంట అయినప్పటికి అనిశ్చిత వాతావరణము, పంటకాలంలో బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడడము, కోత సమయములో అధిక వర్షాలు ఉండడము మరియు వేరుశనగకు అధిక పెట్టుబడి కావడం వలన వేరుశనగ పంట రైతులకు గిట్టుబాటు కావడం లేదు. అయితే వేరుశనగతో పోల్చినప్పుడు ఆముదము పంట తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ శ్రమతో అధిక దిగుబడి, నికర ఆదాయం పొందవచ్చు. ఆముదము పంటలో ఎకరానికి 2 కిలోల విత్తనం అవసరమైతే వేరుశనగలో 44 నుండి 68 కిలోలు అవసరము అవుతుంది. ఆముదము పంటకు 300 నుండి 350 మి.మీ. నీరు / వర్షపాతం అవసరమైతే వేరుశనగకు 450–500 మి.మీ. నీరు / వర్షపాతం అవసరమవుతుంది. ఆముదములో ఎకరానికి సుమారు రూ. 9000/– నుండి రూ. 10,000/– వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అదే వేరుశనగకు ఎకరానికి రూ. 15000/– నుండి రూ. 20000/– వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అంతేకాకుండా వర్షానికి కాయలు తడిచిన ఆముదము మొలక ఎత్తదు. ఈవిధంగా చాలా రకాలుగా ఆముదం పంట వేరుశనగ కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.

b. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు (వర్షాలు ఆలస్యమైనప్పుడు) :

వర్షాలు రావడం ఆలస్యమైన పక్షంలో, రైతులు ఆయా ప్రాంతాల్లో మామూలుగా పండించే పంటల బదులు, తక్కువ రోజుల్లో కోతకు వచ్చే పంటలు, బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకోగలిగే పంటలు మరియు తక్కువ ఖర్చుతో సాగు చేయు పంటలను ప్రత్యామ్నాయ పంటలని అంటారు. ఈ పంటలను ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి, వేసే సమయాన్ని బట్టి ఈ క్రింది పట్టికలో చూపించిన విధంగా పంటలను ఎన్నుకోవాలి.

వర్షాధార ఎర్ర, నల్లరేగడి నేలల్లో సాగు చేసుకోదగ్గ ప్రత్యామ్నాయ పంటలు

పంటపేరు	ఎర్ర నేలలు		నల్లరేగడి నేలలు	
	ఆగష్టు	సెప్టెంబరు	ఆగష్టు	సెప్టెంబరు
జొన్న	√	√	√	√
గోరు చిక్కుడు	√	√	√	√
సజ్జ	√	√	X	X
పెసర	√	√	√	√
అలసంద	√	√	√	X
కంది	√	X	√	X
ఉలవ	√	√	X	X
ఆముదము	√	X	√	X
ప్రొద్దుతిరుగుడు	√	X	√	√
కొర్ర	√	X	√	√
అనుములు	√	√	√	√

√ విత్తుకోవచ్చు X విత్తకూడదు

♦ వర్షాలు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చినప్పుడు (ఆగష్టు రెండవ పక్షం నుండి సెప్టెంబర్ మొదటి పక్షంలో), వివిధ రకాల పశుగ్రాస పంటలను ప్రత్యామ్నాయంగా పరిశీలించినప్పుడు, మేత సజ్జ, మేత జొన్న మరియు మేత మొక్కజొన్న పంటలు అధిక పచ్చి మేతను ఇవ్వడం జరిగింది.

5. అనువైన యాజమాన్య పద్ధతులు :

a. విత్తనం మరియు విత్తే పద్ధతి : మెట్ట సాగులో ముఖ్యంగా వేరుశనగ, కంది, శనగ, జొన్న, సజ్జ, రాగి, ఉలవలు, అలసందలు లాంటి పంటలు ముఖ్యమైనవి. అన్ని పంటలతో పోల్చితే ఒక ఎకరానికి సరిపడే విత్తన మోతాదు, దాని ఖరీదు వేరుశనగలో ఎక్కువ. అందువలన వేరుశనగ కాయల నుండి వచ్చే చిన్న, సన్న గింజలను వేరుచేసి ఎక్కువ ఖరీదుతో పెద్ద సైజు విత్తనాన్ని రైతులు కొంటూ ఉండటం వలన విత్తనపు ఖరీదు ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ, సన్నని విత్తనాలు కూడా విత్తుటకు ఉపయోగించవచ్చును. దీనివలన వేరుశనగ దిగుబడులలో ఎలాంటి తేడాలు ఉండవు.

సరైన సమయంలో పంటలను విత్తుకోవడం వలన వర్షపాత సద్వినియోగంతోపాటు, చీడ పీడల బారి నుండి మరియు పంట చివరి దశలో బెట్టకు గురికాకుండా పంటను కాపాడుకోవచ్చు. వేరుశనగ విత్తడానికి జూన్ మరియు జూలై మాసాలు అనుకూలము. కంది, ఆముదము పంటలను జూన్ నుండి జూలై లోపల విత్తుకొంటే అధిక దిగుబడులు వస్తాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులలో వేరుశనగకు బదులుగా ఆముదము, కంది, కొర్ర మరియు జొన్న వేసుకోవచ్చు. వర్షాలు ఆలస్యంగా ఆగస్టు నెలలో వచ్చినట్లయితే వేరుశనగ బదులు ఉలవలు, సజ్జ, జొన్న, మేత జొన్న, అలసంద మరియు పెసర వేసుకుంటే లాభదాయకం.

వేరుశనగ + కంది అంతర పంటలుగా 7 : 1 / 11 : 1 / 15 : 1 నిష్పత్తిలో సాగుచేయవచ్చు.

వేరుశనగ + కంది అంతర పంటలుగా 7:1 నిష్పత్తిలో సాగు చేయడం ద్వారా హెక్టారుకు 900 కిలోల వేరుశనగ మరియు 170 కిలోల కంది దిగుబడితో అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. అనంతపురం జిల్లాలోని 70% వేరుశనగ పండించే ప్రాంతంలో రైతులు వేరుశనగ + కంది అంతర పంటలుగా సాగు చేస్తున్నారు.

b. కలుపు నివారణ :

సమగ్ర కలుపు నివారణ పద్ధతులు పాటించి కలుపును నివారించాలి. విత్తనం వేసిన తర్వాత 25 రోజులకు ఒకసారి, 40 రోజులకు మరోసారి దంతిగాని, మెట్ల గుంటకగాని వేసి కలుపు నివారించవచ్చు. విత్తిన రెండోరోజు ఎకరాకు 750 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్‌ను తగినంత తడి మట్టితో కలిపి పొలంపై వెదజల్లాలి లేదా పై మందును లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ట్రాక్టరు సహాయంతో అనంత వేరుశనగ విత్తే పరికరంతో విత్తిన పొలంలో తగిన సమయంలో కలుపు నివారించుటకు ట్రాక్టరుతో నడిచే అంతర కృషి పరికరము తయారుచేయబడినది. దీనిని ఉపయోగించుట వలన వరుసల మధ్యలో తేలికగా కలుపు నిర్మూలించవచ్చును.

c. వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- వర్షాభావ పరిస్థితులలో పంట బెట్టకు గురైనప్పుడు మొక్కల ఎదుగుదల కోసం (కొన్ని రోజుల వరకు బెట్టను అధిగమించడానికి) పొటాషియం నైట్రేట్ (13-0-45) ద్రావణాన్ని (లీటరు నీటికి 5 గ్రా.) పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి.

వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాల వారీగా వర్షాధారం క్రింద అనువైన మరియు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు

వ్యవసాయ వాతావరణ మండలము	నేలలు	అనువైన పంటలు	ప్రత్యామ్నాయ పంటలు	
		జూన్ - జూలై	ఆగష్టు	సెప్టెంబర్
1. ఉత్తర కోస్తా మండలం (శ్రీకాకుళం, విజయ నగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి.)	తేలిక నేలలు	గోగు, వేరుశనగ, జొన్న, ఉలవ, రాగి	రాగి, ఉలవలు, జొన్న (చొప్పకు), కంది (మొక్కలు/ సాళ్ళ మధ్య దూరం తగ్గించి)	పెసర, ఉలవ, ప్రొద్దు తిరుగుడు
	మధ్యస్థం నుండి బరువైన నేలలు	నువ్వులు, పెసర మరియు మినుము	రాగి, మినుము, కూరగాయలు, జొన్న (చొప్పకు), ఉలవలు, గోరుచిక్కుడు, కంది (దగ్గరగా విత్తుకోవాలి), మొక్కజొన్న (స్వల్పకాలిక రకాలు), మొక్కజొన్న + కంది	---
2. గోదావరి మండలం (తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ, కాకినాడ)	తేలిక నేలలు	వేరుశనగ, జొన్న, మొక్కజొన్న	రాగి, ఉలవలు, జొన్న (చొప్పకు), కంది (మొక్కలు/ సాళ్ళ మధ్య దూరం తగ్గించి)	మినుము
	మధ్యస్థం నుండి బరువైన నేలలు	ప్రత్తి, పొగాకు, పెసర, మినుము మరియు నువ్వులు	రాగి, ఉలవలు, జొన్న (చొప్పకు) పిల్లి పెసర, అలసంద	---
3. కృష్ణా మండలం (కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, పల్నాడు, మచిలీపట్నం).	తేలిక నేలలు	ఆముదము, కంది, పెసర, మినుము మరియు నువ్వులు	ఉలవలు, జొన్న (చొప్పకు)	మినుము
	మధ్యస్థం మరియు బరువైన నేలలు	ప్రత్తి, పొగాకు, పెసర, మినుము మరియు నువ్వులు	కంది (దగ్గరగా విత్తుకొనుట), అలసంద, ప్రత్తి + కంది	---
4. దక్షిణ మండలం (చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి).	తేలిక నేలలు	వేరుశనగ, కంది, జొన్న, రాగి, సజ్జ, ఆముదము	రాగి, కంది (దగ్గరగా విత్తుకొనుట), పెసర, ఆముదం, జొన్న (చొప్పకు)	మినుము, పెసర, ఉలవ, జొన్న
	మధ్యస్థం మరియు బరువైన నేలలు	ప్రత్తి, మినుము, ఆముదము, కొర్ర	ఉలవలు, అలసంద, వేరుశనగ, ప్రొద్దు తిరుగుడు	---
5. అత్యల్ప వర్షపాత మండలం (కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల).	తేలిక నేలలు	వేరుశనగ, కంది, జొన్న, ఆముదము, కొర్ర, సజ్జ	కొర్ర, పెసర, జొన్న (చొప్పకు), వేరుశనగ, సజ్జ, ఉలవలు, (మొదటి వారం) కంది, అలసంద, (60 సెం.మీ. దూరం)	మేతజొన్న, పెసర, సజ్జ, ఉలవ,
	మధ్యస్థం మరియు బరువైన నేలలు	ప్రత్తి, జొన్న, కంది, ఆముదము, కొర్ర	ఆముదం, వేరుశనగ + కంది, ప్రొద్దు తిరుగుడు, పొగాకు	ప్రొద్దు తిరుగుడు, పొగాకు

రబీ సీజన్‌లో నల్లరేగడి నేలల్లో పప్పు శనగ పంటను అక్టోబర్ నుండి నవంబరు మొదటి పక్షము వరకు విత్తుకొనవచ్చును.

మెట్ట పొలాలకు అనువైన పంట రకాలు

పైరు	రకాలు
నూనె గింజలు	
వేరుశనగ	వేమన, తిరుపతి-4, కె-9, నారాయణి, అభయ, ఐ.సి.జి.వి.-91114, అనంత, కె-6, గ్రీష్మ, కదిరి హరితాంధ్ర, ధరణి, కదిరి లేపాక్షి, విశిష్ట.
ఆముదం	రకాలు : క్రాంతి, జ్వాల, జ్యోతి, హరిత, కిరణ్, హైబ్రిడ్స్ : పి.సి.హెచ్.-111, పి.సి.హెచ్.-222, డి.సి.హెచ్.-519, ఐ.సి.హెచ్.-66, జి.సి.హెచ్.-8, ఐ.సి.హెచ్.-5.
ప్రొద్దుతిరుగుడు	ఎ.పి.ఎస్.హెచ్.-11, కె.బి.యస్.హెచ్.-1, ఎన్.డి.యస్.హెచ్.-1.
నువ్వులు	మాధవి, గౌరి, రాజేశ్వరి, శ్వేత, ఎలమంచిలి-11, ఎలమంచిలి-17, చందన, ఎలమంచిలి 66 (శారద).
కుసుమ	మంజీర, సాగర ముత్యాలు, భీమ, టి.యస్.ఎఫ్.-1, ఐ.ఎస్.ఎఫ్. 764, ఐ.ఎస్.ఎఫ్. 1, డి.ఎస్.హెచ్. 185.
అపరాలు	
కంది	అభయ, ఎల్.ఆర్.జి.-41, టి.ఆర్.జి.-33, ఐ.సి.పి.ఎల్.-85063, పి.ఆర్.జి.-100, డబ్ల్యు.ఆర్.జి.-53, డబ్ల్యు.ఆర్.జి.-52, ఉజ్వల, ఎల్.ఆర్.జి. 105 (కృష్ణ), టి.ఆర్.జి.59
పెసర	యమ్.ఎల్.-267, మధిర-295, పుష్కర్, వరంగల్-2, యల్.జి.జి. 450, యల్.జి.జి.-407, టి.యం.-96-2, పూన-105, డబ్ల్యు.జి.జి.-42.
మినుము	కృష్ణయ్య, ప్రభవ, ఎల్.బి.జి.-623, ఎల్.బి.జి.-752, ఎల్.బి.జి.-20, పి.యు.-31, జి.బి.జి.-1, టి.బి.జి. - 104.
ఉలవ	పి.హెచ్.జి.-9, పి.డి.యం.-1, వి.జెడ్.యం.-1, పాలెం-2, ఎ.టి.పి.హెచ్.జి.-11(అనంత ఉలవ)
శనగ	నంద్యాల శనగ -1, ధీర, నంద్యాల గ్రామ్-49, 119, 452, 857, 776; జె.జి.-11, జాకి-9218, కె.ఎ.కె. -2, విహార్, యం.ఎన్.కె. -1.
సోయాచిక్కుడు	పి.కె.-472, యం.ఎ.సి.హెచ్.-58, జె.ఎస్. 335.
చిరుధాన్యాలు	
జొన్న	సి.యస్.హెచ్.-5, సి.యస్.హెచ్.-16, సి.యస్.హెచ్.-26, ఎన్.టి.జె.-5, యం-35-1, ఎన్.-15 (పచ్చ జొన్న).
సజ్జ	రాజ్-171, ఎ.బి.వి.-04, ధనశక్తి, హెచ్.హెచ్.బి. 67 (అభివృద్ధి పరచిన).
కొర్ర	ప్రసాద్, సూర్యనంది, గరుడ, రేనాడు, మహానంది, ఎస్.ఐ.ఎ. 3156, ఎస్.ఐ.ఎ. 3085.
రాగి	వకుల, వేగవతి, శ్రీచైతన్య, చంపావతి.

- ♦ వర్షాభావ పరిస్థితులలో మెట్ట పంటలకు వరుస వదిలి వరుసలో రక్షక తడులు ఇవ్వాలి.
- ♦ బెట్ట పరిస్థితులలో అధిక సాంద్రత ఉన్నప్పుడు నీటి సంరక్షణ కోసం వత్తుగా ఉన్న మొక్కలను తీసివేయాలి. (ఉదా : కంది మరియు ఆముదం)

6. మెట్ట వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణ :

a. ఎద్దులతో లాగే అనంత వేరుశనగ విత్తే పరికరం

మెట్ట సాగులో ఎర్రనేలల్లో వర్షాధారంగా పండించే వేరుశనగకు వర్షం పడిన తర్వాత నేలలో తగిన తేమ ఉంటే ఆ పంటను విత్తుకోవచ్చును. నేలలో తగిన తేమ, తేలిక నేలల్లో రెండు లేక మూడు రోజులలో ఆరిపోతుంది. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సాధారణంగా వాడుకలో వున్న విత్తే గొర్రులనే కాక తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ ఎకరాలను విత్తడానికి వీలుగా ఎద్దులతో లాగే **'అనంత వేరుశనగ విత్తే పరికరం'** రూపొందించబడినది. ఈ యంత్రాన్ని వాడుట వలన విత్తనానికి ఎటువంటి హానీ ఉండదు. దీనిని ఉపయోగించడం వలన తగిన లోతులో, సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో, నిర్దేశించిన ప్రకారం మొక్కల మధ్య దూరం ఉండేలా తేమ ఆరిపోకుండా తక్కువ సమయంలో, ఎక్కువ ఎకరాలను విత్తడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఈ అనంత ఆటోమేటిక్ విత్తు పరికరం సాంప్రదాయ గొర్రు మాదిరాగానే 4 సాళ్ళలో 2 ఎద్దుల సహాయంతో రోజుకు 4 నుంచి 5 ఎకరములలో విత్తనం విత్తుతుంది. ఈ విత్తు పరికరం ముఖ్య ఉపయోగం ఏమిటంటే ఒక్కొక్క సాలుకు విత్తనం వదిలే కూలీ అవసరం లేకుండానే అమర్చబడిన బాక్సు నుండి విత్తనం విత్తే అమరిక ద్వారా విత్తనం నేలలో 4 నుంచి 5 సెం.మీ. లోతులో విత్తబడుతుంది తద్వారా ఒక కూలీ ఖర్చు తగ్గించుకొనవచ్చును. బాక్సులో ఒకేసారి 8 కిలోలు విత్తనం నింపుకోవచ్చు. ఈ పరికరం బాక్సు కింద ఉండే ఒక గేటు ద్వారా సిఫార్సు చేయబడిన విత్తనం 40 కిలోలు ఒక ఎకరానికి విత్తుకోవచ్చు. ఈ విత్తన పరికరం ఖరీదు సుమారు రూ. 18,000/-.

b. ట్రాక్టరుతో నడిపే 8 వరుసల అనంత ఆటోమాటిక్ వేరుశనగ విత్తు పరికరము

- మెట్ట ప్రాంతంలో వర్షము పడిన వెంటనే విత్తవలసి ఉంటుంది.
- నేలలో సరిపడా తేమ ఉన్నప్పుడు వేరుశనగ విత్తితే ఎక్కువ మొలక శాతము ఉంటుంది.
- అనంత విత్తు పరికరము ద్వారా వేరుశనగను తక్కువ సమయంలో తగు విత్తన మోతాదులో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో విత్తుకొనవచ్చును.
- సాధారణంగా విత్తు పరికరంతో పోల్చితే కూలీల ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చును.
- ఈ యంత్రము ద్వారా గంటకు 1.5 ఎకరాలు విత్తుకొనవచ్చును.
- అనంత ఆటోమాటిక్ విత్తు పరికరము ద్వారా పప్పుశనగ మరియు కంది విత్తుకొనవచ్చును.
- ఈ యంత్రము ఖరీదు రూ. 90,000/-.

c. ట్రాక్టరుతో నడిపే 8 వరుసల వేరుశనగ 1 వరుస కంది విత్తు పరికరము : అనంత ఆటోమేటిక్ వేరుశనగ విత్తు పరికరముతో 8 వరుసల వేరుశనగ 1 వరుస కంది ఒకేసారి విత్తుకోవచ్చు. ట్రాక్టరుతో నడిపే అనంత

విత్తు పరికరములాగే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణం, తక్కువ ఖర్చుతో వేరుశనగ పంటలో కంది అంతరపంటగా ఒకేసారి విత్తుకోవచ్చు.

ఈ యంత్రము ఖరీదు రూ. 95,000/-.

7. సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం :

a. ఎరువుల యాజమాన్యం : వేరుశనగకు గాని, వేరుశనగ + కంది అంతర పంటకు గాని విత్తనం వేసేటప్పుడు ఎకరాకు 8 కిలోల నత్రజని, 16 కిలోల చొప్పున భాస్వరం మరియు పొటాష్‌నిచ్చే ఎరువులు వేయాలి. సజ్జకుగాని, సజ్జ + కంది అంతర పంటకుగాని ఎకరాకు 10 కిలోల చొప్పున నత్రజని, 4 కిలోల భాస్వరం మరియు 4 కిలోల పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులు వేయాలి. జొన్న పైరుకు ఎకరాకు 10 కిలోల నత్రజని, 16 కిలోల భాస్వరం విత్తేటప్పుడు వేయాలి. విత్తిన నెల రోజుల తర్వాత వానవస్తే ఎకరాకు 8 కిలోల నత్రజని పైపాటుగా వేయాలి. ఉలవకు 2 కిలోల నత్రజని, 5 కిలోల భాస్వరం వేయాలి. ప్రతి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత భూసార పరీక్ష చేయించి భాస్వరం, పొటాష్ ఎరువులు ఎంత కావలసింది నిర్ధారించుకోవాలి.

b. భూసార పరీక్షననుసరించి వేయవలసిన ఎరువులు

భూసార పరీక్షను అనుసరించి ఎరువులను సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో వాడకం వలన సాగులో ఖర్చు తగ్గి, మంచి దిగుబడులు సాధించే అవకాశము ఉంది. ఉదాహరణకు అనంతపురము జిల్లాలో అత్యధికముగా సాగు అయ్యే వేరుశనగ పంటలో భూసార పరీక్షను అనుసరించి వేయవలసిన ఎరువుల ఈ క్రింది విధముగా వాడవలెను.

భాస్వరం (కిలోలు / ఎకరాకు)		పొటాష్ (కిలోలు / ఎకరాకు)	
నేలలో లభించేది	వేయవలసినది	నేలలో లభించేది	వేయవలసినది
< 10	16	< 60	16
10-20	8	60-120	8
> 20	0	> 120	0

వేరుశనగ విత్తిన 35 రోజులకు మరియు 45 రోజులకు 0.2 శాతము జింకు సల్ఫేటును (2 గ్రా. లీటరు నీటిలో కలిపి) పిచికారి చేయాలి లేదా 10 కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక ఎకరానికి వేయవలెను.

గొర్రెల మందను ఒక రాత్రంతా పొలంలో ఉంచడం ద్వారా వేరుశనగ కాయ దిగుబడి 13 శాతము మరియు కట్టె దిగుబడి 41 శాతము వరకు పెరుగుతుంది. భూమిలో లభ్య పొటాషియం మరియు లభ్య ఇనుము మరియు జింక్ వంటి సూక్ష్మపోషకాలు కూడా పెరుగుతాయి. రైతులు పొలాలలో గొర్రెలను మంద కట్టడం ద్వారా భూసారాన్ని పెంపొందించుకోవడంతోపాటు ఎరువులకు అయ్యే ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు.

వేరుశనగలో ఊడలు దిగే సమయం మరియు కాయ ఊరే దశల్లో బెట్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు 0.5% పొటాషియం నైట్రేట్ కాని లేదా పొటాషియం క్లోరైడ్ 5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసినట్లైతే అధిక కాయ మరియు నాణ్యమైన దిగుబడి పొందవచ్చు.

వేరుశనగలో భూసార పరీక్షలను అనుసరించి కాని లేదా వాడవలసిన ఎరువుల మోతాదును సగానికి తగ్గించి, నేలలో భాస్వరాన్ని కరిగించే జీవన ఎరువులు ఫాస్ఫేట్ సాల్యుబులైజింగ్ బాక్టీరియా 5 కిలోలు లేదా ఫాస్ఫేట్ సాల్యుబులైజింగ్ ఫంగై 5 కేజీలు మరియు ఫాస్ఫేట్ మొబిలైజింగ్ మైకోరైజా 12.5 కేజీలు ఒక హెక్టారుకు వేసుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడి సాధించవచ్చు మరియు ఎరువులకయ్యే ఖర్చును కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

8. సమగ్ర సస్యరక్షణ :

a. పురుగులు : వేరుశనగ పంటలో రసం పీల్చు పురుగులను (పచ్చదోమ, పేనుబంక) అదుపులో వుంచడానికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.4 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. తామర పురుగును అదుపులో ఉంచడానికి అసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ., లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఎర్రనల్లి ఆశించినపుడు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 3 గ్రా. నీటిలో కరిగే గంధకము (సల్ఫర్) 1 లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఫిరమోన్ మాస్ ట్రాపింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఆకుముడత పురుగును సమర్థవంతంగా అదుపులో వుంచవచ్చు. ఎకరానికి 8 చొప్పున ఫిరమోన్ ఎరలను వేరుశనగ విత్తిన 20 రోజుల లోపల పొలంలో పెట్టటం ద్వారా మగరెక్కల పురుగులను ఆకర్షించవచ్చు. ఈ ఎరలలో వుంచిన ఫిరమోన్ ఎరను 22 రోజులకొకసారి మార్చాలి.

b. తెగుళ్ళు : వేరుశనగను ఆశించు మొదలుకుళ్ళు తెగుళ్ళను, కాండం కుళ్ళు తెగుళ్ళను మరియు శనగను ఆశించు ఎండు తెగులు, వేరుకుళ్ళు తెగుళ్ళ నివారణకు 3 గ్రా.ల మాంకోజెబ్‌ను కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయాలి. ట్రైకోడెర్మా విరిడిని పశువుల ఎరువులో వృద్ధి చేసి భూమిలో వేసి కలియదున్నడం వలన కూడా తెగుళ్ళను అరికట్టవచ్చును. ఈ తెగుళ్ళ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నచోట పంటమార్పిడి విధానాన్ని పాటించాలి. వేరుశనగలో మొవ్వకుళ్ళు తెగులు నివారణకు జొన్న లేదా సజ్జ పంటలను మేర సాళ్ళగాను మరియు అంతర పంటగాను వేసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు గట్లపైనా మరియు పొలంలో పెరిగే కలుపు మొక్కలను ముఖ్యంగా వయ్యారిభామ మొక్కలను పూతకు రాకమునుపే నివారించుకోవాలి.

9. సమగ్ర వ్యవసాయ పద్ధతులు :

రైతులు వేరుశనగ మాత్రమే సాగుచేయడం వలన 4 నెలల వరకు మాత్రమే ఉపాధి ఉంటుంది. రైతులు వేరుశనగతోపాటు, పశుపోషణ, కోళ్ళ పెంపకము, మేకల పెంపకము, గొర్రెల పెంపకము, పుట్టగొడుగుల పెంపకము, తేనెటీగల పెంపకము వంటి వాటిపై కూడా దృష్టి సారించితే అదనపు నికర ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. ఒక హెక్టారు విస్తీర్ణంలో వేరుశనగ పండించే రైతు దానితోపాటుగా, 10 గొర్రె పిల్లలను 4 నెలల పాటు పెంచుకోవడంతో అదనపు నికరాదాయాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది.

పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు మరియు పెరటి కోళ్ళ పెంపకము ద్వారా లభించే ఎరువును పంటపొలాలకు వాడుకోవచ్చు. దీనిద్వారా నేలల్లో సేంద్రియ కర్బన శాతము పెరుగుతుంది. సేంద్రియ కర్బనము ఎక్కువగా ఉన్న నేలల్లో నేల భౌతిక లక్షణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు నేలలు గుల్లబారి వేర్లు చక్కగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. నీరు ఇంకడం పెరిగి మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యం మెరుగవుతుంది. ఇసుక నేలల్లో మట్టి రేణువుల అమరికను క్రమబద్ధం చేస్తుంది. నీటిని గ్రహించి తేమను ఎక్కువకాలం నిల్వ చేసుకొనే సామర్థ్యం పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. బెట్ట పరిస్థితిని తట్టుకొనే శక్తి పెరుగుతుంది.

ప్రస్తుతము మన రాష్ట్రంలోని నేలల్లో సేంద్రియ కర్బనం అత్యల్ప స్థాయిలో (0.5% కంటే తక్కువ) ఉన్నది. సేంద్రియ కర్బన స్థాయిని పెంచడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఆయా ప్రాంతాలలో అందుబాటును బట్టి పశువుల ఎరువు, పచ్చిరొట్ట ఎరువు, పచ్చి ఆకు ఎరువు, కోడిపెంట, గొర్రెల ఎరువు, గొర్రెలు మందకట్టుట, వర్మి కంపోస్టు వంటి ఎరువులను విస్తృతంగా ఉపయోగించాలి. సేంద్రియ వ్యవసాయం వల్ల దీర్ఘకాలిక సుస్థిరత సాధించవచ్చు.

10. ప్రత్యామ్నాయ భూ వినియోగం మెట్ట పొలాలకు అనువైన పండ్ల తోటలు :

మెట్ట భూములందు పండ్ల తోటలను ప్రోత్సహించి, బీడు భూములను, క్షార భూములను, కొండ ప్రాంతాలను సాగులోనికి తీసుకురావచ్చు. రేగు, సీతాఫలం, ఉసిరి, నేరేడు, మామిడి, సపోటా తక్కువ నీటితోనే ఫలసాయాన్నివ్వగలవు. కావున వీటిని మెట్టపంటలుగా పెంచవచ్చు. సాగునీరు అందివ్వగల పరిస్థితులలో సపోటా, మామిడి మరియు దానిమ్మను బీడు భూముల్లో కూడా సాగుచేయవచ్చు. ఈ తోటల్లో నాటిన మొదటి 5 సంవత్సరాల వరకు వేరుశనగ లాంటి ఆహార ధాన్యాలను అంతర పంటలుగా పెంచి, అధిక ఆదాయం పొందవచ్చు. ఆ తర్వాత, నాటిన 6 సంవత్సరాల నుండి ఉలవ, మేతజొన్న మరియు మేత అలసంద లాంటి పశుగ్రాస పంటలను అంతర పంటలుగా సాగు చేసుకోవచ్చు.

మెట్టసాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మెట్ట వ్యవసాయం), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనంతపురం- 515 001.

సెల్ నెం : 99896 25222

వ్యవసాయ రంగంలో ప్లాస్టిక్స్ వినియోగం

వ్యవసాయ మరియు ఉద్యానవన రంగాల్లో ప్లాస్టిక్ మరియు పరికరాల వినియోగ ఆవశ్యకత మన దేశంలో 1970వ దశకం నుండి ప్రారంభమైంది. ఇవి ఇనుము, ఉక్కు మొదలైన పరికరాలతో పోలిస్తే తేలికగా ఉంటాయి. ఎక్కువ రోజులు మన్నిక కలిగి, తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నందు వలన మరియు వాటి నిర్వహణ కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల రైతులలో మంచి అవగాహన కలిగి వీటి వాడుక రోజు రోజుకు పెరుగుచున్నది. ప్రపంచ వాణిజ్య సరళీకృత విధానాలననుసరించి వివిధ దేశాలతో పోటీ ఎదుర్కొవాలంటే మనము కూడా అధిక పంటల దిగుబడులతో పాటు మంచి నాణ్యత గల ఉత్పత్తులను పండించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. దీనికిగాను పై రెండు రంగాలలో ప్లాస్టిక్స్ వాడుక ఎంతొ ప్రాచుర్యము పొందింది.

వ్యవసాయంలొ ప్లాస్టిక్స్ వినియోగం వలన నీటి ఆదాతో పాటు, నేలలోతేమ ఆవిరికాకుండా చేసి, నాణ్యమైన అధిక ఉత్పత్తులను పొందవచ్చు మరియు పంటలకు అనుకూలంగా లేని వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా పంటలను పండించవచ్చు. కనుక ఈ క్రింది పేర్కొన్న ప్లాస్టిక్ పరికరాలు రైతులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండడమే కాకుండా మానవుని దైనందిన జీవిత అవసరాలకు ఎంతో తోడ్పాటు అవుతుంది .

పట్టిక – 1 : వివిధ వ్యవసాయ రంగాలలో ప్లాస్టిక్స్ వినియోగం

క్ర.సం	వినియోగం	వాఖ్యానం
1.	డ్రిప్ ఇరిగేషన్ (బిందు సేద్యం)	పండ్ల తోటలలో చెట్లకు అవసరం మేర బిందువులుగా సాగు నీటిని అంద చేయటం ద్వారా ప్రత్యక్ష్యంగా వేర్ల వ్యవస్థకు నీరు చేరును.
2.	తుంపర సేద్యం (స్పింక్లర్ ఇరిగేషన్)	సాగునీటిని అధిక పీడనం ద్వారా చిన్న రంధ్రం గల నాజిల్ గుండా పంపటం ద్వారా తుంపర ఏర్పడి ఆరుతడి పంటలకు సాగు నీటి అవసరాలను తీర్చగలుగుతుంది.
3.	నీటి తొట్టెలకు ప్లాస్టిక్ లైనింగ్	నీటి తొట్టెలు, చెరువులు రిజర్వాయర్లకు ఎగువవైపు ప్లాస్టిక్ లైనింగ్ అమర్చడం ద్వారా నీరు ఇంకటం అరికట్టడం వలన నీటి వృధాని నివారించవచ్చు.
4.	హరిత గృహాలు	హరిత గృహాలకు ప్లాస్టిక్ షీట్ల ద్వారా పైకప్పు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అతినీలలోహిత కిరణాలు నిరోధింపబడి అనుకూలంగా లేని వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా పంటను పండించవచ్చు.
5.	ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్	మొక్కల చుట్టూ ఉన్న వేళ్ళ భాగాన్ని ప్లాస్టిక్ షీట్లతో కప్పి ఉంచడాన్ని ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ అంటారు. దీని వలన నేలలో తేమ ఆవిరి కాకుండా ఉండటం వలన నాణ్యమైన అధిక ఉత్పత్తులను పొందవచ్చు.
6.	ప్లాస్టిక్ లోటన్నెల్స్	లోటన్నెల్స్ వాడకం వలన కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వాయువు నిర్భంధించబడి కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియ మరింత

		సమర్థవంతంగా జరగటానికి ప్రేరేపిస్తుంది.
7.	ఆహారపదార్థాల ప్యాకింగ్	పాలు, పండ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలను ప్యాకింగ్ ద్వారా కొంతకాలం పాటు నాణ్యతను సంరక్షించవచ్చు.
8.	సస్యరక్షణ పరికరాలు	సస్యరక్షణ పరికరాల తయారికి ప్లాస్టిక్ వినియోగం పెరగడం వలన తుప్పు పట్టటం లాంటి సమస్యలు తగ్గి, అందుబాటు ధరలో లభ్యమవుతుంది.

వివిధ రకములైన ప్లాస్టిక్స్ అనగా పాలిథీన్ (LLDPE, LDPE, HDPE), పాలి ప్రోపీన్(PP), పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ (PVC) విరివిగా వ్యవసాయ మరియు ఉద్యానవన పంటలలో వాడబడుతున్నవి.

క్ర.సం	వినియోగం	పి.వి.సి.	ఎల్.డి.పి.ఇ.	ఎల్.ఎల్.డి.పి.ఇ.	హెచ్.డి.పి.ఇ.	పి.పి.
1.	బిందు సేద్యం	మెయిన్/సబ్ మెయిన్ గొట్టాలు	–	లేటరల్/ఎమిటింగ్ పైపులు	స్క్రీన్ ఫిల్టర్	ఫిట్టింగ్
2.	తుంపర సేద్యం	మెయిన్ /సబ్ మెయిన్ గొట్టాలు కంట్రోల్ వాల్వులు	కనెక్టింగ్ గొట్టాలు –	– –	డిస్క్ ఫిల్టర్ నాజిల్	ఫిట్టింగ్ నాజిల్
3.	హరిత గృహాలు	మెయిన్/సబ్ మెయిన్ గొట్టాలు	యూవి ఫిల్మ్‌లు	యూవి ఫిల్మ్‌లు	మెయిన్/సబ్ మెయిన్ గొట్టాలు	తాళ్ళు
4.	లోటన్నెల్	–	యూవి ఫిల్మ్‌లు	–	హూప్స్	తాళ్ళు
5.	మల్చింగ్	–	–	యూవి ఫిల్మ్‌లు	–	అల్లబడినవి కానివి
6.	ఆహార పదార్థాల ప్యాకింగ్	–	–	ప్యాకేజింగ్ కవర్స్	–	ప్యాకేజింగ్ కవర్స్
7.	సస్యరక్షణా పరికరాలు	–	–	స్ప్రేయర్లు	–	–

వ్యవసాయ మరియు ఉద్యానవన సేద్య విభాగాల్లో ప్లాస్టిక్, బిందు మరియు తుంపర సేద్యాలతోపాటు, మల్చింగ్, హరిత గృహాలు మరియు కుంటలు, కాలువలకు లైనింగ్ చేసే అగ్రి ఫిల్మ్ ఎంతో ముఖ్యపాత్ర వహిస్తున్నవి.

ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ :

మొక్కల చుట్టూ ఉండే వేళ్ళ భాగాన్ని ఏవేనీ పదార్థాలతో కప్పి ఉంచటాన్ని మల్చింగ్ అంటారు. పూర్వం ఈ పద్ధతికి వరి పొట్టు, రంపపు పొట్టు, చెఱకు పిప్పి, ఎండిన ఆకులు మరియు చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళు మొదలైనవి వాడేవారు. కానీ వీటి వినియోగం ఇతర అనుబంధ సంస్థలలో పెరుగుతూ ఉన్నందువల్ల (ఉదా : ఇటుకల బట్టీలు మొదలైనవి) మరియు వాటి లభ్యత రానురాను తగ్గుతున్నందువలన ప్లాస్టిక్ షీటతో మల్చింగ్ వేయడం ప్రస్తుతం ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది. ప్లాస్టిక్ షీట్ తో మొక్క చుట్టూ కప్పి ఉంచడాన్ని ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ అని అంటారు.

ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ లాభాలు :

నీటి ఆదా : మొక్క చుట్టూ భూమిలో ఉండే తేమను ఆవిరి కాకుండా నివారించడం వల్ల వివిధ కాల పరిమితులు గల పంటలకు 30–40 శాతం వరకు నీటి ఆదా అవుతుంది. ఇంకా దీనిని బిందు సేద్య పద్ధతిలో కలిపి వాడితే అదనంగా 20 శాతం నీరు ఆదా అవుతుంది. తద్వారా పంటలకు 2–3 నీటి తడులు ఆదా అవుతాయి.

కలుపు నివారణ : సూర్యరశ్మిని నేరుగా కలుపు మొక్కలకు సోకకుండా చేయడం వల్ల కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరగక సుమారు 85 శాతం వరకు కలుపు నివారణ అవుతుంది. తద్వారా పర్యావరణ సంరక్షణ జరుగుతుంది.

మట్టి కోత నియంత్రణ : వర్షపు నీరు నేరుగా భూమి పైన పడకుండా నివారించడం వల్ల కోతను నివారించి భూసారాన్ని పరిరక్షించవచ్చు.

నేల ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ : మొక్కల చుట్టూ సూక్ష్మ వాతావరణ పరిస్థితులను కలుగజేస్తూ నేల ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా నేలలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల చర్య అధికమై నేల నిర్మాణాన్ని వృద్ధి చేస్తూ మొక్కలకు అన్ని పోషక పదార్థాలు అందేలా చేస్తుంది.

భూమిలోని చీడపీడల నివారణ: పారదర్శక ఫిల్మ్ నే వేసవిలో భూమిపై పరచి సూర్యరశ్మిని లోనికి ప్రసరింపజేసి భూమిలోని క్రిమికారకాలను తెగుళ్ళను నివారిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను నేల సొలరైజేషన్ అని అంటారు.

ఎరువులు మరియు క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం : నేలలో వేసిన ఎరువులు భూమిలోపలి పొరలోనికి వెళ్లకుండా నివారించడం వల్ల మరియు కలుపు నివారణ జరిగి క్రిమిసంహారక మందుల ఆదా జరుగుతుంది. తద్వారా పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడవచ్చు.

నాణ్యతతో కూడిన అధిక దిగుబడులు : మొక్కలకు వాటి జీవితకాలమంతా అనుకూల సూక్ష్మ వాతావరణ పరిస్థితులు కలగడం వలన పంట ఏపుగా పెరిగి, మంచి నాణ్యతతో కూడిన అధిక దిగుబడులు (20–50 శాతం) పొందవచ్చు.

నేల తయారీ ఖర్చు ఆదా : భూమి ఎల్లపుడూ తేమతో నిల్వఉండటం వల్ల నేల గుల్ల బారి వేరు వ్యవస్థ బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. దీనివల్ల నీరు, ఎరువులు భూమి లోపలి పొరలలో నుండి కూడా మొక్కలకు అధికంగా లభ్యమౌతాయి. దీనివల్ల పంటకాలం తర్వాత నేల తయారీకి అయ్యే ఖర్చు ఆదా అవుతుంది.

వివిధ రకాల మల్చింగ్ షీటులు

మల్చింగ్ షీట్లు ఆతి నీలలోహిత మరియు పరారుణ కిరణాలకు తట్టుకునే విధంగా రసాయన శుద్ధి ద్వారా తయారుచేయడం వల్ల వీటి మన్నిక కనీసం 3 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ మల్చిషీట్లు వివిధ రంగులలో లభిస్తాయి. ఉదా : నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, వెండి రంగు మరియు రెండు వైపులా వేర్వేరు రంగు గలవి కూడా లభిస్తాయి. నలుపు– తెలుపు, నలుపు– పసుపు మరియు నలుపు –వెండి. రంగు గలవి. ఒక్కొక్క రంగు షీటు ఒక్కొక్క పంటకు మరియు వివిధ కాలములలో ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. ఉదా : టమాటలో ఎరుపు – నలుపు మరియు ఆకుపచ్చ మల్చి షీట్ వాడటం వల్ల తెలుపు –వెండి రంగు మరియు పారదర్శక షీట్ల కంటే నాణ్యతతో కూడిన అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు. అలాగే సిమ్లా మిర్చి లో ఎరుపు రంగుది

తెలుపురంగుకంటే, కాలీఫ్లవర్లో పసుపు రంగుది ఆకుపచ్చ రంగుకంటే అధిక దిగుబడులు ఇస్తాయి. కొబ్బరి చెట్లుకు వెండి రంగు మల్చి షీట్లు ను కాండానికి తొడిగితే మొవ్వ పురుగు తాకిడిని నివారించవచ్చు. అదే విధంగా వేసవికాలంలో తెలుపు రంగు షీటును, శీతాకాలంలో నలుపు రంగు షీటును వాడాలి. మొక్కల గింజలు మొలకెత్తడానికి పలుచటి నలుపు రంగు మల్చి షీట్లను వాడాలి (7-15 మైక్రాన్ మందం కలది).

ప్లాస్టిక్ మల్చి షీట్లు వివిధ మందములలో లభిస్తాయి.ఈ షీట్లు మైక్రాన్లలోగాని గేజీలలో గాని కొలుస్తారు. ఒక మైక్రాన్ మందం నాలుగు గేజిలకు సమానం. మల్చి షీట్లు 7-200 మైక్రాన్ మందంలో 1.5-4.0 మీటరు వెడల్పులో చుట్టల రూపంలో లభిస్తుంది. వీటి ధర ఒక కిలో సుమారు రూ. 175/- వరకు ఉంటుంది. షీట్ విస్తీర్ణం దాని మందం పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదా. 25 మైక్రాన్ల మందం కల్గిన షీట్ ఒక కిలో కు 43 చ.మీ. విస్తీర్ణం కలిగి ఉంటుంది. కావున రైతులు వివిధ పంటలకు సరిపడు మందాన్ని ఖచ్చితమైన విస్తీర్ణం మేరకు పరచాల్సి ఉంటుంది.

మల్చి షీట్ లక్షణాలు :

• ఇవి గాలి భూమిలో చొరబడనీయనివై ఉండాలి.

• నేలలో ఉండే ఉష్ణోగ్రతను బయటి వాతావరణంలో కలువనీయకుండా ఉండాలి.

• మల్చి షీటు మన్నిక ఒకసారి భూమిపై వేసిన తర్వాత కనీసం ఒక పంటకాలనికైనా వచ్చేదై ఉండాలి.

పంటకాలాన్ని బట్టి వివిధ మందంగల మల్చి షీటు వాడతారు. ఏ ఏ రకం పంటలకు ఎంత మందం గల మల్చి షీటు వేయలో ఈ క్రింది పట్టికలో తెల్పడమైనది.

పటం 2 : వివిధ రకములైన మల్చి షీటులు

మల్చి షీట్ మందం(మైక్రాన్లలో)	పంట రకం
7	వేరుశనగ
15-25	అన్ని రకాల కూరగాయలు, స్ట్రాబెర్రి, చిలకడదుంప (2-4 నెలల వ్యవధి లోపు పంటలు)
50	పూలు మరియు పండ్లు (10-12 నెలల వ్యవధి కలిగినవి)
100	దీర్ఘకాలపు పంటలు (12 నెలల కన్నా ఎక్కువ వ్యవధి కలిగిన)
150-200	నేల సొలరైజేషన్ కొరకు (పారదర్శ ఫిల్మ్)

అలాగే పంట దశను బట్టి మల్చి షీట్ చేసే విస్తీర్ణం ఆధారపడి ఉంటుంది. దానిని ఈ క్రింది పట్టికలో చూడవచ్చు.

పంట దశ	మల్చి వేయవలసిన విస్తీర్ణం (%)
తొలిదశలో ఉన్న పండ్ల మొక్కలు (మామిడి, జామ, నిమ్మ మొ॥)	20
మధ్యస్థ దశలో ఉన్న పూలు, పండ్ల తోటలు	40
కూరగాయలు, స్ట్రాబెర్రి, బొప్పాయి, మల్బరీ మొదలైనవి	60
పూర్తిగా పెరిగిన పండ్ల తోటలు	70-80
హరిత గృహాలలో పండించే పంటలు, నేల సొలరైజేషన్	100

మల్చి షీట్ మందాన్ని బట్టి ఒక హెక్టారుకు (2.5 ఎకరాలకు) కావలసిన షీట్ పరిమాణాన్ని (కిలోలలో) ఈ క్రింది పట్టిక ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా మల్చి షీట్ వృధా కాకుండా ఖచ్చితంగా వేయడానికి రైతులకు వీలవుతుంది.

మల్చి షీట్ మందం (మైక్రాన్లలో)	**25**	**50**	**100**	**200**
మల్చి షీట్ వేసే విస్తీర్ణం (%)	మల్చి వేయడానికి కావలసిన షీటు పరిమాణం (కిలోలలో)			
20	48	96	192	384
40	96	192	384	768
60	144	288	576	1152
80	192	384	768	1536
100	240	480	960	1920

కనుక మల్చి షీటు ఎన్నిక చాలా ముఖ్యం. వేరుశనగ పంటకు అతి పలుచని మందంగల (7 మైక్రానులు) షీటు, తక్కువ కాలపరిమితి కలిగిన పంటలకు (ఉదా: కాయగూరలు, పూలు మొదలైనవి) తక్కువ మందం (15-25 మైక్రానులు) కలది, దీర్ఘకాలిక పంటలకు (ఉదా :పండ్లు మొదలైనవి) మొదటి 3-4 సంవత్సరాల వరకు ఎక్కువ మందం కలది అంటే 50 మైక్రానులు ఆ తర్వాత 100 మైక్రానులు షీట్ ను వాడాలి. ఈ విధముగా చేయటం వలన రైతుకు ఆర్థికంగా లాభం ఉండును. (మల్చి షీటు కనీస మన్నిక 3 సంవత్సరాలు తీసుకోవాలి.)

మల్చి వేసే విధానం : మొక్కలకు ఇరువైపులా (కూరగాయలు) లేదా చుట్టూరా (పూలు, పండ్ల మొక్కలు) 5-10 సెం.మీ లోతు గాడి చేయాలి. మల్చిషీటును కావలసిన సైజ్ లో కత్తిరించుకొవాలి. ఈ షీటును ప్రతి వరుసలో చెట్టు దగ్గర మరీ వదులుగా లేక బిగువుగా కప్పి అన్నీ చివరలను గాడిలోకి పోయేటట్లు చేసి మట్టితో కప్పాలి. ఈ ప్రక్రియను యాంకరింగ్ అని అంటారు. దీనివల్ల మల్చి షీటు గాలికి చెదిరిపోకుండా ఉంటుంది.

మల్చి వేసే విధానం : రెండు రకాలు

ఎ)విత్తుటకు ముందుగా మల్చి వేసే విధానం : మొక్కకు మొక్కకు మరియు వరుసకు వరుసకు గల దూరాన్ని బట్టి ముందే షీటు పై రంధ్రాలు చేయాలి (ప్రస్తుతం రంధ్రాలుగల షీట్లు కూడా లభ్యమవుతున్నాయి).ఈ మల్చి షీటును ప్రతి వరుస మీద పైన తెలిపిన విధంగా పరిచి యాంకరింగ్ చేయాలి. రంధ్రాల గుండా ఒక్కొక్క విత్తనం వేసి మట్టితో కప్పాలి.ఆ తర్వాత నీరు కట్టాలి. ఈ విధంగా చేయటంవల్ల సుమారు 20–25 శాతం విత్తనాలు ఆదా అవుతుంది.

బి) నాటిన పైరుకు మల్చి వేసే విధానం : మొక్కల చుట్టూ అనుకూలంగా మల్చి షీటును ముందుగా తగిన సైజ్‌లో కత్తిరించుకోవాలి. తద్వారా మల్చి షీటుపై మొక్కల దగ్గర చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి వాటిని తొడిగి, అన్ని చివరలను యాంకరింగ్ చేయాలి.

మల్చి షీటు వేసేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు : మల్చి షీటును బలంగా లాగరాదు. చల్లని వాతావరణ సమయాల్లో అనగా ఉదయం లేక సాయంత్రం సమయంలలో మాత్రమే మల్చిషీటు వేయాలి. ఎందుకంటే దీనికి సాగే గుణం ఉంటుంది. కాబట్టి వేడి సమయంలో షీటు వ్యాకోచం చెంది సాగుతుంది మరియు సరిగ్గా పనిచేయదు. ఎక్కువ గాలి (గంటకు 8 కి.మీ కంటే ఎక్కువ) ఉన్నప్పుడు మల్చి వేయరాదు. పంటకాలం తర్వాత మల్చి షీట్లును పొలం నుండి తీసివేసి, పొలం పనులు చేసుకోవాలి. 7–25 మైక్రాన్ మందము కల్గిన మల్చిషీటు ఒక పంట కాలానికి, 50–200 మైక్రానుల మందం కల్గిన మల్చిషీట్లు 3 సంవత్సరాల వరకు మన్నిక కల్గి ఉంటాయి.

పట్టిక : 3. సందర్భానుసారంగా వివిధ మల్చి షీట్లు ఎంపిక

1. వర్షాకాలంలో కన్నాలు కల్గిన మల్చి షీట్లు
2. ఉద్యానవన మరియు పండ్ల తోటలు – ఎక్కువ మందం కల్గిన మల్చి షీట్లు (50–100 మైక్రాన్)
3. నేల సొలరైజెషన్– పల్చటి పారదర్శక మల్చిషీట్
4. సొలరైజెషన్ ద్వారా కలుపు నివారణ – పారదర్శక మల్చిషీట్
5. కలుపు నివారణ – నల్లటి మల్చి షీటు
6. ఇసుక నేలలు – నల్లటి మల్చి షీటు
7. ఉప్పు నీటి వాడకం – నల్లటి మల్చి షీటు
8. వేసవి పంటలు – తెల్లటి మల్చి షీటు

హరిత గృహాలు (గ్రీన్ హౌస్) : పంటలు సాగు చేయడానికి సరిపడే విస్తీర్ణంలో సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ పై పారదర్శక పదార్థంతో (షీట్లు) (200 మైక్రాన్లు లేక 800 గేజి స్టబిలైజ్‌డ్ ఫిల్మ్) కప్పబడి లోపలి వాతావరణ పరిస్థితులను కొద్దిగా కాని పూర్తిగా కాని నియంత్రించి మొక్కలకు అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులను ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్మించిన కట్టడాలను “హరిత గృహాలు లేక గ్రీన్ హౌస్” అంటారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో సుమారు 70,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో గ్రీన్ హౌస్లు ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు 60 శాతం గ్రీన్ హౌస్లు మహారాష్ట్ర లోని పూణే పరిసర ప్రాంతాల్లోనే విస్తరించి ఉన్నాయి. వీటిలో 90 శాతం హరితగృహలను పూల ఉత్పత్తికి మిగతా 10% వాటిని కూరగాయల ఉత్పత్తికి వినియోగిస్తున్నారు. పూర్వం హరిత గృహాల నపోర్టింగ్ ఫ్రేములు వెదురుకర్రలతో చేసి పైకప్పు గాజు పలకలను వాడేవారు. కానీ రాను రాను వెదురు, కలప లభ్యత తగ్గటం వలన ఇనుము మరియు అల్యుమినియం పైకప్పులు ఫ్రేముగా మరియు ప్లాస్టిక్ సాంకేతికత పెరిగిన తర్వాత పైకప్పుగా 200 మైక్రానులు

ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ ప్రస్తుతం బాగా ప్రాచుర్యం పొందుచున్నాయి. మరియు నిర్మాణ ఖర్చు కూడా వీటి ద్వారా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

హరిత గృహాలు ఉపయోగాలు : ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా మొక్కలకు కావలసిన వాతావరణ పరిస్థితులను కల్గించి సంవత్సరం పొడవునా పంటలు పండించవచ్చు. తద్వారా పంట దిగుబడులు బయటి ప్రాంతం కంటే చాలా ఎక్కువగా (3–4 రెట్లు) ఉంటాయి. అధిక విలువగల (వాణిజ్య) పంటలైనా ఔషధ, సుగంధ, పూలు మరియు కూరగాయలు మొదలైనవి పండించి నాణ్యమైన అధిక దిగుబడులు పొందడంవల్ల ఎక్కువ విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆర్జించవచ్చు. తక్కువ సమయంలో, తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ మొక్కలను, అంట్లు ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా ఉత్పతి చేసిన మొక్కలను ధృడపరచడానికి గ్రీన్ హౌసులు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. మరియు మొక్కల పెరుగదల శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అరుదుగా లభించే మొక్కలను సాగుచేయవచ్చు. తద్వారా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పొందవచ్చు. వరి, ఇతర కూరగాయల నారుమొక్కలను వీటిలో పెంచడం వల్ల నారు తొందరగా పెరిగి (సుమారు 7–10 రోజుల ముందుగా) ముందుగా నాటుకొనవచ్చు. తద్వారా ప్రధాన పొలంలో పండించినప్పుడు రెండు నీటి తడులు ఆదా చేసుకోవడంతో పాటు అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు. హరిత గృహాలలో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ శాతం అధికంగా ఉండటం వలన కిరణజన్య సంయోగక్రియ చక్కగా జరిగి పంటలు ఏపుగా పెరిగి అధిక దిగుబడులు ఇస్తాయి.

హరిత గృహాలు–రకాలు : నిర్మాణ ఖర్చు మరియు వాతావరణ నియంత్రణ పరికరాల అమరిక ఆధారంగా ఇవి మూడు రకాలు.

1. తక్కువ ధరది (చ.మీ. కు రూ. 600/–) సహజ పద్ధతుల (వెంటిలేటర్లు, ప్రక్కపరదాలు) ద్వారా వాతావరణాన్ని కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు.

2. మధ్యస్త ధరది (చ.మీ. కు రూ. 1000/–) ఎయిర్ కూలర్లు, మిస్టింగ్ మరియు ఫాగర్లును ఉపయోగించి పాక్షికంగా వాతావరణాన్ని నియంత్రించవచ్చు.

3. ఎక్కువ ధరది (చ.మీ. కు రూ. 4000/–) వీటిలో అన్ని వాతావరణ నియంత్రణ పరికరాలు కంప్యూటరీకరణతో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులు (గాలిలో తేమ, ఉష్ణోగ్రత, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మొ॥) అనుకూలంగా నియంత్రించవచ్చు.

హరిత గృహాల నిర్మాణం : హరిత గృహాలనిర్మాణంలో ముఖ్యంగా నాలుగు భాగాలుంటాయి.

1. సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ 2. పై కప్పు(క్లాడింగ్) 3. వాతావరణ నియంత్రణ పరికరాలు 4. నీటిపారుదల పరికరాలు / పద్ధతి.

1. సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ : దీనికి వెదురు, సరుగుడు, ఇనుము,ఉక్కు, జి.ఐ., ఎం.ఎస్ మరియు అల్యుమినియం పైపులు వాడతారు. ఇందులో హూప్స్, ఫౌండేషన్ పైపులు మరియు ఫ్రేములు, లేటరల్ సపోర్ట్, రిడ్జ్ లైన్ మెకానిజం, పాలిగ్రిప్ అసెంబ్లీ మొదలైనవి ఉంటాయి. ఇవి హరిత గృహ ఆకారాన్ని నిర్ధారిస్తాయి.

ఉదా:గోతిక్, గేబుల్, క్యోంసెట్, సాటూత్, ఆర్చ్ రూఫ్ మరియు లీన్ రకాలు.

2. పై కప్పు : సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ పైన, ఇరువైపులు, ముందు మరియు వెనుక వాడే పారదర్శకమైన 200 మైక్రానులు మందం కల్గిన అతినీలలోహిత మరియు పరారుణ కిరణాలకు తట్టుకోగల పాలి ఎథిలీన్ షీట్లును పైకప్పు లేదా క్లాడింగ్ అంటారు. దీని ద్వారా 80–85 శాతం సూర్యరశ్మిలోనికి ప్రసరించడంతోపాటు గాలి, వర్షంవల్ల మొక్కలపై ఏర్పడే ప్రతికూల పరిస్థితులను తొలగించవచ్చు.

3. వాతావరణ నియంత్రణ పరికరాలు : హరిత గృహాలలో మొక్కలకు అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులను కల్గించడానికి ముఖ్యంగా షేడ్ నెట్స్ (25-90 శాతం నీడనిచ్చేవి), మిస్టు, ఫాగర్లు, వెంటిలేటర్లు (40-60 శాతం), లైట్లు మరియు ఫ్యాన్లు మొదలైనవి ఏర్పాటు చేస్తారు.

4.నీటి పారుదల పద్ధతి : సాధారణంగా హరితగృహాలలో మొక్కలకు బయటికంటే తక్కువ నీరు సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మొక్కలు మరియు నేల నుండి ఆవిరి రూపంలో జరిగే నీటి నష్టం చాలా తక్కువ. సూక్ష్మ నీటిపారుదల పద్ధతులైన బిందు మరియు మినీ స్ప్రింక్లర్ ద్వారా నీరు కట్టడం చాలా అనుకూలం. ఈ పద్ధతిలో మొక్కలకు నీటితో పాటు ఎరువులను మరియు సూక్ష్మపోషక పదార్థాలను ఫెర్టిగేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా అందించవచ్చు. దీని వల్ల కూలీల ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు ఎరువుల వృధా కాకుండా సమర్థవంతంగా వినియోగిపబడతాయి.

హరిత గృహ నిర్మాణంలో పాటించాల్సిన మెళకువలు : అతినీలలోహిత మరియు పరారుణ కిరణాలను తట్టుకునే మంచి పారదర్శక (85 శాతం వరకు సూర్యరశ్మిని లోపలికి పంపగల) కల్గిన 200 మైక్రానుల (800గేజి) షీటునే తప్పని సరిగా పైకప్పుకు వాడాలి. ఒంటరిగా నిర్మించే హరిత గృహాలను ఏ దిశలోనైనా నిర్మించవచ్చు. ఒకటి కంటే ఎక్కువగా కలిపి నిర్మించేటప్పుడు గట్టర్ సహాయంతో ఒకదానినొకటి కలపాలి. వీటి దిశ మాత్రం తప్పని సరిగా ఉత్తర, దక్షణ దిక్కులో ఉండేటట్లు నిర్మించాలి. దగ్గరలో పెద్ద పెద్ద చెట్లులు గాని, గుట్టలు / కొండలుగాని ఉండరాదు. రసాయన పదార్థాలను గాలిలోకి వెదజల్లే పరిశ్రమలకు వీటిని దగ్గరగా నిర్మించరాదు.

సాధారణంగా పూలు, కూరగాయల పెరుగుదలకు మరియు నాణ్యత పెంపొందించుటకు ఉపయోగకరమైన సగటు పగటి మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా $26-23^0$ సెంటిగ్రేడ్, $15-18^0$ సెంటిగ్రేడ్ హరితగృహాల లోపలిఉష్ణోగ్రత 40^0 సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. కావున వెంటిలేటర్లు మరియు ఫ్యాన్లు & ప్యాడ్స్ ద్వారా ఉష్ణోగ్రతలు నివారించవచ్చు.

పై వాతావరణ పరిస్థితులే కాకుండా బొగ్గుపులుసు వాయువు (CO_2) పరిమాణం 300-1000 పి.పి.యం., సూర్యరశ్మి 250-450 మైక్రో మోల్స్ /చ.మీ /సె.ఉండేటట్లు చూడాలి.(టమాటా,వంగ మరియు గులాబీకి మాత్రం 450-750 మైక్రో మోల్స్ /చ.మీ/సె.ఉండాలి).

హరిత గృహాల్లో వాడే మట్టి మిశ్రమం లేదా సబ్ స్ట్రేట్ క్రింది లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి.

- విత్తనం మొలచి మొక్క నిలబడడానికి కావలసిన ఆధారం ఇవ్వగలగాలి.
- మొక్కలకు అందే రూపంలో నీరు నిల్వ ఉంచగలగాలి.
- మొక్కలకు కావలసిన అన్ని పోషకాలను నిలుపుకొనే శక్తి ఉండాలి.
- గాలి మార్గాలు ఎక్కువగా ఉండాలి.
- ఉదజని సూచిక (P^H) 5.5-7.0 మధ్యలో ఉండాలి మరియు లవణాలు (EC) సాంద్రత : 2-10 మిల్లీమోస్/సెం.మీ. ఉండాలి.
- పోషక ఆయానుల మార్పిడి సామర్థ్యం (CEC) 50-200 మిల్లీ ఈక్వవలేంట్స్/100 మిల్లీ గ్రా. ఉండాలి.

మట్టి మిశ్రమంలో శిలీంధ్రాలు, ఫంగస్ సంబంధిత హానికర సూక్ష్మ జీవులు, కీటకాలు వాటి గుడ్లు, లార్వాలు మొదలైనవి ఉంటాయి. పంట వేసే ముందు వాటిని నిర్మూలించాలి. దీనికి క్రింది తెల్పిన ఏవేని పద్ధతులలో మట్టిని శుద్ధి చేయాలి.

1. నీటిఆవిరితో శుద్ధి చేయుట : మట్టి మిశ్రమంలో తగినంత తేమ ఉండేటట్లు చూసి 71^0 సెంటిగ్రేడ్, ఉష్ణోగ్రత ఉండే నీటి ఆవిరిని 30 నిమిషాల పాటు పంపాలి. ఆ తర్వాత బెడ్స్ తయారు చేసుకోవాలి.

2. రసాయనాలతో శుద్ధి చేయుట : మిథైల్ బ్రోమైడ్(4 శాతం), క్లోరోపిక్రిన్ లేక వాపమ్ మొదలైన రసాయనాలలో ఏదేనా ఒక దానితో శుద్ధి చేయాలి.

3. ఫ్యూమిగేషన్(పొగపారించటం) : తయారు చేసుకున్న మట్టి మిశ్రమంలో రోగకారకాలైన శిలీంధ్రాలు, క్రిమి కీటకాలు, నులిపురుగులను పూర్తిగా అరికట్టుటకు మట్టి మిశ్రమాన్ని ఫార్మాల్డిహైడ్ మందు ద్రావణం తయారు చేసుకొని (5 లీ/200 లీ నీరు)ముందుగా మట్టి మిశ్రమాన్ని నీటితో తడిపి తరువాత మందు ద్రావణాన్ని మట్టిపై పిచ్చికారి చేయాలి.తర్వాత నల్లని ఫాలిఫిల్మ్ కాగితాన్ని బెడ్ పై కప్పి 4–7 రోజులు పాటు పాలిహౌస్లు మూసి ఉంచాలి. ఈ విధంగా చేసిన తరువాత వారం రోజులకు మొక్కలు నాటుకోవాలి. లేకుంటే మందు ద్రావణం వలన మొక్కలు చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

హరిత గృహాల – నిర్వహణ

హరిత గృహాలలో సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రత బయటికన్నా 3–10^0 సెంటిగ్రేడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చలికాలంలో ఐతే మొక్కల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.వేసవిలో షేడ్ నెట్లు (50% వరకు) వాడటంవల్ల, మిస్టు, బిందుసేద్యం /మిని స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా ఉష్ణోగ్రతను కొంత వరకు తగ్గించవచ్చు. రసాయనిక లేపనం ద్వారా కూడా పైకప్పుపై పూతపూసి లోపలి ఉష్ణోగ్రతను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు.

ప్లాస్టిక్ టన్నెల్స్ :

సుమారు 5 అడుగుల ఎత్తు కలిగి 40–150 మైక్రాన్లు మందం గల పారదర్శక ఫిల్ము (అతినీలలోహిత కిరణాలకు తట్టుకునే ఫిల్మ్‌తో కప్పబడి గుడిసె ఆకారంలో నిర్మించిన పొడవాటి (4–5మీ) కట్టడాలను ప్లాస్టిక్ టన్నెల్స్ అంటారు.ఈ ఫిల్మ్ సపోర్ట్ కొరకు వెదురు బద్దలను, ప్లాస్టిక్ పైపులను, ఇనుపచువ్వలను వంకరగా ఉన్న ప్రాంతాలలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పూలమొక్కలు, వరినారు మొదలైన వాటిని పండించుటకు చాలా అనుకూలంగా వాడవచ్చు. వీటిని వేసవికాలంలో కూడా పైకప్పుకు అక్కడక్కడ 1–5 సెం.మీ. రంధ్రాలు చేసి ఉష్ణోగ్రత తగ్గించి పై పంటలు పండించవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాలలో హూప్స్ లేకుండా ప్లాస్టిక్ షీటును వరసలుగా ఉన్న మొక్కల పై కప్పటం ద్వారా పంటలను క్రిమి కీటకాదులు, చలి మొదలైన వాటి బారి నుండి కాపాడవచ్చు. ఈ పద్ధతిని ఫ్లోటింగ్ కవరు పద్ధతి అని అంటారు.

షేడ్ నెట్ గృహాలు (shade net houses)

హరిత గృహాలపై వేసే పాలిథీన్ షీట్లుకు బదులు నైలాన్ తో చేయబడిన వలను పైకప్పుగా ఉపయోగించిన వాటిని షేడ్ నెట్ గృహాలు అంటారు. పైకప్పు మినహా ఇవి అన్నివిధాలా హరితగృహలను పోలి ఉంటాయి. ఇవి మొక్కలను సూర్యరశ్మి తీవ్రత నుండి కాపాడుతాయి. వీటికి వాడే నెట్లను "అగ్రో షేడ్ నెట్"అంటారు. ఈ అగ్రో షేడ్ నెట్లు వివిధ పరిమాణాలలో నీడనిచ్చే విధంగా మార్కెట్లలో లభ్యమగును. ఇవి 3 మీ. వెడల్పుతో వివిధ రంగులలో అనగా నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మరియు వీటి మిశ్రమంతో 25 శాతం, 35 శాతం, 50 శాతం, 75 శాతం మరియు 90 శాతం నీడనిచ్చేవిగా దోరుకుతాయి. ఏ ఏ షేడ్ నెట్లు ఏ ఏ పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటాయో ఈ క్రింది పట్టిక ద్వారా తెలుస్తుంది.

పంట	నీడనిచ్చే అగ్రో షేడ్ నెట్స్ (%)
అంటు మొక్కలు, చేమంతి	90
నర్సరీ మొక్కలు, జెర్బెర, అంధూరియమ్, సుగంధ ద్రవ్యాలు, అలంకరణ మొక్కలు	75
గులాబి, ఆకుకూరలు, స్ట్రాబెర్రీ, లిల్లీ, కట్ ఫ్లవర్లు, టమాట	50
ఇతర కూరగాయలు	35

అగ్రో షేడ్ నెట్లు నిర్మాణం ఎండ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో చేయరాదు.అంతేకాక అధిక వేడి వలన వ్యాకోచం కొరకు 2-5 శాతం ఎక్కువ మార్జిన్ ఉండేటట్లు జాగ్రత్త పడాలి. పాలిక్లిప్పుల మధ్య ఉండవలసిన సాధారణ దూరం 30-40 సెం.మీ. ఉండాలి. నీడనిచ్చే శాతాన్ని అనుసరించి ఒక చ.మీ కు రూ. 17-25 వరకు ఉంటుంది. షేడ్ నెట్స్ నిర్మాణ ఖర్చు హూప్స్ రకాన్ని బట్టి ఒక చ.మీ కు రూ. 160-200/- వరకు ఉంటుంది.

కీటక నిరోధక వలలు :

ఇవి ఇంచుమించు మనం వాడే దోమ తెరలాంటి వలలు. ఇవి కూడా నైలాన్ తో చేయబడి వివిధ రంగులలో ఉంటాయి. వీటిలో కూడా అతినీలలోహిత కిరణాల నుండి పాడవకుండా ఉండే రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి 20-60 నెంబర్ వలలుగా లభిస్తాయి. ఈ వలలను షెడ్ నెట్ స్థానంలో హరిత గృహాల పైకప్పుగా వాడవచ్చు. వీటిని కీటక నిరోధక నెట్ గృహాలు అని అంటారు. ఇవి కొంత వరకు నీడను కల్పించుటయేకాక పంటలను ఆశించే చాలా రకాల క్రిమికీటకాదుల నుండి మరియు తెగుళ్ళ నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి.

వ్యవసాయ కుంటలకు, చెరువులకు ప్లాస్టిక్ షీట్ (అగ్రి ఫిల్మ్)తో లైనింగ్ చేయుట :

నీటిని నిలువ చేయడానికి సహజంగాకానీ, మానవనిర్మితంగాకానీ చేసినటువంటి కట్టడాలను నీటి కుంటలు అని అంటారు. ఇవి సహజంగా సరస్సులకంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి. కుంటలకు నీరు వర్షధారంగాకానీ, బావులు, కాలువల ద్వారా అందించి నిలువచేయవచ్చు. నీటి కుంటల ఉపయోగం మనదేశంలో 1832 వ సంవత్సరంలో మొదలైనా దీని ప్రాముఖ్యత 1930 సంవత్సరం తర్వాత పెరిగింది. వీటిలో నిలువ చేసిన నీటిని వ్యవసాయ పంటలకు వాటి సున్నిత దశలలో జీవనాధార తడులుగా ఇచ్చి పంటలను రక్షిస్తారు. కానీ ఇలా కుంటలలో నిల్వ చేసిన నీరు, నేల రకాలను బట్టి భూమిలో పలు పొరలలోకి ఇంకిపోయి వీటి నష్టం సుమారు 70 శాతం వరకు గరిష్టంగా జరుగుతుంది. దీనిని నివారించడానికి కుంటలను ఇటుకలతో గాని, పలుకలు లేదా సిమెంట్ తో కానీ లైనింగ్ వేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఖర్చు అధికమై పూర్తి కాలం మన్నిక ఉండదు.

వ్యవసాయ రంగంలో ప్లాస్టిక్ వాడుక పెరిగిన తర్వాత వ్యవసాయ కుంటలకు కూడా ప్లాస్టిక్ షీట్ (దీనినే అగ్రి ఫిల్మ్ అని కూడా అంటారు) తో లైనింగ్ చేసి నీరు ఇంకిపోయే నష్టాన్ని 98-100% వరకు అరికట్టవచ్చు. ఈ ఫిల్మ్ నల్లని లేక నీలం రంగులో 250 మైక్రాన్లు (1000 గేజి) మందం కలది. చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది 7-9 మీటర్లు వెడల్పు తో లభిస్తుంది. ఒక కిలో 250 మైక్రాన్ల ఫిల్మ్ 4.2 చ.మీ. విస్తీర్ణం కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర ఒక కిలో సుమారు రూ. 275/- ఉంటుంది. అగ్రిఫిల్మ్ లైనింగ్ చేసిన కుంటలు సుమారు 10 సం. వరకు మన్నిక కలిగి ఉంటాయి. అయితే కుంటలలో పశువులు, ఇతర జంతువులు వెళ్లకుండా ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇంకా మన్నిక చాలా రోజులు ఉంటుంది. వీటి నిర్మాణ ఖర్చు సిమెంట్ లైనింగు తో పోలిస్తే 1/3 వంతు మాత్రమే ఉంటుంది.

కుంట రకాలు : కుంటల సైజ్ మరియు లోతు మన అవసరాలకు తగినట్లు చేసుకోవాలి అంటే వ్యవసాయానికి అవసరపడే కుంటలు పెద్ద సైజులో వెడల్పుగా దాదాపుగా 3-5 అడుగుల లోతు ఉండాలి. (సాముహికంగా ఏర్పాటు చేసుకునే కుంటల లోతు 12-15 అడుగులలో ఉండాలి.)
చేపల పెంపకానికైతే చిన్న సైజులో, లోతుగా(12-15 అడుగులు) ఉండాలి.

కుంటలను చతురస్రము, దీర్ఘ చతురస్రము, గుండ్రంగా, అండాకారంగా రకరకాల సైజ్ లలో మనకు అనుకూలంగా నిర్మించుకోవచ్చు.

కుంటలకు అగ్రి ఫిల్ముతో లైనింగ్ చేయుట వలన కలిగే లాభాలు :

1. నీటిని భూమిలోకి ఇంకడాన్ని 100 శాతం తగ్గిస్తుంది. తద్వారా నిల్వ చేసిన నీరు కుంటలలో చాలా రోజులు నిలువ ఉంటుంది.
2. ఈ నీటిని పంటల సున్నిత దశలలో తక్కువ కాల పరిమితి గల పంటలకు మరియు ఆఫ్ సీజన్ లో పండించే పంటలకు చాలా లాభం.
3. ఇసుకతో కూడిన గరపనేల ప్రాంతాలలో ఇవి చాలా ఉపయోగం.
4. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మన్నిక కలిగి, అధిక నీటిని నిలువచేస్తుంది.

కుంటలకు లైనింగ్ వేసే అగ్రి ఫిల్మ్ యొక్క లక్షణాలు :

1. అనుకున్న రీతిలో వాడుకోవచ్చు.
2. ప్రతికూల వాతావరణాన్ని తట్టుకుంటుంది.
3. నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ.
4. అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు నిరోధం కల్గి ఉంటుంది.
5. ఎక్కువ సాగు గుణం ఉండటం వల్ల అధిక నీటి ఒత్తిడిని తట్టుకొంటుంది.
6. త్వరగా మరియు సులభం గా నిర్మించవచ్చు.
7. నీటితో తక్కువ నిరోధం కలిగి ఉంటుంది.
8. దీనివల్ల వాతావరణ కాలుష్యం ఉండదు (UV treatment చేస్తారు) అందుచే దీనిని వాతావరణ మిత్రుడు (ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ) అని అంటారు.

అగ్రి ఫిల్మ్ తో లైనింగ్ వేసే విధానం : దీనిలో ముందుగా కుంటను మనకు అనుకూలసైజులో నిర్మించాలి. కుంటలోతు మరియు వాలు తలల నిష్పత్తి 1:2.5 ఉండేటట్లు చూడాలి. కుంట అడుగు భాగం మరియు నలు వైపులా చదునుగా చేసి సన్నటి ఇసుక సుమారు 5 సెం.మీ మందం పరచాలి. దీనిపై అగ్రి ఫిల్మ్ ను బిగుతుగా, అడుగు భాగం నుండి పైకి పరుచుకుంటూ రావాలి. కుంటపైన నలువైపుల 30×30 సెం.మీ. గాడి చేసి ఫిల్మ్ చివరలను గాడిలోకి వేసి మట్టితో కప్పాలి. ఈ విధంగా చేయడాన్ని "యాంకరింగ్" అని అంటారు. కుంటల సైజ్ పెద్దదిగా ఉన్నపుడు అగ్రి ఫిల్మ్ను "హీట్ సీలింగ్"అనే పద్ధతి ద్వారా అతికించి వాడాలి.

కుంటల నిర్వహణ :

1. కుంటలకు నీటిని సరఫరా చేసే కాలువ ఎల్లపుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి.
2. కుంటలపై చెట్లు మొలవకుండా మరియు మట్టి కోత కాకుండా చూడాలి.
3. కుంటలలోకి జంతువులు మొదలైనవి రాకుండా చుట్టూ కంచె వేస్తే ఎక్కువ కాలము మన్నిక కలిగి ఉంటుంది.
4. కుంటలలోని నీరు ఎల్లపుడూ శుభ్రంగా ఉండేటట్లు చూడాలి.

పంట కాలువలకు కూడా అగ్రిఫిల్మ్ తో లైనింగ్ చేస్తే నీరు భూమిలోకి ఇంకిపోకుండా సుమారు 20–30 శాతం నీరు ఆదా అవుతుంది.

పైన వివరించిన ప్లాస్టిక్ పరికరాలపై ప్రభుత్వం రైతులకు రాయితీ కల్పిస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం "జాతీయ ఉద్యాన మిషన్" (NHM -- National Horticulture Mission) మరియు మన రాష్ట్రంలో " రాష్ట్ర ఉద్యాన మిషన్" (SHM-State Horticulture Mission)ల ద్వారా రాయితీలను అందిస్తుంది.

వివిధ మాదిరి పాలీహౌస్ / హరిత గృహాలపై (మీ.²) వర్తించు రాయితీ :

సం.	వివరణ	<500 (మీ.²)	500–1008 (మీ.²)	1008–2008 (మీ.²)	2008–4000 (మీ.²)	రాయితీ వివరాలు
1	పాలి హౌస్ మాదిరి –1	1060	935	890	844	ప్రతి లబ్ధిదారుడికి 4000 చ.మీ. లోబడి 50% రాయితీ
2	పాలి హౌస్ (ఫ్యాన్ & పాడ్ సిస్టమ్)	1650	1465	1420	1400	
3	పాలి హౌస్ (ఫ్యాన్ & పాడ్ సిస్టమ్)	1650	1465	1420	1400	
4	పాలి టన్నెల్	–	600	–	–	
5	షేడ్ నెట్ –గుమ్మటపు కప్పు	710				
6	షేడ్ నెట్–థర్మల్ తెరలతో గుమ్మటపు కప్పు	710	–	710	710	
7	షేడ్ నెట్– ఫ్లాట్ షేప్	652	–	575	514	
8	షేడ్ నెట్– థర్మల్ తెరలతో ఫ్లాట్ షేప్	710	–	710	710	
9	షేడ్ నెట్ – గెబుల్ పర్లీన్	615	–	537	462	
10	షేడ్ నెట్– థర్మల్ తెరలతో గెబుల్ పర్లీన్	710	–	710	710	
	బహుళ ప్రయోజన షేడ్ నెట్ మోడల్స్					
1	షేడ్ నెట్– ఫ్లాట్ షేప్	698	–	645	596	ప్రతి లబ్ధిదారుడికి 4000 చ.మీ. లోబడి 50% రాయితీ
2	షేడ్ నెట్– థర్మల్ తెరలతో ఫ్లాట్ షేప్	710	–	710	710	
3	షేడ్ నెట్ – గెబుల్ పర్లీన్	710	–	647	582	
4	షేడ్ నెట్– థర్మల్ తెరలతో గెబుల్ పర్లీన్	710	–	710	710	
5	ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్	రూ. 32,000/హెక్టారు				ప్రతి లబ్ధిదారుడికి 2 హెక్టార్లకు లోబడి 50% రాయితీ
6.	నీటి కుంటలు 20 మీ.×20 మీ.×3 మీ.	రూ. 1.50 లక్షలు				50% రాయితీ

ప్రభుత్వ రాయితీలపై మరిన్ని వివరాలకు మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఉద్యాన కమిషనర్ లేదా వివిధ జిల్లాలలోని జిల్లా ఉద్యాన అధికారిని సంప్రదించవచ్చు.

పాలిహౌస్ సోలార్ డ్రైయర్ : హరిత గృహాలను కొద్దిపాటి మార్పులతో మిరప, పసుపు, ఉద్యాన పంట ఉత్పత్తులను నిర్జలీకరణ చేయడానికి సోలార్ డ్రైయర్‌గా కూడా వాడవచ్చును. పాలిహౌస్ డ్రైయర్‌లో బయట గాలి లోపలికి రావటానికి ప్రక్క వెంటిలేటర్ అలాగే లోపలి తేమతో కూడిన గాలిని బయటకు పంపటానికి టర్బోజెట్ వెంటిలేటర్ వాడవలసి ఉంటుంది. పాలిహౌస్ సోలార్ డ్రైయర్‌లో బయట ఉష్ణోగ్రత కంటే $12-15^0$ సెంటీగ్రేడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన పంటల ఆరుదలకు వాడుకోవచ్చు. ఆరుదల సమయం కూడా రైతు వారి పద్ధతులతో పోలిస్తే 50 శాతం తక్కువ సమయంలోనే (6-9 రోజులలో) ఆరుదల చేయవచ్చు. ఈ పద్ధతి ద్వారా ఖర్చు ఆదా అవుతుంది. అలాగే డ్రైయర్‌లో ఆరుదల చేసిన ఉత్పత్తులలో మంచి రంగు నిలుపుకుని, నాణ్యత కలిగి మార్కెట్‌లో మంచి ధర పలుకును.

ప్లాస్టిక్ ఉపయోగించి సైలేజ్ మరియు ధాన్యం నిల్వ

సైలేజ్ నిల్వ :

సైలేజ్ అనేది పశువులకు ఆహారంగా ఉపయోగించే ముఖ్యమైన పోషక ఆహారం. ఇది ప్రధానంగా పచ్చిక పంటలను సేకరించి, ఆక్సిజన్ లేని పరిస్థితుల్లో పాడైపోకుండా నిల్వ చేయడం ద్వారా తయారవుతుంది. ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్‌లు సైలేజ్ నిల్వలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి.

ఎ) ప్లాస్టిక్ ఉపయోగం :

1. సైలేజ్ తయారీలో ప్లాస్టిక్ షీట్ లేదా బాగ్‌లు ఉపయోగించడం ద్వారా పచ్చిక పంటలు తేమను కోల్పోకుండా మరియు చెడిపోకుండా నిల్వ చేయవచ్చు.
2. గాలి ప్రవేశం తగ్గించడానికి 500-700 మైక్రాన్ మందం కలిగిన ప్లాస్టిక్ షీట్‌లు ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
3. ప్లాస్టిక్ బాగ్‌లలో సైలేజ్ నిల్వ చేయడం తక్కువ వ్యయంతో కూడిన మరియు సమర్థవంతమైన పద్ధతి.

ప్రయోజనాలు :

- తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ కాలం నిల్వ;
- పోషకాలు మెరుగ్గా కాపాడబడతాయి.
- తేమ స్థాయి సరైన స్థాయిలో ఉంటుంది.

ధాన్యం నిల్వ :

ధాన్యాలు, గింజలు మరియు ఇతర పంటలను సురక్షితంగా నిల్వ చేయడం పంట నష్టాన్ని తగ్గించడంలో కీలకమైన అంశం. ప్లాస్టిక్ కంటెయినర్‌లు మరియు షీట్‌లు ధాన్యం నిల్వలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

బి) ప్లాస్టిక్ ఉపయోగం:

1. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్‌లు మరియు టార్పాలిన్ కవర్లు ధాన్యం నిల్వ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.
2. ప్లాస్టిక్ సైలోలు (సైలో బ్యాగ్‌లు) తక్కువ ఖర్చుతో అధిక పరిమాణంలో ధాన్యం నిల్వకు అనుకూలం.
3. ప్లాస్టిక్ షీట్‌లను గిడ్డంగులపై కవర్లుగా ఉపయోగించడం ద్వారా తేమ, నీటి ప్రవేశం తగ్గించవచ్చు.

ప్రయోజనాలు :

- నీటి ముంపు, తేమ, పురుగుల ముప్పు తగ్గుతుంది;
- నాణ్యత నిల్వ ఉంటుంది.
- తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ నిల్వ సామర్థ్యం.

ప్లాస్టిక్ ఉపయోగం పంటల నిల్వలో విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకు వచ్చింది. ఇది పంట నష్టాన్ని తగ్గించడం మాత్రమే కాకుండా, రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ధాన్యం నిల్వ కోసం హెర్మెటిక్ బ్యాగ్‌లు :

హెర్మెటిక్ బ్యాగ్‌లు అనేవి గాలి మరియు తేమ ప్రవేశించని విధంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సంచులు. వీటిని ధాన్యం, గింజలు, మరియు ఇతర పంటల దీర్ఘకాల నిల్వ కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇవి అధిక నాణ్యత కలిగిన పాలిథీన్ లేదా నైలాన్ పదార్థంతో తయారవుతాయి.

హెర్మెటిక్ బాగ్‌ల పనితీరు :

1. హెర్మెటిక్ బ్యాగ్‌లలో గాలి ప్రవేశం పూర్తిగా నివారించబడుతుంది.
2. తేమ లేదా ఆక్సిజన్ లేకుండా శక్తివంతమైన వాతావరణం కలుగుతుంది, ఇది పంటలను పొడిగా మరియు సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.
3. పురుగులు లేదా ఇతర కీటకాలు చేరినప్పటికీ ఆక్సిజన్ లేకుండా అవి కాలకృత్యానికి గురవుతాయి.

ప్రయోజనాలు :

1. పురుగుల నియంత్రణ : రసాయనాలు లేకుండా కీటకాలు మరియు పురుగులను నివారించగలగడం.

2. తక్కువ ఖర్చు : భౌతిక గిడ్డంగులు అవసరం లేకుండా తక్కువ వ్యయంతో నిల్వ.

3. పంట నాణ్యత : ధాన్యం పోషక విలువలను మరియు నాణ్యతను దీర్ఘకాలం కాపాడుతుంది.

4. పర్యావరణ అనుకూలత : రసాయన పురుగు మందుల అవసరం తగ్గడం వల్ల పర్యావరణానికి హానీ తగ్గుతుంది.

వినియోగ విధానం :

1. ధాన్యాన్ని పూర్తిగా పొడిగా చేసి బ్యాగ్‌లో నింపాలి.
2. బ్యాగ్‌ను గట్టిగా మూసివేసి గాలి చొరబడకుండా చూసుకోవాలి.
3. నిల్వ చేసిన బ్యాగ్‌లను పొడి మరియు చల్లటి ప్రదేశంలో ఉంచాలి.

హెర్మెటిక్ బాగ్‌ల ప్రత్యేకత :

- రసాయనాల అవసరం లేకుండా కీటకాలపై ప్రభావవంతమైన నియంత్రణ.
- పంట నష్టాన్ని 30–50 శాతం వరకూ తగ్గించగల సామర్థ్యం.
- చిన్న రైతులు కూడా సులభంగా వినియోగించగలగడం.

హెర్మెటిక్ బాగ్‌లు రైతులకు పంట నిల్వలో పరిష్కారాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అవి ధాన్యం నాణ్యతను కాపాడడమే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పెద్ద గిడ్డంగుల అవసరం లేకుండా రైతులు తమ పంటలను సులభంగా, భద్రంగా నిల్వ చేయవచ్చు.

గమనిక : ప్లాస్టిక్ నిల్వ సరైన పద్ధతుల్లో నిర్వహించకపోతే పర్యావరణంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి, పునర్వినియోగపరచదగిన మరియు మన్నికైన ప్లాస్టిక్ వాడకం ప్రోత్సహించాలి.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రాసెసింగ్ మరియు ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం,

డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల,

బాపట్ల – 522 101, ఫోన్ నెం : 94403 63112

సూక్ష్మసాగు నీటి సాగు (మైక్రో ఇరిగేషన్)

అధిక దిగుబడులకై అధికంగా నీరు అందించాల్సిన అవసరం లేదు. పంటకు సరైన సమయంలో, సరైన మోతాదులో, సరైన రీతిలో, సరైన భాగంలో నీరు అందించినప్పుడు మాత్రమే అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు. ఇది సూక్ష్మసాగు నీటి పద్ధతి ద్వారా వీలుకలుగుతుంది. ఈ పద్ధతి రెండు రకాలు అవి బిందు (డ్రిప్) మరియు తుంపర (స్ప్రింక్లర్) పద్ధతులు.

బిందు సేద్యము : ప్రతి రోజు మొక్కకు కావలసిన నీటిని లేటరల్ పైపులకు అమర్చిన డ్రిప్పర్ల ద్వారా బొట్లు బొట్లుగా నేల ఉపరితలం మీద లేదా నేల దిగువన నేరుగా వేరు మండలంలో అతి స్వల్ప పరిమాణంలో (గంటకు 1 నుండి 12 లీటర్ల వరకు) అందించే విధానాన్ని "బిందు సేద్యం" లేదా "డ్రిప్ పద్ధతి" అంటారు. ఈ పద్ధతిలో డ్రిప్పర్ల వరకు నీరు పీడనం (ప్రెషర్) తో పైపులైన్ల ద్వారా సరఫరా చేయబడుతుంది. వివిధ నీటి యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా సాగు నీరందించినపుడు నీటి వినియోగ సామర్థ్యం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది.

నీటి యాజమాన్య పద్ధతి	**నీటి వినియోగసామర్థ్యం**
సాంప్రదాయ పద్ధతి	30-45%
తుంపర పద్ధతి	55-70%
డ్రిప్ పద్ధతి	90-95%

డ్రిప్ పద్ధతిలో అమర్చే పరికరాలను మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు :

1. **నీటిని మరియు ఎరువును అదుపు చేసే విభాగం (హెడ్ కంట్రోల్ యూనిట్) అందులోని భాగాలు:** నాన్ రిటర్న్ వాల్వ్, ఎయిర్ వాల్వ్, వాక్యూమ్ గేజ్, ఫిల్టర్ యూనిట్, ఫెర్టిలైజర్ ట్యాంక్, గన్‌మెటల్ వాల్వ్, ప్రెషర్ గేజ్, ఇతర ఫిటింగులు.
2. **నీటిని విస్తరింప చేసే విభాగం (వాటర్ కన్‌వేయన్స్ సిస్టమ్) అందులోని భాగాలు :** పి.వి.సి. ప్రధాన మరియు ఉపప్రధాన పైప్ లైన్లు, కంట్రోల్ వాల్వ్, ఫ్లష్ వాల్వ్, ఇతర ఫిట్టింగులు.
3. **నీటిని సక్రమ రీతిలో సరఫరా చేయు విభాగం (వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్) అందులోని భాగాలు :**

   అ) ఆన్‌లైన్ డ్రిప్ పద్ధతి: గ్రోమెట్, స్టార్ కనెక్టర్, బార్బ్‌డ్ కనెక్టర్, లేటరల్ పైపు, ఆన్‌లైన్ డ్రిప్పర్లు, ఎండ్ క్యాప్

   ఆ) ఇన్‌లైన్ డ్రిప్ పద్ధతి: గ్రోమెట్, స్టార్ కనెక్టర్, బార్బ్‌డ్ కనెక్టర్, డ్రిప్పర్‌లైన్, ఎండ్ క్యాప్.

   ఇ) మైక్రో స్ప్రింక్లర్ పద్ధతి : గ్రోమెట్, స్టార్‌కనెక్టర్, బార్బ్‌డ్ కనెక్టర్, మైక్రోస్ప్రింక్లర్, ఫీడర్ ట్యూబు, కంట్రోల్‌వాల్వ్, ఎండ్‌క్యాప్.

డ్రిప్ పద్ధతులు : డ్రిప్ పద్ధతిని 3 రకాలుగా పేర్కొనవచ్చు. అవి

1. ఉపరితల డ్రిప్ (Surface) : ఇది ముఖ్యంగా పండ్ల తోటలకు మరియు వరుసల మధ్య ఎక్కువ దూరం ఉన్న పంటలకు సిఫార్సు చేయబడినది.
2. నేల దిగువన అమర్చబడు డ్రిప్ పద్ధతి (Sub-surface) : ఈ పద్ధతి ముఖ్యంగా కూరగాయలు,

గ్రీన్‌హౌస్ షేడ్‌నెట్స్, చెఱకు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఔషధ మొక్కలు మరియు పూల మొక్కలకు సిఫార్సు చేయబడినది.

3. మైక్రోస్ప్రింక్లర్ పద్ధతి: ఈ పద్ధతిని ముఖ్యంగా 12–15 సంవత్సరాల పైబడిన పండ్ల తోటలకు, వేరుశనగ, అకుకూరలు, ఆయిల్‌పామ్ మొదలగు పంటలకు సిఫార్సు చేయబడినది.

డ్రిప్ పద్ధతి వల్ల కలిగే లాభాలు :

- వివిధ పంటలలో 21 నుండి 50% వరకు సాగు నీరు ఆదా అవుతుంది.
- మొక్కల వేళ్ళకు దగ్గరగా భూమిలో తేమ హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా మొక్క పెరుగుదలకు అనుగుణంగా నీటిని, రసాయనిక ఎరువులను సరఫరా చేయటం వలన మొక్కలు ఏపుగా పెరిగి, త్వరితంగా పక్వానికి వచ్చి అధిక దిగుబడులను (15 నుండి 150%) మరియు నాణ్యమైన పంటను పొందవచ్చు.
- అతి తేలికైన ఇసుక, నల్లరేగడి, లోతు తక్కువ మరియు ఎత్తు పల్లాలుగా ఉండే భూములకు, కొండ ప్రాంతాలకు ఎంతో అనువైనది.
- ప్రతీ చెట్టుకు నీరు ఒకే మోతాదులో సమానంగా అవసరాన్ని బట్టి అందచేయడం ద్వారా కొద్ది గంటలు మాత్రమే మోటారు నడపబడి కరెంటు వినియోగంలో దాదాపు 30% – 45% ఆదా అవుతుంది.
- పోషక పదార్థాలను నీటిలో కరిగించి (ఫెర్టిగేషన్ ద్వారా) నేరుగా మొక్కల వేళ్ళకు దగ్గరగా అందించటం వలన ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం పెరిగి (80% –90%) దాదాపు 20–43% ఎరువులు ఆదా అవుతాయి. ఈ పద్ధతి ద్వారా ఎరువులు నేరుగా మొక్కకు అందుతాయి.
- నేలను చదును చేయటం, గట్లు కట్టటం, కాలువలు తవ్వటం, బోదెలు చెయ్యటం, నీటిని పారగట్టటం, ఎరువులు వేయడం మొదలైన పనులు ఉండవు కావున వీటికయ్యే ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఈ పద్ధతిలో పంట వరుసల మధ్యలో తేమ ఉండదు, కావున కలుపు సమస్య తగ్గుతుంది.
- ఉప్పు నీటితో (8 డెసీసైమన్స్ / మీటరు వరకు) కూడా పంటలు పండించవచ్చు.
- మొక్కల మొదళ్ళ వద్ద మాత్రమే తేమ కలిగి వరుసల మధ్య మట్టి పొడిగా ఉండటం వలన పురుగు మందుల పిచికారీ, మొక్కల కత్తిరింపులు (ప్రూనింగ్), పంటకోత మొదలగునవి సులభతరమవుతాయి.
- నీరు నేరుగా మొక్కలకు అందించడటం వలన స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలో మాదిరిగా మొక్కలపై మరియు ఆకులపై తేమ ఉండదు. కావున చీడపీడల సమస్య తక్కువగా ఉంటుంది.
- భూమి కోతకు గురికాదు. ఎరువులు భూమి లోపలి పొరల్లోకి చొచ్చుకొని పోయి వృధా కావు. మురుగునీటి సమస్య తగ్గుతుంది.
- అధికంగా గాలి వీయడం వలన స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలో మాదిరిగా నీటి వినియోగ సమర్థతపైన ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు.
- డ్రిప్ పద్ధతిని ఉపయోగించటం వలన వాతావరణ సమతుల్యతకు ఎటువంటి హాని కలుగదు.

డ్రిప్ నీటిపారుదల పద్ధతికి అనుకూలమైన పంటల వివరాలు : డ్రిప్ పద్ధతిని వివిధ వాణిజ్య పంటలు, కూరగాయ పంటలు, దుంప పంటలు, గడ్డ పంటలు, ఆకు కూరలు, పండ్ల తోటలు, తోట పంటలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కలప పంటలు, ఔషధ పంటలు, పూల పంటలు మొదలగు పంటలలో అమర్చుకోవచ్చు.

డ్రిప్ పద్ధతి అమర్చుకోవటం పంట రకం మరియు మొక్కల సాంద్రత (స్పేసింగ్), మొక్కకు రోజు వారి కావలసిన అత్యధిక నీటిపరిమాణం, పంటకాలం, నేలతీరు మరియు స్వభావం, ఏటవాలు (టోపోగ్రఫీ), పొలం విస్తీర్ణం, నీటి వసతి (బావి, కాలువ, చెఱువు), లభ్యమయ్యే నీటి పరిమాణం (నీటి ఎద్దడి ఉన్నప్పుడు లభించే నీటి పరిమాణం), భూమి నుండి నీటి లోతు (సక్షన్ లిఫ్ట్), నీటి నాణ్యత, పంపు సెట్ రకం (సెంట్రీఫ్యూగల్, టర్బైన్, సబ్ మెర్సిబుల్), పంపుసెట్ సమకూర్చే నీటి పీడనం (ప్రెషర్ హెడ్), రోజుకు విద్యుత్ సరఫరా కాలం (గంటలలో), పంటల మార్పిడి విధానం, భూమి నిలువ ఉంచుకునే నీటి సామర్థ్యం, వాతావరణ పరిస్థితి మరియు రైతు ఆర్థిక పరిస్థితి మొదలగు అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

డ్రిప్ పద్ధతికయ్యే ఖర్చు : డ్రిప్ పద్ధతికయ్యే ఖర్చు ముఖ్యంగా పంటల వరుసల మధ్య, వరుసల్లో మొక్కల మధ్య దూరం, పొలానికి నీటి వసతికి మధ్యగల దూరం మరియు నీటి నాణ్యత, పంట అవసరాలకు సరిపడే డ్రిప్ పరికరాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

నీటి పరిమాణం : డ్రిప్ పద్ధతిలో ఒక్కో మొక్కకు లేదా పొలానికి ప్రతిరోజు పెట్టే నీటి పరిమాణం, ఉష్ణోగ్రత, సూర్యరశ్మి, గాలి వేగం, గాలిలో తేమ, చెట్ల మధ్య దూరం, పంట రకం, పంట స్వభావం, పంట పెరుగుదల దశ మొదలగు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పాన్ ఇవాపోరోమీటర్ (Pan Evaporometer) ద్వారా ఆవిరి అయ్యే నీటి పరిణామాన్ని మరియు మొక్క స్వభావం, పెరుగుదల దశలను పరిగణించి మొక్క యొక్క నీటి ఆవశ్యతను అంచనా వేసుకున్న తర్వాత డ్రిప్ వ్యవస్థను ఎంత పేపు నడిపించాలన్నది డ్రిప్పర్ల సంఖ్య మరియు గంటకు డ్రిప్పర్లు అందించే నీటి పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఫెర్టిగేషన్ : డ్రిప్ పద్ధతిలో నీటిలో కరిగే ఎరువులను కూడా పంటలకు అందించవచ్చు. ఈ ప్రక్రియనే ఫెర్టిగేషన్ అంటారు. ఫెర్టిగేషన్‌లో ఎరువులను నీటిలో కరిగించి ఫర్టిలైజర్ ట్యాంక్ ద్వారా లేదా వెంచూరి పంప్ ద్వారా నేరుగా నీటితో పాటు మొక్కకు అందించడం జరుగుతుంది. సామాన్యంగా ఫెర్టిగేషన్‌లో యూరియా, పొటాషియం నైట్రేట్, ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం, కాల్షియం నైట్రేట్, అమ్మోనియం సల్ఫేట్, మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, మోనో పొటాషియం పాస్ఫేట్, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్, సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మరియు నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ మిశ్రమంతో కూడిన ఎరువులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ ఎరువులను తగు పరిమాణంలో నీటిలో కలిపి పంట యొక్క ఆవశ్యకతను మరియు పెరుగుదల దశను పరిగణలోకి తీసుకొని కొద్ది మోతాదులో నీటితో ప్రవహింపచేసి మొక్కలకు అందించవచ్చు. ఈ విధంగా ఎరువులను మొక్కలకు అందించటం వలన రసాయనిక ఎరువుల వాడకంలో మరియు కూలీల ఖర్చులో ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఎరువులను పంట పెరుగుదల దశను బట్టి పంట కాలంలో ఎప్పుడైనా అందించవచ్చు.

ఇటీవల కాలంలో ఆధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన సెన్సార్ ఆధారిత బిందు నీటి పారుదల పద్ధతి ద్వారా ఔత్సాహిక రైతులు పంటలకు నీరు అందించుచున్నారు. దీని వలన ఖచ్చితమైన నీటి సరఫరా అందించడమే కాకుండా రైతులకు శ్రమ కూడా తగ్గుతుంది.

డ్రిప్ నీటి పారుదల యాజమాన్యం

- డ్రిప్ నీటి పారుదల పరికరాలన్నీ బి.ఐ.ఎస్. లేదా ఐ.ఎస్.ఒ. నాణ్యతా ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.
- డ్రిప్ పెట్టుకోవాలంటే ముందు మొత్తం నేల విస్తీర్ణం, నేల స్వభావం మరియు ఏటవాలు, నీటి వసతి మరియు నీటి నాణ్యతా పరీక్ష ఫలితాల వివరాలు, మట్టి పరీక్ష ఫలితాలు, పండించదలచిన పంటలు మరియు ఆ ప్రదేశం యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులు తెలుసుకొని ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి.
- ఏదైనా పంటలకు డ్రిప్ పెట్టుకోవాలంటే ఆ పంట యొక్క కీలక దశలో అత్యధిక నీటి అవసరాలు తెలుసుకోవాలి
- డ్రిప్ వ్యవస్థ యొక్క పరిమాణం పొలంలో అన్ని పంటలకు, అన్ని నేలల కీలక దశలలో నీరు సరఫరా చేయగలిగేదిగా ఉండాలి.
- నేలలు, వాతావరణం, పంటలు మరియు అవసరాన్ని బట్టి డ్రిప్ పరికరాలను ఎంచుకోవాలి.
- డ్రిప్పర్ రంధ్రాల ద్వారా విడుదల అయ్యే నీరు భూమి మీద ప్రవహించే విధంగా ఉండకూడదు.
- డ్రిప్ పైపులలో తగినంత పీడనం ఉండే విధంగా డ్రిప్ పైపులను అమర్చాలి. నీరు ప్రవహించేటప్పుడు డ్రిప్ పరికరాల వల్ల కోల్పోయిన పీడనం తీసివేసిన తరువాత కూడా వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేసేందుకు అవసరమయ్యే పీడనం పైపుల్లో ఉండే విధంగా పంప్‌ను అమర్చుకోవాలి.
- డ్రిప్ కంపెనీ యొక్క అధీకృత ఇంజనీరింగ్ నిపుణుల పర్యవేక్షణలో క్రమబద్ధంగా డ్రిప్ పారుదల వ్యవస్థను అమర్చుకోవాలి.
- డ్రిప్ పారుదల వ్యవస్థలోని హెడ్ కంట్రోలు, ఫిల్టర్ యూనిట్‌ల వద్ద కాంక్రీటుతో కూడినటువంటి సిమెంటు ప్లాట్‌ఫారంను అమర్చుకోవాలి. దీని వలన హెడ్ కంట్రోలుకు ధృఢత్వం కలుగుటయే కాక, వ్యవస్థ యొక్క నిర్వహణకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- డ్రిప్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన పైప్‌లైను, ఉప ప్రధాన పి.వి.సి. పైపులైన్ల కొరకు భూమిలో గాడులు తీయవలసి ఉంటుంది. ఆ యొక్క గాడిలోతు విధిగా ప్రధాన పైపుకయితే 0.75 నుండి 0.9 మీటర్ల లోతు మరియు 0.3 మీటర్ల వెడల్పు. ఉప ప్రధానపైపులకు 0.6 మీటర్ల లోతు మరియు 0.25 మీటర్ల వెడల్పు ఉండాలి.
- పి.వి.సి ప్రధాన మరియు ఉప ప్రధాన పైపులు బాటకు ప్రక్కగా వచ్చే విధంగా అమర్చుకోవాలి. ప్రధాన పైపులను గాడిలోనే ఉంచి అతికించాలి. ఉపప్రధాన పైపులు భూమిపైన అతికించి తరువాత గాడిలోనికి దింపి మట్టి కప్పాలి.
- గాడిలో పి.వి.సి పైపు వేసిన తరువాత పైపులకు అమర్చిన 'ఎల్' బెండు, టీ, రెడ్యూసర్‌ల వద్ద ధృఢత్వం కొరకు ప్రక్కలకు సిమంటు కాంక్రీటు బ్లాకులు అమర్చుకోవాలి.
- మొత్తం డ్రిప్ వ్యవస్థ అమర్చిన తరువాత పైపుల్లో నీరు వదలి వ్యవస్థ యొక్క పనితనం పరీక్షించాలి.
- ఎరువులను ఫర్టిలైజర్ ట్యాంక్ ద్వారా నీటిలో కరిగించి డ్రిప్ ద్వారా నేరుగా మొక్కలకు ఇవ్వాలి.
- డ్రిప్‌వ్యవస్థ నిర్వహణ విధానం, అందులోని భాగాలయిన ఫిల్టర్‌లను, ఉపప్రధాన పైపులను, లాటరల్స్, డ్రిప్ లైన్లను శుభ్రపరచటం, ఆమ్ల చికిత్స మరియు క్లోరిన్ చికిత్స విధానం, కంట్రోలు వాల్వులు తెరిచే ప్రక్రియ, ఎరువుల ట్యాంక్ ఉపయోగించే విధానం తెలుసుకోవాలి.

- నీటివసతిని బట్టి (నాణ్యతను) ఫిల్టర్‌ను నిర్ణయించుకోవాలి. నీటి వసతిగా బోరు ఉన్నట్లైతే డిస్క్‌ఫిల్టరు లేదా స్క్రీన్ ఫిల్టరును, బోరునందు వచ్చే నీటిలో అధికంగా సుద్ద, మొత్తటి ఇసుక ఉన్నట్లైతే డిస్క్‌ఫిల్టర్‌తో పాటు హైడ్రోసైక్లోన్ ఫిల్టర్‌ను మరియు నీటి వసతి బావి అయినట్లయితే గ్రావల్ లేదా శాండ్ ఫిల్టర్‌తో పాటు డిస్క్ లేదా స్క్రీన్ ఫిల్టర్‌లను ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ ఫిల్టర్‌లను విధిగా క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచుకోవాలి.
- క్రమం తప్పకుండా డ్రిప్పర్‌లను పరీక్షించుకోవాలి, వాటి ద్వారా సక్రమంగా నీరు విడుదల అవుతున్నదీ లేనిదీ గమనించాలి.
- ఒకవేళ డ్రిప్ రంధ్రాలు మూసుకుని పోయి నీరు సక్రమంగా బయటకు విడుదల కానట్లైతే అవసరాన్ని బట్టి ఆమ్ల లేక క్లోరిన్ చికిత్సలు నిర్వహించాలి.

స్ప్రింక్లర్ సేద్యం :

స్ప్రింక్లర్ సేద్యంలో నీటిని తుంపర్లుగా వర్షం వలె మొక్కలు లేదా భూమి ఉపరితలంపైన విరజిమ్మటం జరుగుతుంది. ఈ విధానంలో నీటిని ఒక క్రమమైన పీడనంతో (1.5 నుండి 3 కిలోలు/సెం.మీ.^{2}) పైపుల్లో ప్రవహింపచేసినపుడు ఆ నీరు పైపులపై అమర్చబడిన స్ప్రింక్లర్ నాజిల్ గుండా తుంపర్లుగా విడిపోయి వర్షపు జల్లుగా నేలపైన పడుతుంది.

స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలోని అతి ముఖ్యభాగాన్ని "స్ప్రింక్లర్ హెడ్" అంటారు. దీనిలో 2 రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఒక రంధ్రం సైజు 4 నుండి 5.6 మి.మీ. వరకు, రెండవది 3.13 మి.మీ. ఉంటుంది. స్ప్రింక్లర్ హెడ్ సామర్థ్యం పంపు అందచేసే పీడనాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎక్కువ పీడనం కలది 2-4 కేజీలు/సెం.మీ^{2}, తక్కువ పీడనం కలది 0.34-2.72 కేజీలు/సెం.మీ.^{2} వరకు పనిచేస్తాయి. ఎక్కువ పీడనం గలది సుమారు 35 మీటర్ల వ్యాసం కలిగిన నేలను తడపగలదు. తక్కువ పీడనం గలది 30 మీటర్ల వ్యాసం గల నేలను తడుపగలదు.

స్ప్రింక్లర్ నాజిల్ నుండి వెదజల్లబడే నీటి బిందువుల పరిమాణం పైపులోని పీడనం (ప్రెషర్) వల్ల మారుతుంటుంది. పీడనం తక్కువగా ఉన్నట్లయితే నీటి బిందువులు స్ప్రింక్లర్ నాజిల్ ద్వారా పెద్ద పరిమాణంలో విడుదలవుతాయి. అట్టి పరిస్థితులో పంటకు మరియు నేలకు హాని కులుగుతుంది. అందుచేత అవసరమైన పీడనంతో స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిని నడపాలి.

స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలోని ముఖ్య భాగాలు : నీటి వసతి మరియు పంప్‌స్టేషన్, పంప్ కనెక్టర్, 6 మీటర్లు పొడవు గల HDPE పైపులు, (కప్లర్ లేదా ల్యాచింగ్‌తో సహా), స్ప్రింక్లర్ సాడిల్, స్ప్రింక్లర్ హెడ్ లేదా నాజిల్, రైజర్ పైపులు (20.మి.మీ. చుట్టుకొలతతో 76 సెం.మీ. పొడవు), పైపు బెండు (కప్లర్ లేదా ల్యాచింగ్‌తో సహా) మరియు ఎండ్‌క్యాప్.

స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిని మూడు విధాలుగా అమర్చుకోవచ్చు : శాశ్వతంగా ప్రధాన, ఉపప్రధాన పైప్‌లైన్లను, లాటరల్స్‌ను భూమిలో పాతిపెట్టి కదిలించేందుకు వీలు లేకుండా అమర్చవచ్చు. రెండో పద్ధతి కొంతవరకు శాశ్వతంగా అమర్చే పద్ధతి. దీనిలో ప్రధాన పైపులు మాత్రమే భూమిలో ఉండి మిగతా పరికరాలు కదిలించేందుకు వీలవుతుంది. మూడో పద్ధతి తాత్కాలికంగా అమర్చే పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో అన్ని పరికరాలను ఒక పొలం నుండి మరొక పొలానికి తీసుకొని పోయి అమర్చుకోవటానికి వీలవుతుంది.

స్ప్రింక్లర్ రకాలు : స్ప్రింక్లర్‌లోని వివిధ రకాలు మరియు అవి ఉపయోగించే పంటల వివరాలు.

- **ఇంపాక్ట్ స్ప్రింక్లర్స్ :** తక్కువ పరిధి కలవి. పనిచేసేందుకు కావలసిన పీడనం 2 నుండి 5 కేజీలు/సెం.మీ. స్ప్రింక్లర్ నీటి జట్ ఏంగిల్ 30^0. నీటి విడుదల (డిస్చార్జి) గంటకి 1200 నుండి 4000 లీటర్లు. ఈ రకం స్ప్రింక్లర్ అన్ని రకాల పంటలకు (వేరుశెనగ, గోధుమ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, ఆకు కూరలు) అనుకూలం.
- **మైక్రోస్ప్రింక్లర్ లేదా మైక్రోజట్స్ :** ఉద్యానవనపంటలు, తోట పంటలకు అనుకూలం. తక్కువ ప్రెషర్‌తో (2 కిలోలు/సెం.మీ.^{2}) పనిచేస్తాయి. నీటి జట్ ఏంగిల్ 4^0 నుండి 7^0. నీటి విడుదల గంటకు 20 నుండి 500లీటర్లు.
- **రెయిన్‌గన్ స్ప్రింక్లర్స్ :** ఎక్కువ పరిధి కలవి, రెయిన్ గన్ స్ప్రింక్లర్స్. అధిక పీడనం (2 నుండి 5 కేజీలు సెం.మీ^{2}) అవసరం. నీటి జట్ ఏంగిల్ 30^0 మరియు నీటి విడుదల గంటకు 6000 నుండి 18000 లీటర్లు. గడ్డి మరియు ఆహార ధాన్య పంటల్లో వాడుకోవచ్చు.
- **పాపప్ స్ప్రింక్లర్స్ :** మధ్యరకం పీడనం (ప్రెషర్) 2 నుండి 5 కేజీలు/సెం.మీ.^{2}తో పనిచేస్తాయి. ఈ రకం స్ప్రింక్లర్లు లాన్స్‌లలో, పచ్చికలలో మరియు గోల్ఫ్ కోర్టులలో వాడతారు. నీటి విడుదల గంటకు 500 నుండి 5000 లీటర్లు.
- **రెగ్యులేటెడ్ స్ప్రింక్లర్స్ :** ఎగుడు దిగుడు లేదా ఎత్తు పల్లాలు ఎక్కువగా ఉన్న నేలల్లో వాడుతారు.
- **పార్ట్ సర్కిల్ స్ప్రింక్లర్స్ :** నేల అంచుల్లో ఒక ప్రక్క మాత్రమే అర్ధ వలయం తడిసే విధంగా వాడతారు.
- **పర్‌ఫోరేటెడ్ పైపులు :** పచ్చికలలో మరియు లాన్స్‌లలో ఎక్కువగా వాడుతారు.

స్ప్రింక్లర్ పద్ధతి వలన లాభాలు

- స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలో సాంప్రదాయ నీటి పారుదల విధానంలో వలె పొలంలో నీరు పారించేందుకు కాలువలు, గట్లు ఏర్పాటు చేయనవసరం లేదు. అందువలన పంటల, భూమి నష్టపోకుండా పొలం మొత్తం సాగుచేయవచ్చు.
- సాంప్రదాయ నీటి పారుదల విధానంలో నీరు వాల్వుల గుండా పారినపుడు పక్కలకి ఇంకి 35%పైగా నీరు వృధా అవుతుంది. స్ప్రింక్లర్ పారుదల పద్ధతిలో అటువంటి నష్టం ఉండదు.
- పంటకు తరచూ అవసరమయ్యే పరిమాణంలో నీటిని అందించటం వలన ఎదుగుదల బాగా ఉండి మంచి నాణ్యతతో కూడిన అధిక దిగుబడి (5–20% వరకు) సాధించవచ్చు.
- స్ప్రింక్లర్ పద్ధతిలో నీటిని భూమిలోపలి పొరల్లోకి చొచ్చుకొని పోనీకుండా అవసరమయినంత లోతుకు మాత్రమే ఇవ్వవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇసుక నేలలలో సమర్థవంతంగా నీటి యాజమాన్యం చేపట్టవచ్చు.
- మొక్కలకు అవసరమయినంత నీటిని ఎక్కువ సార్లు, తక్కువ మొత్తంలో ఇవ్వవచ్చు.
- స్ప్రింక్లర్‌లో ఉత్పన్నమయ్యే మృదువైన నీటి తుంపర్ల వలన భూమిపై అధికంగా నీరు నిలువ ఉండదు, మట్టి గడ్డకట్టదు. అవసరమైన నిష్పత్తిలో గాలి మరియు నీరు భూమిలో ఉంటూ విత్తనాలు తర్వగా మొలకెత్తుతాయి. తద్వారా అధిక దిగుబడి సాధ్యమవుతుంది.
- ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న నేలలను, నీటి వసతి కన్నా ఎత్తులో ఉన్న భూములను కూడా సాగుచేసుకోవచ్చు.
- నీటి వర్షం మాదిరి తుంపర్లుగా పడుట వలన పరిసరాలు చల్లబడి అధిక ఉష్ణోగ్రత నుండి పంటలను కాపాడవచ్చు.

స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థ ఖర్చు వివరాలు : స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థను అమర్చేందుకు ఒక ఎకరాకు సుమారుగా రూ.16000–18,500 ఖర్చు అవుతుంది. స్ప్రింక్లర్ పైపుల సైజులను బట్టి ధరలలో కొద్ది మార్పులు ఉండవచ్చు.

నిర్వహణ : పైపులు మరియు ఫిట్టింగ్‌లు : తరచూ పైపులను మరియు కప్లర్లను శుభ్రపరచుకోవాలి. నట్‌లు మరియు బోల్ట్‌లను టైట్‌గా బిగించాలి. పైపులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎరువుల కుప్పలపై మరియు తడిగా ఉన్న కాంక్రీటు మీద ఉంచరాదు.

స్ప్రింక్లర్ హెడ్ : స్ప్రింక్లర్ పరికరాలను అటు ఇటు కదల్చినపుడు స్ప్రింక్లర్ హెడ్ పాడవకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్ప్రింక్లర్‌కు నూనె, గ్రీజ్ మరియు ఇతర లూబ్రికెంట్లు వాడరాదు. అరిగిపోయిన వాచర్లను ఎప్పటికప్పుడు మార్చాలి. స్ప్రింగ్ టెన్షన్ తగ్గిన ఎడల, పెంచేందుకు స్ప్రింగ్ ఆర్మ్‌ను గట్టిగా బిగించి స్ప్రింగ్ చివరలను పైకి లాగి వంచాలి. మూసుకుపోయిన నాజిల్స్‌ను శుభ్రపరిచేందుకు ఇనుప చువ్వలకు బదులుగా సన్నని పుల్లలను వాడాలి. పైపులను నేలమీద లాగకుండా మనుషులచే మోసుకుపోవాలి.

సూక్ష్మ నీటి సేద్య పద్ధతి (మైక్రో ఇరిగేషన్) లో పరిశోధనా ఫలితాలు :

- బిందు సేద్య పద్ధతిలో 10 మి.మీ. నీటిని ప్రతి మూడు రోజుల కొకసారి ఇస్తే మడుల పద్ధతి కంటే 94 శాతము అధికంగా దిగుబడి నమోదవుతుంది.
- తుంపర సేద్యము మరియు మైక్రోజెట్ తుంపర సేద్యములో సాంప్రదాయ మడుల పద్ధతి కంటే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు.
- వేరుశనగలో భూగర్భ బిందు సేద్య పద్ధతిలో క్షేత్ర నీటి వినియోగ సామర్థ్యం నేల ఉపరితల బిందు సేద్యము కంటే అధికంగా ఉంటుంది.
- వేరుశనగలో బిందు సేద్యములు నీటిని విత్తిన 20 రోజుల తరువాత నుండి ప్రతి మూడు రోజులకొకసారి 10 మి.మీ. (2 1/2 గం॥) నీటిని, 65 రోజుల నుండి 15 మి.మీ. (3 గం॥) నీటిని ఇచ్చి అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు. మడుల పద్ధతితో పోలిస్తే 292 మి.మీ. నీటి పరిమాణము బిందు సేద్యము ఆచరించి పొదుపు చేయవచ్చు.
- శనగ పంటలో 40 మి.మీ. నీటిని బిందు సేద్యము పద్ధతిలో 35 మరియు 55 రోజులకు రెండు దఫాలుగా పూత మరియు కాయ వూరే దశలో ఇస్తే 26 శాతము అధిక దిగుబడి వర్షాధార శనగతో పోలిస్తే వస్తుంది.
- కందిలో పూతకు 20 రోజుల ముందు మరియు పూత వచ్చిన 20 రోజుల తర్వాత రెండు సార్లు బిందు సేద్యంతో జీవ తడి ఇస్తే 58 శాతము అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు.
- మైక్రోజెట్ తుంపర సేద్యము ఉపయోగించి తక్కువ నీటితో తక్కువ ఎత్తు పెరిగే వేరుశనగ, పెసర, మినుము, వరి, రాగి, ఆకు కూరలు పంటలను పండించవచ్చు.
- ఎద్దుల గొర్రుతో హైబ్రిడ్ వరి విత్తనాలు నేరుగా విత్తి మైక్రోజెట్ స్ప్రింకర్లతో నీటి యాజమాన్యం చేస్తే అధిక దిగుబడి పొందడమే కాక (5 ట/హె) నీటి వినియోగ సామర్థ్యము కూడా పెరుగుతుంది.

సూక్ష్మసాగు నీటి పద్ధతి పెట్టుబడికి అయ్యే ఖర్చు మరియు ఇతర వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

అసోసియేట్ డీన్, ఎస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి – 517 502, ఫోన్ నెం. : 99896 25206
మరియు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల – 522 101. ఫోన్ నెం. : 98485 72321

బిందు సేద్యం ద్వారా ఎరువుల యాజమాన్యం

వ్యవసాయ రంగంలో ఆశించిన స్థాయిలో ఉత్పత్తిని మరియు ఉత్పాదకతలను సాధించే దిశగా ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాలలో అధిక ఉత్పత్తిని సాధించటమే కాకుండా ఉత్పాదక వ్యయాన్ని తగ్గించటం కూడా అతికీలకమైన అంశం. ఈ లక్ష్యాలను సాధించాలంటే పంటలకు అవసరమయ్యే నీటిని మరియు పోషకాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడమే మార్గం. పర్యావరణానికి హానికలుగని రీతిలో మరియు నీటి వనరులను సంరక్షించుకోవటంలో పంట అవసరాలకు అనుగుణంగా సమగ్ర సాగునీటి మరియు పోషకాల యాజమాన్యం అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

సాగు నీరు మరియు పంటలకు అవసరమయ్యే పోషకాలు ఒకేసారి సమాంతరంగా సూక్ష్మ నీటి పారుదల పద్ధతిలో మొక్కలకు అందించటాన్ని ఫర్టిగేషన్ అంటాం. ఈ పద్ధతి వల్ల పంటల దిగుబడులు పెరగటమే కాకుండా పర్యావరణంపై దుష్ప్రభావాలు తక్కువ. ఫర్టిగేషన్ పద్ధతి వల్ల ఒనగూరే ప్రయోజనాల దృష్ట్యా భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది రైతులు ఇప్పటికే సూక్ష్మ సాగు నీటిపద్ధతులు అయిన భూ ఉపరితల డ్రిప్, భూమిలోపల నుండి వేసే డ్రిప్, మైక్రోస్ప్రింక్లర్లు అలాగే మైక్రోజెట్స్ లాంటి వాటిపై మక్కువ చూపిస్తున్నారు. దీనివల్ల గతకొద్ది సంవత్సరాలుగా సూక్ష్మసాగు నీరు వాడే రైతుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగింది. బిందు సేద్య రైతుల్లో ఫర్టిగేషన్ పట్ల పెరిగిన అవగాహన అలాగే బిందు సేద్యం పరికరాలను కొద్ది పాటి మార్పు చేర్పులతో ఫర్టిగేషన్‌కు కూడా ఉపయోగించవచ్చనే ఆలోచన వల్ల ఎక్కువ మొత్తంలో రైతులు ఫర్టిగేషన్ వైపు ఆకర్షితులౌతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఫర్టిగేషన్ పద్ధతి చాలా రకాల పంటల్లో, వివిధ రకాల నేలల్లో, వాతావరణ పరిస్థితుల్లో విస్తృతంగా వాడుకలో ఉంది. భారతదేశంతో సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫర్టిగేషన్ క్రింద విస్తీర్ణం ప్రతీ సంవత్సరం పెరుగుతూ వస్తుంది. సాగునీటికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఇజ్రాయిల్ లాంటి దేశాల్లోనైతే దాదాపు 75 శాతం సాగు విస్తీర్ణం సూక్ష్మసాగునీటి పద్ధతి ద్వారానే సాగు చేయబడుతూ ఉంది. అయినప్పటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా తక్కువ విస్తీర్ణంలో (అనగా 3 శాతం కంటే తక్కువ) సూక్ష్మసాగు నీటి పద్ధతుల ద్వారా పంటలు సాగుచేయబడుతూ ఉంటాయి. ఇక మనదేశంలో నీటి పారుదల క్రింద ఉన్న మొత్తం విస్తీర్ణంలో కేవలం 0.3 శాతం మాత్రమే సూక్ష్మసాగునీటి పద్ధతుల క్రింద ఉంది. దేశవ్యాప్తంగానే కాక రాష్ట్రంలో కూడా చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సూక్ష్మసాగు నీటి పద్ధతులను అందుబాటులోకి తేవడానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 27 మిలియన్ల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సూక్ష్మసాగు నీటి పారుదల పద్ధతులను విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

ఇజ్రాయిల్‌లో సూక్ష్మనీటి సాగు క్రింద ఉన్న మొత్తం విస్తీర్ణంలో దాదాపు 81 శాతం విస్తీర్ణాన్ని ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో సాగు చేయడాన్ని గమనిస్తే, ఫర్టిగేషన్ పద్ధతికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అభివృద్ధి చెందిన దాదాపు అన్ని దేశాలలో ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిని విస్తృతంగా అవలంభిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మాత్రం ఫర్టిగేషన్ పద్ధతి వాడకం ఇంకా ఆరంభ దశలోనే ఉంది. సూక్ష్మ సాగు నీటి పద్ధతుల క్రింద ఉన్న మొత్తం విస్తీర్ణంలో కేవలం కొద్దిపాటి విస్తీర్ణంలో మాత్రమే ఫర్టిగేషన్ ద్వారా ఎరువులు అందిస్తున్నారు. రైతులు ఇంకా ఎరువుల వాడకం సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే అంటే, వెదజల్లడం గాని, లేదా మొక్కల మొదళ్ళలో వేయడం కాని చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్టిగేషన్ పద్ధతుల వల్ల పోషకాలను ఖచ్చితంగా మొక్క వేరు వ్యవస్థకు సూటిగా అందించే సౌలభ్యం ఉంది. ఫర్టిగేషన్ ద్వారా మొక్క ఎదుగుదల దశలకు అనుగుణంగా వాటి అవసరాలను ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేస్తూ వేరు ఎదుగుదల, అభివృద్ధి చెందే దశ, పూత మరియు కాపు దశల్లో సిఫార్సు చేసిన పోషకాలను అందించే అవకాశం ఉంది. బిందుసేద్యంతో పాటు ఫర్టిగేషన్ చేయకపోతే పంటల దిగుబడులలో, నీటి వినియోగ సామర్థ్యంలో, పోషకాల సక్రమ వినియోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు రావు.


ఫర్టిగేషన్ వల్ల కలిగే లాభాలు :

- ఈ పద్ధతిలో పంట యొక్క పోషకాల అవసరాలను, ఎదుగుదల దశలను అలాగే వాతావరణ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకోవడం వల్ల పోషకాల వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
- పంటకు కావల్సిన మోతాదులో మరియు అవసరమైన దశలలో పోషకాల లభ్యత.
- పోషకాలు నేరుగా వేర్లకు అందించడం వల్ల పోషకాలు వ్యర్థం కావు.
- పోషకాలు భూమిలో ఇంకిపోవడం, ఆవిరి కావడం అలాగే అలభ్య పోషకాలుగా రూపాంతరం చెందటం లాంటి నష్టాలను ఫర్టిగేషన్ ద్వారా అధిగమించవచ్చు.
- ఎరువుల వాడకం 15 నుండి 40 శాతం వరకు అలాగే కూలీల అవసరం 10 నుండి 15 శాతం వరకు తగ్గుతాయి.
- సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఎరువులను వెదజల్లటం, మొక్కల మొదళ్ళలో వేయడం లాంటి పద్ధతులతో పోలిస్తే ఫర్టిగేషన్ వల్ల ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం రెండింతలుంటుంది.
- వాలుగా ఉన్న పొలాల్లో అలాగే ఇతర సమస్యాత్మక భూములకు ఫర్టిగేషన్ చాలా అనుకూలమైన పద్ధతి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఫర్టిగేషన్ పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడుతుంది.
- పంట దిగుబడులు దాదాపు 30 నుండి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉన్నది.
- పంట ఉత్పత్తుల నాణ్యత బాగుంటుంది.

ఫర్టిగేషన్ పద్ధతి మూడు రకాలైన పరికరాల ద్వారా ఇవ్వవచ్చు. ఈ పరికరము కంట్రోలు హెడ్ దగ్గర అమర్చబడి ఉంటుంది. ఫర్టిగేషన్ పరికరము ద్వారా వచ్చే ఎరువు ద్రావణము మెయిన్ లైన్‌లోని నీటితో కలిసి ఫిల్టరు ద్వారా మరలా మెయిన్ లైన్‌లోకి వెళ్ళునట్టు చూడవలెను. ఈ విధముగా చేయడం వలన ఎరువు ద్రావణంలో ఉన్న మలినాలు ఫిల్టరు అవుతాయి. ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో ఫర్టిగేషన్ ట్యాంకు, వెంచురి లేక ఫర్టిగేషన్ పంపు ద్వారా ఇవ్వవచ్చు. ఫర్టిగేషన్ ట్యాంకు లేక వెంచురి ఖరీదు తక్కువ కాబట్టి రైతులు వీటిని ఎక్కువగా

వినియోగిస్తున్నారు. ఫర్టిగేషన్ పరికరం ఎంపిక ముఖ్యంగా వాడే ఎరువులు (పొడి లేదా ద్రవ రూపం), పొలం విస్తీర్ణం, పరికరం యొక్క ఖరీదు తదితర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఫర్టిగేషన్‌కు అనుకూలమైన కొన్ని రసాయనిక ఎరువులు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.



ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో ఉపయోగించే ఎరువులు నీటిలో పూర్తిగా కరిగే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. లేకుంటే ఎరువుల అవశేషాలు డ్రిప్పరు రంధ్రాలకు అడ్డుపడి మూసివేస్తాయి. ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో పొడి రూపంలో (లేదా) ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఎరువులను వాడుకోవచ్చు. మంచి నాణ్యత మరియు దిగుబడులు సాధించడానికి క్లోరైడ్‌లు లేనటువంటి ఎరువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

ఫర్టిగేషన్ పద్ధతి యాజమాన్యంలో కీలకమైన అంశాలు :

ఫర్టిగేషన్ ద్వారా పంటల యాజమాన్యంలో వివిధ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని, వాటికి అనుగుణంగా పోషకాలను ఏ దశలో, ఎంత మోతాదులో విడుదల చేయాలి అనే అంశాలను నిర్ణయించటం జరుగుతుంది.

ఫర్టిగేషన్‌ను ప్రభావితం చేసే కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు :

- ఎన్నుకునే పంట (రకం, పంట ఎదుగుదల దశ, నిర్ణీత విస్తీర్ణంలో మొక్కల సాంద్రత, పంట పోషకాలను తీసుకొనే విధానం, పంట కాలపరిమితి మరియు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న దిగుబడులు)
- సాగు విధానం (సాధారణ సాగు, గ్రీన్ హౌస్‌లో సాగు, మట్టి లేకుండా ఇతర మాధ్యమాలలో సాగు)
- భూభౌతిక మరియు రసాయనిక లక్షణాలు (నేల స్వభావం, లవణ పరిమాణ సూచిక (ఇ.సి.), ఉదజని సూచిక, బంకశాతం, సేంద్రియ కర్బనం, భూసారం)
- వాతావరణ పరిస్థితులు
- సాగునీటి నాణ్యత (ఉదజని సూచిక, ఇ.సి)

పైన సూచించిన విధంగా ఫర్టిగేషన్ యాజమాన్యం వివిధ అంశాల ద్వారా ప్రభావితం అవుతుంది. కాబట్టి ఫర్టిగేషన్ ద్వారా పంటలకు పోషకాలను అందించే ప్రణాళికలను తయారు చేసేటప్పుడు క్రింద సూచించిన సాంకేతిక అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.

1. మధ్యస్థం నుండి లోతైన రేగడి భూముల్లో ఫర్టిలైజరు ట్యాంకు పరికరాన్ని వాడుకోవాలి. అలాగే తేలికపాటి భూముల్లో ఫర్టిలైజరు ఇంజెక్టరు పరికరాన్ని వాడుకోవాలి.
2. ప్రతిరోజు ఫర్టిగేషన్ ద్వారా పోషకాలను అందించటం అత్యంత శ్రేయస్కరం. వీలుకాకపోతే, వారానికి రెండుసార్లయినా ఫర్టిగేషన్ చేయాలి.
3. పంట యొక్క పోషకాల అవసరాల దృష్ట్యా సరైన ఎరువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎంపిక చేసుకొనే ఎరువు, పోషకాలను అందించటమే కాకుండా అవసరమైతే నీటి ఉదజని సూచికను కూడా సవరించేదిగా ఉండాలి.
4. ఎంపిక చేసే రసాయనిక ఎరువు సాగునీటి నాణ్యతకు అనువుగా ఉండాలి. (లేకుంటే అవశేషాలు ఏర్పడి డ్రిప్పర్లు మూసుకుపోతాయి).
5. సాగునీటిలో ఎక్కువ మోతాదు కాల్షియం, మెగ్నీషియం, సల్ఫేట్, ఇనుము లేదా మాంగనీసు గనక ఉంటే అవి ఎరువులతో చర్య జరిపి ఎరువుల సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయని రైతులు గుర్తించుకోవాలి.
6. సాధారణంగా దొరికే యూరియా, తెల్లరకం మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మరియు నీటిలో కరిగే కాంప్లెక్స్ ఎరువులతో కలపడం వల్ల పంటయొక్క నత్రజని, భాస్వరము మరియు పొటాష్‌ల అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చును.
7. ఒకే ట్యాంకులో కలిపిన వివిధ రసాయనిక ఎరువులు ఒక దానితో మరొకటి తేలికగా కలిసి పోయే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. ద్రవరూపంలో ఉండే ఎరువులు కూడా మార్కెట్‌లో దొరుకుతాయి. కాని ఇవి ఖరీదైనవి కాబట్టి అధిక విలువ గల ఉద్యాన పంటల్లో ఉపయోగిస్తారు.
8. పంటకు సిఫార్సు చేసిన మొత్తం పోషకాలను పూర్తి పంట కాలంలో అందించే విధంగా రోజువారి మోతాదును లెక్కగట్టుకోవాలి.

9. ద్రవ లేదా పొడి రూపంలో ఉండే రసాయనిక ఎరువులను ట్యాంకులో కలిపేటప్పుడు ట్యాంకు పరిమాణములో 70 శాతం మించకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
10. ఫర్టిగేషన్ వ్యవధి, సాగు నీరు అందించే వ్యవధిలో అంతర్భాగమై ఉండాలి. ఫర్టిగేషన్ వ్యవధి ఎప్పుడు సాగు నీరు అందించే వ్యవధి కన్నా తక్కువగా ఉండాలి.
11. ఫర్టిగేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభించే ముందు కొద్దిసేపు డ్రిప్ వ్యవస్థను నడిపించాలి. దీని వల్ల పొలం అంతటా సమానమైన ఒత్తిడితో నీరు విడుదల అవుతుంది.
12. డ్రిప్ సిస్టంను కొద్దిసేపు నడిపి, నీటి ఒత్తిడి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫర్టిగేషన్‌ను ప్రారంభించాలి. దీని వల్ల సిస్టంలో దూరంగా ఉన్న డ్రిప్పర్లు కూడా సమాన పీడనంతో నీటిని, పోషకాలను మొక్కలకు అందివ్వగలుగుతాయి.
13. ఫర్టిగేషన్ తరువాత నిర్ణీత వ్యవధిలో డ్రిప్ వ్యవస్థను కొద్దిసేపు నడిపించాలి. దీని వల్ల పైపులలో మరియు డ్రిప్పర్లలో మిగిలిపోయిన పోషకాల అవశేషాలు కడిగి వేయబడుతాయి. నిర్ణీత వ్యవధి కన్నా మరీ ఎక్కువ సేపు గనుక నీటిని పంపితే మొక్కల వేర్ల దగ్గరలో ఉన్న పోషకాలు భూమిలోపలి పొరల్లోకి ఇంకిపోతాయి.

చెఱకు పంటకు డ్రిప్ ద్వారా పోషకాల యాజమాన్యంపై అనకాపల్లిలో జరిపిన పరిశోధనలో, సిఫారసు చేసిన నత్రజని మరియు పొటాష్ ఎరువులను యూరియా, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (తెల్లని) రూపంలో నాటిన 30 రోజుల నుండి 180 రోజుల వరకు వారం వ్యవధిలో 20 దఫాలుగా అందించినపుడు భూమిలో వేసే పద్ధతి కంటే సుమారు 20.1 శాతం అధిక దిగుబడి పొందవచ్చని నిర్ధారించడం జరిగింది. భాస్వరం ఎరువును నాటేటప్పుడు చాళ్ళలో వేయడం మంచిది.

పట్టిక 1 : వివిధ ఎరువుల యొక్క నీటిలో కరిగే స్వభావము

ఎరువులు	నీటిలో కరిగే స్వభావము (గ్రాములు ఒక లీటరు నీటిలో 20^0 C వద్ద)
ఎ. నత్రజని ఎరువులు	
1. అమ్మోనియం నైట్రేట్	1920
2. యూరియా	1100
3. కాల్షియం నైట్రేట్	1290
బి. భాస్వరం ఎరువులు	
1. మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్	400
2. యూరియా ఫాస్ఫేట్	495
3. ఫాస్ఫోరిక్ ఆమ్లము	457
సి. పొటాష్ ఎరువులు	
1. పొటాషియం నైట్రేట్	310
2. పొటాషియం క్లోరైడ్	340
3. మల్ట్ – కె.	320
4. ఎన్.పి.కె. మిశ్రమం	330

పట్టిక 2 : ఫర్టిగేషన్ కొరకు ఏ ఏ ఎరువులు కలపవచ్చు, కలపకూడదో ఈ క్రింది పట్టికలో సూచించబడింది.

ఎరువులు	1	2	3	4	5	6	7
1		సి	సి	సి	సి	సి	సి
2	సి		సి	సి	సి	సి	సి
3	సి	సి		ఎల్‌సి	సి	సి	ఎల్‌సి
4	సి	సి	ఎల్‌సి		ఎల్‌సి	ఎల్‌సి	సి
5	సి	సి	సి	ఎల్‌సి		సి	సి
6	సి	సి	సి	ఎల్‌సి	సి		సి
7	సి	సి	ఎల్‌సి	సి	సి	సి	

సి – కలిపి పిచికారీ చేయవచ్చు ఎస్.సి. – కలిపి పిచికారీ చేయరాదు

ఎల్‌సి – కొంత వరకు కలపవచ్చు

ఫర్టిగేషన్ ఎరువుల వివరాలు

1. యూరియా
2. అమ్మోనియం నైట్రేట్
3. అమ్మోనియం సల్ఫేట్
4. కాల్షియం నైట్రేట్
5. మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్
6. మోనో పొటాషియం ఫాస్ఫేట్
7. పొటాషియం నైట్రేట్

ఉదాహరణ: తేలికపాటి ఎర్రనేలల్లో వేరుశనగ సాగు చేయునప్పుడు డ్రిప్పు ద్వారా నీటిని విత్తిన 20 రోజుల తర్వాత ప్రతి మూడవ రోజు 10 మి.మీ. నీటిని 65 రోజుల వరకు, అటు తర్వాత పక్వదశ వరకు 15 మి.మీ. నీటిని ఇవ్వాలి.

నీటి ద్వారా ఎరువుల వాడకము ఈ క్రింద తెలిపిన విధంగా వేరుశెనగ పంటకు వాడటం వల్ల అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు. నీరు అరగంట వదిలిన తర్వాత వెంచురీ సిస్టంను అమర్చి బకెట్టులో లేక ఫెర్టిలైజరు టాంకులో నీటిలో కరిగే ఎరువుల మోతాదును ఎకరాకు క్రింద తెలిపిన విధంగా కలిపి డ్రిప్పు ద్వారా పంపవచ్చును. ఎరువులు ఇచ్చిన తర్వాత నీటిని కనీసము అరగంట వరకు పంపించాలి.

డ్రిప్ ద్వారా వేరుశనగలో 6రోజుల వ్యవధిలో	20 రోజుల తర్వాత 2 దఫాలు (ఎకరాకు)	45 రోజుల తర్వాత 3 దఫాలు (ఎకరాకు)	65 రోజుల తర్వాత 3 దఫాలు (ఎకరాకు)
	3.5 కిలోల కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేటు	1.5 కిలోల మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేటు	2.5కిలోల సల్ఫేటు ఆఫ్ పొటాష్

వేరుశెనగలో జరిపిన పరిశోధనలలో, పంట విత్తిన 25 రోజుల తర్వాత 5 రోజుల వ్యవధితో సమాన మోతాదులో ఎకరాకు 500 గ్రాముల యూరియా, 1.5 కిలోల మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేటు, 2.5 కిలోల సల్ఫేటు ఆఫ్ పొటాష్‌ను 12 దఫాలుగా ఇవ్వటం వల్ల, సిఫారసు చేసిన ఎరువులను దుక్కిలో వేసే పద్ధతి కంటే అధిక దిగుబడి పొందవచ్చును. నీటిని ఇచ్చిన తర్వాత ఎరువులను ఇవ్వాల్సి వుంటుంది.

ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో ఎరువుల వాడకం సంబంధించి ఇతర వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల,

బాపట్ల - 522 101. ఫోన్ నెం. : 98485 72321

భూసారం, సాగునీరు మరియు పంట మొక్కల పరీక్షల విధానం - ఆవశ్యకత

I. భూసార (మట్టి లేదా మృత్తిక) పరీక్ష

నేలలు వాటిలోని సహజంగా ఉన్న పోషక పదార్థాలతో పాటు, అదనంగా వేసిన సేంద్రీయ మరియు రసాయనికి ఎరువుల్లోని పోషకాలను మొక్కలకు అందజేసి పంట దిగుబడికి దోహదపడుతాయి. కాబట్టి నేలల్లో ఉన్న భూసారాన్ని తరచూ తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. తద్వారా ఎరువుల వాడకంలో అనవసరపు ఖర్చులు చేయకుండా, భూసారాన్ని కాపాడుకుంటూ, అధిక మరియు సుస్థిర దిగుబడులను పొందవచ్చు. దీనికి సంబంధించి రైతులు తమ పొలంలోని మట్టిని వర్షాధార భూములలో 3 సం॥లకు ఒకసారి మరియు నీటి వసతి క్రింద 3 పంటలకొకసారి పరీక్ష చేయించుకుంటే మంచిది. పోషక పదార్థాల గురించే కాక, భూమిలోని చౌడు గుణాలను, సున్నం శాతాన్ని, నేల కాలుష్యాన్ని గుర్తించేందుకు కూడా మృత్తిక (మట్టి) పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

భూసార పరీక్షలో అన్నిటికన్నా ముందు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మట్టి నమూనాను సేకరించడం. భూసార పరీక్ష కొరకు తీయవలసిన మట్టి నమూనా సరియైనది కానిచో, దాని భౌతిక, రసాయనిక మరియు జీవ లక్షణాలు మన పొలం లక్షణాలను ప్రతిబింబించేదిగా ఉండదు. దీని వలన చేయించిన భూసార పరీక్ష, దానికి అనుగుణంగా చేసిన ఎరువుల సిఫార్సులు వ్యర్థమవుతాయి. అంతేకాక, ఒక్కొక్కసారి తప్పుడు సిఫార్సులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి, మట్టి నమూనా సేకరణలో ఈ క్రింది జాగ్రత్తలను తప్పక పాటించాలి.

- పొలంలో 'V' ఆకారంలో గడ్డిజాతి పంటలైన వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న, సజ్జ, చెఱకు మొదలగు పంటలకు 15 సెం.మీ. వరకు మరియు లోతైన వేరు వ్యవస్థ గల వేరుశనగ, ప్రత్తి, అపరాలు, కూరగాయలు మొదలగు పంటలలో 30 సెం.మీ. వరకు పారతో గుంట తీసి, అందులో పైపొర నుంచి క్రింది వరకు ఒక ప్రక్కగా మట్టిని సేకరించాలి.
- ఈ విధంగా ఎకరా విస్తీర్ణంలో 8-10 చోట్ల సేకరించిన మట్టిని ఒక దగ్గర చేర్చి, బాగా కలిపి 4 భాగాలుగా చేయాలి. అందులో ఎదుటి భాగాలు తీసుకుని, మిగతా భాగాలు తీసివేయాలి. ఈ విధంగా మట్టి 1/2 కిలో వచ్చే వరకు చేయాలి.
- ఇలా సేకరించిన మట్టిలో రాళ్లు, పంట వేర్లు, మొదళ్ళు లేనట్లుగ చూసుకొని, నీడలో ఆరనివ్వాలి.
- మట్టి నమూనా కొరకు పొలంలో మట్టిని త్రవ్వి, సేకరించినపుడు
  - గట్ల దగ్గరలోను మరియు పంట కాల్వలలోను మట్టిని తీసుకోరాదు.
  - చెట్ల క్రిందనున్న పొలం భాగం నుంచి మట్టిని సేకరించరాదు.
  - ఎరువు (పశువుల పేడ, కంపోస్టు, వర్మికంపోస్టు, పచ్చిరొట్ట మొదలగునవి) కుప్పలు వేసి ఉంచిన చోట మట్టిని సేకరించరాదు.
  - ఎప్పుడూ నీరు నిలబడే పల్లపు స్థలంలో మట్టిని సేకరించరాదు.
- పొలంలో వాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, దానిని ఎత్తు, పల్లపు ప్రాంతాలుగా విభజించి వేరు వేరుగా మట్టి నమూనాలను సేకరించాలి. అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా, పైన తెలిపిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
- పొలంలో అక్కడక్కడ చౌడు ప్రాంతంగా ఉన్నట్లు అనుమానం కలిగితే అక్కడి నుండి ప్రత్యేకంగా నమూనాను

తీసి వేరుగా చౌడు లక్షణాల పరీక్ష కొరకు పంపాలి. అంతేగాని, అటువంటి మట్టిని బాగుగా ఉన్న ఇతర ప్రాంతపు మట్టితో కలుపరాదు.

- పండ్ల తోటలకు అనువైన నేలలను గుర్తించునపుడు గాని, పండ్ల చెట్లకు ఏవైన పోషక పదార్థాలు మరియు ఇతర సమస్యల గుర్తింపు కొరకు మట్టి నమూనాను ఈ క్రింది విధంగా తీసుకోవాలి.
  - సాధారణంగా పంటను బట్టి 3 నుండి 5 అడుగుల (1–2 మీ) లోతు గుంట త్రవ్వి, విడిగా ప్రతి అడుగుకు కొంత మట్టిని (నమూనా) సేకరించి, భూసార పరీక్షకు పంపాలి.
  - మట్టి నమూనా కొరకు గుంట త్రవ్వుతున్నప్పుడు ఏవైనా గట్టి పొరలు ఉన్నట్లయితే వాటి లోతు మరియు వాటి లక్షణాల గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
  - పండ్ల తోటల విషయంలో ఇలాంటి నమూనా సేకరణ ఎకరాకు 2–4 చోట్ల నుంచి చేస్తే చాలా మంచిది.

  ఇటువంటి నమూనాలను పరీక్ష కొరకు పంపునపుడు "పండ్ల తోటలకు అనువైన పరీక్షల కొరకు" అని తెలియజేయాలి.
- పొలంలోని పలు ప్రాంతాల (8–10 చోట్ల) నుండి సేకరించిన మట్టిని లేదా పండ్ల తోట కొరకు తీసిన మట్టిని గాని, కలిపేందుకు యూరియా లేక ఇతర ఎరువుల సంచులను వాడరాదు. ఇందుకొరకు శుభ్రమైన ప్లాస్టిక్ షీటును ఉపయోగించుట మంచిది.
- ఈ విధంగా సేకరించిన మట్టిని బాగా నీడలో గాలికి ఆరిన తరువాత మంచి ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో గాని, గుడ్డసంచిలో గాని నింపి, తమకు సమీపంలోని వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించిన భూసార పరీక్షా కేంద్రానికి ఈ క్రింది సమాచారంతో పంపాలి.
  1. రైతు పేరు, సర్వే నెంబరు, గ్రామం, మండలం
  2. కావలసిన పరీక్ష (భూసార/చౌడు/పండ్లతోట ఎంపికకు)
  3. ఇంతకు మునుపు పంట, దానికి వాడిన ఎరువులు
  4. వేయబోవు పంట
  5. నేలలో గమనించిన ఏవేని సమస్యలు
- సాధారణంగా రైతులు కాగితంలో పైన తెలిపిన విషయాలు వ్రాసి మట్టి నమూనాతో పాటు సంచిలో వేసి భూసార పరీక్ష కేంద్రానికి పంపుతుంటారు. దీనితో పాటు, మరొక కాగితంపై ఇదే విషయాలు వ్రాసి పైన జత చేసి పంపితే బాగుంటుంది. వివరాలను వ్రాయటానికి పెన్సిల్‌ను ఉపయోగిస్తే మేలు.

భాస్వరం ఎరువుల వాడకంపై నియంత్రణ

మన రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాలలో నేలల్లో లభ్య భాస్వరపు పరిస్థితి గమనించినట్లయితే దాని లభ్యత మధ్యస్థం నుంచి ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వివిధ పరిశోధనా స్థానాలలో, నేలలోని భాస్వరపు లభ్యతననుసరించి ఎరువుల వాడకంపై జరిపిన పరిశోధనలలో భాస్వరం లభ్యత అధికంగా ఉన్నప్పుడు, దానిని తగ్గించి వాడినా కూడా దిగుబడులు తగ్గకుండా అదే ఫలసాయాన్ని పొందవచ్చునని ఫలితాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

మన రాష్ట్రంలో, ఖరీఫ్‌లో ముఖ్యమైన పంటలైన వరి, మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, వేరుశనగలో నేలల్లో భాస్వరము అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎరువుల వాడకాన్ని 25 నుండి 50 భాతం వరకు తగ్గించవచ్చని ప్రత్యేక ట్రేసర్ ప్రయోగాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. వరి పంటలో నేల భాస్వరపు పరిస్థితిని బట్టి, హెక్టారుకు 100

నుండి 300 కిలోల సూపర్‌ను (2–6 బస్తాలు), లేక 35 నుండి 112 కిలోల డిఎపిని (¾బస్తా నుండి2¼ బస్తాలు) తగ్గించి వాడినా కూడా దిగుబడి ఏమాత్రం తగ్గకుండా రావడం జరుగుతుంది. అలాగే భూసార పరీక్షలననుసరించి మొక్కజొన్నలో కూడా 25 నుండి 50 శాతం వరకు, ప్రొద్దుతిరుగుడులో 50 నుండి 100 శాతం వరకు తగ్గించి దిగుబడులు పొందవచ్చును. కాబట్టి రాష్ట్ర రైతాంగం వారి పొలాల్లోని లభ్య భాస్వరపు స్థాయిని బట్టి, భాస్వరపు ఎరువుల వాడకంలో నియంత్రణ పాటించి ఎరువులపై ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చును.

II. సాగునీటి పరీక్ష :

పూర్వం సాగునీటి యొక్క నాణ్యతపై ఎక్కువ అనుమానాలు లేక రైతులు నిర్భయంగా వాడుతుండేవారు. కానీ పెరుగుతున్న నీటి కొరత వలన భూమిలోని పొరల నుండి నీటిని తోడుట వలన (బోర్లు) ఎక్కువ లవణాలు నేల ఉపరితలంపై చేరి పంట ఎదుగుదలకు హాని కారకమవుతున్నాయి. దీని వలన పంటలు సరిగా ఎదగక పోవటమే కాకుండ, నేలలు కూడా బాగుచేసేందుకు వీలుపడని రీతిలో చెడిపోయేందుకు ఆస్కారమున్నది. ఇటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడకుండా, క్రొత్తగా త్రవ్విన బోరు బావుల నీరు, నర్సరీల కొరకు వేరే ప్రాంతం నుండి తెప్పించి వాడే నీటిని మొదట పరీక్ష చేసి ఆ తరువాత వాడుకోవడం మంచిది.

- సాగునీటి పరీక్ష కొరకు పొలంలోని బోరు బావి నీటిని పంపులో సుమారు 20–30 నిమిషాలు బయటకు వదలిపెట్టిన తరువాత మంచి ప్లాస్టిక్ సీసాలో సుమారు 500 మి.లీ. (అరలీటరు) తీసి సమీప భూసార పరీక్షా కేంద్రానికి పంపాలి. వీలయినంత వరకు గాజు సీసా బదులు ప్లాస్టిక్ సీసాను వాడుటయే శ్రేయస్కరం. మందు సీసాలను వాడరాదు. నీటి నమూనాను తీసే సీసాను అదే నీటితో 3–4 సార్లు కడిగి ఆ తరువాత నీటి నమూనాతో నింపుకోవాలి. సీసా మూతతో గాలి లేకుండా నీటితో పూర్తిగా నింపాలి.
- కాలువలు లేదా చెరువుల నుండి నమూనా నీటిని తీసేటప్పుడు ఒక పెద్ద కర్రకు చిన్న బకెట్‌ను కట్టి ఒడ్డుకు దూరంగా నీటిని తీయాలి. ఆ నీటితో సీసాను 2–3 సార్లు కడిగి, ఆ తరువాత నమూనాతో నింపాలి.
- ఒక్కొక్కసారి పరిశ్రమల నుండి వదిలి పెట్టబడిన నీటిని కూడా పరీక్ష చేయవలసి వస్తుంది. అటువంటి సందర్భాలలో ఆ నీరు పొలంలో మొదట ప్రవేశించే స్థలం వద్ద నీటి నమూనాను తీయాలి. అలాగే వీలయితే అదే నీరు పరిశ్రమ ఆవరణం నుండి బయటకు వచ్చిన ప్రాంతం నుండి కూడా నమూనాను తీసి పరీక్ష కోసము పంపితే, రెండింటి నీటి నాణ్యత పోలిక లేక వ్యత్యాసాన్ని గమనించవచ్చు.
- సాగునీటి నాణ్యత పరీక్ష కొరకు నమూనాను సేకరించిన వెంటనే 6 గం॥ల లోపు దగ్గరలోని సమీప భూసార పరీక్ష కేంద్రానికి పంపాలి. నమూనాతో పాటు రైతు పేరు, సర్వే నెంబరు, బోరు లేక కాలువ వివరాలు, గ్రామం, మండలం తదితర విషయాలు తెలియజేయాలి.

III. పంట మొక్కలు / పండ్ల చెట్ల ఆకుల నమూనా పరీక్ష :

కొన్ని పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా పండ్ల తోటల్లో చెట్లు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత భూమి అడుగు పొరలలోని ప్రతికూల పరిస్థితుల వలనగాని, భూమి నిస్సారమవటం వలన గాని పోషక పదార్థముల లోప లక్షణాలు చూపిస్తాయి. ఇటువంటి సందర్భాల్లో నేల ఉపరితల పొరల మట్టికన్నా, చెట్ల యొక్క భాగాలను, ముఖ్యంగా ఆకులను పరీక్షచేసి పోషక పదార్థాల లోపాలను సవరించుకోవచ్చు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో సాధారణ వార్షిక పంటలో కూడా పంట నాటిన తర్వాత పోషక పదార్థాలు, ముఖ్యంగా సూక్ష్మపోషక పదార్థాల లోపాలు

కనిపిస్తాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పంట యొక్క భాగాలను పరీక్ష చేయించి తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకొని పంట దిగుబడి మరియు నాణ్యత తగ్గకుండా చేసుకోవచ్చు.

- పంట యొక్క ఆకులు మరియు చెట్ల ఆకులలో ఏవైన లోపాలున్నట్లు సందేహం కలిగినపుడు ముఖ్యంగా అవి పెరగకుండా, చిన్నవిగ, పసుపు రంగుగా లేక ఎర్రగా మారుతున్నట్లయితే వెంటనే పరీక్ష చేయించాలి. అయితే ఈ చిహ్నాలు కీటకాలు లేదా రోగం వలన వచ్చినవి కావని నిర్ధారణ చేసుకున్న తరువాతనే మొక్క/చెట్టు ఆకులను పోషక పదార్థ లోపాల కొరకు పరీక్ష చేయించాలి. ఇటువంటి పరీక్ష కొరకు, ఏ పంటలో ఏ భాగాన్ని పరీక్షకు పంపాలో పట్టికలో యివ్వబడింది. నిర్దిష్టమైన సంఖ్యలేనప్పటికి, పరిస్థితులకనుగుణంగా ఒక ఎకరాలో సందేహాస్పదముగ ఉన్న 8–10 చోట్ల ఆకులను సేకరించి నమూనాగా పంపాలి.
- నమూనా కొరకు తీయవలసిన పంట ఆకులను శుభ్రమైన చేతులతో త్రుంచి / తీసి మంచి నీటితో బాగా కడిగి, ఆరబెట్టి, మంచి కాగితపు సంచుల్లో వేసి కావలసిన సమాచారాన్ని (రైతు పేరు, పంటపేరు, గ్రామం, మండలం తదితర వివరాలు) పొందుపరచి ప్రయోగశాలకు పంపాలి.
- ఈ పరీక్షలను 4–5 రోజుల్లో పూర్తి చేయించుకునే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ప్రస్తుతం ఈ పరీక్షలను ద్రాక్ష, అరటి మరియు ఎగుమతికి అనువైన పండ్ల తోటల్లో పాటిస్తున్నారు. ఈ పరీక్ష కొరకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కలిగిన ప్రయోగశాలలు కావలసి ఉన్నందున ఇప్పుడిప్పుడే యివి ప్రాచుర్యంలోకి వస్తున్నవి.

పంట పేరు	**పరీక్ష కొరకు సేకరించాల్సిన భాగం**
మామిడి	పూర్తిగా తయారైన క్రొత్త ఆకు
చీని, నిమ్మ	పూర్తిగా తయారైన క్రొత్త ఆకు (కొమ్మ చివరన)
అరటి	పై నుండి 3వ ఆకు (ఈనె తీసివేసి)
ద్రాక్ష	5వ ఆకు తొడిమ
వరి	పై నుండి 3వ ఆకు
చెఱకు	పై నుండి 3 నుండి 5వ ఆకు
ప్రత్తి	పై నుండి 3వ ఆకు

IV పరీక్ష ఫలితాల విశ్లేషణ :

భూసార, సాగునీటి, పంట ఆకుల పరీక్షా ఫలితాలను విశ్లేషించేందుకు పరీక్షలు జరిపిన చోట ఉన్న అధికారుల సహాయం తీసుకోవాలి. ఫలితాలు పోస్టు ద్వారా వస్తే, సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయశాఖ అధికారులను గాని, వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల్లోని సంబంధింత శాస్త్రవేత్తలను గాని సంప్రదించాలి. తదనుగుణంగా చర్యలు తక్షణం తీసుకోవాలి.

- **భూసార పరీక్షా కేంద్రం నుంచి లభించే సలహాలు :**

1. భూసారాన్ని నిర్ధారించి, వేయవలసిన పంటలు, వేయవలసిన ఎరువుల మోతాదును నిర్ణయించడం
2. సమస్యాత్మక భూములను గుర్తించి, బాగుచేసే విధానాలు, యాజమాన్య పద్ధతులు సూచించడం
3. సూక్ష్మపోషకాలను విశ్లేషణ చేసి సలహాలు ఇవ్వడం

"సమతుల ఎరువుల వాడకం భూసార పరీక్షల వల్ల మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది".

వివిధ జిల్లాలలోని భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు
వ్యవసాయ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము

క్ర. సంఖ్య	జిల్లా కేంద్రం		జిల్లా భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు/క్రొత్త భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు		సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు/ప్రాంతీయ భూసార పరీక్ష కేంద్రాలు		వ్యవసాయ మార్కెట్‌లోని భూసార పరీక్ష కేంద్రాలు	జిల్లాలోని మొత్తం భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు
1.	శ్రీకాకుళం	1	ఆముదాల వలస	1	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, శ్రీకాకుళం	1	పలాస	4
						2.	పాలకొండ	
2.	విజయనగరం	2	విజయనగరం			3.	పార్వతీపురం	3
		3	క్రొత్త భూసార పరీక్షా కేంద్రం, విజయనగరం					
3.	విశాఖపట్నం	4	అనకాపల్లి	2	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, విశాఖపట్నం	4	నర్సీపట్నం	3
4.	తూర్పు గోదావరి	5	సామర్లకోట	3	మండల భూసార పరీక్షా కేంద్రం, సామర్లకోట	5	రంప చోడవరం	7
						6	రాజమండ్రి	
						7	తుని	
						8	అంబాజీపేట	
						9	ద్రాక్షారామం	
5.	పశ్చిమ గోదావరి	6	తాడేపల్లి గూడెం	4	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, పశ్చిమ గోదావరి	10 11	జంగారెడ్డి గూడెం భీమవరం	4
6.	కృష్ణా	7	విజయవాడ			12 13 14 15	నూజివీడు మచిలీపట్నం గుడివాడ నందిగామ	5
7.	గుంటూరు	9	గుంటూరు	5	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, బాపట్ల	16	నరసరావుపేట	5
				1	ప్రాంతీయ భూసార పరీక్షా కేంద్రం, బాపట్ల	17	చిలకలూరిపేట	
8.	ప్రకాశం	10	ఒంగోలు	6	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, గిద్దలూరు	18 19	కందుకూరు మార్కాపూర్	4
9.	నెల్లూరు	11 12	నెల్లూరు క్రొత్త భూసార పరీక్షా కేంద్రం			20	కావలి	3
10.	చిత్తూరు	13	తిరుపతి	7	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, చిత్తూరు.	21	మదనపల్లె	6
						22	చిత్తూరు	
						23	కుప్పం	
						24	శ్రీకాళహస్తి	
11.	అనంతపురం	14	అనంతపురం	8	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, అనంతపురం	25	ధర్మవరం	4
						26	పెనుగొండ	
12.	కడప	15	కడప	9	సంచార భూసార పరీక్షా కేంద్రం, కడప	27	ప్రొద్దుటూరు	4
						28	రాయచోటి	
13.	కర్నూలు	16	ఎమ్మిగనూరు			29	కర్నూలు	4
		17	డోన్			30	నంద్యాల	
	మొత్తము	17		9		30		

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

భూసార పరీక్షా కేంద్రాలు

క్ర.సం.	జిల్లా	పరిశోధన కేంద్రం/వ్యవసాయ కళాశాల/కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం
1.	తిరుపతి	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి
2.	తిరుపతి	శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి
3.	తిరుపతి	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, పెరుమాళ్ళపల్లె
4.	వై.యస్.ఆర్.కడప	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఊటుకూరు
5.	నెల్లూరు	కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, నెల్లూరు
6.	నంద్యాల	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నంద్యాల
7.	అనంతపురం	వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనంతపురం
8.	అనంతపురం	కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, అనంతపురం
9.	గుంటూరు	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు
10.	బాపట్ల	ఉప్పు నీటి పరిశోధనా స్థానం, బాపట్ల
11.	బాపట్ల	వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల
12.	అనకాపల్లి	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి
13.	పశ్చిమ గోదావరి	ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు
14.	శ్రీకాకుళం	వ్యవసాయ కళాశాల, నైరా

భూసారం, సాగు నీరు మరియు పంట మొక్కల పరీక్షల విధానం ఆవశ్యకత గురించిన మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం)
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి.
ఫోన్ నెం. : 98484 65232

తీర ప్రాంత నేలల్లో నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు మరియు భూగర్భ నీటి వాడకంలో పాటించవలసిన మెళకువలు

ఆంధ్ర కోస్తా తీరములో 8.23 లక్షల హెక్టార్ల ఇసుక నేలలు ఉన్నాయి. అందులో 1.738 లక్షల హెక్టార్లలో నీటి మట్టము భూమి ఉపరితలము నుండి 0.3–3.0 మీ. లోతులో ఉంటుంది. ఈ నేలల్లో వేసవికాలంలో నీటిమట్టము భూ ఉపరితలం నుండి 1.8 – 3.0 మీ.ల లోతుకు దిగి మరల వర్షపునీరు ఇంకుట వలన నవంబర్ నెలాఖరుకు నీటిమట్టము 0.3 – 0.5 మీ.ల లోతుకు పెరుగుతుంది. వర్షము ద్వారా భూమిలోనికి ఇంకిన మంచి నీరు, లోతులో ఉన్న ఉప్పు నీటిపై కటకాలుగా ఏర్పడటం ఈ ఇసుక నేలల ప్రత్యేకత. అందువలన రైతులు ఇసుక నేలలలో దొరువులు త్రవ్వి, ఆ దొరువులోనికి ఊట ద్వారా వచ్చు మంచినీటిని కుండపోత పోసి, కాయగూరలు పండించడము, వరి, మిరప, వర్జీనియా పొగాకు, యూకలిప్టస్, సర్వినారు మళ్ళు మరియు చిన్న చిన్న పూలతోటలు పెంచడము చేస్తారు. ఒక్కొక్క దొరువు సుమారు 160–200 (4–5 సెంట్లు) చ.మీ. విస్తీర్ణము కలిగి సుమారు 800 చ.మీ. విస్తీర్ణములో పైర్లు పండించుటకు ఉపయోగపడును. ఒక హెక్టారు భూమిలో 10 దొరువుల త్రవ్వుట వలన ప్రతి హెక్టారునకు సుమారు 2000 చ.మీ. భూమి అనగా అయిదవ వంతు దొరువుల క్రింద వృధా అవుతుంది. ఈ విధముగా తీరప్రాంతములో సాగుచేయుటకు యోగ్యమైన సుమారు 34760 హెక్టార్ల భూమి దొరువుల క్రింద వృధా అవుతుంది. ఈ ఇసుక నేలల్లో సేద్య యోగ్యమైన మంచి నీటి పొర లోతు తక్కువగా ఉన్నందున గొట్టపుబావులు ద్వారా నాణ్యమైన నీరు లభ్యము కాదు.

బాపట్లలోని అఖిలభారత సమన్వయ ఉప్పునీటి పరిశోధనా కేంద్రములో పనిచేయుచున్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రజ్ఞులు ఈ సమస్యలు పరిష్కరించటానికి, ముందుగా నీటి మట్టములోను మరియు లవణ సాంద్రతలోను వచ్చు మార్పులను అధ్యయనము చేసి, కొత్త ప్రక్రియ కనిపెట్టారు. ఈ ప్రక్రియ సాంకేతిక పరంగా ఎక్కువ సాగునీటి లభ్యమయ్యేటట్లు చేయుటయే గాక సూక్ష్మసేద్య పద్ధతి ద్వారా నీటిని సమర్ధవంతముగా ఉపయోగించుటకు దోహదపడుతుంది. ఈ నూతన దొరువు పద్ధతిలో సుమారు 2 హెక్టార్ల భూమి మధ్యలో మొదట 4 లేక 6 అడుగుల (1.2–1.8 మీ.ల.) వ్యాసము కలిగిన సిమెంటు వరలను 4.8 మీ.ల. లోతు వరకు భూమిలోనికి దించాలి. ఈ బావి సాధారణముగా రైతులు తవ్వుకునే దొరువులాగానే పనిచేస్తుంది. 4 లేక 6 అంగుళాల వ్యాసము కలిగి మూడు లేక నాలుగు వరుసలలో చిన్న చిన్న రంధ్రములు కలిగిన మట్టి, సిమెంటు లేక పి.వి.సి. పైపులను వేసవిలో నీటి మట్టమునసరించి 2.5 లేక 3.0 మీ.ల. లోతున బావికి ఇరుపక్కలా 35 మీ.ల. చొప్పున మొత్తం 70 మీ.ల. పొడవున అమర్చాలి. మొదట బావికి పైపులు అమర్చుటకు నిర్ణయించిన లోతుల్లో బావి లోపలి నుండి రంధ్రము చేసి వెలుపలి నుండి పైపులను అమర్చాలి. పైపులు భూమిలో అమర్చునపుడు రంధ్రములు క్రింది వైపునకు ఉండునట్లు అమర్చి పైపుల చుట్టూ 10–15 సెం.మీ. ల మందములో బేబీ చిప్స్ (8–12 మి.మీ.) ను వేసి పై భాగమున పాలిథీన్ పేపర్‌లో కప్పి భూమిలో పూడ్చాలి. ఇదేవిధంగా రెండవ పక్క కూడా అమర్చాలి. నేలలోని నీరు పైపునకు అమర్చిన రంధ్రముల గుండా పైపు లోనికి చేరుతుంది.

పైపులను 0.2 శాతం వాటములో వుంచుట వలన పైపులైను లోని నీరు బావిలోనికి ప్రవహిస్తుంది. ఈ విధముగా అమర్చిన 70 మీ.ల. పైపులైను నుండి పైపులైను పై నున్న నీటి మట్టమును అనుసరించి సెకనుకు 3–8 లీటర్లు చొప్పున నీరు బావి లోనికి ప్రవహిస్తుంది. ఈ బావులు 20 సంవత్సరములు పంటలు

పండించుటకు ఉపయోగపడును. ఈ నీటితో 6 స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా అందించి రోజుకు ఒక హెక్టారుకు నీటితడి పెట్టవచ్చును. ఈ విధముగా తయారు చేసిన వరల బావి సుమారు 2 హెక్టార్ల విస్తీర్ణములో రబీ కాలములో వేసిన ఆరు తడి పైర్లకు సూక్ష్మసేద్య పద్ధతి లేదా 4 హెక్టార్ల విస్తీర్ణములో నాటిన పండ్లతోటలకు బిందు పద్ధతిలో నీటిని సరఫరా చేయగలుగుతుంది. 8–10 స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా 2 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఈ క్రింద చెప్పబడిన పంటలను మరియు నర్సరీని పెంచవచ్చును.

ఖరీఫ్ – వరి, పొగాకు, మిరప, క్యాజురీనా, మామిడి మరియు కొబ్బరి నర్సరీ, క్రుసాంద్రా మరియు చేమంతి.

రబీ – వేరుశనగ, పెసర, మినుము, మిరప, వంగ, బెండ మరియు కొలకాసియా

వేసంగి – వరి నర్సరీ.

మన రాష్ట్రంలో 70,000 హెక్టార్ల ఇసుక నేలల్లో ఈ బావులు నిర్మించుటకు అనుకూలం. సుమారు 375 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 35,000 బావులు నిర్మించి తద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 276 కోట్ల అధిక ఆదాయాన్ని రైతులు పొందుటకు అవకాశం ఉంది.

బావుల నిర్మాణంలో పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు :

1. బావి నిర్మాణం వేసవికాలంలో నీటిమట్టం బాగా క్రిందికి దిగినప్పుడు చేయాలి. అందువలన వేసవిలో కూడా కొంతమేరకు నీటిని పొందుటకు అవకాశం ఉంది.

2. రంధ్రములు ఉన్న మట్టి పైపులను కలిపి అమర్చునప్పుడు కొబ్బరి పీచు సరిగా అమర్చాలి మరియు పైపుల క్రింద గులక సరిగా కూర్చి రంధ్రముల గుండా పైపులోనికి ఇసుక రాకుండా చూడాలి లేనిచో ఇసుక ఎక్కువగా బావిలోకి వచ్చి బావి వెంటనే పూడి పోయే ప్రమాదం ఉంది. పీ.వీ.సీ. పైపులు అమర్చునప్పుడు పైపులకు నైలాన్ మెష్ గుడ్డ సంచి తొడగాలి.

3. దొరువు పద్ధతిలో బావులు నిర్మించునప్పుడు బావికి బావికి మధ్య దూరము నేల స్వభావము బట్టి 80 నుండి 120 మీ. ఉండేటట్లు చూడాలి. ఇందువలన గొట్టములోనికి ప్రవేశించు నీటి మీద ఇతర బావుల ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

4. బావుల నిర్మాణానికి ముందు విధిగా భూమిలోని నీటి వ్యవసాయ వినియోగ యోగ్యత పరీక్షలు జరిపించవలెను.

నూతన పద్ధతిలో బావి నిర్మాణమునకు అగు ఖర్చు :

ఈ పద్ధతిలో బావి నిర్మించుటకు సుమారు రూ. 50,000/– ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ఖర్చు ముఖ్యముగా బావి సైజు పైపులు అమర్చు లోతు మరియు దానికి అవసరమగు మట్టి పని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వేసవిలో నదిమట్టం 1.75 మీ. (5.75 అ.) లోతులో ఉండి పైపులు 2.10 మీ. (7 అ.) లోతులో అమర్చుటకు బావి సైజును బట్టి రూ. 50,000/– వరకు ఖర్చు అగును. గొట్టములు 3.0 (10.అ) లోతున అమర్చుటకు రూ. 60,000/– వరకు ఖర్చు అగును.

ఈ ఆధునిక దొరువు పద్ధతిలో 100 కు పైగా వ్యవసాయ బావులు మరియు మంచి నీటి సేకరణ బావులను ప్రకాశం, గుంటూరు మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో నిర్మించడం అయినది. మన రాష్ట్రంలో 70,000 హెక్టార్ల ఇసుక నేలల్లో ఈ బావులు నిర్మించవచ్చును.

ఈ పద్ధతి వలన లాభములు :

• పైనున్న మంచి నీటినే పైపుల ద్వారా నేకరించుట వలన నేల లోపల పొరలలో ఉన్న ఉప్పు నీరు పైకి వచ్చే అవకాశం లేదు. • నీటిమట్టము పైపులైను కన్నా క్రిందకు పడిపోయినప్పుడు నీటి సరఫరా ఆగిపోవును. కావున

భూగర్భ జలాలను అతిగా వినియోగించే అవకాశము లేదా ఉప్పునీరు పైకి వచ్చే ప్రమాదము లేదు. • దొరువుల నుండి నీరు ఆవిరి ద్వారా వృధా కావటాన్ని అరికట్ట వచ్చును. • దొరువుల క్రింద వృధాగా పోవు సేద్యమునకు యోగ్యమైన 34760 హెక్టర్ల భూమిని పూర్తిగా సేద్యమునకు ఉపయోగించవచ్చును. • ఆధునిక నీటి పరికరాలతో సూక్ష్మసేద్య మరియు బిందు పద్ధతిలో నీటిని సద్వినియోగం చేసికొని తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడులను సాధించవచ్చును. • గ్రామీణ ప్రాంతములో మంచి నీటి సరఫరా చేయుటకు ఈ బావులు అనుకూలము.

బావి నిర్మాణమునకు అవసరమగు పరికరములు :

• 5 అడుగుల వ్యాసం గల వరలు. • 5 అం॥ వ్యాసం గల మట్టిపైపులు / రంధ్రములు ఉన్న పీ.వీ.సీ పైపులు, నైలాను మెష్ తొడుగు • శుభ్రము చేసిన కొబ్బరిపీచు • 1/3, 1/2 అం. సైజు గులకరాళ్ళు (చిప్స్)
• అడుగు వెడల్పు ఉన్న ప్లాస్టిక్ పేపరు చుట్ట.

గొట్టపు బావులు :

అదే విధముగా రైతులు వివిధ రకములు గొట్టపు బావులను తీర ప్రాంతంలో ప్రస్తుతము వాడుచున్నారు.
• లోతుగా వేసే గొట్టపు బావులు • తక్కువ లోతులో వేసే గొట్టపు బావులు • తక్కువ లోతులో 2 లేక 3 గొట్టపు బావులు కలిసి వేసినవి.

లోతుగా వేసే గొట్టపు బావుల ద్వారా 2 డెసిసిమెన్స్ /మీ. కన్నా అధిక లవణ సాంద్రత కలిగిన నీరు తోడబడి, పంటలకు హాని కలిగే అవకాశాలు చాలా తీరప్రాంతపు గ్రామాల్లో ఉన్నది. అందువలన 14-18 అడుగుల లోతులో నిర్మించే గొట్టాపు బావుల ద్వారా 1 హెచ్.పి. మోటారు పంపుతో గంటకు 14,400 లీటర్ల నీటిని మించి తోడకుండా మూడు గంటలపాటు నీటిని తోడి పంటలకు ఆరు తడులను డ్రిప్ మరియు స్ప్రింక్లర్ల పద్ధతిలో అందించవచ్చు. ఈ విధముగా ఒక గొట్టపు బావి నుండి ఉదయం ఒకసారి, మరల సాయంత్రం ఒకసారి మూడు గంటలకు మించకుండా మొత్తము 86,400 లీటర్ల నీటిని తోడటం వలన నీటి లవణ సాంద్రతలో పెద్దగా మార్పు రాదు మరియు నేల స్వభావము పంటలకు హాని చేయు విధంగా మారదు. యస్.ఏ.యస్. 400 టెర్రా మీటర్ ద్వారా ఆచార్య ఎన్. జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, గుంటూరు మరియు జాతీయ భూ భౌతిక పరిశోధనా సంస్థ, హైదరాబాద్ వారు చేసిన పరిశోధనలలో ఈ విషయం నిరూపించబడినది.

4.5-6.0 మీ. లోతులో వేసే గొట్టపు బావులలో నీటి లవణ సాంద్రత 8.1-46.0 శాతము పెరిగే అవకాశము ఉన్నది. ఈ తక్కువ లోతులో వేసే గొట్టపు బావులు హెక్టారుకు 5 నుండి 6 వేయవలసి ఉన్నది మరియు 2 లేక 3 పోర్టబుల్ మోటారు పంపులు వాడి ఈ బావుల నుండి నీటిని సేకరించి వేరుశనగ, మిరప, వివిధ కూరగాయలు మరియు నారు మళ్లను లాభసాటిగా పెంచుకొనవచ్చును. ఈ పద్ధతిలో గొట్టపు బావులను నిర్మించుటకు హెక్టారుకు సుమారు రూ. 25000 - 30000 ఖర్చు అవుతుంది.

రెండు లేక మూడు గొట్టపు బావులను వేసి వాడు విధానములో గొట్టములలో గాలి చేరుట మరియు ఇతర సమస్యల వలన పెద్దగా వాడకం లోనికి రాలేదు మరియు అనుసరణీయం కాదు.

ఈ బావులను నిర్మించుటకు అవసరమగు సాంకేతిక సహాయమునకు మరియు ఇతర వివరములకు ఉప్పు నీటి పరిశోధనా కేంద్రం, వ్యవసాయ కళాశాల ఫారం లేదా వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల వారిని సంప్రదించవచ్చును.

మరింత సమాచారం కొరకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ, పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు., లాం, గుంటూరు జిల్లా - 522 034, సెల్. నెం. 94913 83962

సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు - సవరణ

ప్రతి మొక్క తన జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి 19 మూలకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఈ మూలకాలను ఆవశ్యక పోషకాలు అంటారు. అయితే కొన్ని పోషకాలను ఎక్కువ మోతాదులోను, కొన్ని పోషకాలను తక్కువ మోతాదులోను ఉపయోగించుకుంటుంది. మొక్క ఉపయోగించుకునే మోతాదును బట్టి స్థూల లేదా ప్రధాన పోషకాలని (అధిక మోతాదులో), ఉప లేదా ద్వితీయ పోషకాలు (స్థూల పోషకాలు కంటే తక్కువ) మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు (అతి తక్కువ మోతాదు) గా విభజించడం జరిగినది. కర్బనము, హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్‌లను నిర్మాణాత్మక పోషకాలుగాను, నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం ప్రధాన పోషకాలుగాను, కాల్షియం, మెగ్నీషియం మరియు గంధకమును ఉప పోషకాలుగాను, జింక్, ఇనుము, రాగి, మాంగనీసు, బోరాన్, మాలిబ్డినమ్, క్లోరిన్, సోడియం, వెనిడియం, సిలికాన్‌లను సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు, పేరుకు తగినట్లుగానే మొక్కకు ఇవి సూక్ష్మ పరిమాణంలో అవసరం అవుతాయి. అయితే మొక్క పెరుగుదలలోను, దిగుబడులు పెరగడంలోను వీటి పాత్ర అత్యంత కీలకం. ఇవి లోపించినప్పుడు దిగుబడులు తగ్గడంతో పాటు మరియు కీలక పరిమితికి మించి అవసరమైన స్థాయికన్నా అధికంగా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు హాని కలిగి దిగుబడులు తగ్గుతాయి. మొక్కకు కావలసిన పోషక పదార్థాలను సకాలంలో సక్రమంగా మరియు సమగ్రంగా అందించినపుడు మాత్రమే ఆశించిన దిగుబడులు సాధించగలం.

పంటల పెరుగుదలకు ప్రధాన పోషకాలతోపాటు సూక్ష్మ పోషకాల అవసరం చాలా ముఖ్యము. ప్రధాన పోషకాలు అందుబాటులో ఉన్నా, సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలుంటే దిగుబడులు తగ్గుతాయి. అందువలన సూక్ష్మ పోషక లోపాలు క్రితం సంవత్సరం పైరులో గమనించిన యెడల సాధ్యమైనంత వరకు నేలలోనే వాటికి సంబంధించిన ఎరువులు వేసుకొని లోపాలు పంటలపై రాకుండా నివారించుకోవాలి. వివిధ పంటలలో సూక్ష్మ పోషకాల ఆవశ్యకత, లోప చిహ్నాలు, నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం.

ముఖ్యంగా ఈ సూక్ష్మ పోషక లోపాలు అధిక సున్నం కలిగి క్షార గుణం కలిగిన నల్లరేగడి నేలలు, సేంద్రీయ పదార్థం తక్కువగా ఉన్న నేలల్లో, ఆమ్ల గుణం కలిగిన తేలిక పాటి నేలల్లోను, అధిక వర్షపాతం మరియు అతి తక్కువ లోతులో నీటి మట్టం ఉన్న నేలల్లోను, నాణ్యమైన సాగు నీరు అందించలేనపుడు, పంట బెట్టకు గురైనపుడు, చలి తీవ్రంగా ఉన్న పరిస్థితులలోను సూక్ష్మ పోషక లోపాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. బెట్టకు గురయ్యే నేలల్లో బోరాన్, ఇనుము మరియు మాంగనీసు లోపాలు సాధారణంగా అన్ని పంటలలో వస్తూ ఉంటాయి. చలి తీవ్రంగా ఉన్న పరిస్థితులలో జింక్, రాగి, ఇనుము లోపాలు బహిర్గతమవుతుంటాయి. అదే విధంగా నీరు నిలిచే లోతట్టు భూములు, మురుగు నీరు పోని భూములు మరియు ఎల్లవేళలా నీరు పెట్టే వరి పొలాల్లోను సాధారణంగా జింక్ లోపం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. సాగు నీటిలో కార్బోనేట్స్, బై కార్బోనేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, నేలలో సున్నం పాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నపుడు ఇనుప ధాతు లోపం కనిపిస్తుంది. అయితే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ పంటలపై కొన్ని పోషక పదార్థాల లోపాలు గమనించడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా లోప లక్షణాలు గమనించిన తర్వాత పంటలపై పోషకాలను పిచికారి చేస్తుంటాం. అయితే పిచికారి

ద్వారా కంటే భూమి ద్వారా మొక్క తీసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కాబట్టి భూసార పరీక్ష ఫలితాల ప్రకారం కావలసిన పోషకాలను సిఫారసు మేరకు ముందుగానే నేలకు అందించినట్లయితే లోపాలను నివారించుకోవచ్చును. మన రాష్ట్రంలో సూక్ష్మ పోషకాలలో జింకు లోపము వరి మరియు మొక్కజొన్న పండించే భూముల్లో సాధారణము. జింకు తరువాత ఇనుము మరియు బోరాన్ లోపాలు అక్కడక్కడా, రాగి మరియు మాంగనీస్ లోపాలు మన రాష్ట్రం నేలల్లో చాలా తక్కువ శాతం గమనించడమైనది.

పోషక లోపాలు బహిర్గతమయ్యే మొక్కల వివిధ భాగాలు : సాధారణంగా స్థూల పోషక లోప చిహ్నాలు మొక్కల క్రింది భాగాల్లో ముదురు ఆకుల్లో కనిపిస్తే, సూక్ష్మ పోషక లోప చిహ్నాలు మొక్కల పై భాగంలో లేత ఆకుల్లో కనిపిస్తాయి. ఇనుము, మాంగనీసు, రాగి మరియు గంధకం పోషక లోపాలు మొక్క పై భాగంలో కనిపించి తీవ్రం అయినపుడు మొక్క మొత్తం బహిర్గతమవుతాయి. జింక్, మాలిబ్డినమ్, మెగ్నీషియం లోప లక్షణాలు ముందుగా మొక్క మధ్య భాగంలో ఉన్న ఆకుల్లో కనిపిస్తాయి. బోరాన్ మరియు కాల్షియం లోప లక్షణాలు మొక్క చిగుర్లలో కనిపిస్తాయి.

సూక్ష్మ పోషకాల ఆవశ్యకత : జింకు అనే సూక్ష్మ పోషకం మొక్క పెరుగుదలకు తోడ్పడే రసాయనాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. అంతేగాక అనేక ఎంజైమ్‌లలో ఉత్తేజకారకంగా పనిచేసి ఎక్కువ పిలకలతో మొక్క ఏపుగా పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా పంటలలో దిగుబడులను ప్రభావితం చేసే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే ప్రక్రియలో ఇనుము కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. మాంగనీస్ ఆవశ్యకత కనుక చూసినట్లైతే పత్రహరితం పెంపొందించడంలోను, మొక్క ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే ప్రక్రియలో ఇతర పోషకాల స్వీకరణను క్రమబద్ధీకరించడంలోను, అనేక ఆక్సీకరణ, క్షయకరణ చర్యలలోను కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. మొక్కల వివిధ జీవక్రియలలో, పత్ర హరితం తయారీలో మరియు కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో రాగి మూలకం అత్యంత కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. పంట పక్వతలోను, ఫలదీకరణకు, మొక్కలలో వివిధ పిండి పదార్థాల సరఫరాలోను బోరాను ముఖ్యమైన కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. సాధారణంగా ఒక కిలో గ్రాము ఎండిన పంట మొక్క చొప్పలో కనీసం ఉండవలసిన సూక్ష్మపోషకాల గాఢత 100, 50, 100, 20, 20, 0.1, 0.1 మరియు 6 మి.గ్రా. ల క్లోరిన్, మాంగనీస్, ఇనుము, బోరాన్, జింక్, మాలిబ్డినమ్, నికెల్ మరియు రాగి.

సూక్ష్మ పోషకాలలో జింకు లోపము దాదాపు అన్ని జిల్లాల నేలల్లో గమనించబడింది. రాష్ట్రంలోని సాగు భూముల్లో సుమారు 40 శాతం ఈ లోపం ఉంది. అయితే గుంటూరు, నెల్లూరు, వై.ఎస్.ఆర్. కడప, చిత్తూరు మరియు ప్రకాశం జిల్లాల్లో జింకు లోపము విస్తారంగా గమనించబడినది. కర్నూల్, అనంతపురము మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో జింకు లోపం ఒక మోస్తరుగా విస్తరించి ఉంది. విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి మరియు ఖమ్మం జిల్లాల్లో జింకు లోపం తక్కువ స్థాయిలో ఉంది.

జింకు లోపము సాధారణంగా దాళ్వా వరిలో, మొక్కజొన్న, ప్రత్తి, వేరుశనగ మరియు అపరాలలో కనిపిస్తుంది. వరిలో జింకు లోపం మెరక తీసిన పొలాల్లో, చివకని లేక మాగని సేంద్రియ పదార్థం వేసిన నేలల్లో, చౌడు మరియు ఉప్పు నేలల్లో, భాస్వరం ఎరువు ఎక్కువ మోతాదులో వేసిన పొలాల్లో జింకు లోపం కనిపిస్తుంది. జింకు లోపం దాళ్వా వరిలో నాటిన 2 నుంచి 4 వారాలలో మొక్క పైనుండి 3 లేదా 4వ ఆకు

నడిమ ఈనె తెల్లగా పాలిపోతుంది. ఆ తరువాత ఆకు కొనభాగం ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఉండి ఆకు మధ్యభాగంలో ముదురు ఇటుకరంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి (తుప్పు మచ్చలు), కొన్నిసార్లు ఏవిధమైన లోప లక్షణాలు కనిపించకుండా నత్రజని, భాస్వరం ఎరువులు తగినంతగా వేసినప్పటికీ పైరు ఏపుగా పెరగదు.

మొక్కజొన్నలో జింకు లోపం వలన లేత ఆకుల్లో నడిమ ఈనెకు సమాంతరంగా తెలుపు లేదా పసుపు చారలు ఏర్పడి, మొక్క గిడసబారి ఉంటుంది. లోపం తీవ్రత ఎక్కువయినప్పుడు ఆకులు ఎరుపు రంగులో మారి ఆకుపై మచ్చలు ఏర్పడతాయి.

ప్రత్తి పండించే అన్ని రకాల భూములలో జింక్ లోపం కనిపిస్తుంది. పంట శాఖీయ దశలో జింకు లోపం వలన లేత ఆకులలో ఈనెల మధ్య భాగం పత్రహరితం కోల్పోవటం, తెల్లని చిన్నమచ్చలు ఏర్పడతాయి. కణపులు మధ్య పొడవు తగ్గి మొక్క పొదలాగ ఉండి కాండం సన్నగా ఉంటుంది. లోపం అధికమైనప్పుడు వేర్లు కుళ్ళిపోవడం, ఆకులు అంచులు చుట్లు తిరగడం మరియు కాడల మీద తుప్పు (రాగి రంగు) మచ్చలు ఏర్పడతాయి. మొగ్గలు, పూలు రాలిపోవడం జరుగుతుంది. వర్షాధారంగా పండించే వేరుశనగ పంటలో జింక్ లోపం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. లేత పసుపు పచ్చని చారలు ఆకుల ఈనెలు మరియు అంచుల వెంబడి ఏర్పడి, లోపం తీవ్రమైనప్పుడు ఈనెలు కూడ పసుపు పచ్చగా మారి, చివరకు కొమ్మలు ఎండిపోవడం, ముదురు ఆకులలో కూడా క్లోరోసిస్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

అపరాలలో జింకు లోపము వల్ల మొక్కలు గిడసబారిపోయి లేత ఆకుపచ్చ లేదా తెలుపు మచ్చలు వచ్చి, ఆకులు చిన్నవిగా మారి, కణుపులు దగ్గరగా ఉండి మొక్క గుబురుగా ఆలస్యంగా పెరుగుతుంది.

కంది పంటలో జింక్ లోపించినచో మొక్కలు ముదురు ఆకుపచ్చ చారలతో కనిపిస్తాయి. ఆకులలో ఈనెలు ఆకుపచ్చగా ఉండి ఈనెల మధ్య భాగం పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. మొక్కలు కురచగా ఉండి, కొమ్మలు మరియు ఆకుల పరిమాణం బాగా తగ్గి చిన్న ఆకులతో పువ్వు మాదిరి అనిపిస్తుంది. పూత రావటం ఆలస్యం అవుతుంది. పూత మరియు పిందె రాలటం జరుగుట, లోపం తీవ్రమైనప్పుడు ఈనెలు ఆకుపచ్చగా ఉండి మధ్యకు, పాలిపోయి లోపలికి ముడుచుకుంటాయి. ఆకు అంచుల నుండి ఎండినట్లుగా, లోప తీవ్రతను బట్టి గోధుమ రంగులో నిర్జీవమైన మచ్చలు ఏర్పడి ఆకు మొత్తం ఎండిపోయి రాలిపోవడం జరుగుతుంది.

చెఱకులో జింకు లోపం కార్శి తోటలలో సర్వ సాధారణం. జింకు లోపం వలన ఆకులలో నడిమెఈనె మరియు ఆకు అంచులు పచ్చగా వుండి మధ్యభాగం పత్రహరితాన్ని కోల్పోయి తరువాత కణజాల క్షయం జరుగుతుంది. దుబ్బు చేయదు మరియు కణుపుల మధ్య నిడివి తగ్గిపోతుంది. చెఱకు గెడలు సన్నగా, రసం లేకుండా వుంటాయి.

పంటలలో జింకు లోపం నివారణకు సాధారణ నేలల్లో మూడు పంటలకు ఒకసారి, క్రొత్త ఆయకట్టు క్రింద సాగుచేసే నేలల్లో, చౌడు మరియు ఉప్పు నేలల్లో రెండు పంటలకు ఒకసారి ఎకరాకి 20 కిలోల జింకు సల్ఫేట్ వేయాలి. పైరుమీద జింకు లోపం గమనిస్తే లీటరు నీటికి 2 గ్రాములు జింకు సల్ఫేట్ చొప్పున కలిపి ఆకులు మొత్తం తడిచేలా ఎకరాకు 200 లీటర్ల మందు ద్రావణం చొప్పున, 2–3 సార్లు 5 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి. వరి తరువాత వరి పండించే నేలల్లో ఎకరానికి 20 కిలోల జింకు సల్ఫేట్‌ను ప్రతి దాళ్వా పంటకు ముందు వేసి జింకు లోపాన్ని నివారించుకోవచ్చును.

మన రాష్ట్రంలో జింకు తరువాత ఇనుము లోపం ప్రధానమైనది. ఇనుము లోపం సున్నం అధికంగా ఉండి క్షార గుణం కలిగిన నేలల్లో మరియు సాగునీటిలో కార్బొనేట్లు, బైకార్బోనేట్లు అధికంగా ఉండే సందర్భాల్లో కనిపిస్తుంది. అధిక మోతాదులలో జింకు, భాస్వరం, పొటాషియం, మాంగనీసు ఉన్న నేలల్లో కూడా ఇనుము లోపం కనిపిస్తుంది.

ఇనుము లోపం వరిలో మెట్ట నారుమడుల్లో, నీటి ఎద్దడి ఉన్నప్పుడు ఆకుల ఈనెల మధ్యభాగం పత్ర హరితాన్ని కోల్పోయి, పసుపుగా మారుతుంది. లోపం తీవ్రము అయ్యేకొద్దీ ఆకు క్రమంగా పాలిపోయి తెల్లగా మారి ఎండిపోతాయి.

ప్రత్తి పంటలో ఇనుప ధాతు లోపం ఏర్పడినప్పుడు మొదట లేత ఆకులు తెల్లగా పాలిపోతాయి. ధాతు లోపం ఎక్కువైనపుడు ముదురు ఆకులలో కూడ ఈనెల మధ్య తెల్లగా పాలిపోతుంది. చివరగా పెద్ద ఈనెలు మాడిపోయి, లేత ఆకుల మీద మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఇనుము లోపము గ్రహించినప్పుడు లీటరు నీటికి 10 గ్రా. అన్నబేధిని 1 గ్రా. నిమ్మ ఉప్పుతో కలిపి మొక్క మొత్తం తడిచేవిధంగా వారం, పదిరోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

చెఱకు పంటలో ఇనుము లోపించినప్పుడు లేత ఆకులు పసుపు రంగుకు మారి పాలిపోయి క్రమంగా ఆకు అంతా తెల్లగా పెలుసుబారుతుంది. పిలకలు చనిపోతాయి. ఈనెలకు సమాంతరంగా ఆకులు పొడవునా చారలు ఏర్పడతాయి. లోపం తీవ్రమైనప్పుడు దుబ్బు మొత్తం తెల్లగా మారుతుంది. మొక్క తోటతో పోలిస్తే కార్శి పంటలో ఇనుము లోప లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పంటపై 20 గ్రా. అన్నభేది, నిమ్మ ఉప్పు 2 గ్రా. లేదా ఒక చెక్క నిమ్మ బద్ద రసం ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కంది పంటలో ఇనుము లోపం వలన మొదటగా లేత ఆకుల ఈనెల మధ్య భాగం తాత్కాలికంగా పాలిపోయి పసుపు రంగులోకి మారతాయి. లోపం కొనసాగినా లేద తీవ్రతరమైతే ఈనెల మధ్య భాగం ప్రకాశవంతమైన పసుపు రంగుకు మారుతుంది. ప్రముఖంగా ఎగువ ఆకులలో ఈనెల మధ్య భాగం పసుపుగా మారటం అనేది ఇనుప ధాతువు లోపం యొక్క ప్రధాన లక్షణం. లోపం బాగా ఎక్కువైనప్పుడు ఈనెలు కూడా పాలిపోయి ఆకులు మొత్తం లేత ఆకుపచ్చ లేదా పసుపుగా మారి చివరకు పూర్తిగా కాగితం తెలుపులోకి మారుతుంది. పంటలో లోపం రాకుండా ఒక హెక్టారుకు 10 కిలోల ఐరన్ చీలేట్‌ను వేసి నివారించుకోవచ్చును. ఉదజని సూచిక ఆధారంగా ఐరన్ చీలేటులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. పంటలో లోప లక్షణాలు కనిపించిన ఎడల అన్నభేది లీటరు నీటికి 5 గ్రా. చొప్పున, 0.5 గ్రా. నిమ్మ పప్పు మరియు 15 గ్రా. యూరియాతో కలిపి వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి. మెట్ట ప్రాంతాలలో భూమిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు మినుము, పెసర పైర్లలో ఇనుపధాతు లోపం కనిపిస్తుంది. లేత ఆకులలో ఈనెల మధ్య భాగం పసుపు వర్ణంలోకి మారి ఈనెలు మాత్రం ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి. ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి నల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయి. లోపం తీవ్రమైనప్పుడు ఆకులు మొత్తం తెల్లగా మారి ఎండిపోతాయి. నివారణకు లీటరు నీటిలో ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ / అన్నభేది 2 గ్రా., 0.5 గ్రా. నిమ్మ ఉప్పు మరియు 15 గ్రా. యూరియా కలిపి పైరుపై వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి. ఇతర పంటల్లో కూడా ఇదే విధమైన లక్షణాలు ప్రధానంగా లేత ఆకుల్లో కనిపించి మొక్క పెరుగుదల కుంటుపడుతుంది.

బోరాన్ లోపం ఉభయ గోదావరి మరియు కృష్ణా జిల్లాల్లోని కొబ్బరి పండించే నేలల్లో గమనించడం జరిగింది. వరిలో బోరాన్ లోపం వల్ల లేత ఆకులు వంకర్లు తిరిగి ఆకులు ఎండిపోతాయి. నేలల్లో బోరాన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆకులపై చివరన మచ్చలు వచ్చి ఎండిపోతాయి. నేలల్లో బోరాన్ లోపస్థాయి మరియు విషమ స్థాయిల మధ్య వ్యత్యాసం తక్కువ కావున బోరాన్ లోపం నిర్ధారించిన తరువాత మాత్రమే నేలలకు లేదా పంటకు బోరాన్ అందించాలి.

పంట మార్పిడి చేయకుండా అదే నేలల్లో ఏళ్ళ తరబడి ప్రత్తి పంటనే సాగు చేయటం వలన ప్రత్తి పండించే అన్ని రకాల నేలల్లో, బోరాన్ లోపం సర్వ సాధారణమైనది. బోరాన్ లోపం వలన ప్రత్తిలో లేత కొమ్మలు ఎండిపోవడం, కొమ్మలు దగ్గర దగ్గరగా ఏర్పడడం, కొమ్మలలో కణపుల మధ్య దూరం తగ్గడం జరుగుతుంది. ఆకులు దోనె ఆకారంలోకి మారతాయి. ఆకుల కాడలు సన్నగా మెలితిరిగి, ఆకారం కోల్పోయి, కాడల మీద నల్లటి వలయాలు ఏర్పడతాయి. పూత స్వరూపం మారుతుంది. ఆకర్షణ పత్రాలు చిన్నవై లోపలకు ముడుచుకొని ఉంటాయి. చిన్నకాయలు ఏర్పడతాయి. ప్రధాన కాండం మరియు లేత కాయలపై పగుళ్ళు ఏర్పడి రాలిపోవడం జరుగుతుంది. గూడ, పూలు రాలిపోయి, దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ప్రత్తి పోగు, పింజ నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. ప్రత్తి పండించే నేలల్లో బోరాన్ లోపం నివారణకు ఎకరాకు 4 కిలోల బోరాక్స్‌ను ఆఖరి దుక్కిలో వేసి భూమిలో కలియదున్నడం వలన ప్రత్తి పంటలో బోరాన్ లోపం నివారించవచ్చు. పైరుపై గమనించిన లోపంను సవరించుటకు 1 నుండి 1.5 గ్రా. బోరాక్స్‌ను ఒక లీటరు నీటిలో కలిపి (0.15%) ప్రత్తి మొక్క 60-65 రోజులలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి 85-90 రోజులప్పుడు మరొకసారి మొక్క పూర్తిగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

చెఱకు పంట ఏపుగా పెరగడం, గెడల సంఖ్య పెంచడంలో మరియు పంట పక్వతకు త్వరగా రావడానికి బోరాన్ అవసరం. బోరాన్ లోపం కారణంగా అకుల కాడల లోపల సన్నని గోధుమ రంగు చారలు ఏర్పడి పెరుగుతున్న చివరి కొనలు కుంచించుకుపోయి, మొక్కల చివరలు చనిపోతాయి. లోప నివారణకు సేంద్రీయ ఎరువులు వాడకం తప్పనిసరి, పంటపై లోప లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే 0.5 శాతం బోరాక్స్ లేదా బోరిక్ యాసిడ్ ద్రావణంతో (5 గ్రా. లీటరు నీటికి) పిచికారి చేయటం వలన లోపంను సవరించవచ్చును.

ప్రొద్దుతిరుగుడు మరియు వేరుశనగ పంటల్లో బోరాన్ లోపం సర్వసాధారణం. ప్రొద్దుతిరుగుడులో పూలల్లో మధ్యభాగం గింజ కట్టదు. అదేవిధంగా వేరుశనగలో పప్పు మధ్యభాగం బోలుగా ఉంటుంది. ఈ లోపాన్ని 0.1 శాతం బోరిక్ ఆమ్లాన్ని (1 గ్రా. 1 లీటరు నీటికి) పైరు వేసిన 30 నుండి 45 రోజుల తరువాత రెండుసార్లు పిచికారి చేసిన ఎడల సవరించుకోవచ్చును.

సాధారణంగా మాంగనీసు నేలల్లో ఉండవలసిన కనీస స్థాయి కన్నా అధికంగానే ఉంటుంది. ప్రతికూల పరిస్థితులలో నేల నుండి మొక్క గ్రహించలేనప్పుడు మాంగనీసు లోపం పైరుకు ఏర్పడుతుంది. మాంగనీసు లోపం వలన లేత ఆకుల ఈనెల మధ్య భాగములో పత్ర హరితము కోల్పోయి పసుపు రంగుకు మారుతాయి. ఈనెలను అంటుకుని ఉన్న పత్ర దళ భాగము మాత్రము ఆకు పచ్చగానే ఉంటుంది, పసుపు రంగులో ఉంటే ఇనుము లోపంగా గుర్తించాలి.

చెఱకు పంటలో మాంగనీసు లోపం గమనించినప్పుడు మధ్య ఆకులు మరియు కొత్తగా వచ్చే ఆకులలో ముదురు ఆకు పచ్చ చారలు ఈనెల మధ్య ఏర్పడతాయి. లేత రంగు కనబడిన ఆకులు క్రమేపి రంగు కోల్పోయి తెల్లగా మారతాయి. లోపం తీవ్రమైనప్పుడు తెల్లగా మారిన ఆకు భాగాల మధ్య మచ్చలు ఏర్పడి ఒక దానిలో ఒకటి కలిపి చారలుగా ఏర్పడుట వలన ఆకు నిలువుగా చీలినట్లు కనబడతాయి. ఈనెలు కూడా ఆకు పచ్చ రంగు కోల్పోయి లేత పసుపు రంగుకు మారతాయి. లోప నివారణకు ఎకరాకు 20–40 కిలోల మాంగనీసు సల్ఫేట్ నేలకు వేసి గాని లేదా 0.2–0.5 శాతం (2–5 గ్రా. లీటరు నీటికి) మాంగనీసు సల్ఫేట్ ద్రావణం వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు పంటపై పిచికారి చేయాలి.

మాలిబ్డినం లోపం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లోని ఆమ్ల నేలల్లో గమనించబడింది. ఈ లోపం వలన మొక్క ఎదగక, పసుపు రంగుకి మారి నత్రజని లోప లక్షణాలను పోలి ఉంటాయి. ఆకుల్లో ఈనెల మధ్య పసుపు మచ్చలు ఏర్పడతాయి. కంకులలో తాలు గింజలు ఏర్పడతాయి. ఈ లోపాన్ని నివారించడానికి ఎకరానికి 400 గ్రాముల సోడియం మాలిబ్డేట్‌ను మట్టితో కలిపి వేయాలి. పంటపై లోప లక్షణాలను నివారించుటకు 0.1 శాతం (1 గ్రా. లీటరు నీటికి) అమ్మోనియం మాలిబ్డేట్‌ను పిచికారి చేయాలి.

ఎంజైమ్ వ్యవస్థలో రాగి అత్యంత కీలకం. రాగి లోపం వలన ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చ, నీలి రంగు కలిసినట్లుగా మరియు ఆకుల కొనలు పసుపుగా పాలిపోయి తెల్లగా మారి ఎండిపోవును. కంకులలో గింజలు పూర్తిగా ఏర్పడక చిన్నవిగా ఉంటాయి. నిమ్మ జాతి మొక్కలలో లేత ఆకులు రాలిపోవడం, కాండము మరియు కాయల మీద ఇటుక రంగు మచ్చలు ఏర్పడును. కాయ లోపల మధ్య భాగంలో బంక ఏర్పడును. లోప నివారణకు ఎకరానికి 10 కిలోల మైలు తుత్తుము వేసి లోపాన్ని సరిచేయవచ్చును.

అందుబాటును బట్టి సాధ్యమయినంత వరకు సేంద్రియ ఎరువులను వాడినట్లయితే, సూక్ష్మ పోషకాల లోపాలు పంటలపై రాకుండా చూసుకోవచ్చు.

లోప చిహ్నాలు కనిపించిన తర్వాత పంటలపై పోషకాలను పిచికారీ చేయడం వలన ఆ పంట కాలానికే పని చేస్తాయి. అయితే ముందుగానే భూసార పరీక్ష ఫలితాలను గమనించి నేలకు సిఫారసు మేరకు వేసుకున్నట్లయితే ఒకటి, రెండు సంవత్సరాల వరకు లోపాలు రాకుండా ఉండటంతో పాటు మంచి దిగుబడులు పొందే అవకాశం కలదు. ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో కొంత మోతాదులో సేంద్రీయ ఎరువులను నేలకు అందించినట్లయితే సూక్ష్మ పోషకాల లోపాల బారి నుండి మొక్కలను కాపాడుకోవడంతో పాటు ఆశించిన దిగుబడులు పొందగలం.

పట్టిక : ప్రధాన సూక్ష్మపోషక ఎరువులు మరియు పోషక విలువలు

పోషకం	ఎరువులు	ఎరువుల సూత్రం	ఎరువులలో ఉన్న పోషకం (%)
ఇనుము	ఫెర్రస్ సల్ఫేట్	$FeSO_4.7H_2O$	21
	ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్	$Fe_2(SO_4)_3$	17
	ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్	$FeCl_3$	5–18
	ఐరన్ – ఇ.డి.టి.ఎ.	Fe-EDTA	12
మాంగనీస్	మాంగనీస్ సల్ఫేట్ ట్రైహైడ్రేట్	$MnSO_4.3H_2O$	26–28
	మాంగనీస్ సల్ఫేట్ – మోనోహైడ్రేట్	$MnSO_4.H_2O$	30–32
	మాంగనీస్ డయాక్సైడ్	MnO_2	55–65
	మాంగనీస్ – ఇ.డి.టి.ఎ.	Mn-EDTA	5–12
జింక్	జింక్ ఆక్సైడ్ – హెప్టాహైడ్రేట్	$ZnSO_4.7H_2O$	21
	జింక్ సల్ఫేట్ – మోనోహైడ్రేట్	$ZnSO_4.H_2O$	33
	జింక్ ఆక్సైడ్	ZnO	55–70
	జింక్ – ఇ.డి.టి.ఎ.	Zn-EDTA	12
రాగి	రాగి సల్ఫేట్ – పెంటాహైడ్రేట్	$CuSO_4.5H_2O$	24
	రాగి సల్ఫేట్ – మోనోహైడ్రేట్	$CuSO_4.H_2O$	35
	రాగి – ఇ.డి.టి.ఎ.	Cu-EDTA	9–13
బోరాన్	బోరాక్స్	$Na_2B_4O_7.10H_2O$	10.5
	బోరిక్ యాసిడ్	H_3BO_3	17.5
	సాల్యుబర్	$Na_2B_4O_7.5H_2O + Na_2B_4O_7.10H_2O$	19
మాలిబ్డినం	సోడియం మాలిబ్డేట్	$Na_2MoO_4.2H_2O$	37–39
	అమ్మోనియం మాలిబ్డేట్	$(NH_4)6Mo_7O_{24}.4H_2O$	54
క్లోరిన్	పొటాషియం క్లోరైడ్	KCl	48

మూలం : ఎఫ్.సి.ఓ. (1985), ఎఫ్.ఎ.ఐ. (1998) ప్రకారం

** సాధారణంగా క్లోరైడ్ యొక్క ఎరువులు కొబ్బరి పంటలలో తప్ప వేరే వాటికి వర్తించవు

ఇతర వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు
ఫోన్ : 08819 – 246283, సెల్ : 94404 15303

సమస్యాత్మక భూములు – వాటి యాజమాన్యం

సమస్యాత్మక భూములు, సాధారణ సాగు భూములకు భిన్నంగా ఉండి, పంటల స్థిర అధికోత్పత్తిని సాధించుటకు ఆటంకము కలుగ చేస్తాయి. సమస్యాత్మక భూములు అనేక రకాలు. వీటిని భౌతిక మరియు రసాయన సమస్యాత్మక భూములుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఈ నేలల్లో సమస్యను గుర్తించి, సరి చేసి, పంటల సాగుకు అనుకూలంగా మార్చి, అధిక దిగుబడులను సాధించుటకు ఈ క్రింద సూచించిన యాజమాన్య పద్ధతులను పాటించవలెను.

భౌతిక సమస్యలు

1. లోతు తక్కువ మరియు గలస అధికంగా గల నేలలు : నేల లోతు తక్కువగా ఉండటం (30 సెం.మీ. కన్న తక్కువ) వలన నీరు మరియు భూసారం పరిమితంగా ఉండటంతో వేరు పెరుగుదల తగ్గి పంట దిగుబడి తగ్గుతుంది. ఈ నేలల ఉత్పాదక శక్తిని పెంచడానికి వాలుకు అడ్డంగా బోదెలను నాగళ్ళతో లేదా "బండ్‌ఫార్మర్" తో లేదా పారలతో గాని మీటరు దూరంలో నిర్మించి పైరును బోదెల మీద నాటాలి. ఒక మీటరు మధ్య దూరంలో దుక్కి లోతుగా మూడు సంవత్సరాల కొకసారి దున్నాలి. వీటితో పాటు ఎకరానికి 4 టన్నుల పశువుల ఎరువు లేదా ఇతర సేంద్రీయపు ఎరువులను వేసి దిగుబడిని పెంచవచ్చు.

2. నీటి నిల్వశక్తి తక్కువ గల భూములు : వీటిలో ఇసుక శాతం అధికంగా ఉండటంతో పాటు, బంక మన్ను 20 శాతం కన్నా తక్కువగా ఉన్న భూములలో ఈ సమస్య ఉంటుంది. ఈ నేలల్లో దిగుబడిని పెంచటానికి ఎకరాకు 40 టన్నుల చౌడు స్వభావం లేని చెరువు మట్టిని వేసవిలో వర్షాలకు ముందే వేయాలి. చెరువు మట్టిని పొలంలోకి వేసే ముందు విడిగా మట్టి నమూనాన్ని పరీక్ష చేయించుకోవాలి. చెరువు మట్టిలోని పెద్ద పెళ్ళలను పగలగొట్టి చేను మొత్తంపై పలుచగా చల్లి భూమిలో కలియదున్నాలి. ఇసుక నేలల్లో చెరువు మట్టిని వేసిన తరువాత 200 కిలోల బరువు గల రోలర్‌ను 5–6 సార్లు నడిపించాలి. చెరువు మట్టి వేయడం వలన భూమిలో బంక మన్ను శాతం పెరుగుతుంది. అందువలన భూమికి నీటిని, పోషక పదార్థాలను నిలుపుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. ఏ పంట అవశేషాన్నైనా ఎకరాకు 20 క్వింటాళ్ళ చొప్పున వర్షాకాలానికి ఒక నెల ముందుగానే ష్రెడ్డర్ యంత్ర సహాయంతో చిన్నముక్కలుగా చేసి ఆ తరువాత గుంటకతో మట్టిలో కలియదున్ని ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు. నేలలో వేసిన తర్వాత అలానే వదిలి వేయకుండా వెంటనే ఈ అవశేషములను భూమిలో కలియదున్నడం చాలా ముఖ్యం. పశువుల వ్యర్థములను కూడా నేలకు వేయడం వలన నీటి నిల్వ శక్తి పెంపొందించవచ్చును.

3. నేల పైపొర గట్టిపడే సమస్య : అధిక ఇనుము, అల్యూమినియం ఆక్సైడు మరియు బంకమన్ను, సిల్ట్ కలిపి 20 –40 శాతము కన్నా ఎక్కువ ఉన్న భూములలో తొలకరి వర్షాల తరువాత ఎండ వలన నేల ఉపరితలం పెంకుకడుతుంది. అందుచేత నీరు ఇంకుదల తగ్గి ప్రవాహ వేగం పెరగడం వల్ల నేల కోతకు గురవుతుంది. అంతేకాక ఉపరితల గట్టి పొరల వల్ల గింజ మొలకెత్తు శాతం, వేరు మరియు వేరు బుడిపెల అభివృద్ధి సన్నగిల్లుతుంది. సాధారణంగా తక్కువ సేంద్రియ పదార్థమున్న ఎర్ర నేలల్లో మట్టి పెళ్ళలు

బలహీనంగా ఉండడం వలన వర్ష తాకిడికి ఈ సమస్య వస్తుంది. పశువుల ఎరువు లేదా మాగిన సేంద్రీయ పదార్థాల వాడకము నేల పైపొర గట్టి పడకుండా చేస్తాయి. వ్యవసాయ వ్యర్థాలు అయిన వేరుశనగ పొట్టు, వరి గడ్డి / ముక్కలు చేసిన ప్రత్తి కట్టె, మొక్కజొన్న చొప్ప మొదలగునవి కుళ్ళించి వేసవిలో నేలలో వేసుకొని కలియదున్నాలి. గింజ పెద్దగా ఉండే లేక అధిక విత్తనం వాడే పంటలకు ఇది అంత ఇబ్బందికరం కాదు. వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో మట్టిని కప్పటం వలన (మల్చ్) ఈ సమస్య రాకుండా చూడవచ్చు. చిసెల్ నాగలితో నేలను దున్నటం ద్వారా వ్యవసాయోత్పత్తిని పెంచవచ్చు. ఇటువంటి నేలల్లో ఎకరానికి 16 టన్నుల ఇసుకని వెదజల్లి దుక్కి చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు కనిపించును. ఈ పద్ధతి అనంతపురము జిల్లా ఎర్రనేలల్లో ప్రాముఖ్యత చెందింది. దీనివల్ల నేలలోకి నీరు ఇంకే స్వభావము పెరుగుతుంది.

4. నేల లోపల గట్టి పొరలు : ఉపరితలం నుండి మీటరు వెడల్పున గుంట త్రవ్వుతూ వెళితే, కొంత లోతున గట్టి పొరలు కనబడతాయి. గట్టి పొరకు పైన, క్రింద మామూలు మట్టి ఉంటుంది. చిన్నపాటి చాకును గ్రుచ్చి ఈ గట్టి పొరను నిర్ధారించుకోవచ్చు. గట్టిపొర ఉన్నచోట చాకుకు గట్టిగా తగులుతుంది. పెద్ద ట్రాక్టరుతో లోతుగా దున్నే నాగళ్ళతో లేదా సబ్ సాయిలర్ లేదా చిసెల్ నాగళ్ళతో దున్ని ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు. లోతు సాళ్ళను 60 సెంటీమీటర్ల దూరంలో అడ్డంగా, నిలువుగా రెండు వైపులా తోలాలి. వీటితో పాటు ఎకరాకు 10 టన్నుల పశువుల ఎరువు మరియు 2 టన్నుల జిప్సం కూడా వేస్తే 10 నుండి 12 శాతం వరకు అధిక దిగుబడి పొందవచ్చు. ఈ లోతు దుక్కి ప్రభావం మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.

5. మాగాణిలో అరుతడి పంటలకు దుక్కి సమస్య గల భూములు : మాగాణిలో వరి తర్వాత ఆరుతడి పైరుకు అనువైన దుక్కి చేయడం ఒక ప్రధాన సమస్య. వరి తరువాత ఆరుతడి పంటలు వెయ్యటానికి భూమిని దున్నగానే పెళ్ళలు పెద్దవిగా లేస్తాయి. అందువల్ల వేసిన పైరు (విత్తిన గింజలు) సరిగా మొలకెత్తవు. మొక్కల సాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మొదట మామూలుగా నాగళ్ళతో దున్నిన తర్వాత ట్రాక్టరుతో నడిచే తిరుగు దంతె (రోటవేటర్) లేదా పళ్ళ దంతెతో తేలికగా దున్నితే పెద్ద పెళ్ళలు పగిలి ఆరుతడి పంటలకు అనువైన దుక్కి వస్తుంది. దీని వల్ల వేరుశనగలో అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు. వరి కోసిన తరువాత వేసే ఇతర ఆరుతడి పంటలకు కూడా ఈ పద్ధతితో దుక్కి చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.

6. తీవ్ర వాలు గల భూములు : దీనివల్ల నేలకోత అధికంగా ఉండటమే కాక భూసారం తగ్గటంతో పాటు నేల నీటి నిల్వశక్తి తగ్గి, బెట్ట పరిస్థితులు వేగంగా వచ్చి పంట దిగుబడి తగ్గుతుంది. ఇది మెట్ట ప్రాంతాల్లో తీవ్ర సమస్య.

మూడు, నాలుగు శాతం వరకు వాలువున్న నేలల్లో వాలుకు అడ్డంగా కాంటూరు సేద్యం చెయ్యడం ద్వారా ఈ నేలల ఉత్పాదకతను గణనీయంగా పెంచవచ్చు. కాంటూరు సేద్యానికి వీలు కలిగించేందుకు వాలుకు అడ్డంగా ప్రతి మీటరు నిలువుకు (50 నుండి 100 అడుగుల దూరంలో) కాంటూరు 'కీ' లైన్లను (ఆధార రేఖలను) ఏర్పాటు చెయ్యాలి. దీనికై చిన్న గట్టును ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దీనిపై చెట్లను పెంచుకోవచ్చు.

రాళ్ళను కూడ పేర్చవచ్చు. పైరు వేసిన 3–4 వారాల తర్వాత పెద్ద నాగలితో ప్రతి 3.5 మీటర్ల దూరంలో వర్షపు నీరు సంరక్షణకై వాలుకు అడ్డంగా కాంటూరు కీలైన్లకు సమాంతరంగా లోతు నాగలి సాలు (నీటి సంరక్షణ సాలు) ను వేయాలి. పైరు వేసిన 25 రోజుల తర్వాత పైరు సాలుకు అనుగుణంగా బోదెలు, కాల్వల నిర్మాణం కూడ వర్షపు నీటి సంరక్షణ మరియు సద్వినియోగానికి ఎంతో దోహదపడుతుంది. వీటి వల్ల మెట్ట పైర్ల దిగుబడి 20 నుండి 25 శాతం వరకు పెరుగుతుంది.

వాలు తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పుడు కాంటూరు (సమతల) గట్లను 20–70 మీ. దూరంలో 0.5 చ.మీ. విస్తీర్ణం తగ్గకుండా వేసుకోవాలి. ఈ గట్లు వరద నీటి వేగాన్ని ఆపి, నేలలో నీటి నిల్వను పెంచుతాయి. ఫలితంగా వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పైరు బెట్టను దీర్ఘకాలం ఎదుర్కొనే వీలుంటుంది. వీటిని ఏర్పాటు చేసుకొనేటప్పుడు ప్రతి మీటరు నిలువుకు ఒక గట్టును నిర్మించాలి.

తేలిక పాటి నేలల్లో మరియు వార్షిక వర్షపాతం 600 మి.మీ. కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో కాంటూరు గట్లు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. వార్షిక వర్షపాతం 600 మి.మీ. కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న లేదా నీటిని వేగంగా పీల్చే గుణం తక్కువగా ఉన్న ఎడల వాలు గట్లను నిర్మించవచ్చు.

వట్టివేరు గడ్డి మొక్కలతో జీవగట్లను కూడా కాంటూరు గట్లకు బదులుగా పెంచవచ్చు. ఈ మొక్కలను కాంటూరు గట్లు మాదిరిగానే కాంటూరు మీద వేయాల్సి వుంటుంది. బెట్టను తట్టుకొని, పశువులు తినని, తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే ఇతర స్థానిక గడ్డి జాతి మొక్కలను కూడా వట్టివేరుకు బదులుగా జీవగట్టు నిర్మాణానికి ఉపయోగించవచ్చు.

కాంటూరు గట్టుకు ప్రత్యామ్నాయంగా చిన్న మట్టి గట్టును నిర్మించవచ్చు. ఈ మట్టి గట్టు ఎగువ వైపు గట్టును ఆనుకొని వట్టివేరు మొక్కలను ప్రతి 10–15 సెం.మీ.ను ఒక మొక్కను నాటితే ఇవి కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. దీని వల్ల కాంటూరు గట్ల వల్ల నష్టపోయే భూమి విస్తీర్ణం తగ్గుతుంది. ఖర్చు కూడా కలసివస్తుంది.

అధిక వర్ష సమయంలో నేల కోత లేకుండా వరదనీరు వెళ్ళటానికి కాంటూరు గట్లను కొద్దిగా వాలు ఇచ్చి (గ్రేడుతో) నిర్మించాలి. రేగడి భూముల్లో 0.1 నుండి 0.2 శాతం వాలు సరిపోతుంది. మధ్యస్థపు నేలల్లో 0.3 నుండి 0.4 శాతం వాలు ఇవ్వవచ్చు. ఇదే ఇసుక నేలల్లో 0.5 శాతం వరకు వాలు ఇవ్వవచ్చు. కాంటూరు వాలు గట్లు 400 మీటర్లకన్నా పొడవుగా నిర్మించి నేల కోత లేకుండా వరదనీరు పోవడానికి వాలుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా వరద కాలువలను నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాల్వలోని నీటిని పొలాల్లోని నీటి కుంటల (ఫార్మ్ పాండ్స్) లోకి మళ్ళించాలి. ఫారం పాండ్లను 10×10×2.5 మీ. విస్తీర్ణంలో త్రవ్వుకొని, మట్టి మరియు సిమెంటు 6:1 నిష్పత్తిలో కలిపి పూత పూసినట్టయితే నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. ఈ గుంటలలోని నీటిని పశువులు త్రాగడానికి, చెట్ల పెంపకానికి, బెట్ట సమయంలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పైరును రక్షించటానికి వినియోగించవచ్చు. దీని వల్ల మెట్ట పైరుల్లో 20–30 శాతం వరకు దిగుబడులను పెంచవచ్చును.

రసాయన సమస్యలు

చౌడు నేలలు : నీటిలో కరిగే లవణాలు లేదా మార్పిడి చేయబడే సోడియం నేలలో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చౌడు నేలలు ఏర్పడతాయి. మన రాష్ట్రంలో 80.67 మరియు 34.97 వేల హెక్టార్ల మధ్యస్థ మరియు తీవ్ర చౌడు నేలలు ఉన్నట్లుగా అంచనా వేయబడింది. వీటిని తెల్ల చౌడు మరియు నల్ల చౌడు నేలలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సాధారణంగా ఈ సమస్య వర్షపాతం కన్నా ఆవిరి అయ్యే నీరు ఎక్కువైనప్పుడు భూగర్భ నీటి మట్టం నేల ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉండటం మరియు అధిక లవణాలు ఉన్న నీటిని సాగుకు ఉపయోగించడం వలన ఏర్పడతాయి.

1. తెల్లచౌడు లేదా పాలచౌడు నేలలు : నేలల్లో క్లోరైడ్ మరియు సల్ఫేటుతో కూడిన లవణాలు ఎక్కువగా ఉండటం వలన వేసవిలో నీరు ఆవిరి అవటం వలన ఆ లవణాలు నేల ఉపరితలంపై తెల్ల పొరగా ఏర్పడును. ఈ నేలల్లో మట్టిని పరీక్షించినప్పుడు లవణ సాంద్రత 4 డి.యస్./మీ. కన్నా ఎక్కువ, ఉదజని సూచిక 8.5 కన్నా తక్కువ మరియు మార్పిడి చెందు సోడియం శాతం 15 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ నేలల్లో ఉప్పును తట్టుకునే ఉప్పాకు మొక్కలు (క్రెస్సా క్రిటికా) అధికంగా ఉంటాయి. ఈ భూముల్లో విత్తిన గింజలు సరిగా మొలకెత్తవు. మొలకెత్తిన పైరు కూడా ఏపుగా పెరగదు. పొలంలో మొక్కల సాంద్రత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు భూమిపై పేరుకొన్న ఉప్పు (చౌడు) ను పారతో చెక్కి తీసివేయాలి. పొలాన్ని మొదట బాగా దున్ని సౌలభ్యాన్ని బట్టి చిన్న మడులుగా చేసుకోవాలి. ప్రతి మడిలో సుమారు 15 సెం.మీ. లోతు నీరు నిల్వ ఉండేటట్లు మంచి నాణ్యత కలిగిన (తక్కువ లవణ శాతం) సాగు నీటిని పెట్టాలి. ఈ నీటిని మడిలో 4 లేదా 5 రోజులు నిల్వ ఉంచి భూమిలో ఇంకనీయాలి.తర్వాత మురుగు నీటిని లోతైన కాలువల ద్వారా తీసివేయాలి. వర్షపు నీటిని ఈ పనికి ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఈ విధంగా 3–4 సార్లు చేస్తే చౌడు తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గుతుంది. నాణ్యమైన నీరు అందుబాటులో లేనప్పుడు, ఉప్పునీటిని తట్టుకొనగలిగే వరి, చెఱకు, జొన్న, సోయా, బొబ్బర, సజ్జ, ఆవాలు లాంటి పైర్లను పెంచుకోవాలి. వరిలో సార్వా కాలానికి దీప్తి (యం.టి.యు. 4870), ఇంద్ర (యం.టి.యు. 1061), పాండు రంగ (యం.సి.యం. 100), యం.సి.యం. 125, నెల్లూరు సోన (యన్.యల్.ఆర్. 3041) మరియు దాళ్వా సాగుకు సోమశిల (యన్.యల్.ఆర్. 33358), నెల్లూరి మషూరి (యన్.యల్.ఆర్. 34449), నెల్లూరు సోన (యన్.యల్.ఆర్. 3041), యం.టి.యు. 1293 రకాలు, చెఱకులో 83వి15, మిరపలో భాస్కర, ఆవాలులో క్రాంతి, పి.యమ్. 28, వరుణ్ రకాలను ఎంచుకోవాలి.

వరి సాగుకు పచ్చి రొట్ట పైర్లు ముందుగా నేలలో పెంచి కలియదున్నాలి. నాటుకు ముందు మంచి నీటిని వినియోగించి 3–4 సార్లు నేలలోనికి లవణాలను ఇంకించటం ద్వారా లేదా బయటికి పోయేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నారు వయస్సు 25–35 రోజులు ఉండి, కుదురుకు ఎక్కువ మొక్కలు వచ్చేలా నాటు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సిఫారసు కన్నా 25 శాతం అదనపు నత్రజని ఎరువులను వేసుకోవాలి. నాటిన 15 మరియు 20 రోజులకు జింక్ సల్ఫేట్ 2 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. భూసార పరీక్షల ద్వారా క్షారం కూడా అధికంగా ఉంటే సిఫారసు మేరకు జిప్సంను కూడా వాడుకోవాలి. పప్పుధాన్యపు

పంటలు చౌడును అంతగా తట్టుకోలేవు. మెట్ట ప్రాంతాల్లో బోదెలు, సాళ్ళు నిర్మించి బోదెల అంచుల్లో విత్తాలి. బోదె మీద విత్తరాదు. విత్తటానికి ముందు విత్తనాలను 0.1 శాతం ఉప్పు ద్రావణంలో (1 గ్రా. లీటరు నీటిలో) 2–3 గంటలు నానబెడితే, ఉప్పు ప్రభావాన్ని తట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. పశువుల ఎరువు, కంపోస్టు మరియు పచ్చిరొట్ట ఎరువులను వాడాలి. వీటితో బాటు భూమిలో ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగించే యూరియాను వాడితే మంచిది. సైనోబాక్టీరియా అనే సూక్ష్మ బాక్టీరియాను వాడటం వల్ల సోడియం లవణాల వల్ల కలిగే చౌడును కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు.

నీటి వసతి లేని చౌడు భూములు : నీటివసతి లేని చౌడు భూములను బాగు చేయుటకు సాధ్యపడదు. కనుక అట్టి భూములలో అనువైన చెట్లను నాటవచ్చు. ఈ భూముల్లో 15 సెం.మీ. వ్యాసం గల 'ఆగర్' ను వాడి 1.2–1.5 మీ. లోతు గుంత వెయ్యాలి. ప్రతి గుంత నుండి తీసిన మట్టిలో 2–3 కిలోల జిప్సం, 7–8 కిలోల సేంద్రీయ ఎరువు కలిపి గుంతలు పూడ్చాలి. ప్రతి గుంతకు 25 గ్రా. నత్రజని, అమ్మోనియం సల్ఫేట్ రూపంలో వేసి మొక్కలు నాటవచ్చు. మొక్కలు బ్రతికేవరకు నీరు పెట్టవలెను.

ఉప్పు గుణాన్ని తట్టుకొనే బహుళ ప్రయోజన వృక్షజాతి మొక్కలు

తరగతి	లవణ సాంద్రత (డి.యస్./మీ.)	వృక్ష జాతులు
తట్టుకొనే రకాలు	25–35	సర్కారితుమ్మ, జెరుసలేం తుమ్మ
మధ్యస్థంగా తట్టుకొనే రకాలు	15–25	నల్లతుమ్మ, సరుగుడు, నీలగిరి, ఇజ్రాయిల్ తుమ్మ
మధ్యస్థంగా సున్నితత్వం	10–15	సరుగుడు, తెల్లమద్ది, కానుగ
సున్నితత్వం	7–10	నేరేడు, తంగేడు

2. కారు చౌడు నేలలు : ఈ కారు చౌడు నేలల్లో వేసవి కాలంలో భూమిపై నలుపు లేక బూడిద రంగు పొరను చూడవచ్చు. ఈ నేలలో ఉదజని సూచిక 8.5 మరియు మార్పిడి జరిగే సోడియం 15 శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మార్పిడి సోడియం అధికంగా ఉండటం వలన నేల యొక్క భౌతిక లక్షణాలు క్షీణిస్తాయి. నేల కణములు విడివిడిగా ఉండటం వలన, రంధ్రాలు పూడిపోయి కొద్ది పాటి వర్షం వచ్చినా, నీరు త్వరగా భూమిలోకి ఇంకదు. ఎండినప్పుడు నేల చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సేద్యానికి అనుకూలంగా ఉండదు. ఈ నేలల్లో సాధారణంగా మొక్క మొలవదు, మొలిచినా అక్కడక్కడా మాత్రమే ఉండి తగిన ఎదుగుదల కనిపించదు. ఈ నేలల్లో సేంద్రీయ పదార్థం విచ్ఛిన్నం అవటం వలన నిల్వ ఉన్న నీరుకు నల్లని రంగు వస్తుంది. ఈ నేలల్లో ఉదజని సూచిక 8.5 కన్నా ఎక్కువ మరియు నేల నిర్మాణం సరిగా లేకపోవడం వలన పోషకాల సమతుల్యత దెబ్బతిని మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలు అందుబాటులోకి రాకపోవటం, అవసరంలేనివి అందుబాటులోకి వచ్చి మొక్కకు హానికలిగించడం జరుగుతుంది. ఈ నేలల్లో నీరు ఇంకే స్వభావం తక్కువ కాబట్టి మొదటగా పొలాన్ని చిన్నచిన్న మళ్ళుగా చేసుకొని, మళ్ళ నుండి మురుగు నీరు పోయేలా లోతైన మురుగు నీటి కాల్వలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ నేలలను బాగు చేయటానికి "జిప్సంను"

వేయాల్సి వుంటుంది. జిప్సం మోతాదును భూసార పరీక్ష ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. భూసార పరీక్షా ఫలితాలు అందుబాటులో లేకపోతే ఎకరాకు సుమారుగా 1.2 నుండి 1.6 టన్నుల జిప్సాన్ని వేయవచ్చు. జిప్సాన్ని నేలపై చల్లి మట్టిలో కలిసేలా పైన దంతెతో లేదా గొర్రుతో దున్నాలి. మొత్తం జిప్సాన్ని ఒకే దఫాగా వేయాలి. పలు దఫాల్లో వేయకూడదు. తరువాత నీటిని నిల్వ కట్టి నేలలో ఇంకేలా చేసి వారం రోజులు తరువాత నీటిని, మురుగు కాలవలోనికి పంపాలి. రేగళ్ళలో తరుచుగా తేలికపాటి తడులను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

ఒకవేళ నేలలో సున్నం అధికంగా వుంటే, జిప్సానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఐరన్ పైరైట్‌ను లేదా పొడిచేసిన గంధకాన్ని వాడవచ్చు. పైరైట్ పొడి 5 మిల్లీ మీటర్ల కన్న తక్కువ సూక్ష్మత్వం కలిగి వుండాలి. పైరైట్‌ను నేలమీద చల్లి మట్టిలో కలిసేలా దంతెతో తేలికగా దున్నాలి. మట్టి తేమగా వుండేటట్లు తేలికపాటి తడిపెట్టి వారం రోజులు గాలికి వదిలి వేయాలి. తరువాత మడిలో నీరు పెట్టి ఇంకేలా చేసి, తరువాత మురుగు కాలువల ద్వారా బయటకు పంపాలి.

చెఱకు ఫ్యాక్టరీలలో వ్యర్థ పదార్థంగా మిగిలే ప్రెస్‌మడ్‌ను కూడ జిప్సంకు బదులుగా వాడవచ్చు. ఎకరాకు 1.2 నుండి 1.6 టన్నులు వేయాలి. కారుచౌడు ఒక మోస్తరుగా ఉంటే, జీలుగను పెంచి మట్టిలో కలియదున్నితే చౌడు ప్రభావము తగ్గుతుంది. ఇటువంటి నేలల్లో ఒక బోదె విడిచి రెండవ బోదెలో సాగునీటిని కట్టి పైరును నీరు కట్టిన సాలులో వేసి దిగుబడిని పెంచవచ్చు. తప్పని సరిగా జీలుగ, వరి, రాగి పంటల క్రమాన్ని 2–3 సం॥ వరకు పాటించాలి.

3. ఉప్పు కారు చౌడు నేలలు : ఇవి చూడటానికి తెల్లచౌడు నేలలు మాదిరిగా ఉండి తెల్ల మరియు కారు చౌడు నేలల్లో ఉన్న లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రయోగశాలల్లో ఈ మట్టిని పరిశీలించినప్పుడు ఉదజని సూచిక 8.5 కన్నా తక్కువ / ఎక్కువగాను, లవణ సాంద్రత 4 డి.యస్./మీ. కన్నా ఎక్కువగా, మార్పిడి చెందే సోడియం 15 శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఈ నేలలను బాగు చేయడానికి అధికంగా ఉండే లవణాలతో పాటుగా సోడియం శాతం మరియు ఉదజని సూచిక తగ్గించాలి. బాగా పొడి చేసిన జిప్సంను నేలలో వేసి పూర్తిగా కలిసిపోయేటట్లు చేసి, నీరు పెట్టి 3–4 సార్లు బాగా ఇంకేటట్లు చేయాలి. చివరిగా నీరు అధికంగా పెట్టి, బాగా దమ్ము చేసి తేరనిచ్చి మురుగునీరు తీసివేయాలి.

ఈవిధంగా 3–4 సార్లు చేసినప్పుడు అధికంగా ఉన్న సోడియం మురుగు నీటిలో సోడియం సల్ఫేట్ రూపంలోను మరియు అధికంగా ఉన్న లవణాలు మురుగు నీరు ద్వారా బయటకు పోతాయి.

4. ఆమ్ల నేలలు : ఈ నేలల ఉదజని సూచిక 6.5 కన్న తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేలలు సర్వసామాన్యంగా వార్షిక వర్షపాతం అధికంగా ఉండే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం మరియు నెల్లూరు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. పైకి చూడటానికి ఈ నేలలు తేలికగా ఎర్రగా కనపడతాయి. ఈ నేలలను బాగు చేయడానికి సున్నం లేదా ఉక్కు పరిశ్రమలో వ్యర్థపదార్థంగా మిగిలే బేసిక్‌స్లాగ్‌ను వాడవచ్చు.

భూసార పరీక్ష ఆధారంగా ఎంత సున్నం వేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. భూసార పరీక్ష ఫలితం అందుబాటులో లేనప్పుడు ఎకరాకు 2 నుండి 3 క్వింటాళ్ళ పొడి చేసిన సున్నాన్ని సాళ్ళలో వేస్తే సరిపోతుంది. మొదటి 2–3 సంవత్సరాలు సున్నం బాగా అవసరమయ్యే లెగ్యుమ్ జాతి పైర్లను, కూరగాయలను పండించవచ్చు. వేసిన సున్నం ప్రభావం 5 సంవత్సరాల వరకు వుంటుంది. అందువల్ల ఆ తరువాత సంవత్సరాల్లో సున్నం అంతగా అవసరం లేని ఇతర పైర్లను వేయవచ్చు.

5. సున్నం అధికంగా గల నేలలు : ఈ నేలలను గుర్తించటం చాలా తేలిక. గలస లేదా ప్రత్యేక పొర రూపంలో ఉన్న సున్నాన్ని చూడగానే తేలికగా గుర్తించవచ్చు. తేలికగా గుర్తించలేని పరిస్థితులో 1:4 నిష్పత్తిలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, నీరు కలిపి ఒక చుక్క మిశ్రమ ద్రావణాన్ని మట్టిపై వేస్తే బుస బుసమనే నురగ వస్తే, సున్నం అధికంగా గల నేలగా గుర్తించవచ్చు. ఈ నేలలో భాస్వరం ఎరువు వినియోగ సామర్థ్యం అతి తక్కువగా ఉండటమే కాక సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలైన జింకు, ఇనుము, మాంగనీస్, రాగి లోపాలు సర్వసామాన్యంగా కనిపిస్తాయి.

సూక్ష్మ పోషకాలు ఈ నేలల్లో వేస్తే అంత సమర్థవంతంగా పైరులో లోపాలను సరిదిద్దలేవు. ఫలితంగా ఈ నేలల్లో వేసే పంటల దిగుబడి మరియు నాణ్యతను మెరుగుపర్చలేవు. కనుక పైరుపై పిచికారీ చేయటం మంచిది.

ఎకరానికి 4 టన్నుల పశువుల ఎరువును వేసి పంట నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఈ నేలల్లో జనుము మరియు జీలుగను పచ్చిరొట్ట పైర్లుగా పెంచి నేలలో కలియదున్ని మురిగేలా చేస్తే సున్నపు దుష్ప్రభావాలు కొంత వరకు తగ్గిపోతాయి.

భాస్వరం ఎరువును పొలము మొత్తం వెదజల్లకుండా పైరును సాలులో విత్తేటప్పుడే గింజకన్నా 5 సెంటీ మీటర్ల లోతు మరియు 5 సెంటీమీటర్ల పక్కన పడేలా విత్తనం మరియు ఎరువును ఒకేసారి వేసే "సీడ్ కమ్ ఫెర్టిలైజర్ డ్రిల్" ద్వారా వేయాలి. ప్రత్యామ్నాయంగా భాస్వరంతో పటిష్ఠపరచిన పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్‌ను కూడా వాడి భాస్వరం ఎరువు వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచవచ్చు.

ఈ నేలల్లో పెరిగే నిమ్మ, నారింజ తోటల్లో ఇనుప ధాతు లోపం వల్ల సామాన్యంగా పల్లాకులు కనిపిస్తాయి. ఈ లోపాన్ని సవరించటానికి జనుమును పచ్చిరొట్ట పంటగా పెంచి పాదులో వేసి కుళ్ళనిస్తే, పోషక లోపాలు ముఖ్యంగా ఇనుప ధాతు లోపం తగ్గుతుంది. దీనితోపాటు ప్రతి పాదులో 25 కిలోల మాగిన పశువుల ఎరువు మరియు 125 గ్రాముల అన్నభేదిని వేస్తే, ఈ లోపం సవరించబడుతుంది.

ఈ నేలల్లో వేసిన నిమ్మ, నారింజ తోటల్లో బహుళ సూక్ష్మ మరియు ఇతర పోషకాల లోపాలు విస్తారంగా కనపడతాయి. వీటిని సవరించటానికి ఈ క్రింది మిశ్రమాన్ని లీటరు నీటికి కలిపి 2–3 సార్లు పక్షం వ్యవధిలో పిచికారీ చేయాలి. జింకు సల్ఫేట్ 5 గ్రాములు, మాంగనీస్ సల్ఫేట్ 2 గ్రా., మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ 2 గ్రా., ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ 2 గ్రా., బోరాక్స్ 1 గ్రా., సున్నం 6 గ్రా. మరియు యూరియా 10 గ్రా.

6. ఉరక భూములు : వ్యవసాయానికి సాగు నీరు ఎంత అవసరమో మురుగు నీరు పోయే వసతి కూడా అంతే అవసరం. డెల్టా భూముల్లో ముఖ్యంగా చౌడు భూముల్లో మురుగునీరు నిల్వ ఉంటే పంటలు సరిగా

పండవు. పొలాల్లో మిగులు నీరు ఉండటం వలన మొక్కల వేరువ్యవస్థకు సరైన మోతాదులో ప్రాణవాయువు అందక దిగుబడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఈ భూములు సహజంగా మురుగుపోని, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోనే ఉంటాయి. ఈ భూముల్లో మురుగు పోవుటకు రెండు పద్ధతులు అవలంబించవచ్చు.

ఉపరితల మురుగుతీత : ఉరక భూములలో వాలుననుసరించి ప్రతి 100 మీ. లేదా 125 మీ. దూరంలో నిలువుగా 1.25 మీ. లోతు, 1 మీ. వెడల్పు గల బోదెలను తీసి వాటిని మురుగు కాల్వకి కలపాలి. దీనివలన పొలంలోని పైపొరలో కరిగి ఉన్న లవణాలు ఈ మురుగు నీటి ద్వారా పోతాయి.

భూగర్భ మురుగుతీత పద్ధతి : భూమి ఉపరితలమునకు నీటి మట్టము దగ్గరగా ఉండే మురుగు నిల్వలను, భూగర్భ మురుగునీటి పారుదల గొట్టములను అమర్చుట ద్వారా చౌడు భూములను బాగు చేయవచ్చును. ఈ పద్ధతిలో మురుగునీటిని తీసి నేలలో లవణ సాంద్రతను తగ్గించుటకు 3 లేక 4 అంగళముల వ్యాసం కలిగి రంధ్రములు ఉన్న మట్టి / పి.వి.సి. ప్లాస్టిక్ గొట్టములను నేలలోవున్న లవణ సాంద్రత మరియు నీటి మట్టము ఉన్న లోతు ననుసరించి సుమారు 1.25 మీ.ల లోతులో బోదెలను త్రవ్వి గొట్టములను అమర్చవలెను. బోదెల మధ్య దూరం, నేల భౌతిక స్వరూపం ననుసరించి 30 నుండి 60 మీ. ఉండవలెను. మట్టి పైపులైతే గొట్టము చుట్టూ 10 సెం.మీ.ల మందము ఇసుక వేసి పూడ్చవలెను. ప్లాస్టిక్ గొట్టములు అమర్చినట్లైతే రంధ్రముల చుట్టూ నైలాను గుడ్డ అమర్చవలెను. ఈ విధంగా బోదెలలో అమర్చిన గొట్టముల వరుసలన్నింటిని ముందుగా అమర్చి మురుగు నీటిని పొలం నుండి బయటకు తీసుకొని వెళ్ళే ముఖ్య గొట్టముల వరుసకు కలపవలెను. అప్పుడు వరుసల నుండి లవణములతో కూడిన మురుగునీరు ముఖ్య వరుసలోనికి, ముఖ్య వరుస నుండి దగ్గరలో ఉన్న లోతైన మురుగు కాల్వలోనికి గ్రావిటీ పద్ధతిలో ప్రవహిస్తుంది. ముఖ్య వరుస నుండి గ్రావిటీ పద్ధతిలో నీరు పోవుటకు అవకాశం లేని ప్రాంతాలలో ముఖ్య గొట్టముల వరుస చివర ఏర్పాటు చేసిన వరల బావిలోనికి చేరు నీటిని ఇంజను సహాయంతో మురుగు కాల్వలోనికి తోడవలెను. ఈ పద్ధతి అనుసరించి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు మచిలీపట్నం వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానంలో చేసిన పరిశోధన ఫలితంగా వరిలో 25 నుండి 50 శాతం మరియు తమలపాకు పంటలో 35 నుండి 38 శాతం అధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చునని తేలింది. ఈ పద్ధతిలో మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ నిర్మించుటకు హెక్టారు ఒక్కింటికి సుమారుగా 80,000 – 1,20,000 (ప్రస్తుత ఖరీదుప్రకారం) రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. విస్తీర్ణం పెరిగితే హెక్టారు ఖర్చు తగ్గును.

భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థల వివరములు : అప్పికట్ల, ఉప్పుగుండూరు పరిశోధనా క్షేత్రాలలో భూగర్భ మురుగునీటి నిర్మూలన వ్యవస్థల ఏర్పాటు వలన వరి పంట దిగుబడి అప్పికట్లలో 1.8 నుండి 6.75 ట/హె (275%) పెరగడమే కాకుండా రెండో పంట అయిన మినుము, పెసర, పచ్చజొన్న, ఆవాలు పంటలు కూడా సాగు చేయగలిగారు. ఈ వ్యవస్థల ఏర్పాటు వలన భూముల యొక్క లవణ సాంద్రతలో గణనీయమైన అనుకూల మార్పు కనిపించింది. లవణ సాంద్రత 16.2 నుండి 3.1 డె.యస్./మీ వరకు తగ్గింది. అప్పికట్ల గ్రామంలో భూగర్భ మురుగునీటి నిర్మూలనా వ్యవస్థ వలన సాలీన ఒక హెక్టారు నుండి 3.5 టన్నుల లవణాలు తొలగింపబడినట్లు పరిశోధనా ఫలితాలు తెలియచేస్తున్నాయి.

మురుగు తీసే వసతిలేని భూములలో సల్ఫైడ్ హాని : పల్లపు ప్రాంతాలలో వరి పండించే పొలాల్లో మురుగు వసతి సక్రమంగా లేనప్పుడు పంటలకు సల్ఫైడ్ వల్ల నష్టం కలుగుతుంది. ఈ భూములలోగల గంధకము సల్ఫైడ్‌గా మారుతుంది. సల్ఫైడ్ హాని సాధారణముగా బంక నేలల్లోను, కొత్తగా సాగులోనికి తెచ్చిన నేలల్లోను, ఇనుప ధాతు లోపం ఉన్న నేలల్లోను, మురుగు వసతి సక్రమముగా లేనప్పుడు కలుగుతుంది.

యాజమాన్య పద్ధతులు

1. ఈ లక్షణములను గమనించిన వెంటనే అక్కడక్కడ పొలం అంతా ఒక అడుగు లోతున కాలువ తీసి నీటిని పొలం నుండి తీసివేయాలి.
2. పొలమును చిన్న చిన్న నెర్రెలు ఏర్పడేవరకు ఆరబెట్టాలి. తరువాత నీరు పెట్టాలి.
3. అనువైన పరికరముతో పొలంలో చాళ్ళ మధ్య మట్టి బాగా కదిలేలా చెయ్యాలి.
4. పైరు కోలుకున్న తరువాత నత్రజని ఎరువులు తప్పనిసరిగా వాడాలి.
5. సల్ఫైడ్ హాని వచ్చు పొలంలో కుళ్ళి, సగం కుళ్ళియున్న సేంద్రియ పదార్థములను (ఎరువులను) వాడరాదు.
6. సల్ఫేటు మూలకం వున్న రసాయన ఎరువులను వాడరాదు.
7. ఇనుప దాతువు ఉన్న ఎరువులను వాడవలెను.
8. ఎర్రమట్టిలో ఇనుప ధాతువు ఎక్కువగా ఉండుట వలన, సల్ఫైడ్ హాని సమస్య ఉన్న భూములలో ఈ ఎర్ర మట్టిని వాడి నివారించవచ్చును.

సమస్యాత్మక భూములపై ఇతర వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం), ఉప్పునీటి పరిశోధనా స్థానం, వ్యవసాయ కళాశాల క్షేత్రము, బాపట్ల.

ఫోన్ : 94946 37759

ఉప్పు చౌడు మరియు ఉరక భూముల పునరుద్ధరణకు భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన పద్ధతులు

ఉప్పు చౌడు, ఉరక భూములలో లవణ సాంద్రత, ఉదజని సూచిక మరియు మార్పు చెందు సోడియం శాతం ఎక్కువగా ఉండడం వలన మొక్కలకు, వేళ్ళకు గాలి, నీరు, పోషక పదార్థములు సరిగా అందక పైరు పెరుగుదల తగ్గి దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ భూములలో విత్తనాలు సరిగా మొలకెత్తక పోవడం, నార్లు ఎండిపోవడం పెరుగుదల సక్రమంగా లేకపోవడం, నత్రజని, జింకు వంటి పోషక పదార్థముల లోపం మొదలగు సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో భూగర్భ నీటి మట్టం ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉండడం వలన ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండే కాలంలో ఉపరితలం నుండి నీరు ఆవిరి అయినపుడు లవణాలన్నీ భూమిపై పొరలలో పేరుకు పోయి లవణ సాంద్రత బాగా పెరిగి పంటలలకు నష్టం చేకూరుతుంది. ఈ సమస్యల వలన వివిధ పంటలలో ఉత్పత్తి గణనీయంగా సుమారు 30 నుండి 40 శాతానికి తగ్గిపోయి రైతులు విపరీతంగా నష్టపోతున్నారు. సాగు ఖర్చు విపరీతంగా పెరిగిన ప్రస్తుత కాలంలో పంట దిగుబడులు తగ్గిపోవడం రైతులకు గోరు చుట్టుపై రోకలి పోటుగా అభివర్ణించవచ్చు. సాగు నీటి భూములలో నెలకొన్న కొన్ని పరిస్థితుల మూలంగా మంచి భూములు కూడా ఉప్పు చౌడు మరియు ఉరక భూములుగా కొన్ని సంవత్సరాలలోనే రూపాంతరం చెందుతున్నాయి. మన రాష్ట్రంలోని 65 లక్షల హెక్టార్ల వ్యవసాయ భూమిలో సుమారు 30 లక్షల హెక్టార్ల భూమికి వివిధ వనరుల ద్వారా సాగు నీరు అందచేయబడుతున్నది. రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉప్పు చౌడు భూములు సుమారు 4 లక్షల హెక్టార్లలోనూ, ఉరక భూములు సుమారు 3 లక్షల హెక్టార్లలోనూ ఉన్నట్టు గుర్తించారు.

1. ఉప్పు చౌడు నేలలు : లవణ సూచిక, ఉదజని సూచిక మరియు మార్పు చెందు సోడియం శాతం ఆధారంగా సమస్యాత్మక భూములను ఉప్పు, చౌడు మరియు ఉప్పుతో కూడిన చౌడు నేలలుగా ఈ క్రింది పట్టికలో పేర్కొనబడిన విధంగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది.

సమస్యాత్మక నేలలు	లవణ సూచిక (ఇ.సి.ఇ.)(డి.ఎస్./ఎమ్.)	ఉదజని సూచిక (పి. హెచ్.)	మార్పు చెందు సోడియం శాతం (ఇ.ఎస్.పి.) (%)
ఉప్పు నేలలు (పాల చౌడు లేదా తెల్ల చౌడు నేలలు)	4 కంటే ఎక్కువ	8.5 కంటే తక్కువ	15 కంటే తక్కువ
చౌడు/క్షార నేలలు (కారు చౌడు లేదా నల్ల చౌడు నేలలు)	4 కంటే తక్కువ	8.5 కంటే ఎక్కువ	15 కంటే ఎక్కువ
ఉప్పుతో కూడిన చౌడు నేలలు	4 కంటే ఎక్కువ	8.5 కంటే తక్కువ	15 కంటే ఎక్కువ

2. ఉరక నేలలు : వ్యవసాయ భూములలో భూగర్భ నీటి మట్టం భూమి ఉపరితలం నుండి 1.0 మీటరు కన్నా తక్కువగా ఉంటే వీటిని ఉరక భూములుగా వర్గీకరిస్తారు. భూగర్భ నీరు మంచిదయితే కొంత వరకూ పరవాలేదు. ఉప్పు నీరయితే సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ భూములలో మొక్కల వేళ్ళకు గాలి, పోషక పదార్థములు సరిగా అందవు. ఇదేకాకుండా వేసవి కాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల మూలంగా నీటి ఆవిరి ప్రక్రియ వలన లవణములు భూమిపై పొరలకు చేరతాయి. తద్వారా పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఈ సమస్యాత్మక భూములలో ఏ సమస్యకు ఏ పద్ధతి అవలంభించాలి, ఎలాంటి సాగు నీటి మరియు మురుగు నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అనే వాటిపై రైతులు అవగాహన పెంచుకోవాలి. లేకపోతే, అధిక మోతాదులో రసాయనిక ఎరువుల వినియోగం వలన ఖర్చు అధికమై రైతులకు నికర లాభం ఆశాజనకంగా ఉండదు.

ఈ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు, ఈ భూముల పునరుద్ధరణకు ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వివిధ పరిశోధనా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మచిలీపట్నం కేంద్రంగా వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, వ్యవసాయ భూములలో డ్రైనేజీ పధకం, బాపట్ల కేంద్రంగా ఉప్పునీటి పరిశోధనా పధకం, ఇండో – డచ్ డ్రైనేజ్ పరిశోధనా పధకం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి యాజమాన్య పధకం ద్వారా పరిశోధనలు నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ పధకాలు వివిధ ప్రాంతాలలో సాగు చేసే వివిధ పంటలలో దిగుబడులు, ఉత్పాదకత పెంచడానికి వివిధ పద్ధతులు సిఫారసు చేయడం జరిగింది. వీటిలో సేంద్రీయ పద్ధతులు, సాయిల్ అమెండ్‌మెంట్ పద్ధతులు మరియు భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన (ఇంజనీరింగ్) పద్ధతులు ఉన్నాయి. అలాగే జెనెటిక్స్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ విభాగము వారు కూడా సమస్యాత్మక భూములలో ఉప్పు చౌడులను తట్టుకునే వంగడాలను రూపొందించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉప్పు చౌడు భూములలో పండించడానికి వరి వంగడాలను మారుటేరు (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) మరియు నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు. వివరాలను వ్యవసాయ పంచాంగంలోని సంబంధిత వ్యాసాలు /సెక్షన్లలో పొందుపర్చడం జరిగింది. సమగ్ర వివరాలను ఈ పరిశోధనా స్థానాల నుండి రైతులు పొందవచ్చును. ఇక ఇంజనీరింగ్ పద్ధతుల పరంగా సమస్యాత్మక భూములలో లీచింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మురుగు నీటిని నిర్మూలించడానికి లవణ సాంద్రత తగ్గించడానికి రెండు రకాల పద్ధతులు పరిశోధనా ఫలితాల ద్వారా రూపొందించడం జరిగింది.

1. ఉపరితల మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థ. 2. భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థ.

సమస్య తీవ్రత, స్వభావము, భూమి భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ వ్యవస్థల ఎంపిక, డిజైన్ మరియు నిర్మాణము ఈ క్రింది అంశములపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

1. నేల మరియు భూగర్భ నీటి లవణ సూచిక. 2. భూగర్భ నీటి మట్టం.
3. నేల మరియు నీటి ఉదజని సూచిక. 4. నేల యొక్క రకము.
5. ఆ ప్రాంతంలోని వర్షపాతము. 6. ఆ ప్రాంత పంటలు రకాలు, సరళి.

ఉపరితల మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థ : ఈ పద్ధతిలో పైన పేర్కొన్న అంశాలను బట్టి 50 నుండి 100 మీటర్లు అంతరముతో 1 మీటరు లోతు, 40 సెం.మీ. క్రింద వెడల్పు, 1:1 ప్రక్కవాలుతో ట్రైపీజీయం ఆకారపు అడ్డుకోత సెక్షన్‌లో మురుగు నీటి కాలువలను భూమి విస్తీర్ణం మేరకు సమాంతరంగా త్రవ్వడం జరుగుతుంది.

ఇలా చేసినపుడు మురుగునీరు మరియు అందులో కరిగిన లవణాలు ఈ కాలువలలోకి చేరతాయి. వీటి ద్వారా ఈ నీటిని దగ్గరలోని పెద్ద మురుగు కాలువలోకి పంపే ఏర్పాటు చేయడం వలన లవణాలు మరియు మురుగునీరు పొలం నుండి బయటకు పంపి వేయబడతాయి. 2–3 సంవత్సరాలలో ఉప్పు చౌడు ఉరక స్వభావం తగ్గి పంటల దిగుబడులు పెరుగుతాయి. ఈ పద్ధతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది. ఎక్కువ యంత్రాలతో పని లేకుండా రైతుల పరంగా చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది.

భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థ : ఈ పద్ధతిలో భూగర్భ నీటి మట్టాన్ని బట్టి 1 నుండి 1.5 మీటర్ల లోతులో 30 నుండి 100 మీటర్ల అంతరములో కందకాలు త్రవ్వి, వాటిలో రంధ్రములు కలిగిన పి.వి.సి. పైపులను గానీ మట్టి పైపులను గానీ, 0.2 శాతం వాలు ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసి కందకాలను తిరిగి పూడ్చివేయాలి. గతంలో మట్టి పైపులను ఉపయోగించేవారు. ఇప్పుడు ఆధునాతనమైన పి.వి.సి. పైపులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. ఈ పైపుల రంధ్రముల ద్వారా మట్టి రేణువులు పైపులలోకి వెళ్ళకుండా చేయడానికి అవసరాన్ని బట్టి పైపుల చుట్టూ నైలాన్ మెష్ (దోమ తెర లాంటిది) కానీ జియో–టెక్స్‌టైల్ (రగ్గులాంటిది) వంటి ఆధునాతన పదార్థములు లేదా కొబ్బరిపీచు, ప్రత్తి గుడ్డలు చుట్టడం గానీ, చిన్న సైజు కంకర రాళ్ళను చుట్టూ పోయడం గానీ చేయాలి. ఇలా సమాంతరంగా వేసిన రంధ్రములు కలిగిన పైపులను లేటరల్ పైపులు అంటారు. వీటి వ్యాసం అవసరాన్ని బట్టి 8 సెం.మీ. నుండి 10 సెం.మీ. గా ఉండాలి. ఈ లేటరల్ పైపులను కలుపుతూ కొద్దిగా ఎక్కువ వ్యాసం (అంటే సుమారు 10 సెం.మీ. నుండి 15.0 సెం.మీ.) కలిగిన పైపును ఏటవాలుగా అమర్చాలి. దీనిని కనెక్టరు పైపు అంటారు. దీనికి వాలు 1 నుండి 2 శాతం ఉంచాలి. భూమి లోపల ఈ లేటరల్ మరియు కనెక్టరు పైపులను తగినంత వాలులో అమర్చడం వలన పైపులలో నీరు ఆగక సులభంగా చివరి వరకు ప్రవహిస్తుంది. లేటరల్ పైపుల చుట్టూ వడకట్టు (ఫిల్టర్) పదార్థములను చుట్టడం వలన పైపులలోకి చిన్న మట్టి రేణువులు గానీ ఇసుక గానీ చొరబడే అవకాశం ఉండదు. అందువలన పైపుల రంధ్రములు మూసుకుపోకుండా ఉండి వ్యవస్థ ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది. కనెక్టరు పైపుకు రంధ్రములు ఉండవు. కాబట్టి చుట్టూ ఫిల్టర్ పదార్థములు చుట్టనవసరం లేదు. లేటరల్ పైపును కనెక్టరు పైపుకు కలపడానికి టి–జాయింట్ లను ఉపయోగిస్తారు. ఈ రకంగా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం వలన భూగర్భంలోని మురుగు నీరు వాటిలో కరిగి ఉన్న లవణాలు ఈ పైపుల ద్వారా ప్రవహించి భూగర్భ నీటి మట్టం తగ్గడానికి దోహదపడుతుంది. ఇలా పొలం చివరి వరకు చేరిన మురుగు నీటిని సహజ వాలును ఉపయోగించుకుని కనెక్టరు పైపు ద్వారా నేరుగా గానీ, లేదా భూమి సహజ వాలు సరిపోని పరిస్థితులలో నీటిని పొలం చివర ప్రాంతంలో ఒక నుయ్యి (సంప్) లోకి చేర్చి దీని నుండి మోటారు – పంపు సహాయంతో నీటిని తోడి దగ్గరలోని మురుగు కాల్వకు పంపించవచ్చును. ఈ వ్యవస్థ నిర్మాణం వలన మురుగు నీరు ఎప్పటికప్పుడు బయటకు వెళ్ళడం వలన భూగర్భ నీటి మట్టం మరియు భూమిలోని లవణ సూచిక క్రమంగా తగ్గి పంట బాగా వచ్చి దిగుబడి పెరుగుతుంది. రెండు మూడు సంవత్సరాలలో భూమి భౌతిక, రసాయనిక స్థితిలో మార్పులు వచ్చి మంచి నేలలుగా మార్పు చెందుతాయి. ఈ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి తొలి ఖర్చు కొద్దిగా ఎక్కువ అయినా, నిర్వహణ ఖర్చు దాదాపుగా ఉండదు. కొన్ని అంచనాలను బట్టి భూమిలోని సమస్యల తీవ్రత, పైపుల పరిమాణముల ఆధారంగా ఒక ఎకరానికి పదిహేను వేల రూపాయలుగా తొలి ఖర్చు ఉండవచ్చు. రైతులు ఈ వ్యవస్థను సహకార పద్ధతిలో సామూహికంగా

ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ఖర్చు బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. వ్యవస్థ డిజైన్ మరియు నిర్మాణము నేల స్వభావము, భూగర్భ నీటి మట్టము, ఆ ప్రాంతములో పంటలను బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఖర్చు కూడా అందుకు అనుగుణంగా మారుతుంది. ఏ పంటలో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పరచినా రెండు, మూడు సంవత్సరాలలో దిగుబడులు 2–3 రెట్లు పెరుగుతాయి. అన్ని జాగ్రత్తలు సాంకేతికపరంగా తీసుకుని సరిగ్గా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఈ వ్యవస్థ దాదాపు 25–30 సంవత్సరాల వరకూ ఎటువంటి సమస్య లేకుండా పని చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రైతులు తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే వారి ప్రాంతంలో సమస్యాత్మక భూములు ఉన్నట్టయితే, వాటి వర్గీకరణ ప్రకారం ఎలాంటి పరిష్కార మార్గం లేదా ఎలాంటి వ్యవస్థ అవసరమవుతుంది అన్నది. చౌడు భూములయితే చౌడు శాతం తగ్గించడానికి సిఫారసు చేసిన మోతాదులో 'జిప్సమ్' వాడుట బాగా ఉపయోగకరము. జిప్సమ్ వాడుట వలన భూమిలో లవణముల మధ్య రసాయనిక చర్యల మూలంగా నీటిలో కరగడం వల్ల ఈ నీటిని పొలం నుండి బయటకు విడగొట్టవచ్చును. అలాగే తగిన మోతాదులో కంపోస్టు ఎరువు, జీలుగ లేదా ఇతర పచ్చిరొట్ట ఎరువులను కలియదున్నడం వలన చౌడు శాతం బాగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా భూభౌతిక లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి. పంటలు బాగా పెరిగి దిగుబడులు పెరుగుతాయి.

ఉప్పు నేలలు లేదా ఉప్పుతో కూడిన చౌడు నేలలు అయితే పైన పేర్కొనబడిన సేద్య పద్ధతులు మరియు సాయిల్ అమేండ్‌మెంట్ పద్ధతులతో బాటుగా లీచింగ్ ప్రక్రియతో మురుగు నీటితో బాటు లవణముల నిర్మూలనకు ఉపరితల మురుగునీటి నిర్మూలన వ్యవస్థను గాని, అవసరాన్ని బట్టి భూగర్భ మురుగు నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థను గానీ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ఉప్పు నేలలను సమర్థవంతంగా పునరుద్ధరించవచ్చును.

మోలు భూగర్భ నీటి నిర్మూలన వ్యవస్థ (మోలు డ్రైనేజీ సిస్టం) : బంక మట్టి నేలలలో అనగా సుమారు 35% బంక మన్ను ఉండే నేలలలో ఈ వ్యవస్థను పైపులు లేకుండా మోలు నాగలితో వేసుకోవచ్చు. ఇది యూనైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు నెదర్లాండ్ దేశములలోను, మన దేశంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని సోయాబీన్ పండించే ముంపుకు గురియైన భూములలోను ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. భూమిలో తేమ శాతం 25% ఉన్నప్పుడు 75 హెచ్.పి. ట్రాక్టరుతో నడిచే మోలు నాగలితో సుమారుగా 45 నుండి 50 సెం.మీ. లోతులో నడిపినప్పుడు, గుండ్రంగా ఉండే కాలువలు భూగర్భంలో ఏర్పడి కూలిపోకుండా నిలబడతాయి. ఈ కాలువల ద్వారా ఎక్కువ నీరు క్రిందకు ఊరి తద్వారా ప్రధాన మురుగు నీటి కాలువలోకి వాలు ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. ఈ కాలువలు సుమారు 2 నుంచి 4 సంవత్సరాలు పని చేస్తాయి. కాలువల అంతరము 2.5 నుంచి 4 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. మోలు నాగలి ఖరీదు సుమారు రూ. 30,000/–, ఇది సి.ఐ.ఎ.ఇ. భోపాల్‌లో దొరుకుతుంది.

మన రాష్ట్రంలో శ్రీ సర్వారాయ షుగర్స్ మరియు కె.సి.పి. షుగర్స్ కంపెనీ వారు చెఱకు పండించే బంక మట్టి నేలల్లో (ముంపుకు గురైన) ఈ మోలు డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేసి (నమూన పద్ధతిలో) పరిశోధనలు చేశారు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రొఫెసర్ & హెడ్ (ఇరిగేషన్ & డ్రైనేజ్); డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల.

ఫోన్ నెం. 81798 15632

వర్మి కంపోస్టు తయారీలో మెళకువలు

వర్మి కంపోస్ట్ ఒక రకమైన సేంద్రీయ ఎరువు. ఇది ప్రపంచంలోని ఉత్తమ ఎరువుగా గుర్తింపు పొందింది. ఇది వానపాముల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. వానపాముల మలము, సేంద్రీయ పదార్థాలు, జీవించి ఉన్న వానపాములు, వాటి కకూన్లు మరియు ఇతర సూక్ష్మజీవుల మిశ్రమంగా ఉంటుంది.

వానపాములు (ఎర్త్ వార్మ్స్) అనాదిగా మన భూముల్లో ఉంటూ రైతు మిత్రులుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇవి పంట భూముల్లో లభ్యమయ్యే సేంద్రీయ పదార్థాలను తింటూ నేలను సారవంతం చేసి, తద్వారా మంచి దిగుబడులు సాధించడానికి దోహదపడతాయి. ఇటీవలి దశాబ్దాలలో పెరుగుతున్న జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని పంట ఉత్పత్తులను పెంచడానికి అధిక మోతాదులో ఎరువులు, పురుగు మందులు, తెగుళ్ళ మందులు, కలుపు మందులు, విరివిగా వాడడం జరిగింది. ఇందువల్ల చాలా వరకు భూములన్నీ వివిధ రసాయనిక మందులతో కలుషితం అయిపోయి భూసారం తగ్గిపోయి, వానపాముల సాంద్రత కూడా చాలా తగ్గిపోయింది.

నేల, నీరు, గాలి, పురుగు మందులు, తెగుళ్ళ మందులు, కలుపు మందులు, రసాయనిక ఎరువుల వల్ల కలుషితమై, జంతువులకు, మనుషులకు హాని చేకూర్చుతున్నవని నిరూపణ అవ్వటం వల్ల, ప్రస్తుత వ్యవసాయ రంగంలో మరల "సేంద్రీయ వ్యవసాయం" అనే పోకడను అనుసరించడం మొదలయినది. మందుల అవశేషాలను నిలపని వ్యవసాయ పద్ధతులన్నింటినీ "సేంద్రీయ వ్యవసాయం" కిందకు చెప్పుకోవచ్చు.

పచ్చి రొట్ట ఎరువులు, పశువుల ఎరువు, వర్మి కంపోస్టు, ఎన్‌రిచ్‌డ్ కంపోస్టు, కోకోపిట్ మొదలగునవి ముఖ్యమైన సేంద్రీయ ఎరువులు. ఇప్పటి కాలంలో వ్యవసాయం యాంత్రీకరణ వైపు కూడా అభివృద్ధి చెందుతుండటం వల్ల, పశు సంపదను పోషించడం చాలా తక్కువ మంది రైతులు చేపడుతున్నారు. కాబట్టి పశువుల ఎరువు కూడా అందుబాటులో ఉండటం లేదు. పచ్చి రొట్ట ఎరువులను వేయటం, వరి మాగాణాకి కొన్ని ప్రాంతాల రైతులు పాటిస్తున్నారు. ఈ క్రమములో ఇతర సేంద్రీయ ఎరువులలో ముఖ్యమైనది అయిన వర్మి కంపోస్టును కూడా తయారు చేసి పంటలకు వాడవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.

వానపాములు దాదాపు ఏ రకమైన సేంద్రీయ పదార్థంనైనా తినగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఒక కిలో గ్రాము వానపాములు రోజుకు ఒక కిలో గ్రాము వ్యర్థాలను తినగలవు. కాబట్టి, వర్మి కంపోస్ట్ అనేది ఆహార అవశేషాలు, వ్యవసాయ పరిశ్రమ వ్యర్థాలు, గృహ వ్యర్థాలు, పందులు, కోళ్ళు మరియు ఆవుల వంటి జంతువుల వ్యర్థాలను రీసైకిల్ చేయడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మరియు సమర్థవంతమైన పద్ధతిగా ఉపయోగించవచ్చు.

మట్టిలో నివసించే అనేక రకములైన సూక్ష్మజీవులు (ఆక్టినోమైసెట్స్) వానపాముల సంయోగంలో వేగంగా పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే అవి వానపాములు మరియు బ్యాక్టీరియా సమూహం మధ్య పరస్పర సహకార / సహజీవన చర్య ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతాయి. వానపాముల ద్వారా తయారైన భూమిలోని సేంద్రీయ పదార్థం పండ్లు, కూరగాయలు, ధాన్యాలు, పాల ఉత్పత్తులు మరియు ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సేంద్రీయంగా ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. వర్మి కంపోస్ట్ భూసారాన్ని పెంచడం ద్వారా భూగర్భ నిర్మాణాన్ని, గాలి,

ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇతర సేంద్రీయ ఎరువులతో పోలిస్తే ఇది 4 నుండి 5 రెట్లు ఎక్కువ మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు రసాయన ఎరువులతో పోలిస్తే 30 నుండి 40 శాతం ఎక్కువ మొక్కలకు పెరుగుదలను అందిస్తుంది. అదనంగా, వర్మి కంపోస్టింగ్ గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతకు సేంద్రీయ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగం చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించే గొప్ప అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

వర్మి కంపోస్టు తయారీకి అనువైన వానపాముల రకాలు :

వానపాముల యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు మరియు జీవన విధానాన్ని బట్టి రెండు రకాలుగా విభజించారు.

1. సర్‌ఫేస్ ఫీడర్స్ : ఇవి భూమి పై పొరల్లో ఉంటాయి. వీటి జీవిత కాలం 28 నెలలు. వీటికి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం ఎక్కువ. ఇవి 20-25^0 సెంటీగ్రేడ్ వద్ద చురుకుగా ఉంటాయి. శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వర్మి కంపోస్టు తయారీకి ఈ సర్‌ఫేస్ ఫీడర్స్ అనుకూలమైనవి. ఉదా : ఎయిసినియా ఫొయిటిడా, పెరియోనిక్స్ ఎస్కవేటస్, లుంబ్రికస్ రుబెల్లస్.

2. డీప్ బర్రోయర్స్ : ఇవి భూమి నుండి 3 మీటర్ల వరకు తొలుచుకుంటూ వెళ్ళి సేంద్రీయ పదార్థాలను తయారు చేస్తాయి. వీటి జీవిత కాలం 15 సం॥లు. వీటిని తోటల్లో పునరుత్పత్తి చేసి పొలాల్లో ప్రవేశపెడితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా వర్మి కంపోస్టు తయారు చేయడం కష్టతరం.

వర్మి కంపోస్టులోని పోషక విలువలు :

ఒక కిలో వానపాములు ఒక రోజుకు 5 కిలోల వ్యర్థ పదార్థాలను కంపోస్టుగా మార్చగలవు. మామూలు పశువుల ఎరువుతో పోలిస్తే వర్మి కంపోస్టులో 40-60 శాతం సేంద్రీయ స్థూల, సూక్ష్మ మరియు పోషక పదార్థాలు ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. ఇంకా హార్మోన్లు, విటమిన్లు, ఎంజైములు మరియు అనేక రకాల మేలు చేసే సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి.

పోషక పదార్థం	వానపాముల ఎరువు	పశువుల ఎరువు
నత్రజని (%)	1.6	0.5
భాస్వరం (%)	0.7	0.2
పొటాషియం (%)	0.8	0.5
కాల్షియం (%)	0.5	0.9
మెగ్నీషియం (%)	0.2	0.2
ఐరన్ (పి.పి.యం.)	175.0	146.5
కాపర్ (పి.పి.యం.)	5.0	2.8
జింక్ (పి.పి.యం.)	24.50	14.50
మాంగనీస్ (పి.పి.యం.)	96.50	69.00

వర్మి కంపోస్టింగ్‌ను పడకలు లేదా బిన్స్, టవర్లు, గుంటలు లేదా కాల్వలు మరియు కంటైనర్లు వంటి అనేక మార్గాల్లో చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది రెండు పద్ధతుల్లో చేయవచ్చు.

1. బ్యాచ్ వ్యవస్థ : దీనిలో వర్మి కంపోస్ట్‌ను బ్యాచ్‌లలో ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఇందులో ప్రారంభంలో ఒక నిర్ధిష్ట పరిమాణంలోని వ్యర్ధ పదార్ధాలను వర్మికంపోస్ట్ తొట్టెలకు జోడిస్తాను. ఆ తర్వాత కుళ్ళిపోయేలా చేసి వానపాములను తినేందుకు వదులుతారు. ఒక నిర్ధిష్ట కాలం తర్వాత, వర్మి కంపోస్ట్‌ను తీసుకొని శుభ్రపరిచిన తరువాత తదుపరి సిమెంటు తొట్టెలను సిద్ధం చేస్తారు. ఈ నిర్మాణాలు చిన్నస్థాయి వర్మి కంపోస్టింగ్ కార్యకలాపాలకు అనువుగా ఉంటాయి.

2. నిరంతర ప్రవాహ వర్మి కంపోస్టింగ్ వ్యవస్థ : ఈ నిర్మాణంలో ఆహార పదార్ధాల నిరంతర సరఫరా కొనసాగుతుండగా వర్మి కంపోస్టును నిరంతరం తీసుకోబడుతుంది.

ఈ నిర్మాణానికి వానపాములను వర్మి కంపోస్టును వేరు చేసే యాంత్రిక విధానం ఉండాలి. ఈ నిర్మాణాలు పెద్ద స్థాయి వర్మి కంపోస్టు కార్యకలాపాలకు అనువైనవి.

వర్మి కంపోస్టును తయారు చేయు విధానం :

మిద్దె తోటలు, లాన్స్, హౌస్ గార్డెన్స్, కిచెన్ గార్డెన్స్ మొదలగు వాటికి తక్కువ మోతాదులో సిమెంటు రింగులు, చెక్క పెట్టెలు, మట్టి తొట్టెలు లేదా ప్లాస్టిక్ ట్రేలు ఉపయోగించి వర్మి కంపోస్టును తయారు చేసుకోవచ్చు. వర్మి కంపోస్టును వ్యాపార సరళిలో, ఎక్కువ మోతాదులో చేయటానికి, షెడ్ నిర్మాణం చేపట్టాలి.

షెడ్ నిర్మాణం : షెడ్‌లోని నేల నిర్మాణం కాంక్రీట్‌తో లేదా వాటికి బదులుగా నల్లబండలను ఉపయోగించి చేయాలి. పైకప్పును కాంక్రీట్ సిమెంటు లేదా గాల్వనైజ్డ్ షీట్స్ లేదా ఖర్చు తగ్గించుకునే విధంగా పంటలలో వచ్చే చెత్త (చెఱకు ఆకులు, వరి గడ్డి, చొప్ప మొ॥) లేదా బోద లేదా తాటాకులతో నిర్మించవచ్చు. పెద్ద తొట్టెలు 3 మీ.×1$^{1}/_{2}$ మీ.×1 మీ. విస్తీర్ణంలో మరియు చిన్న తొట్టెలను 2 మీ.×1 మీ.×1 మీ. విస్తీర్ణంలో కట్టుకోవాలి. పై కప్పును 9–10 అడుగుల మరియు గోడలను 5–6 అడుగుల ఎత్తు వరకూ ఉండేటట్లు నిర్మించాలి.

ఆకు, గడ్డి, పేడ మొదలగు పదార్ధాలతో తొట్టెను నింపడం :

- రక రకాల చెట్ల (వేప, కానుగ, మొదలగునవి) నుంచి ఎక్కువగా పెరిగిన కొమ్మలను కత్తిరించి ఆకులను సేకరించాలి.
- గట్ల మీద, బీడు భూములలో పెరిగిన గడ్డిని సేకరించుకోవాలి.
- చెఱకు ఆకు, ధాన్యపు పంటలు, వేరుశనగ మొదలగు మొక్కల నుంచి కాయలను తొలగించిన తర్వాత మిగిలిన వ్యర్ధాలను సేకరించాలి.
- పంటలలోని కలుపు మొక్కలను తీసినప్పుడు, అవి కూడా తొట్లకు ఉపయోగించవచ్చును.
- పట్టు పురుగుల పెంపకం ఉన్న వారు, సెరికల్చర్ యూనిట్ లోని వ్యర్ధాలను వాడుకోవచ్చు.

- కిచెన్‌లో వచ్చే కూరగాయలు, పండ్ల యొక్క తొక్కలను తొట్లకు వాడవచ్చు.
- చెక్క ముక్కలు, గాజు పెంకులు, రాళ్ళు, ఇనుప ముక్కలు మొదలగునవి ఉండరాదు.
- పచ్చి పేడ గాని, చివికిన పశువుల ఎరువుగాని సేకరించి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఆకుల మిశ్రమాన్ని 20 సెం.మీ. మందంతో మొదటి పొరగా అమర్చాలి.
- తర్వాత రెండవ పొరగా పచ్చి పేడను, నీళ్ళలో కలిపి చిక్కగా పోయాలి లేదా చివికిన ఎరువును పొరగా చల్లాలి.
- ఇలాగ, మూడు పొరలు ఆకులు, మూడు పొరలు పేడ వేసుకోవాలి. తొట్టికి 90 శాతం ఎత్తు వరకూ పొరలు అమర్చవలెను.
- రోజూ క్రమం తప్పకుండా తొట్లకు (వర్మి బెడ్స్) నీరు ముద్దగా పట్టాలి.
- 20 రోజులకు తొట్టిలోని పదార్థాలు చాలా వరకు కుళ్ళుతాయి.
- అప్పుడు ఈ మిశ్రమంలోకి వానపాములను వదలాలి. వర్మి బెడ్ సైజును బట్టి 4-6 కిలోల కంపోస్టుతో పాటు బెడ్‌లో సమానంగా చల్లాలి. కొంతసేపటికి వానపాములు మొదటి పొరలోకి వెళ్ళిపోయి, ఆ పదార్థాలను తినడం మొదలు పెడతాయి.
- రోజూ నీరు తొట్టికి అన్ని వైపులా సమానంగా పెడుతూ, చీమలు, చెదలు, ఎలుకలు, బల్లులు మొదలగునవి శత్రువుల బారి నుంచి ఎరలను కాపాడుకుంటూ షెడ్‌లను సురక్షితంగా చూసుకోవాలి. బెడ్‌లను ఎప్పుడూ ముద్దగా ఉంచితే, వానపాములకు అనుకూలం. ఎరువు తొందరగా తయారవుతుంది. వానపాముల వృద్ధి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ వృద్ధి చెందితే, వానపాములను ఇతరులకు విక్రయించవచ్చు.
- 20 రోజులకంతా మొదటి పొర చిన్న చిన్న, అతి సన్నని, పిడకలుగా (క్యాస్టింగ్స్) కనిపిస్తుంది. ఇవి వానపాముల విసర్జితాలు. ఇదే వర్మి కంపోస్టు. ఇది వానపాముల జీర్ణ నాళములోని కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ తోనూ, వానపాముల శరీర పై భాగములోనుంచి వచ్చే ద్రవాలను కలిగి ఉంటుంది.
- ఒక టన్ను వర్మి కంపోస్టు తయారవడానికి దాదాపు 3000 వానపాములు కావలసి వస్తుంది.
- తయారయ్యే కొద్ది, పై పొరలను ఒడుపుకుని వాడటం ఒక పద్ధతి లేదా తొట్టి అంతా తయారైన తర్వాత మొత్తం అంతటినీ ఒడపటం రెండవ పద్ధతి.
- తొట్టి అంతా తయారయినప్పుడు, ఆ తొట్టికి నీరు పెట్టడం ఆపాలి. పైపొరలను తీసి టార్పాలిన్స్ మీద ఆరబోసుకోవచ్చు (నీడలో) కింది పొరలను పిరమిడ్ ఆకారంలో తొట్టి మధ్యలోకి అమర్చాలి. వానపాములు తేమ ఎక్కువ ఉన్న కుప్ప అడుగు భాగంలోకి వెళ్తాయి. పై ఎరువును తీసుకుని, కింద ఉన్న వానపాములను వేరే తొట్లలో చల్లడానికి ఉపయోగించుకోవాలి.

వానపాముల ఎరువు జల్లెడ పట్టడం :

- ఇసుక జల్లెడ పట్టడానికి ఉపయోగించే జల్లెడలనే ఎరల ఎరువును జల్లెడ పట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- జల్లెడ పట్టిన ఎరువును మరియొక్క సారి నీడలో ఆరబెట్టి తర్వాత సంచులలో నిల్వ ఉంచి, విక్రయించుకోవచ్చు.
- సొంత పొలానికి అప్పటికప్పుడు వాడేటప్పుడు జల్లెడ పట్టనవసరం లేదు.
- నీడలో ఆరబెట్టడం వలన "వర్మి కంపోస్టు" లో ఉండే పోషకాలు అలాగే నిలవ ఉంటాయి.
- ఆకుల మిశ్రమం, పేడ వాడటం వలన తయారయ్యే "వర్మి కంపోస్టు", చాలా నాణ్యత కలిగి, "టీ పొడి" రూపంలో కనిపిస్తుంది. దీనిని సంవత్సరకాలం పాటు ఇంటిలో కూడా నిల్వ ఉంచుకుని అంచెలంచెలుగా వాడుకోవచ్చు. ఎలాంటి వాసన కూడా రాదు.

వానపాముల ఎరువు తయారీలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

- కంపోస్ట్ బెడ్లలో ప్లాస్టిక్ పదార్థాలను గాజు ముక్కలు, రాళ్ళు, కోడిగుడ్ల పెంకులు తీసివేయాలి.
- పక్షులు, తొండలు, ఎలుకలు వానపాములను తినకుండా బెడ్‌పైన గడ్డితోగానీ, గోనె సంచిలో కప్పాలి.
- బెడ్లలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- తయారైన వర్మి కంపోస్ట్‌లో తగినంత తేమ ఉండే విధంగా నీడలో మాత్రమే ఆరబెట్టి నిల్వ ఉంచుకోవాలి.

వానపాముల ఎరువు పంటలకు వాడటం :

పూల మొక్కలకు, నర్సరీలకు, పెరటి తోటలకు, కొత్తగా నాటిన పండ్ల తోటలకు వర్మి కంపోస్టును ఉపయోగించడం ఎంతో మేలు. చిన్న కుండీలకు అందాసుగా 100 గ్రా., పెద్ద కుండీలకు 250 గ్రా. వాడవచ్చు. సంవత్సరానికి మూడు సార్లు వేయాలి. ఇక ఎలాంటి రసాయన మందులు వాడకూడదు. తోటలలోని చెట్లకు, చెట్టు వయస్సును బట్టి $^{1}/_{2}$-10 కిలోలు వేయాలి. వేరు ప్రాంతామునకు వేసి కలియబెట్టాలి. వర్మి కంపోస్టు అందుబాటులో ఉంటే ఆహార పంటలకు కూడా 1 ఎకరాకు 1-2 టన్నులు వేసుకోవచ్చు. మూడు నెలల వరకు నీటితో కలిసి ఎరువులోని పోషకాలు చెట్టుకు అందుతూనే ఉంటాయి. మొక్కలు ధృడంగా, కాంతిగా ఉంటాయి. పురుగులు, తెగుళ్ళ బారిన పడవు. పూలు, కాయలు నాణ్యతతో, ఎక్కువ నిల్వ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి.

వర్మి వాష్ తయారు చేయు విధానం - వాడకం :

వానపాముల శరీరముపై స్రవించే ద్రవాలు, వానపాముల క్యాస్టింగ్స్ మరియు కుళ్ళే చెత్త, ఇసుక, ఇటుకలు, గులకరాళ్ళు మొదలగు పొరల నుంచి జాలు వారే ద్రావణమునే "వర్మి వాష్" అంటాము. ఇది అధిక స్థాయిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, హార్మోన్లు, ఎంజైములు మరియు మేలు చేసే బాక్టీరియా కలిగి ఉండి, మొక్కల వేర్ల చుట్టూ ఉన్న లక్ష్య ప్రాంతాన్ని వర్మి కంపోస్ట్ కంటే త్వరగా చేరుకుంటుంది.

తయారు చేసే విధానం :

- 100 లీటర్లు లేదా 200 లీటర్ల పెద్ద ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములను సిమెంటు దిమ్మల మీద గానీ, బండల మీద గాని ఉంచాలి.
- అడుగు భాగంలో ఒక రంధ్రం చేసి దానికి ఒక కుళాయిని అమర్చాలి.
- డ్రమ్ అడుగు భాగాన 10 సెం.మీ. వరకు కంకర, తరువాత గులకరాళ్ళు వేయాలి.
- తదుపరి 15 సెం.మీ. వరకు ఇటుక రాళ్ళు అమర్చాలి.
- తరువాత 10 సెం.మీ. వరకు ఇసుక వేయాలి.
- తరువాత పొరగా 10 సెం.మీ. ఎత్తు ఎండిన ఆకులు, చెత్త వేయాలి.
- ఇంకొక పొరగా పశువుల ఎరువును (ఎఫ్.వై.యం.) 10 సెం.మీ. వరకు వేసుకోవాలి.
- తరువాత 10 సెం.మీ. పొరగా వర్మి కంపోస్టుతో దట్టంగా ఉన్న వానపాములను వేయాలి. (ఒక డ్రమ్ముకు దాదాపు 200)
- అన్ని పొరలు నింపిన తర్వాత పైన గోనె సంచులతో మూసివేయాలి.
- రోజూ నీరు రోస్ క్యాన్‌తో చిలకరించాలి.
- ఈ నీరు, వానపాములను వాష్ చేస్తూ, వర్మి క్యాస్ట్‌ను, ఇతర పొరలను దాటుకుంటూ ధారగా చుక్కచుక్కగా కారుతుంది.
- ఈ వర్మివాష్‌ను బకెట్స్‌లోకి గాని, వేరే డ్రమ్ములోకి గాని పట్టుకుని వాడుకోవాలి లేదా విక్రయించుకోవచ్చు.

వర్మి వాష్‌ను పూల చెట్లకూ, పండ్ల తోటలకూ, కిచెన్ గార్డెన్స్, టెర్రెస్ గార్డెన్స్‌కూ పాదిలో పోసేటప్పుడు 1:3 నిష్పత్తిలో (నీరు), చెట్టుకు పిచికారి లాగా అయితే 1:5 (నీరు) నిష్పత్తిలో వాడాలి,

వర్మి కంపోస్టు లాగా, వర్మి వాష్ కూడా నూటికి నూరుపాళ్ళు సేంద్రియ ఎరువు. ఇందులోని పోషకాలు, హార్మోన్లు, మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు, వానపాముల విసర్జితాలు కలిగి చెట్లు ఎదగడానికి, పురుగులు, తెగుళ్ళను అరికట్టడానికి, మంచి నాణ్యత కలిగిన దిగుబడిని అందించడానికి తోడ్పడతాయి.

వర్మి కంపోస్ట్ వలన కలిగే ప్రయోజనాలు – పరిమితులు – సవాళ్ళు :

- వర్మి కంపోస్ట్ ద్వారా ఎక్కువ పోషకాలతో పాటు ఇతర మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు మరియు నేల యొక్క నీటిని నిల్వ ఉంచే సామర్థ్యం హ్యూమస్ సమృద్ధిగా ఉండే ఎరువును ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.
- వర్మి కంపోస్ట్‌ను చిన్న స్థలంలో, ఇండోర్ లేదా ఔట్‌డోర్‌లో చేయవచ్చు.
- వానపాములు ఎక్కువ కాలం బాగా పని చేస్తాయి కాబట్టి, ఇది ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేకుండా కొనసాగించవచ్చు.

- వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడకుండా, సంవత్సరమంతా వర్మి కంపోస్టింగ్ చేయవచ్చు.
- వర్మి కంపోస్టింగ్ ద్వారా సేంద్రీయ వ్యర్థాల పరిమాణం తగ్గించవచ్చు. తద్వారా హానికరమైన హరితగృహ వాయువుల ఉద్గారాలను తగ్గించవచ్చు.

పరిమితులు మరియు సవాళ్ళు :

- వానపాములు, బెడ్డింగ్ పదార్థాలు మరియు పరికరాల కోసం కొంత పెట్టుబడి అవసరం.
- వానపాముల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహణ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- వర్మి కంపోస్టింగ్ చిన్న స్థాయిలో చేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది. కానీ వాణిజ్య స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున చేయడం కష్టం అవుతుంది.

వర్మి కంపోస్టింగ్ ఒక సహజ, పర్యావరణహిత మరియు స్థిరమైన సేంద్రీయ విధానం. ఇది సేంద్రీయ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగం చేయడంలో మరియు మొక్కలకు విలువైన ఎరువులను అందించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. కొన్ని పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ ఇది వ్యర్థాల నిర్వహణను మెరుగుపరచడంలో రైతులందరూ తేలికగా తయారు చేసుకోదగ్గ ఉత్తమమైన పద్ధతిగా నిలుస్తుంది.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ఆచార్యులు (కీటక శాస్త్రం) & అధిపతి, యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి – 517502

సెల్ నెం : 98487 43639

జీవన ఎరువులు – వ్యవసాయంలో వాటి ప్రాముఖ్యత

ప్రస్తుత వ్యవసాయ రంగంలో హరిత విప్లవం ద్వారా ఎంతో ప్రగతిని సాధించియున్నాము. హరిత విప్లవంలో మనం ప్రవేశ పెట్టిన హైబ్రిడ్ వంగడములు, రసాయనికి ఎరువుల వాడకంతో మంచి దిగుబడులు ఇవ్వడం కారణంగా నేటి వ్యవసాయంలో రసాయన ఎరువులు మరియు రసాయన మందులు వాడకం నానాటికి పెరుగుతూ ఉన్నది. దీని ప్రభావం మనకు తెలియకుండానే భూమిలో ఉన్న జీవరాసులపై అధికంగా ఉన్నది. అధిక రసాయన ఎరువులు వాడకం వలన భూమిలోని జీవరాశులలో అతి ముఖ్య సముదాయమైన సూక్ష్మ జీవులపై ప్రభావం పడి వాటి సంఖ్య తగ్గుతూ ఇవి జరిపే రసాయన చర్యలపై గణనీయమైన మార్పులు సంతరించుకొనుచు భూమికి ఉన్న సహజ గుణాలు మరియు నేల ఆరోగ్య పరిస్థితి నానాటికి క్షీణించుటకు దోహద పడుచున్నది.

వ్యవసాయంలో అధిక మొత్తంలో ఈ రసాయన ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు వాడకం వలన భూమిలోపల మరియు ఉపరితలంపై ఉన్న పర్యావరణం కాలుష్యం అగుటయేగాక రైతుకు పెట్టుబడి విషయంలో అధికమైన భారం కూడా పడుచున్నది. ఈ నేపధ్యంలో మన వ్యవసాయ రంగంలో సమన్వయ సమగ్ర భూసార సంరక్షణ పద్ధతి ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా గుర్తించటం జరిగింది. దీనిలో సేంద్రియ ఎరువులు వాడకంతో పాటు జీవన ఎరువుల వాడకం ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది. జీవన ఎరువులు అనగా భూమిలో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులలో మొక్కలకు పోషక పదార్థాలను మరియు పెరుగుదలకు ఉపయోగపడే హార్మోన్లను సమకూర్చే సూక్ష్మజీవుల సముదాయం. ఈ సూక్ష్మ జీవులు పంటకు కావాల్సిన పోషక పదార్థాలను ప్రకృతిలోని సహజసిద్ధమైన వనరుల నుండి అందించే గుణమును కలిగి ఉండును. దానికి అనుగుణమైన మార్పులను భూమిలో కలుగజేయును. జీవన ఎరువులు భూమిలో వేసినప్పుడు వాటిలో ఉన్న సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగి మొక్కలు చురుకుగా పెరగడానికి వివిధ పోషకాలతో పాటు అవసరమైన హార్మోన్లను, విటమిన్లను అందించును. జీవన ఎరువులు సహజ సిద్ధమైనవి. వాటి వలన వాతావరణ కాలుష్యం జరుగదు. పంటకు హాని చేయవు. వీటి వాడకం ద్వారా రసాయన ఎరువుల మోతాదు కొంత మేర తగ్గును. తక్కువ ఖర్చుతో అధిక ఫలితం పొందవచ్చును.

వీటిలో ముఖ్యమైనవి

(ఎ) నత్రజనిని స్థిరీకరించే జీవన ఎరువులు

1. రైజోబియం
2. అజటోబాక్టర్
3. అజొస్పైరిల్లమ్
4. నీలి ఆకుపచ్చ నాచు
5. అజొల్లా
6. అసిటోబాక్టర్
7. ఫ్రాంకియా

రైజోబియం : లెగ్యూమ్ జాతి పంటలు అనగా అపరాల (పప్పుజాతి) పంటలకు నత్రజని అందించు జీవన

ఎరువుగా వాడవలెను. పప్పుజాతి పైర్లలో ముఖ్యమైన కంది, పెసర, మినుము, శనగ వంటి పైర్లకు, వేరుశనగ, సోయాచిక్కుడు వంటి నూనె గింజల పైర్లకు రైజోబియం కల్చర్‌ను విత్తనమునకు పట్టించి ఉపయోగించవలెను. దీనిని ఉపయోగించుట వలన మొక్క వేర్లపై లేత గులాబి రంగు కలిగిన బుడిపెలు ఏర్పడతాయి. ఈ బుడిపెలలో ఉన్న రైజోబియం గాలిలోని నత్రజనిని స్థిరీకరించి మొక్కలకు అందించును. ఈ రైజోబియం కల్చర్ ఒక్కొక్క పంటకు ప్రత్యేకమైన స్ట్రైన్ ఉండును. కావున రైతు ఏ పంట వేయునో ఆ పంటకు నిర్దేశించబడిన రైజోబియం మాత్రమే వాడవలెను.

ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పండించే రాజ్మా పంటకు అనువైన రైజోబియం జాతి సూక్ష్మ జీవిని (రైజోబియం లెగ్యుమినోసెరం, ఫాజియోలై) కొత్తగా కనుక్కొని రైతులకు అందుబాటులోనికి తీసుకురావటం జరిగింది. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లిలో ఈ జీవన ఎరువు అందుబాటులో ఉంది, ఈ జీవన ఎరువును విత్తనశుద్ధి (కిలో విత్తనానికి 10 మి.లీ.) ద్వారా రాజ్మా పంటకు ఉపయోగించవచ్చును.

ఉపయోగించు విధానం : 100 మి.లీ. నీటిలో 10 గ్రా.ల పంచదార లేదా బెల్లం లేదా గంజి పొడరును కలిపి 10 నిమిషాలు మరగబెట్టి చల్లార్చవలెను. ఈ చల్లార్చిన ద్రావణం 10 కిలోల విత్తనాలపై చల్లి దానికి 200 గ్రా. ల రైజోబియం కల్చర్ పొడిని బాగా కలియబెట్టి విత్తనం చుట్టూ పొరలా ఏర్పడేటట్లు జాగ్రత్త వహించవలెను. ఈ ప్రక్రియను రైతులు పాలిథన్ సంచినిగాని, ప్లాస్టిక్ తొట్టిని గాని ఉపయోగించి చేసుకొనవచ్చును. పట్టించిన విత్తనాలను 10 నిమిషాలు నీడలో ఆరబెట్టి తరువాత పొలంలో నాటుకొనవలెను.

రైజోబియం జీవన ఎరువు తప్పనిసరిగా వాడవల్సిన అవశ్యకత

1. కొత్తగా లెగ్యూమ్ జాతి పంటను పొలంలో వేసేటప్పుడు
2. గతంలో లెగ్యూమ్ జాతి పంట వేసినప్పటికి తగినన్ని వేరు బుడిపెలు (నాడ్యూల్స్) ఏర్పడనప్పుడు
3. పంట మార్పిడి పద్ధతిలో లెగ్యూమ్ జాతి పంటకు ముందు మరియు ఏ ఇతర జాతి పంటలను వాడియున్నయెడల
4. వాతావరణ పరిస్థితులు రైజోబియం (జీవన ఎరువు) బ్రతికి ఉండుటకు అనుకూలించనప్పుడు అనగా:
   ఎ. అధిక ఆమ్ల / క్షార భూములు అయిన యెడల
   బి. మురుగు నీరు నిల్వ ఉన్న పొలంలో (వరదలు వచ్చినప్పుడు)
   సి. అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతాలలో

అజటోబాక్టర్ : పప్పుజాతి పంటలను మినహాయించి మిగతా అన్ని పంటలకు నత్రజని జీవన ఎరువుగా ఉపయోగపడును. ఈ బాక్టీరియా నత్రజనిని స్థిరీకరించుటయే కాక మొక్కకు కావల్సిన హార్మోన్లను మరియు విటమిన్‌లను అందించును. ఈ బాక్టీరియా ముఖ్యంగా సేంద్రియ కర్బనం ఎక్కువగా ఉన్న భూమిలో సమర్థవంతంగా పనిచేయును. అందువలన ఈ జీవన ఎరువు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మరియు పూల తోటలకు సిఫారసు చేయబడుచున్నది.

వాడే విధానం : ఏ పంటకు వాడిన గాని 2 కిలోల కల్చర్‌ను 200 కిలోల సేంద్రియపు ఎరువుతో కలిపి విత్తనం నాటే సమయంలో ఒక ఎకరం నేలపై వెదజల్లవలెను. ఇది చల్లిన సమయంలో కాని, వెనువెంటనే కాని భూమిలో తగినంత తేమ ఉండునట్లు జాగ్రత్త తీసుకొనవలెను.

అజోస్పైరిల్లమ్ : ఈ మధ్య కాలంలో దీని ప్రాముఖ్యత అధికంగా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ బాక్టీరియా మొక్క వేర్లు చుట్టూ పెరుగుతూ అవకాశమున్న చోట వేర్లలోకి చొరబడి కూడా జీవిస్తాయి. ఈ కారణంగా ఈ జీవన ఎరువు స్థిరీకరించిన నత్రజని నేరుగా మొక్కకు ఎక్కువ శాతం అందుబాటులో ఉండును.ఈ జీవన ఎరువును లెగ్యూమ్ జాతి పంటలకు తప్పించి మిగతా పంటలకు వాడుకొనవచ్చును. ఇది వరి, చెఱకు, ప్రత్తి, మిర్చి, జొన్న, సజ్జ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, అరటి మొదలైన పంటలకు బాగా ఉపయోగపడును. సేంద్రియ పదార్థం తక్కువగా ఉన్న నేలలో కూడా ఇది పని చేయును.

ఉపయోగించు విధానము : తక్కువ కాలం పంటలకు 2 కిలోల అజోస్పైరిల్లమ్ కల్చర్‌ను 200 కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి ఒక ఎకరం పొలంలో విత్తనము క్రింద పడేటట్లు వేసుకొనవలెను. నారుమడి వేసుకొనే పంటలకు నారు పీకుటకు ముందుగా నారుమడి వద్ద 70 నుండి 80 లీటర్లు పట్టే చిన్న మడిని తయారు చేసుకొనవలెను. ఆ నీటిలో 2 కిలోల అజోస్పైరిల్లమ్ జీవన ఎరువును బాగుగా కలిపి ఆ ద్రావణంలో 10 నిముషాలు వేర్లను మాత్రమే ముంచి వెంటనే నాటుకొనవలెను. చెఱకు పంట విషయంలో నాటే విత్తనపు చెఱకు ముచ్చెలను 10 నిమిషాలు ముంచి నాటుకోవలెను.

నీలి ఆకుపచ్చనాచు (సైనొబాక్టీరియా)

ఇది వరికి మాత్రమే ఉపయోగపడే నత్రజనికి సంబంధించిన జీవన ఎరువు. ఈ జీవన ఎరువులో ముఖ్యంగా నాస్టాక్, ఎనాబినా, టాలిఫోథ్రిక్స్ మొదలగు సైనో బాక్టీరియాల సముదాయము ఉండును. రైతులు వరి పంటకాలంనకు ముందుగా చిన్న చిన్న మడులలోగాని, తొట్టెలలోగాని పెంచుకొని వరినాట్లు వేసిన తరువాత దీనిని వాడుకొనవచ్చును. ఈ జీవన ఎరువును 3-4 పంట కాలాలకు వరుసగా వేస్తే ఆ తరువాత నుండి వేయనవసరం లేదు.

వాడే విధానం : ఒక ఎకరం పొలంలో వరినాట్లు వేసిన 3 నుండి 7 రోజుల వ్యవధిలో 4 నుండి 6 కిలోల ఈ జీవన ఎరువును 40-50 కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి చల్లుకోవలెను. ఇది వేసిన 15-20 రోజులలో ఈ నాచు మందముగా, చాపలా అల్లుకుపోయిన తరువాత నీరు తీసివేసి నేలను తాకిన నాచును మట్టిలో కలిసేటట్లు చేయవలెను. ఈ జీవన ఎరువు స్థిరీకరించిన నత్రజని మొక్కకు అందుటయేగాక ఈ నాచు సేంద్రియ పదార్థంగా కూడా మొక్కకు ఉపయోగపడును.

రైతులు తయారు చేసుకునే విధానం : ముందుగా తయారు చేసుకున్న నేలను మంచిగా చదునుపర్చుకొని 20×2 మీ. వైశాల్యంగల మడులుగా తయారు చేసుకొని వాటికి గట్లను, నీటి కాలువలను ఏర్పరచుకోవలెను.

10 సెం.మీ. లోతు నీటిని ఉంచి దీనిలో 2 కిలోలు సూపర్ ఫాస్ఫేట్‌ను వేయవలెను. ఆ తరువాత 5 కిలోల కల్చర్‌ను సమానంగా చల్లుకోవలెను. చీడపీడలు రాకుండా 200 గ్రా.లు కార్బోఫ్యూరాన్ గుళికలను చల్లవలెను. 10 సెం.మీ. నీటిమట్టం ఎల్లప్పుడు ఉండునట్లు జాగ్రత్త వహించవలెను. 15 రోజులలో మనకు మందమైన నాచు పొర ఈ నీటిపై ఏర్పడును. ఆ సమయంలో నీటిని పూర్తిగా తీసివేసి మడిని ఎండబెట్టిన మనకు ఎండిన ఆల్గేను పెచ్చులు మాదిరిగా తీసినచో ఒక్కొక్క మడి నుండి 30-40 కిలోలు లభ్యమగును.

అజొల్లా : ఈ జీవన ఎరువు నీటిపై తేలి ఆడుతూ వరి పొలంలో పెరిగే ఫెర్న్ జాతి చిన్న మొక్క అయిన అజోల్లా - అనాబినా అనే సైనో బాక్టీరియాకు ఆశ్రయం కలిపించి నత్రజనిని స్థిరీకరించి వరి పైరుకు అందుబాటులో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ జీవన ఎరువు ఒక నత్రజని మాత్రమే గాక, సేంద్రియ కర్బనం మరియు పొటాషియం వరి పైరుకు అందించును. ఇది భూమి యొక్క భౌతిక గుణాలను, భూసారం పెంపొందించును. ఈ జీవన ఎరువు ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండి, తగినంత నీటి వసతి, భాస్వరపు పోషకం ఉన్నచోట బాగా పెరుగును.

వాడే విధానం : వరి నాటిన వారం తరువాత సుమారు 200 కిలోల అజోల్లా జీవన ఎరువును ఒక ఎకరంలో వెదజల్లి 15 నుండి 20 రోజులు నీటిపై బాగా పెరగనివ్వవలెను. తరువాత నీటిని తొలగించినచో ఇది 3-4 రోజులలో కుళ్ళిపోయి నత్రజనిని మరియు ఇతర పోషకములను మొక్కకు అందించును. అవకాశమున్న రైతులు దీనిని పచ్చిరొట్ట ఎరువుగా పెంచి దమ్ములో కలియ దున్నినచో దీని ఉపయోగం మరింత బాగా ఉండును. అంతేకాక చిన్న, చిన్న తొట్టెలలో పెంచిన అజోల్లాను బయటకు తీసి ఎండబెట్టి పొడిగా చేసి పశువుల దాణాలో కలిపి పశువుకు తినిపించడం వలన పాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగును.

అసిటో బాక్టర్ : ఇది చెఱకు మరియు షుగర్ బీట్ వంటి పంటలకు మాత్రమే నత్రజని జీవన ఎరువుగా ఉపయోగపడును. ఈ జీవన ఎరువుకు నేరుగా మొక్కల వ్రేళ్ళల్లోనే గాక మొక్కల పై భాగముల పైనను కూడా జీవించి నత్రజనిని స్థిరీకరించి మొక్కలకు అందించును. అంతేకాక నాఫ్థలీన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ (ఎన్.ఎ.ఎ.) అనబడే హార్మోను అధికంగా ఉత్పత్తి చేసి మొక్క పెరుగుదలకు దోహదపడును.

వాడే విధానం : ఒక ఎకరం చెఱకు పంటకు 4 కిలోల జీవన ఎరువును రెండు దఫాలుగా వాడవలెను. ముచ్చెలు నాటేటప్పుడు 2.0 కిలోలు మరియు మోకాలు ఎత్తు పంట అయిన తరువాత 2.0 కిలోలు, 200 కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి వాడవలెను.

ఫ్రాంకియా : ఇది ఎక్టినోమైసిటిస్ జాతికి చెందిన సూక్ష్మ జీవి. దీనిని సరుగుడు చెట్లకు మాత్రమే నత్రజనిని స్థిరీకరించే జీవన ఎరువుగా వాడుకోవలెను. ఇది సరుగుడు చెట్లు వేర్లపై పెద్ద సైజు బుడిపెలు ఏర్పరచి అధిక మోతాదులో నత్రజనిని స్థిరీకరించి మొక్కకు అందించును.

వాడే విధానం : సరుగుడు మొక్కలను భూమిలో నాటేటప్పుడు రైతులు ముందుగా పాత మొక్కల వేర్లపై ఉన్న

బుడిపెలను సంగ్రహించి, వాటిని ఒక పాత్రలో మెత్తగా నలగగొట్టి నీటితో బాగా కలిపి ద్రావణం తయారు చేసుకోవలెను. ఈ ద్రావణంను కొత్త మొక్కలు నాటే ప్రతి మొక్కకు 500 మి.లీ. చొప్పున పోసి నాటుకోవలెను.

బి. భాస్వరంను అందించే జీవన ఎరువులు

పంట మొక్కలకు వేసిన లభ్య భాస్వరం, భూమిలో చేరి కొద్ది రోజుల వ్యవధిలో భూమి యొక్క ఉదజని సూచకను అనుసరించి, వివిధ రకములైన లభ్యంకాని భాస్వరపు రూపంలోనికి మారిపోవును. ఉదాహరణకు భూమి ఆమ్లగుణము కలిగియున్నచో, వేసిన భాస్వరం, ఐరన్ లేదా అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్‌లుగా మారిపోయి మొక్కకు లభ్యం కాకుండా ఉండును. ఒకవేళ భూమి క్షార గుణము కలిగి ఉన్నప్పుడు వేసిన భాస్వరం, కాల్షియం లేదా మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్స్‌గా మారి మొక్కకు లభ్యంకాదు. ఈ పరిస్థితులలో భాస్వరంనకు సంబంధించి జీవన ఎరువులు వేసినచో లభ్యంకాని రూపంలో ఉన్న భాస్వరంను మొక్కకు లభ్యమయ్యే స్థితికి తెచ్చును.

వీటిలో ముఖ్యంగా వాడుకలో ఉన్నవి

1. ఫాస్ఫేట్ సాల్యుబులైజింగ్ బాక్టీరియా (ఫాస్పో బాక్టీరియా)
2. ఫాస్ఫేట్ సాల్యుబులైజింగ్ ఫంగై (ఫాస్పోఫంగై)

ఫాస్పోబాక్టీరియా : ఈ జీవన ఎరువు ముఖ్యంగా బాసిల్లస్ మెగథీరియంతో గాని, సూడోమోనాస్‌ను గాని ఉపయోగించి తయారు చేయబడును. ఈ జీవన ఎరువు భూమిలోని మొక్కలకు లభ్యం కాని రూపంలో ఉన్న భాస్వరంను, లభ్యమగు రూపంలోకి మార్చును. ఈ జీవన ఎరువును అన్ని పంటలకు వాడుకొనవచ్చు. ఈ జీవన ఎరువు సమర్ధవంతంగా పనిచేయుటకు సేంద్రియ కర్బనము అత్యవసరం. కావున ఈ జీవన ఎరువుతో తప్పని సరిగా సేంద్రీయ ఎరువును వాడవలెను. ఈ జీవన ఎరువు మొక్కకు భాస్వరంను లభ్యపరుచుటయే గాక మొక్కలకు కావాల్సిన హార్మోన్లను కూడా సరఫరా చేయును. మొక్కలకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించును. దీని వల్ల పంట దిగుబడి పెరుగును.

వాడే విధానం : ఎకరాకు 2.0 కిలోల ఫాస్పోబాక్టీరియాను, 200 కిలోల పశువుల ఎరువుతో కలిపి దుక్కిలోగాని, మొక్క నాటినప్పుడు గాని సాళ్ళలో పడేటట్లు వేసుకొనవలెను. వరి విషయంలో నాట్లు వేసిన 3 నుండి 7 రోజుల వ్యవధిలో వేసుకొనవలెను. ఈ జీవన ఎరువులు వాడే సమయంలో పొలంలో తగినంత తేమ ఉండునట్లు జాగ్రత్త తీసుకోవలెను.

ఫాస్పోఫంగై : ఈ జీవన ఎరువు ఆస్పర్జిల్లస్ అవమోరి లేదా పెనిసీలియం డిజిటోటమ్‌ను ఉపయోగించి తయారు చేయబడును. ఫాస్పోబాక్టీరియం కన్నా శక్తివంతమైన జీవన ఎరువు. దీనిని అన్ని పంటలకు వాడుకొనవచ్చును. ఇది నేలలో చేసే జీవప్రక్రియ ద్వారా ఎక్కువ శాతం లభ్య భాస్వరం మొక్కకు దొరుకును.

వాడే విధానం : ఎకరానికి 2.0 కిలోల జీవన ఎరువును 200 కిలోల సేంద్రీయ ఎరువుతో కలిపి విత్తనం నాటే సాళ్ళలో పడేటట్లు వేసుకోవలెను.

ఫాస్పేటు మొబిలైజింగ్ మైకోరైజా : ఇది శిలీంధ్రపు జాతికి చెందిన జీవన ఎరువు. మొక్క వేర్లు చొరలేని భూమి అడుగు పొరలలోనికి చొచ్చుకొనిపోయి మొక్కలకు ముఖ్యంగా భాస్వరంతోపాటు సూక్ష్మపోషకాలైన జింకు, కాపర్, సల్ఫర్, మాంగనీసు, ఇనుము మొదలగు వాటిని నీటితో సహా అందించును. మైకోరైజా వాడిన మొక్కలలో నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోవటం, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగటం గమనించవచ్చు. భూమిలో నెమటోడ్ల బెడదను ఈ శిలీంధ్రం ద్వారా మొక్కలకు తప్పించవచ్చును. ఈ జీవన ఎరువు ముఖ్యంగా గ్లోమస్ లేదా గైగాస్పారా అనే శిలీంధ్రములతో తయారవును.

వాడే విధానం : ఈ జీవన ఎరువుకు సరియైన నిర్దిష్ట పరిమాణములు లేని కారణం వలన కనీసం 5 కిలోలను ఒక ఎకరం భూమికి వేయవలసి ఉంటుంది. రైతులు నారుమడి వేసి పండించే పంటలకు దీనిని సులభంగా వాడుకొనవచ్చును. తప్పనిసరిగా విత్తనం / మొక్క క్రింద మాత్రమే పడేటట్లు ఈ జీవన ఎరువును వాడవలెను.

సి. పొటాషియం మొబిలైజర్స్ : ఈ జీవన ఎరువు భూమిలో మొక్కకు అందుబాటులో లేని పొటాషియంను అందుబాటులోకి తెచ్చును. ఇవి ఇటవల కాలంలోనే పరిగణలోనికి తీసుకొనబడినవి. వీటిలో ముఖ్యంగా "ఫ్రటూరియా అరాన్షియా" అనే బాక్టీరియా పొటాషియం మోబిలైజర్స్‌గా ఇవ్వబడుచున్నది. దీనితోపాటు కొన్ని బాసిల్లస్ జాతులు కలిపి మిశ్రమంగా తయారు చేయుచున్నారు.

వాడే విధానం : 2.0 కిలోల జీవన ఎరువును 200 కిలోల సేంద్రియ ఎరువుతో కలిపి ఒక ఎకరం భూమిపై వెదజల్లవలెను. నూనె పంటలలో దీని ప్రభావం బాగా కనబడుచున్నది.

డి. జింక్ సాల్యూబులైజర్ : ఈ జీవన ఎరువు కొన్ని బాసిల్లస్ స్పీసిస్ ఉపయోగించి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ప్రైవేటు సంస్థలు తయారు చేయుచున్నవి. దీని ప్రభావం వరి, మొక్కజొన్న వంటి పంటలపై కొంతమేరకు చూడవచ్చును.

ఇ. మొక్క పెరుగుదలను అభివృద్ధి పరచే జీవన ఎరువు (పి.జి.పి.ఆర్.) : ఈ జీవన ఎరువు ఒక మిశ్రమ సముదాయంతో కూడుకున్నది. ముఖ్యంగా బాసిల్లస్ జాతి బాక్టీరియాలను మరియు సూడోమోనాస్ జాతి బ్యాక్టీరియాలను ఒక మిశ్రమంగా తయారుచేసి పి.జి.పి.ఆర్. జీవన ఎరువుగా అందించుచున్నారు. మొక్కకు పోషకాలు అందించుటతోపాటు ఈ జీవన ఎరువులు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించును. మొక్కల పెరుగుదలకు ఉపయోగపడే హార్మోన్లను, విటమిన్‌లను అందించును. భూమిలోని మొక్కలకు, తెగుళ్ళు కలుగచేసే శిలీంధ్రాలను పెరగకుండా అరికట్టును. వాటిలో కొన్నింటిని జీవనియంత్రణ కారులుగా నిర్దేశించడమైనది.

వాడే విధానం : ఒక ఎకరాకు రెండు కిలోలు ఈ జీవన ఎరువును 200 కిలోలు పశువుల ఎరువుతోగాని, వానపాముల ఎరువుతోగాని విత్తనం నాటుకునే సమయంలో వెదజల్లవలెను. అవసరమైనప్పుడు ఒకసారి పైరుపై సాయంత్రపు వేళ పిచికారీ కూడా చేయవచ్చును. పిచికారీ ద్రావణములో ఏదైనా ఎమల్సిఫయిర్ (emulsifier) కలుపవలెను.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన పంటలకు అవసరమైన ముఖ్య జీవన ఎరువులు మరియు వాటి మోతాదు

పంట	విస్తీర్ణం (హె.)	మోతాదు (కి./హె.)	అవసరమైన జీవన ఎరువులు (టన్నుల్లో)				
			అజోస్పైరిల్లమ్ అజటోబాక్టర్	ఫాస్ఫో బాక్టీరియా	పొటాష్ బాక్టీరియా	రైజోబియం	మైకోరైజా
వరి	370	అజోస్పైరిల్లమ్/ అజటోబాక్టర్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	1850	1850	1850	–	4625
జొన్న	300	అజోస్పైరిల్లమ్/ అజటోబాక్టర్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	1580	1580	1580	–	3750
మొక్కజొన్న	513	అజోస్పైరిల్లమ్/ అజటోబాక్టర్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	2565	2565	2565	–	6413
అపరాలు	1290	ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., రైజోబియం 1.25 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	–	3010	3010	1665	16125
వేరుశనగ	1290	ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., రైజోబియం 1.25 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	–	3225	3225	3225	16125
ఇతర నూనె పంటలు	203	అజటోబాక్టర్/ అజోస్పైరిల్లమ్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	1015	1015	1015	–	2538
చెఱకు	170	అజోస్పైరిల్లమ్ /అజటోబాక్టర్ 10 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 10 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 10 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	1740	1740	1740	–	2175
మిర్చి	205	అజోస్పైరిల్లమ్/ అజటోబాక్టర్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	1525	1525	1525	–	3813
ప్రత్తి	905	అజోస్పైరిల్లమ్/ అజటోబాక్టర్ 5 కి./హె., ఫాస్ఫోబ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., పొటాష్ బ్యాక్టీరియా 5 కి./హె., మైకోరైజా 12.5 కి./హె.	2263	2263	2263	–	11313
అవసరమైన జీవన ఎరువుల మొత్తము టన్నులలో 1,19,142			12538	18773	16064	4890	66877

ద్రవ రూపంలో రూపొందించబడిన జీవన ఎరువులు

పొడి రూపములో లభ్యమవుతున్న పైన వివరించిన జీవన ఎరువులలో ఉన్న సాధక బాధలను గుర్తించి అమరావతి వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానంలో పరిశోధనా ఫలితముగా వెలువడిన ద్రవ రూపంలోని జీవన ఎరువులు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకొనుచున్నవి. ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు రూపొందించిన ఈ ద్రవ రూపంలోని జీవన ఎరువులు పొడి రూపంలో తయారవుతున్న జీవనఎరువుల కన్నా ఎంతో మంచి ఫలితాలు అందజేయుచున్నవి. ద్రవ రూపములోనున్న ఈ జీవన ఎరువులు తయారుచేయునప్పుడు అనేక సేంద్రియ రసాయన పదార్థములు కలిపి ఎక్కువ కాలము నిల్వ ఉండే విధముగా తయారు చేయడమైనది. అధిక సంఖ్యలో పంట పొలమునకు కావలసిన ఈ జీవన ఎరువుల బ్యాక్టీరియా కణములు (10^8/మి.లీ.) లభ్యమగును. ఈ ద్రవరూప జీవన ఎరువులు రాబోయే కాలంలో మంచి నాణ్యత కలిగి సత్ఫలితములను అందించును.

వాడవలసిన మోతాదు : ఒక ఎకరం పొలమునకు 500 మి.లీ. ప్రతి ఒక్కొక్క రకపు జీవన ఎరువును మిశ్రమ ద్రావణముగా చేసి వాడవలెను.

వాడవలసిన పద్ధతి :

విత్తనమునకు పట్టించే పద్ధతి : ఒక కిలో విత్తనమునకు 8-10 మి.లీ. జీవన ఎరువును సమాన మోతాదులో విత్తనము చుట్టూ సమానముగా పట్టునట్లు కలపవలయును. తరువాత 10 నిమిషములు నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకొనవలెను.

భూమిలో వేసే పద్ధతి : ఒక ఎకరము పొలమునకు 500 మి.లీ. ప్రతి ఒక్కొక్క రకపు జీవన ఎరువును తీసుకొని 10 లీటర్ల సాధారణ నీటితో కలిపి, దాదాపు 100-200 కిలోల పశువుల ఎరువుతో గాని, వానపాముల ఎరువుతో గాని లేదా మరి ఏ ఇతర సేంద్రియ ఎరువుతో గాని కలిపి విత్తనము నాటే సాళ్ళలో పడేటట్లు వేసుకొనవలెను. ఎట్టి పరిస్థితులలోను పంట పొలములో చేపట్టే మొదటి అంతరకృషి చేయుటకు ముందుగా జీవన ఎరువులు వాడుట ముగించవలెను.

నారును ముంచి వాడే పద్ధతి : ఈ పద్ధతి ముఖ్యముగా అజొస్పైరిల్లమ్ అనే జీవన ఎరువు వాడుకోడానికి ఉపయోగపడును. 500 మి.లీ. అజొస్పైరిల్లమ్ జీవన ఎరువును 70 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నారుమడిలో చిన్న కుంట చేసి దానిలో పోయవలయును. ఈ నీటిలో పీకిన నారు యొక్క వేర్లను 10 నిమిషములు ముంచి నాట్లు వేసుకొనవలెను.

డ్రిప్ పద్ధతిలో నీటిని పెట్టే పంటకు : 500 మి.లీ. ప్రతి ఒక్కొక్క రకపు జీవన ఎరువును తీసుకొని డ్రిప్ ట్యాంక్‌లో కలిపి మొక్కలు నాటిన వారం రోజులలోపు వేసుకొనవలెను.

ద్రవ రూపములో నున్న ఈ జీవన ఎరువుల వలన లాభములు :

1. ఎక్కువ కాలము అనగా 12 నుండి 18 నెలలు నిల్వ ఉండును.
2. గడువు తేదీ వరకు అధిక సంఖ్యలో బ్యాక్టీరియా ఉండును.
3. ఇతర బ్యాక్టీరియా కలుషితము ఉండదు.
4. తేలికగా ఎక్కువ భూమి విస్తీర్ణమునకు తక్కువ సమయంలో ఉపయోగించవచ్చును.
5. తేలికగా పంట యొక్క వేర్ల చుట్టూ ఉన్న వాతావరణముతో సమన్వయ సంబంధము ఏర్పరచుకొని అధిక సంఖ్యలో పెరుగును.

6. ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క అధిక ఉష్ణోగ్రతలు మరియు ఇతర వాతావరణ ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని పెరుగును.
7. ఈ టెక్నాలజి ద్వారా తేలికగా ఎక్కువ పొలమునకు తక్కువ సమయంలో జీవన ఎరువులను నేరుగా మొక్క వేర్ల దగ్గర చేరునట్లు వేయవచ్చును.
8. పంట పెరుగుదల మరియు ఉత్పత్తి అధికముగా ఉండును.
9. సేంద్రీయ వ్యవసాయములో పంటకు కావలసిన పోషకములను సమకూర్చడంలో ఈ ద్రవజీవన ఎరువులు ప్రధాన పాత్ర వహించును.

వేస్టు డీకంపోసర్ : వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థములను ఎరువుగా మార్చే సూక్ష్మజీవుల సముదాయము.

వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు అనగా పంట నూర్పిడి మరియు పంట కోసిన తరువాత పొలములో మిగిలిపోయిన పదార్థములు. ఉదా : వరి గడ్డి, మొక్కజొన్న మరియు జొన్న సొప్ప, ప్రత్తి కట్టె, మిరప కట్టె, కంది కట్టె, బొప్పాయి చెట్టు కాండము, అరటి కాండము మరియు ఆకులు మొదలగు వ్యర్థ పదార్థములు. ఇవి సాధారణంగా రైతులు పొలములో వదిలి వెయ్యడమో లేదా కాల్చడమో చేస్తుంటారు. ఈ వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థములను కూడా రైతులు ఎరువుగా మార్చి, తిరిగి పొలములో వేసుకునే ప్రక్రియనే కుళ్ళపెట్టే ప్రక్రియ అని అంటారు. ఈ ప్రక్రియను "కంపోస్టింగ్" అని పిలుస్తారు మరియు కంపోస్టింగ్ యొక్క తుది ఉత్పత్తిని "కంపోస్ట్" అని పిలుస్తారు.

కంపోస్టింగ్ అనేది నియంత్రిత పరిస్థితులలో వివిధ రకాల సూక్ష్మజీవుల చేత వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు కుళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. పంట అవశేషాలు, జంతు వ్యర్థాలు, ఆహార చెత్త, కొన్ని గ్రామ మరియు పట్టణ నివాసితుల (మున్సిపల్) వ్యర్థాలు మరియు తగిన పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు వంటి ముడి సేంద్రీయ పదార్థాలను, కంపోస్టింగ్ చేసిన తర్వాత, కంపోస్ట్ ఎరువుగా మారి నేలకు పోషకాలను అందించి, నేల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలలో లిగ్నిన్, హెమి సెల్యులోస్, సెల్యులోస్, చక్కెర, కొవ్వు మరియు ప్రోటీన్స్ మొదలగు పదార్థాలు నేరుగా మొక్కలకు పోషకాలు అందించలేవు. ఇవి సంక్లిష్టమైన పదార్థాలు. ఇవి సరళ పదార్థాలుగా మారినప్పుడు మాత్రమే, పోషకాలు మొక్కలకు అందగలవు. అందుకే వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను కుళ్ళబెట్టాల్సిన అవసరము ఉంది. వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను (వరి గడ్డి, సొప్ప, ప్రత్తి కట్టె, మిరప కట్టె, కంది కట్టె, అరటి మరియు బొప్పాయి కాండాలు మొదలగు వ్యర్థ పదార్థములు) ముడి సేంద్రీయ పదార్థాలను పూర్తి చేసిన కంపోస్ట్‌గా విచ్ఛిన్నం చేయడం – ఇది క్రమంగా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ, దీనిలో సేంద్రీయ పదార్థం కంపోస్ట్‌గా మారడానికి రసాయన మరియు జీవ ప్రక్రియలు రెండూ జరగాలి.

ఆంగ్రూ వేస్ట్ డీకంపోసర్

డి కంపో – ఎ : ఇది నాలుగు రకాల శిలీంధ్రాల సముదాయము

డి కంపో – బి : ఇది ఐదు రకాల బాక్టీరియాల సముదాయము

మోతాదు :

ఒక టన్ను వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలకు /ఒక కిలో డి కంపో –ఎ మరియు ఒక కిలో డి కంపో – బి.

వాడే విదానము :

ఆంగ్రూ వేస్ట్ డికంపోసర్ (ఒక కిలో డి కంపో –ఎ మరియు ఒక కిలో డి కంపో –బి) 50 కిలోల బాగా చితికిన పశువుల ఎరువులో కలపాలి. (కుళ్ళ బెట్టడానికి కావాల్సిన గుంతల పరిమాణము – ముందుగా 4.5 – 5.0 మీటర్ల పొడవు, 1.5–2.0 మీటర్ల వెడల్పు మరియు 1.0 – 1.5 మీటర్ల లోతు గుంత ఏర్పాటు చేసుకోవాలి లేదా గుంతల పరిమాణము సౌకర్యాన్ని బట్టి నిర్మించికోవాలి). వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను (వరి గడ్డి, జొన్న లేదా మొక్క జొన్న సొప్ప, ప్రత్తి కట్టె, మిరప కట్టె, కంది కట్టె మొదలగు వ్యర్థ పదార్థములు) వీలైతే చిన్న చిన్న

ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొన్న వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను నీళ్ళు చల్లి కుప్ప వేసుకోవాలి. ఒక రోజు నాన బెట్టిన తరువాత రోజు కుప్ప వేసుకొన్న వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను, 25 సెం.మీ. మందముతో గుంతలో పరచాలి. డి కంపో –ఎ మరియు (శిలీంద్రాల సూక్ష్మజీవులు) మరియు డి కంపో – బి (బాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు) బాగా చితికిన 50 కిలోల పశువుల ఎరువులో కలిపిన మిశ్రమాన్ని వ్యర్థ పదార్థాల మీద చల్లాలి. కొద్దిగా నీటిని తేమ కోసం పిచికారి చేయాలి. దాని మీద ఇంకొక 25 సెం.మీ. మందముతో తిరిగి వ్యర్థ పదార్థాలను వేసుకొని డి కంపో –ఎ మరియు డి కంపో – బి మిశ్రమాన్ని చల్లాలి. ఈ విధముగా 2 – 3 పొరలు వేసుకోవాలి. కుళ్ళ బెట్టడానికి ఉపయోగించే వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాల మీద 60 శాతం నీరు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి (నీరు ఎక్కువ కాకుండా అంటే కారేటట్లుగా మరియు తక్కువగా అంటే ఎండి పోయేటట్లుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి). ఏడు రోజుల కొకసారి, కిందికి పైకి తిప్పాలి. తేమ శాతము తక్కువైతే, నీటిని పిచికారి చేసుకోవాలి. ఒకవేళ గుంతలు లేని చోట, వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలకు, 50 కిలోల పశువుల ఎరువులో కలిపిన ఒక కిలో డి కంపో –ఎ మరియు ఒక కిలో డి కంపో – బి ని కలిపి, కొద్దిగా నీళ్ళు చల్లి, కుప్ప లాగా వేసుకోవాలి (పోగేసుకోవాలి). వీలైతే వారానికి ఒకసారి కిందికి పైకి తిప్పుకొని, తేమ శాతము తక్కువైతే, నీటిని పిచికారి చేసుకోవాలి. తిరిగి కుప్ప లాగా వేసుకోవాలి (పోగేసుకోవాలి). 40–65 రోజులలో కంపోస్ట్ తయారవుతుంది.

సూచన : గుంతలు లేని చోట, ప్లాస్టిక్ కంపోస్ట్ సంచులు మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో కూడా కంపోస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు .

వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను పొలములో కుళ్ళబెట్టే పద్ధతి :

పంటకోత తరువాత, పొలములో వచ్చే వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు పొలములోనే కుళ్ళ బెట్టుకోవచ్చు. డి కంపో –ఎ మరియు (శిలీంద్రాల సూక్ష్మజీవులు) మరియు డి కంపో – బి (బాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు) బాగా చితికిన 50 కిలోల పశువుల ఎరువులో కలిపిన మిశ్రమాన్ని వ్యర్థ పదార్థాల మీద చల్లాలి. చల్లేటప్పుడు వ్యర్థ పదార్థాల మీద తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి లేదా తేమ ఉన్నప్పుడే ఆంగ్రూ వేస్ట్ డికంపోసర్ (డి కంపో –ఎ మరియు డి కంపో – బి) మిశ్రమాన్ని వ్యర్థ పదార్థాల మీద చల్లాలి).

జాగ్రత్తలు :

1. వ్యర్థ పదార్థాల మీద తగినంత నీటి శాతం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
2. ఏడు రోజుల కొకసారి, కిందికి పైకి తిప్పి నీటిని పిచికారి చేసుకోవాలి. తిరిగి కుప్ప లాగా చేసుకోవాలి.
3. వ్యర్థ పదార్థాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటే తొందరగా కుళ్ళిపోతాయి.
4. ష్రెడ్డర్ లేకపోతే, గట్టిగా ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలు (ఉదా : కంది, ప్రత్తి, మిరప), ట్రాక్టర్ సాయంతో పడుగు తిప్పాలి ఏదైనా పద్ధతి ద్వారా వ్యర్థ పదార్థాల పరిమాణము తగ్గించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల, వ్యర్థ పదార్థాల పరిమాణము తగ్గి, తొందరగా కుళ్ళిపోతుంది.

జీవన ఎరువు వాడకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

1. జీవన ఎరువు ప్యాకెట్ ఎండ వేడి తగలని నీడ ప్రదేశంలో నిల్వచేయవలెను.
2. రైతు వాడే జీవన ఎరువు ప్యాకెట్ ఆ పంటకు సరైనదై ఉండవలెను.
3. ఉపయోగించే జీవన ఎరువు ప్యాకెట్‌పై ఉన్న గడువు తేదీ లోపల మాత్రమే ఉపయోగించవలెను.
4. రసాయనాలతో విత్తనశుద్ధి చేసుకొనేటప్పుడు విధిగా 24–48 గం॥ వ్యవధి ఉండవలెను.
5. రసాయన ఎరువులతో కలిపి జీవన ఎరువులు వాడరాదు.

6. సమర్థవంతంగా పనిచేయుటకు నాణ్యతగల కల్చర్‌ను వాడుకొనవలెను.
7. పైరుకు నిర్దేశించబడిన జీవన ఎరువును పొలములో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు వాడుకోవలెను.
8. సేంద్రీయ ఎరువుతో జీవన ఎరువు కలిపిన వెంటనే పంటకు వాడుకోవలెను.
9. జీవన ఎరువులను వాడేప్పుడు లేదా మొదటి సారిగా వినియోగించేటపుడు సంబంధిత శాస్త్రవేత్తలను గాని/ వ్యవసాయ అధికారులను గాని సంప్రదించి వారి సలహా మేరకు వాడుకోవడం మంచిది.

జీవన ఎరువుల వాడకం వలన కలిగే ఉపయోగములు

1. వాతావరణ కాలుష్యంను అరికట్టవచ్చు.
2. వాతావరణంలోను, నేలలోని, మొక్కలు తమంత తాము ఉపయోగించుకోలేని పోషకాలను వాటికి అందుబాటులోకి తెచ్చును.
3. హార్మోన్లు, విటమిన్లు మొక్కకు లభ్యమై పెరుగుదల వేగంగాను మరియు ఆరోగ్యకరంగా ఉండును.
4. నేల నుండి సంక్రమించే తెగుళ్ళను కొంతమేర అరికట్టవచ్చును.
5. నేల భౌతికలక్షణాలు బాగుపడును మరియు భూసారం అభివృద్ధి చెందును.
6. రైతులకు రసాయన ఎరువుల ఖర్చు తగ్గి లాభాల నిష్పత్తి అధికమగును.
7. రసాయన ఎరువుల దిగుమతికయ్యే విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అగును.
8. సాధారణ దిగుబడులు 10–20 శాతం వరకు పెరుగును. దీనితో పాటు 20–25 శాతం రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవచ్చును.

ప్రస్తుత పరిశోధనలో ఉన్న మిశ్రమ జీవన ఎరువుల వాడకం ద్వారా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని తేలినది. ఈ మిశ్రమ జీవన ఎరువులో ఒక నత్రజని బాక్టీరియా, ఒక ఫాస్ఫేట్‌ను కరిగించే బాక్టీరియా మరియు ఒక పి.జి.పి.ఆర్. బాక్టీరియా కలపి ఒకే ప్యాకెట్‌గా రూపొందించబడుచున్నవి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జీవన ఎరువులు లభ్యమయ్యే కేంద్రాలు

1. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా
2. ఉద్యానవన పరిశోధనా స్థానం, వై.యస్.ఆర్. హార్టికల్చర్ యూనివర్శిటీ, తాడేపల్లిగూడెం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా
3. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లా
4. వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అమరావతి, పల్నాడు జిల్లా
5. వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, ఊటుకూరు, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా.

జీవన ఎరువులు పై మరింత సమాచారం కొరకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త & యూనివర్శిటీ హెడ్ (మైక్రో బయోలజీ), ఎ.పి.జి.సి., లాం – 522 034, గుంటూరు జిల్లా. సెల్ : 95732 13028

మరియు

సెల్ : 90305 51865 (ఎ.ఆర్.ఎస్., అమరావతి).

ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలు

వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, ఆధునిక వ్యవసాయ విధానాలలో చాలా ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే కొత్తవంగడాలు, వ్యవసాయపద్ధతుల ద్వారా పెరిగిన ఉత్పాదకతను చేజిక్కించుకొని రైతు పూర్తి లాభం పొందాలంటే, గ్రామాలలో ఉండే వ్యవసాయ కూలీల లోటు మరియు సకాలంలో చేయవలసిన పనులను నిర్వర్తించేందుకు యాంత్రీకరణ మాత్రమే రైతుకు అండగా సహాయపడగలదు. ఈ యాంత్రీకరణ ముందుగా ట్రాక్టరును మొదలుకొని వ్యవసాయపనులలో ఉపయోగపడే యంత్రాలను రూపొందించడం వరకు జరిగింది. ఈ ట్రాక్టరు లేదా పనిముట్లను సరైన పద్ధతులలో వాడేందువలన వ్యవసాయ పనులను సకాలంలో సమర్ధవంతంగా నిర్వర్తించవచ్చును. తద్వారా పంటల ఉత్పాదకత పెంచడంతో పాటు వ్యవసాయానికయ్యే ఖర్చును గణనీయంగా తగ్గించవచ్చును. ఇంతేకాక వ్యవసాయ కూలీలపై ఆధారపడడాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడంతోపాటు నాణ్యమైన ఫలితాన్ని పొందడంలో దోహదపడుతుంది.

ఈ యాంత్రీకరణ విధానంలో ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పనులకు కావలసిన శక్తినందించే ట్రాక్టరు మరియు పనిని బట్టి రూపొందించిన యంత్రము లేదా పనిముట్లు గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఇందులో ట్రాక్టరు రకాలను పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా మూడు రకాల ట్రాక్టర్లను రూపొందించడం జరిగింది. ఇందులో 1) పవర్ టిల్లర్ 2) 4 చక్రాల ట్రాక్టరు 3) చైను లేదా బెల్టు చక్రాల ట్రాక్టరు.

పవర్ టిల్లర్ : దీని ద్వారా అన్ని అంతర కృషి మరియు దమ్ము చేయవచ్చును. ఇంతేకాక దీనికి అమర్చిన ఇంజను నుండి శక్తిని బెల్టు ద్వారా పొంది నూర్పిడి యంత్రాలను నడిపెందుకు, రసాయనాలను పిచికారీ చేయడానికి, నీటిని తోడే పంపులను సమర్ధవంతంగా నడుపవచ్చును. అదే విధంగా ఈ పవర్ టిల్లరును ఉపయోగించి ట్రాలీ ద్వారా ధాన్యం, ఎరువులు మొదలయిన వాటి రవాణాను సునాయసంగా చేయవచ్చును. ఇలా పవరు టిల్లరును బహుళార్ధక శక్తి యంత్రంగా వాడి రైతాంగం లాభపడవచ్చు. ఈ పవర్ టిల్లరును చిన్న, సన్నకారురైతులు తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని పనులను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చును. ఈ పవర్ టిల్లరు వెడల్పు 45-60 సెం.మీ. ఉండటం వల్ల ఉద్యానవన పంటలలో అంతరకృషికి సమర్ధవంతంగా నడపవచ్చు. అంతేకాక పండ్ల తోటలలో రసాయన మందుల వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి తోటలలో ఈ పవరు టిల్లరుపై స్ప్రేయర్‌ను అమర్చుకొని చాలా సమర్ధవంతంగా మందులను పిచికారి చేయవచ్చును.

ట్రాక్టరు : ఇది నాలుగు చక్రాలతో నడుపబడే వ్యవసాయ పనులకోసమే అనగా ఎగుడుదిగుడు, ఎండిన లేదా బురద, బంక లేదా ఇసుక వంటి అతికష్టమయిన పరిస్థితులలో కూడా వాడేందుకు వీలుగా రూపకల్పన చేయబడిన యంత్రము దీని అశ్వపు శక్తి 15-90 హెచ్‌పి ల వరకు ఉండి రెండు లేదా నాలుగు చక్రాలకు శక్తిని కల్పించి పొలంలో నడిపేందుకు రూపొందించబడి ఉంటుంది. ఈ ట్రాక్టురు ప్రత్యేకతలను మామూలు నాలుగు చక్రాల వాహనాలతో పోలిస్తే 1) ఇందులో ఎక్కువ అశ్వపుశక్తిని పొందుపరిచే ఇంజను ముందరి భాగంలో అమర్చి ఎటువంటి పరిస్థితులనయినా ఎదుర్కొని అతిక్రమించడానికి వీలుగా రూపొందించబడి ఉంటుంది. 2) ఇండిపెండంట్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. దీని ద్వారా ట్రాక్టరు ఒకవైపు అనగా కుడి లేదా ఎడమ చక్రాలను మాత్రమే లేదా రెండు ప్రక్కల చక్రాలను ఒకే మారు ఆపేందుకు వీలవుతుంది. ఇలా ఒక వైపు మాత్రమే చక్రాలను అపగలగడం వలన పొలంలో

అతి తక్కువ ప్రదేశంలో తిరిగేందుకు వీలవుతుంది. ఇందువలన పొలంలో పంట ఉన్నపుడు తక్కువ ప్రదేశంలో తిరిగేందుకు ఉపయోగపడటం వలన ప్రతి పనులలో కూడా అంతరకృషి లేదా పిచికారి చేసి సమయం వృదాకాకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. 3) 3 హిట్చ్ సిస్టమ్ ఈ అమరిక ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయ పనిముట్లను ట్రాక్టరు తగిలించుకొని, పనిచేసేప్పుడు కావలసిన విధంగా ట్రాక్టరుతో అనుసందాన పరిచేందుకు తోడ్పడుతుంది. అంతేకాక హిట్చ్ సిస్టము ద్వారా క్రిందుకు పైకి కదిపి తద్వారా నిర్దిష్టమయిన లోతుకు పొందవచ్చును. 4) పి.టి.ఓ అమరిక ట్రాక్టరు శక్తిని ఇతర పరికరాలను నడిపేందుకు అనగా నూర్పిడి యంత్రాలు పిచికారి చేసే స్ప్రేయరు, రోటవేటరు వంటి యంత్రాలను నడిపేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. 5) హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సిస్టమ్ దీని ద్వారా బరువులను లేపే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్‌గా మరియు హైడ్రాలిక్ మోటారును సైతం నడిపేందుకు అనువుగా రూపొందించి ఉంటుంది. ఇంతేకాక ప్రత్యేకంగా నాలుగు చక్రాలకు శక్తిని కలిగి పొలం ఎంత ప్రతికూలతలు ఇమిడి ఉన్నప్పటికి అతిసునాయసంగా యంత్రాలను వాడేందుకు సహాయపడుతుంది. అనగా 4 చక్రాలలో ఏ రెండు లేదా ఒక చక్రానికి నేలపై పట్టు దొరికినా పట్టు సహాయంతో పనిని పూర్తి చేయగలదు అనగా అవరోధాలను అధిగమించగలదు.

చిన్న ట్రాక్టరు (MINI TRACTOR) **:** మనదేశ వ్యవసాయ రంగంలోని రైతులు 86 శాతము చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులు ఉండడం వలన, దేశంలోని ట్రాక్టరు తయారీదారులు, చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులను ఉద్దేశించి రూపకల్పన చేయబడింది. దీని అశ్వపు శక్తి 14.5–24 హెచ్‌పి దాకా ఉన్నవి. కాకపోతే ఈ చిన్న ట్రాక్టర్లు దుక్కిదున్నడానికి పనికిరాదు. ఎందుకంటే దుక్కిదున్నేప్పుడు కావలసిన అశ్వపుశక్తి ఉన్నపుటికీ దున్నేప్పుడు ట్రాక్టరుపై పడే బరువును అధిగమించేందుకు పొలంలో పట్టు చక్రాలద్వారా ఉండాలి. కాని ఉన్న చక్రాల పరిమాణం బరువు అధిగమించడానికి సరిపోదు. కాకపోతే ఈ చిన్న ట్రాక్టర్లు దున్నిన పొలాన్ని దమ్ము చేయడానికి, అంతరకృషి చేయడానికి, రసాయనాలు పిచికారీ చేయడానికి మొదలయిన పనులను పొలంలో ఉండేపంటను త్రొక్కకుండా నష్టపరచకుండా చేపట్టవచ్చును. ఈ మిని ట్రాక్టరు పరిమాణం పొట్టిగా చిన్నగా ఉండడం వలన ఉద్యానవన పండ్ల తోటలలో అంతరకృషి కొమ్మల క్రింద భాగంలో కూడా చేయవచ్చును. అంతేకాక మందులు పిచికారి చేయడానికి సమర్ధవంతంగా ఉపయోగపడుతుంది.

బెల్టు చక్రాల ట్రాక్టరు : ఈ ట్రాక్టరు నందు బెల్టు చక్రాల అమరిక ద్వారా ట్రాక్టరుకు నేలపై బాగాపట్టు దొరుకుతుంది. ఇందుమూలంగా ట్రాక్టరు ఎటువంటి అవరోధాలనయినా సునాయసంగా అధికమించి చేపట్టిన పనిని సఫలీకృతం చేయగలదు. ఈ ట్రాక్టరులను పెద్ద పెద్ద ఎత్తు పల్లాలను చదును చేయడానికి మరియు మట్టి పనులకు వాడేందుకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ బెల్టు చక్రాల ట్రాక్టరు యుద్ద యంత్రాలకు సైతం వాడుతారు.

I. దుక్కి దున్నే యంత్రాలు :

రైతాంగం పొలం తయారీలో 9 లేదా 11 కర్రుల కల్టీవేటరును ఉపయోగించి దాని తరువాత రోటోవేటరును వాడి పొలం తయారీ చాలా బాగా చేసినట్లు అనుకుంటారు. నిజానికి కల్టీవేటరు అంతర కృషి చేసేందుకు రూపొందించబడిన నాగలి. కావున కల్టివేటరును ఉపయోగించడం ద్వారా 15 సెం.మీ. వరకు మాత్రమే పొలంలో దిగబడి దుక్కి చేయడం జరుగుతుంది. ఇందు మూలంగా పంట వేళ్ళు ఉపరితలంలో మాత్రమే ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇలా పైపనే పంట వేళ్ళు ఉండడం మూలంగా చెఱుకు పంటలో గాలి కాలంలో అనగా అక్టోబరు,నవంబరు నెలలలో పడిపోవడం జరుగుతుంది.

ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా పొలాన్ని లోదుక్కి దున్ని అనగా సుమారు 30 నుంచి 40 సెం.మీ. లోతుకు దున్ని ఆ తరువాత రోటోవేటరుతో కలియదున్ని తరువాత నాటడం వలన పంట వ్రేళ్ళు వృద్ధి బాగా చెందుతుంది. ఇలా చేయడం వలన పోషకాలను లోతైన నేల నుండి తీసుకొని పంట దిగుబడి కూడా పెరుగుతుందని పరిశోధనా ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. లోతు దుక్కి వలన బలమైన వ్రేళ్ళు తయారై నీటిని మరియు పోషకాలను సమర్థవంతంగా గ్రహించడం, పంట బాగా పండించడం వలన పంట దిగుబడి 10 నుండి 15% వరకు ఉత్పాదకత పెరిగే వీలుంది.

1. సబ్ సాయిలర్ లేదా చిసల్ ప్లౌ (SUB SOILER) : వ్యవసాయ పొలాలను సంవత్సరం పొడవున రెండు లేదా మూడు పంటలను పండించడానికి ఎడ తెరపిలేకుండా వాడడం వలన పొలంలోని పై పొరలలో పోషకాలు తగ్గి క్రమేపి పంట దిగుబడులు తగ్గిపోవడం ప్రతి రైతు గమనించి ఉంటారు. ఇలా తగ్గిపోవడానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలలో దుక్కిని లోతుకు దున్నకపోవడం. లోదుక్కి క్రిందనున్న గట్టి మట్టి పొరను ఛేదించడం వలన క్రమేణి పై మట్టి లోమట్టిలో కలిసి మొక్కకు కావలసిన పోషకాలను సమర్థవంతంగా ఇవ్వగలుగుతాయి. ఇలా పొలాన్ని అతి లోతుగా దున్నేందుకు రూపొందించబడినదే "సబ్ సాయిలర్" లేదా "చిసిల్" నాగలి.

ఇది ఒకటి లేదా మూడు ధృఢమైన కర్రులచే నిర్మించబడిన నాగలి. దీనిని ఉపయోగించి దుక్కిని అతి లోతుగా అనగా 60 నుండి 90సెం.మీ.లోతు వరకు దున్నవచ్చును. ఈ నాగలిని మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒక మారు ఉపయోగించి దుక్కిని అతిలోతుగా దున్నడం వలన నేల క్రింది భాగంలోని గట్టిపొరను (హార్డ్‌ప్యాన్) చీల్చి క్రొత్త మట్టిని పాత పై మట్టితో కలపడం జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వలన పలు లాభాలు ఉన్నాయని వ్యవసాయ పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మెట్ట సేద్యంలో వర్షాధారపు పంటలను పండించేటపుడు ఈ సబ్ సాయిలర్ లేదా చిసిల్ నాగలి ద్వారా దున్నడం వలన లోతైన మట్టి పొరలను కదిలించి లోతైన పొరల్లో నేల గుల్ల బార నివ్వడం వలన పడిన వర్షపు నీటిని ఎక్కువ భాగం పొలం లోతు పొరలలో నిల్వ ఉంచేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఈ నీటి నిల్వ గణనీయంగా పెరుగుట వలన పొలంలో పండించే పంట నీటి ఎద్దడికి లోను కాకుండా ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే పొలాన్ని అతిలోతుగా దున్నేందుకు కనీసం 45హెచ్.పి. గల ట్రాక్టర్లను ఉపయోగించడం ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఒక ఎకర పొలమును 1 లేదా 1 1/2 గంటలలో దున్న వచ్చును.

2. రెక్క నాగలి (M.B. PLOUGH) : ఇది అతి ముఖ్యమైన దుక్కిని దున్నడానికి రూపొందించబడిన నాగలి. ఆ నాగలిని ఎడ్లతో గాని ట్రాక్టరుతో గాని లాగినపుడు నాగలి ముందరి కర్రు భాగం నేలలో నిర్దేశించబడిన (నాగలి పరిమాణాన్ని బట్టి) లోతుకు దిగి ఆపై మట్టి పెళ్ళను సమర్థవంతంగా భూమి నుండి వేరుచేస్తుంది. అలా వేరుచేయబడిన మట్టి పెళ్ళను నాగలిరెక్కపైకి పంపి పొడిగా చేస్తుంది. ఇంతేకాక పై రెక్క యొక్క వంపువలన మట్టి పెళ్ళను పూర్తిగా త్రిప్పి ప్రక్కకు వేస్తుంది. ఇది సుమారు 30–60 సెం.మీ.లోతు వరకు దున్ని నాగలి పరిమాణాన్ని బట్టి దుక్కిని పొందవచ్చు. దీనితో దున్నిన దుక్కినాణ్యత ఎడ్లతో నడిపే చెక్కనాగలితో లేదా ట్రాక్టరుతో నడుపబడే కల్టివేటరుతో వచ్చే నాణ్యతతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు హెచ్చుగా ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా రెక్క నాగలిలో ఉండే రెక్కను మన అవసరాన్ని బట్టి అనగా కలుపు బెడద ఎక్కువగా ఉన్న చోట కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా తిరగ తిప్పడానికి, లేదా పంట అవశేషాలు ఉండే పొలాన్ని బాగా పొడి చేయడానికి, మరీ బంకమన్ను ఉన్న పొలంలో నాణ్యమయిన

పొలం తయారీకి నిర్ణీత రెక్కను మార్చి అధిక ఫలితాన్ని పొందవచ్చును. ఇలా చేయడం వలన పనిముట్లకు వాడే ఎడ్లు లేదా ట్రాక్టర్ల శక్తి సామర్థ్యాలను సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. చల్కా భూములలో పై పొర గట్టి పడినప్పుడు ఈ పనిముట్టు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 35 హెచ్.పి. ట్రాక్టరుతో ఈ పరికరాన్ని వాడి రెండు గంటలలో 1–1.5 ఎకరాలను దున్నవచ్చును.

3. పళ్ళెపు నాగలి (DISC PLOUGH) : ఇందులో సుమారు 60 సెం.మీ. నుండి 90 సెం.మీ. వరకు వ్యాసం కలిగి గుంతగా ఉన్న రెండు లేదా మూడు పళ్ళాలను ప్రత్యేక రీతిలో విడివిడిగా తిరిగేందుకు వీలుగా ఒక ఛట్రానికి అమర్చి నేలను దున్నేందుకు వీలుగా వుంటుంది. ఇలా తిరిగే నాగలి పళ్ళెలు ఉండడం వలన ఏ విధమైన ఆటంకము ఎదురైనప్పటికి ఈ పళ్ళెపు నాగలిని ఉపయోగించవచ్చు.

రెక్క నాగలిని ఎక్కడైతే సమర్థవంతంగా ఉపయోగించలేమో అటువంటి నేలలో కూడా ఈ పళ్ళెపు నాగలిని సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. అంతే కాకుండా నేలంతా రాళ్ళమయమై ఉన్నప్పుడు లేదా మొక్కల వేళ్ళు అవశేషాలు పొదిగి ఉన్నప్పుడు లేదా ఇసుక నేలల్లో లేదా చల్కా నేలల్లో కూడా పళ్ళెపు నాగలిని సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఈ పళ్ళెపు నాగలి ముఖ్యంగా బరువు వలన భూమిలోపలికి దిగడం వలన గట్టి నేలలో తగిన తేమ లేని నేలలో కూడా నాగలి బరువును పెంచి నిర్ణీత లోతు వరకు దున్నవచ్చును. కాకపోతే దీనిలో పళ్ళెలతో దున్ని మట్టిని ప్రక్కకు నెట్టడంవలన పొలమంతా పెద్ద పెద్ద గడ్డలతో ఎత్తు పల్లాలుగా తయారవుతుంది. పొలంలో ఏర్పడ్డ ఈ ఎత్తు పల్లాలను సమర్థవంతమయిన దంతుల ద్వారా నేలను బాసినపుడు మట్టి గడ్డలు పొడి అయిపోయి నేల చదునుగా తయారవుతుంది. అట్లుకాక ఈ ఎత్తు పల్లాలకు బయపడి రైతాంగం నేలనుదున్నడం మాని ఏ విధంగాను ఉపయోగపడని కల్టివేటరును వాడడం వలన నేలను దున్నినామన్న భ్రమలో రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు.

II. దున్నిన పొలాన్ని నూర్పిడి చేసే పనిముట్లు

మట్టి గడ్డలను పగలగొట్టే పనిముట్లు : దుక్కిని సుమారు 30 సెం.మీ. లోతు వరకు దున్నడం వలన పెద్దపెద్ద మట్టి గడ్డలు ఏర్పడి పొలమంతా ఎత్తుపల్లాలుగా వుండుటవల్ల తక్షణమే విత్తడానికి వీలు పడదు. ఈ పొలాన్ని విత్తేందుకు వీలుగా మట్టి గడ్డలను పొడిచేసి చదును చేయడం చాలా ముఖ్యము. ఇలా చేయడం వలన పైర్లను సక్రమంగా విత్తడమే కాకుండా నీటి పారుదలకు వీలుగా పొలాన్ని చదును చేసి బోదెలను లేదా కాల్వలను తయారు చేసుకొనేందుకు సులభమవుతుంది. ఇలా పొలాన్ని విత్తేందుకు అనువుగా మార్చడానికి వివిధ రకాల దంతులను వాడుతారు.

1. పళ్ళెపు దంతి (DISC HARROW) **:** ఇది పళ్ళేల సమూహంతో చేయబడిన ఒక పరికరం, ఇందులో గుండ్రంగా ఉండే 3 నుండి 12 పళ్ళాలను ఒక గ్యాంగులో నిలువుగా అమర్చి, ఇలాంటి సమూహాలను (గ్యాంగులను) రెండు లేదా నాలుగింటిని ఒక ఛట్రానికి బిగించబడి ఉంటుంది. ఈరకం దంతులను ఎడ్లతో గాని ట్రాక్టరుతో గాని నడిపేందుకు ప్రత్యేక రీతిలో రూపొందించబడినది. దుక్కిని ఒకటి లేదా రెండు మార్లు దున్ని పొలంలో నడపడం వలన మట్టి గడ్డలను బాగా పొడిచేస్తుంది. అంతే గాక పొలంలోని మట్టినంతా కలియ తిప్పుతుంది. ఇలా కలియత్రిప్పడం వలన నేల బాగా గుల్ల బారి మొక్క ఎదుగుదలకు వేర్ల పెంపుదలకు కావలసిన గాలి మరలను పొలంలో ఏర్పడడానికి సహాయ పడుతుంది.

ఈ పళ్ళెపు దంతులలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. వీటిని అవసరాన్ని బట్టి సమర్థవంతంగా వాడుకోవచ్చును. ఉదాహరణకు ఇసుక పాలు అధికంగా ఉన్న పొలాలు లేదా ఎడ్లు మాత్రమే ఉన్న రైతులు రెండు గ్యాంగులు ఉన్న

దంతులు (Single Action Disc Harrow) సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. అదే కండ నేలలో ఎక్కడైతే ఎక్కువ గడ్డలను పొడిచేయవలసి ఉంటుందో అక్కడ నాలుగు గ్యాంగులు ఉన్న దంతులు (Double Action Disc Harrow) వాడవలసి ఉంటుంది. పండ్ల తోటలలో చెట్ల క్రింద సేద్యం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన (offset disc harrow) దంతిని సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. వీటిని ఉపయోగించి 35 హెచ్.పి. ట్రాక్టరుతో గంటకు రెండు ఎకరాలు దున్నవచ్చును.

2. పళ్ళ దంతి (SPIKE TOOTH HARROW) **:** దుక్కిని బాగా దున్ని, పొడి చేసిన తరువాత పొలం ఉపరితలం ఎగుడు దిగుడులుగా ఉండటం పరిపాటి. ఈ ఎత్తు పల్లాలను సరిచేసి వదిలివేసిన కలుపు మొక్కలను ఏరివేసి పొలం అంతా దున్ని చదును చేసేందుకు లేదా సమతలంగా పొలాన్ని తయారు చేయడానికి ఈ దంతి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని పండ్ల మాను దంతి అని కూడా అంటారు. ఈ పళ్ళ దంతి ఛట్రానికి రెండు వరుసలలో ఇనుప ముక్కలను ముందు వెనుక సరిలేకుండా అమర్చి ఉంటారు. ఈ ఇనుప ముక్కలు (కర్రులు) బదులు 'సి' రూపంలో స్ప్రింగు కర్రులను కూడా అమర్చిన పళ్ళ దంతులు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా కర్రులను ఎక్కువ లోతుకు సరిచేసి రాళ్ళు ఉన్న పొలాల్లో సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఈ పళ్ళ దంతులలో రెండు వరుసలలో ఒక వరుస ప్రక్కకు (అటుఇటు) కదిలేందుకు వీలుగా ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. నుండి శక్తిని తీసుకొని వాడవచ్చును. దీనిని ముఖ్యంగా మట్టి గడ్డలను నలిపి కలుపు అవశేషాలను తీసి వేయడానికి సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును.

ఈ పళ్ళమాను వరి పొలాలలో దమ్ము చేసిన తరువాత నేలను చదును చేసేందుకు మరియు కదిపి వేసిన కలుపు మొక్కలను సేకరించి వేరుచేసేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

3. రోటోవేటరు (ROTOVATOR) **:** ఇది ఆధునిక పరికరాలలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన పరికరం. ఈ పరికరము ట్రాక్టరు వెనుక భాగంలో అమర్చబడిన పవర్ టేక్ ఆఫ్ (పి.టి.ఒ) సహాయంతో నడుపబడే ఒక పరికరం. పి.టి.ఒ. నుండి పరికరానికి అమర్చిన తిరిగే కర్రుల ద్వారా పొలంలోని మట్టి గడ్డలను మరియు పంట నిల్వలను బాగా కత్తిరించి కలియతిప్పడం ద్వారా అత్యధిక గాలి మరలను పొలంలో చేర్చి నాణ్యమైన గుల్లను పొలంలో లభ్యమయ్యేట్లు చేస్తుంది. దీనిని ముఖ్యంగా నేలలోపల పండే పంట (వేరుశనగ, పసుపు మొదలగు) పొలాలను తయారు చేయడం వలన మొక్క వేర్ల పెరుగుదలకు అనువైన పరిస్థితులను అందించి ఎక్కువ దిగుబడులను పొందేందుకు వీలవుతుంది. అంతే కాక చెఱకు,మొక్కజొన్న వంటి పంటల కోత తరువాత పంట అవశేషాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగాచేసి పొలంలో కలుపడం ద్వారా, తక్కువ సమయంలో అవశేషాలు కుళ్ళి పొలం నాణ్యతను పెంపొందించవచ్చును. ఈ రోటోవేటరు కర్రులు 30 లేదా 36 లేదా 42 కలిగి, ట్రాక్టరు పరిమాణాన్ని బట్టి పొలంలోని నేల స్వభావాన్ని బట్టి ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ పరికరం ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. శక్తి ద్వారా నడపడం వలన అధిక ఇంధనం ఖర్చు అవుతుంది.

ఈ పరికరం ద్వారా పొలం నాణ్యతను నియంత్రించేందుకు వెనుక భాగంలో అమర్చిన తలుపును, దాని కోణాన్ని మార్చి వాడవలసి ఉంటుంది. గంటకు ఎకరా చొప్పున 30–36 కర్రుల రోటోవేటరును 35–45 హెచ్.పి. ట్రాక్టరుతో లేదా 42 కర్రుల రోటోవేటరును 50–55 హెచ్.పి. ట్రాక్టరుతో మొత్తటి దుక్కి చేసుకోవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని దుక్కి దున్నడానికి కాకుండా దున్నిన పొలంలో నేలను గుల్ల బార్చడానికి చాలా సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును.

4. పవర్ హో (POWER HOE) : ఈ యంత్రము దుక్కిదున్నిన తరువాత ద్వితీయ దుక్కి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పరికరాన్ని ట్రాక్టరు పి.టి.ఓ. తో నడపడం వలన, నేలను గుల్ల బార్చడంలో చాలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అటువంటి పొలంలో పొలం దున్నిన వెంటనే పొలమంతా మట్టిగడ్డలతో ఎగుళ్ళు దిగుళ్ళుగా ఉంటుంది. ఈ పరికరంలో కర్రులు నిలువుగా పొందుపరచి అవి ట్రాక్టరు శక్తి వలన మట్టిగడ్డలను పొడి చేయడమే కాకుండా, గాలి మరలను నేలలో మెండుగా నింపడం జరుగుతుంది. ఇలా నేలను గుల్లబార్చడం ద్వారా పండించిన పంట వేర్లు వృద్ధి చెందడం మరియు భూమిలో పండే పంటలయిన వేరుశనగ, పసుపులాంటి పంటలు బాగా పండేందుకు వీలవుతుంది. అంతేకాక వేర్లకు ఆక్సిజన్ బాగా అందడం ద్వారా పంటకు అందించిన పోషకాలు బాగా అంది ఉపయోగపడుతుంది.

5. చదును చేసే పలక (LEVELING PLANK) : ఇది సాగునీటి ఆధారిత పొలాల్లో ఉపయోగపడే చాలా ముఖ్యమైన పరికరం ఎందుకంటే భూమిని దుక్కి దున్నిన తరువాత నేలంతా ఎత్తుపల్లాలతో నిండి ఉంటుంది. అదీ కాక దున్నడం చేత నేల గుల్ల బారడం కూడా జరుగుతుంది. ఇలా ఎత్తు పల్లాలతో కూడిన గుల్ల బారిన నేలలోసాగు నీటిని పెట్టడం (ప్రవహింప చేయడం) ద్వారా పల్లంగా ఉన్న ప్రాంతపొలాల్లో నీరు బాగా నిలిచి పోయి ఎత్తు ప్రదేశాలకు చేరక పోవడం, ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతాలకు కూడా సాగు నీటిని అందించడం కోసం ఎక్కువ సేపు నీటిని పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఇలా ఎక్కువ సేపు నీరు పెట్టడంవలన తగ్గు పొలాల్లో నీరు నిలిచి లోపలి పొరలకుపోయి (Deep Percolation) చాలా వరకు వృధా అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా 25–30 శాతం సాగు నీళ్ళు నష్టం జరుగుతుంది. ఇలా కాక దున్ని, దమ్మును చేసిన తరువాత నేల మట్టాన్ని సమతలంగా చేయడం ద్వారా సాగునీటి ఆదా సుమారు 30–40% ఉంటుందని పరిశోధనాత్మకంగా నిరూపించబడింది. కాబట్టి దున్నిన నేలను చదును చేయడం ఎంతయినా అవసరం. ఈ దున్నిన నేలను చదును చేసేందుకు పలకను రూపొందించడం జరిగింది. ఈ చదును చేసే పలక ఎడ్ల సహాయంతో చేసేదయితే క్రింద భాగంలో ఒక ఇనుప పట్టీ వెనుక భాగంలో చిన్న పలక (TailBoard) అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ ప్రధాన పలకకు నేల యొక్క కోణాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మార్చేందుకు చేతి పిడిని అమర్చి ఉంటారు. ఈ చేతి పిడిని ముందుకు వంచి పెట్టడం ద్వారా ప్రధాన పలక మరియు దానికి అమర్చిన ఇనుప బద్ద నేలపై రాసుకుంటూ ఎటువంటి నేలను తెంచకుండా లాగిన మట్టిని అక్కడ వదులుతుంది. ఇలా కాక చేతి పిడిని నిటారుగ ఉపయోగించడం ద్వారా నేల ఉపరితలాన్ని తెంచి ఎత్తు ప్రదేశాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈవిధంగా పలకను ఉపయోగించి నేల మట్టాన్ని రూపొందించవచ్చును. ఈ చదును చేసే పరికరం ట్రాక్టరుతో వాడడానికి ట్రాక్టరు 3 పాయింటు హిచ్ ద్వారా తగిలించడానికి రూపొందించి ఉంటారు. దీనిని ప్రయోగించి నేలను సమర్థవంతంగా చదును చేయడానికి వీలవుతుంది. ఈ చదును చేసే పలకకు దంతులను అమర్చి రెండు పనులను ఒకేసారి చేయవచ్చును.

6. లేజర్ గయిడడ్ ల్యాండ్ లెవలర్ (LAZER GUIDED LAND LEVELLER) : ఇటీవల రూపొందించిన ట్రాక్టరుతో నడిచే లెవలర్‌ను నియంత్రించేందుకు (Lazer guided land leveller) లేజర్ సహాయంతో పరికరాన్ని రూపొందించి ఉన్నారు. ఈ పరికరాన్ని పరిశీలిస్తే పొలంలో వున్న ఎత్తు పల్లాలను సవరించడమేకాకుండా మనకు కావలసిన వాలు శాతాన్ని పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఈ వాలు పొలం యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి కావలసిన విధంగా, ఒకవైపు గాని లేదా రెండు వైపుల వాలుకు గూడా నియంత్రించేందుకు వీలవుతుంది. ఈ పరికరం

ద్వారా flat or table top పొలాన్ని కూడా పొందవచ్చును. ఇంతే కాకుండా ఈ లేజర్ గయిడడ్ ల్యాండ్ లెవలర్‌ను వరి పొలం దమ్ము చేసిన తరువాత కూడా వాడి సమర్థవంతంగా సాగు నీటిని ఆదా చేయవచ్చు.

7. గుంటక (BLADE HARROW) **:** దున్నిన పొలాన్ని దంతులతో బాగా పొడిచేసి, తరువాత పొడి మట్టి లోపలి నేల ఎత్తు పల్లాలను సరిచేసి సమతలం పొందడానికి ఈ గుంటక వాడుతారు. ఇందులో ఒక బ్లేడును చట్రానికి అమర్చి పొలంలోని పై మట్టి క్రింద భాగంలో దాగి ఉన్న ఎత్తు పల్లాలను లేకుండా చెక్కి చదును చేయడానికి సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. అదే కాకుండా ఏదయినా కలుపు మొక్కలు మొదలగు వాటిని వేళ్ళతో సహా తీసేందుకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ గుంటకను వాడి నేలపై భాగమే కాకుండా మట్టి క్రింద ఎత్తు పల్లాలను సరిచేయడం వలన సాగు నీటిని పొలంలో సమానంగా అన్ని దిక్కులకు ప్రవహింప చేయవచ్చును. ఇలా సరి చేసిన నేలలో సాగు నీటిని నిర్వహణ వలన సుమారు 30 శాతము నీటిని ఆదాచేయవచ్చునని పరిశోధనల ద్వారా నిరూపించబడినది.

8. బోదె నాగలి (BUND FORMER) **:** దున్ని చదును చేసిన పొలంలో బోదెలు వేయడానికి ఈ పరికరాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించవచ్చును. అనగా కొన్ని పంటలు బోదెల పైభాగంలో నాటడానికి అవసరమైన చోట్ల పొలంలో విభజన చేసేందుకు బోదెలు వేయడం పరిపాటి. ఈ బోదెలను వేయడానికి రూపొందించిన పరికరానికి,అమర్చిన రెండు పలకలు ముందుకు నడిపేటప్పుడు ముందరి వెడల్పాటి ముఖంద్వారా మట్టిని పలక మధ్య నెట్టి చివరిగా అమర్చబడ్డ తక్కువపాటి ద్వారం గుండానొక్కడం ద్వారా బోదెలను రూపొందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.కావలసిన బోదెల పరిమాణాన్ని బట్టి బోదె నాగలిని ఎంచుకోవలసి ఉంటుంది. ఇది ట్రాక్టరుతో నడిపే నాగళ్ళ ద్వారా ఒకే సారి రెండు లేదా మూడు బోదెలను రూపొందించవచ్చును. వీటి మధ్య దూరాన్ని మూడు నుంచి ఐదు అడుగుల వరకు మార్చుకునే వీలుంటుంది.

9. కాల్వలు తీసే పరికరం (RIDGER) **:** ఈ పరికరంలో, నేలదున్ని, చదును చేసిన తరువాత నేల ఉపరితలంలో కాలువలు చేసేందుకు వాడుతారు. దీనికి 'V' ఆకారంలో ఒక కర్రు మధ్యలో అమర్చబడి రెండువైపులా రెక్కలను అమర్చి వాడేందుకు వీలుగా చేతి పిడిని (ఎడ్లతో నడిపే వాటికి) పొందు పరచి ఉంటారు. చదును చేసిన పొలంలో ఈ పరికరాన్ని వాడడం ద్వారా 'V' ఆకారపు కర్రు నేల లోపలికి పోయి రెండు రెక్కల ద్వారా వచ్చే మట్టిని సమానంగా ఇరువైపులా తోయడం వలన పొలంలో కాల్వ ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా సాగు నీటిని ప్రవహింపచేసేందుకు పొలంలో కాలువ చేసి నీటిని కట్టడం ద్వారా నీటి ఆదా జరగడమే కాక, సాగు పొలంలో అన్ని ప్రాంతాలకు నీరు సక్రమంగా అందేట్లు చేయవచ్చును. ఇంతేకాక, కొన్ని పంటలలో నేలను (మట్టిని) మొక్కల వేళ్ళకు ఎగదోయడం (Earthingup) ఎంతయినా అవసరం అనగా బంగాళాదుంప వంటి పంటలకు మరియు పొడవుగా పెరిగే చెఱకు, మొక్కజొన్న, జొన్న మొదలయిన పంటలకు వేళ్ళ కుదుళ్ళ వద్ద నేలను / మట్టిని తోయడం ఎంతయినా అవసరం ఇటువంటి ప్రదేశాలలో ఈ రిడ్జరును ఉపయోగించి సమర్థవంతంగా మట్టిని ఎగదోయడమే కాక, కాల్వ రూపకల్పన అద్భుతంగా నిర్వహించవచ్చును.

III. విత్తేందుకు అనువైన పరికరాలు (SOWING EQUIPMENT)

విత్తనాన్ని విత్తడం అనేది సేద్యంలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. విత్తనము ఎంతమంచిదైన నిర్ణీత సమయంలో విత్తినప్పుడే రైతు కష్టాలు ఫలించి పూర్తి దిగుబడి సాధ్యమవుతుంది. అదీకాక వర్షాదార పరిస్థితులలో

వాసరాక ఎవరికి తెలియదు. వర్షం ఎంత పడినా నేలలో అనువైన తేమ శాతం 3-5 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సమర్థవంతంగా విత్తేపరికరాలు ఎంతైనా అవసరం. అదే విధంగా రసాయన ఎరువులను విత్తనముతో పాటు విత్తనానికి 5 సెం.మీ. లోతును 5 సెం.మీ ప్రక్కన వేయడం వలన అధిక దిగుబడులను పొందవచ్చునని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. ఇంతేకాక వ్యవసాయ కూలీల కొరత తప్పించుకోవాలంటే సేద్యంలో పనులన్నింటినీ యాంత్రీకరణ కావించడం ఎంతయినా అవసరం. ఈ యాంత్రీకరణకు ముఖ్యమయిన ఆవశ్యకత విత్తనాన్ని సాళ్ళలో నాటడం, అపుడే అంతరకృషి, పంట వేళ్ళకు మట్టి కప్పడం మరియు సాళ్ళలో కాల్వలు తీయడం వంటి పనులను యంత్రాల/పనిముట్ల ద్వారా సులభంగా చేయవచ్చును. కాబట్టి, కావలసిన విధంగా విత్తనము వేయడంతో పాటు అంతర కృషి వంటి పనులను కూలీల అవసరం లేకుండా సులువుగా పూర్తి చేసేందుకు తప్పనిసరిగా విత్తే పరికరాలను మాత్రమే వాడాలి.

ఎ.ఫెస్పోనాగలి (FESPO PLOUGH) **:** అంటే మమూలు చెక్క / ఇనుప నాగలికి రెండు జడ్డిగాలను (గరాటులను) అమర్చి దాని నుండి నాగలి వెనుక భాగంలో, నాగలి చేసిన సాళ్ళలో విత్తనం, మరియు ఎరువు విడివిడిగా ఎరువు పడేట్లు గొట్టాలను అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ విత్తే నాగలి నడిపే రైతుతో బాటు, విత్తనాన్ని మరియు ఎరువును వాటికి నిర్దేశించబడిన జడ్డిగాలలో వేయడానికి ప్రత్యేకించి కూలీలు కావాలి. ఇంతేకాకుండా సాలుకు సాలుకు మధ్య దూరం సమానంగా పొలమంతా పొందాలంటే పని నైపుణ్యత గల కూలీతో బాటు సాలు చక్కగా వేయగల మచ్చిక చేయబడ్డ ఎడ్లు ఎంతయినా అవసరం.

వరి డ్రై డ్రమ్ సీడర్ : వరి నాట్లు వేయడానికి కూలీల సమస్యల వలన తయారైన పొడి దుక్కిలో వరి విత్తనాన్ని నేరుగా వేసి తరువాత నీళ్ళు కట్టి పండించే డ్రై సీడింగ్ పద్ధతిని అవలంభిస్తున్నారు. ఇలా విత్తడానికి విత్తే యంత్రాన్ని రైతాంగం వాడుతున్నారు. దీని ఖరీదు రూ. 90,000/- ఉంటుంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా డ్రమ్ సీడరు వరి విత్తే యంత్రం రూపొందించడం జరిగింది. దీని ఖరీదు రూ. 35,000/- మాత్రమే. దీనిని కూడా ట్రాక్టరుతో నడుపవలసి ఉంటుంది. ఇలా విత్తడానికి ఒక గంటలో ఒక ఎకరం వరకు సునాయాసంగా విత్తవచ్చును. ఇలా చేయడం వలన వరి నాటుకు అయ్యే ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గించవచ్చును. కాకపోతే ఈ పద్ధతిలో కాలువల కింద లేదా నీటి కొరత లేని ప్రాంతంలో వాడవచ్చును.

ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్‌కు అనువైన యంత్రాలు :

మారుతున్న అవసరాలు మరియు పెరుగుతున్న ఖర్చుల వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని వ్యవసాయాన్ని మరింత శాస్త్రీయంగా ముందుకు తీసుకొనిపోతూ పంటకు కావలసిన విత్తనాలు మరియు ఎరువుల వినియోగం సామర్థ్యం పెంచడానికి వృధా ఖర్చును తగ్గించడానికి ప్రత్యేకంగా కొన్ని యంత్రాలను రూపొందించడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా

1. ఖచ్చితమైన విత్తే యంత్రము విలువైన విత్తనాలను ఉదా : ప్రతి పండ్ల విత్తనాలు మొదలగు వాటిని విత్తేందుకు అనువుగా అనగా ఒకటి లేదా రెండు విత్తనాలు మాత్రమే విత్త గలిగే యంత్రాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. నిర్దిష్టమైన దూరంలో మరియు లోతులో విత్తనాన్ని ఖచ్చితమైన మోతాదులో వేసేందుకు వీలవుతుంది.
2. ఖచ్చితమైన స్ప్రేంగు : రసాయన మందులను పిచికారి చేసేటప్పుడు మొక్క పైనే పడేందుకు వీలుగా అమరిక కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మొక్క లేని దూరంలో పిచికారి ఆగి మందు వృధాకాకుండా చేసి ఖర్చును

తగ్గిస్తుంది. ఇలా అనేకమైన ఖచ్చితమైన వ్యవసాయానికి ఎన్నో పనిముట్లు ఉన్నందున రైతాంగం వాటిని వాడుకొని లాభం పొందవచ్చును.

బి. గొర్రు. (SEED DRILL) **:** ఇది పూర్తిగా ఇనుము ఎడ్ల సహాయంతో విత్తే యంత్రము. ఇనుములేదా చెక్కతో చేయబడి, మేడికి ఇరువైపులా రెండు జడ్డిగాలను బద్ధీలతో అమర్చి ఉంటారు. ఎరువు మరియు విత్తనం వేర్వేరుగా పడేందుకు వీలుగా కర్రులకు ఇరువైపులా రెండు గొట్టాలను అమర్చి ప్లాస్టిక్ గొట్టాల ద్వారా జడ్డిగాలకు కలుపబడి ఉంటుంది. లాగే ఎద్దుల శక్తి మరియు సమర్థతను, బట్టి మూడు నుండి ఎనిమిది కర్రులను అమరుస్తారు. ఈ కర్రుల / చెక్కల సంఖ్యను బట్టి జడ్డిగాల సందుల సంఖ్య నిర్ధారించబడుతుంది. ఈ రెండు జడ్డిగాల నుండి అమర్చబడ్డ చెక్కలకు గొట్టాల ద్వారా ఎరువును మరియు విత్తనాన్ని చేరుస్తుంది. ఉదాహరణకు 4 చెక్కల గొర్రు నందు జడ్డిగాలకు 4 గొట్టాలను అమర్చేందుకు వీలుగా 4 రంద్రాలు చేసి ఉంటాయి. ఈ చెక్కల సంఖ్య పెరిగే దానిని బట్టి, గొర్రుద్వారా విత్తే విస్తీర్ణము పెరుగుతుంది. దీనిని వాడి సుమారు రోజుకు రెండు నుండి నాలుగు ఎకరాలు విత్తవచ్చును. ఈ జడ్డిగాలలో నిర్దేశించిన విత్తనాన్ని వేయడానికి, నైపుణ్యం కల కూలీలు ఎంతయినా అవసరం. ఇప్పటి పరిస్థితులలో ఇది కష్టమైన పని.

సి. క్రిడా విత్తేనాగలి (CRIDA SEED DRILL) **:** ఈ విత్తేపరికరం కేంద్ర మెట్ట వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం వారిచే రూపొందించబడినది. దీనిలో గొర్రు లాగా విత్తేందుకు కూలీలు అవసరం లేకుండా, తనంతటతానే నిర్దేశించబడిన విత్తనాన్ని మరియు ఎరువును నియంత్రించేందుకు ఒక పళ్ళ చక్రాన్ని వాలుగా రూపొందించుటచే, విత్తనం ఒకొక్కటిగా పడేందుకు వీలుంది. దీనిని ముఖ్యంగా వేరుశనగలాంటి మెత్తటి విత్తనాన్ని సైతం అతి తక్కువ రాపిడికి గురి అయ్యే విధంగా నిర్మించబడినది. ఈ విత్తే పరికరం ట్రాక్టరు లేదా ఎడ్ల ద్వారా నడిపేందుకు వీలుగా తయారు చేసారు. ట్రాక్టరుతో విత్తే యంత్రంలో 9 లేదా 11 సాళ్ళు ఒకే మారు విత్తే విధంగా కర్రులు ఉండటంవల్ల గంటకు ఒకటిన్నర నుండి రెండు ఎకరాలు విత్తేందుకు వీలవుతుంది. అదే ఎడ్లతో నడిపే యంత్రంలో 3 సాళ్ళు విత్తేందుకు వీలుగా 3 కర్రులు కలిగి ప్రత్యేకించి విత్తనం డబ్బాలు అమర్చారు. దీనితో గంటకు 1/2 నుండి 1 ఎకరము వరకు విత్తడానికి వీలవుతుంది. దీని ఖరీదు సుమారు రూ. 40,000/– మరియు రూ. 60,000/– ఉంటుంది.

డి. గుజరాత్ విత్తేయంత్రము (TROUGH FEED SEED DRILL) : ఈ విత్తేయంత్రంలో విత్తనం డబ్బానుండి ఒక చిన్నపాటి దోనెలోకి పడి వాటి నుండి కప్పులతో కలిగిన చక్రం తిరగడం ద్వారా పై విత్తనం ఏవిధమైన రాపిడిగాని, ఒత్తిడిగాని లేకుండా విత్తనాన్ని కర్రులలో అమర్చబడిన గొట్టాలకు చేరుస్తుంది. ఇలా విత్తనానికి ఏవిధమైన రాపిడి లేనందున ఎటువంటి విత్తనాన్ని యైన విత్తవచ్చును. అనగా మెత్తటి, గట్టి విత్తనం లేదా చిన్న విత్తనం లేదా పెద్ద విత్తనం అయినా విత్తవచ్చును. పంటను బట్టి విత్తన మోతాదు మారడం వలన వాటికి సరిపడా కప్పులను (గుంతలను) కలిగిన రూపొందించిన చక్రాలను రూపొందించి యంత్రంతో బాటు వస్తాయి. ట్రాక్టరుతో అయితే గంటకు 1–2 ఎకరములు సులభంగా విత్తవచ్చును. దీని ఖరీదు సుమారు రూ. 38,000/– ఉంటుంది. అదే రాళ్ళు పొదిగి ఉన్న పొలాలలో వాడేందుకు వీలుగా స్ప్రింగ్ కర్రులు కలిగిన విత్తేయంత్రాన్ని వాడవలసి ఉంటుంది దీని ధర సుమారు రూ. 50,000/–.

ఈ యంత్రం ఎడ్లతో నడిపేందుకు వీలుగా కూడా రూపొందించబడి ఉంది. దీనితో అయితే గంటకు 1/2 నుండి 1 ఎకరం వరకు విత్త వచ్చును. దీని ధర రూ. 12,000/–

ఇ. ఫ్లూటడ్ ఫీడ్ విత్తే యంత్రము (FLUTED FEED SEED DRILL) **:** ఈ విత్తేయంత్రమును మెత్తటి విత్తనాలకు మినహా ఎటువంటి విత్తనాలయినా, కావలసిన విత్తన మోతాదును ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా విత్తవచ్చును. ఈ విత్తే యంత్రములో విత్తనం డబ్బా క్రింద బాగాన కర్రుల సంఖ్యను బట్టి విడివిడిగా ఫ్లూటడ్ వీళ్ళను (గుండ్రటి స్థూపాకారపు చక్రాన్ని) ఉపరితలంలో గాడీలుగా చేసినటువంటి చక్రాలను ఒక పొడవాటి కడ్డీపై అమర్చబడి ఉంటుంది. విత్తే యంత్రం గ్రౌండ్‌వీల్ నుండి వచ్చే త్రిప్పే శక్తిని ఈ కడ్డీని త్రిప్పేవిధంగా ఇనుప చైన్లద్వారా కలుపబడి ఉంటుంది. ఈ గాడీ చక్రం విత్తనం డబ్బాలో తెరువబడిన ఎడాన్ని బట్టి విత్తే విత్తనం మోతాదు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇదే పరికరాన్ని అతి చిన్న విత్తనాన్ని విత్తేందుకు వీలుగా అడుగు బాగంలో అమర్చిన మీటను ఉపయోగించి వాటి మధ్య దూరాన్ని తగ్గించి విత్తవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని వరి, గోధుమ పంట ధాన్యాలను సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. కాకపోతే ఈ యంత్రం ద్వారా విత్తినపుడు మనకు కావలసిన సాళ్ళ దూరాన్ని పొందేలా రూపొందించేందుకు వీలవుతుంది కానీ, గింజకు గింజకు మధ్య నిర్దేశించిన ఎడమ పొందడానికి వీలుకాదు. కాబట్టి ఈ విత్తేయంత్రాన్ని అన్ని పంటలకు అనగా మొక్కకూ, మొక్కకూ మధ్య దూరం ఉండవలసిన పంటలకు ఉపయోగించలేము.

ఎఫ్. జీరో టిల్ డ్రిల్ (ZERO TILL DRILL) **:** ఇది కూడా విత్తనాన్ని విత్తేందుకు ఉపయోగపడే యంత్రము కాకపోతే, నేలను దున్నకుండా విత్తవలసివచ్చినపుడు సమర్థవంతంగా పొలం ఉపరితలాన్ని అమర్చిన గట్టి కత్తివంటి కర్రును ఉపయోగించి కత్తిరించి అందులో విత్తనాన్ని వేసి వాడకలిగే విత్తేయంత్రము. అనగా నల్లరేగడి నేలలో మొదటి పంటను కోసేసిన తరువాత రెండోపంటను విత్తేందుకు, నేలను దున్నినట్లయితే పెద్ద పెద్ద మట్టిగడ్డలు ఏర్పడి తిరిగి సాగు చేయాల్సివస్తుంది. ఇలా చేయడానికి సమయం ఉండకపోవడమేకాక ఎక్కువ శ్రమపడ వలసి వస్తుంది. ఇలాంటి నేలలో పంటకోసిన వెంటనే, దున్న కుండానే విత్తనాన్ని విత్తడం ఎంతయినా అవసరం. కాకపోతే మొదటి పంటకు తప్పనిసరిగా దుక్కిని దున్ని సాగు చేయడం ఎంతయినా అవసరం ఇలా ఒకే విత్తేయంత్రము పలు రకాల విత్తనాన్ని విత్తడమే కాకుండా పలు మోతాదులలో నిర్దేశించడానికి వీలయిన అమరికలు కలిగి బహు సమర్థవంతంగా పని చేయగలిగిన యంత్రము. దీనిలో ముఖ్యంగా గోధుమ, మొక్కజొన్న, శెనగ మొదలగు విత్తనాలను చాలా సమర్థవంతంగా విత్తవచ్చును.

జి. విత్తే యంత్రము : మన దేశంలో చిన్న సన్నకారు రైతులు 80 శాతం ఉండటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇందువలన వ్యవసాయ యాంత్రీకరణలో చేతి పనిముట్లు మరియు చేతి యంత్రాల ప్రాముఖ్యత తప్పకుండా ఉంటుంది. అంతేకాక గ్రామాలలో క్షీణించిన పశుసంపద, కూలీల కొరత ఎక్కువ కావడం వలన రైతే తన పొలంలో సులువుగా వాడేందుకు వీలుగా, నడిచేటప్పుడు అమర్చబడిన లాంగ్ హ్యాండిల్‌ను తోస్తు విత్తేందుకు వీలుగా ఈ యంత్రం రూపొందించబడినది. ఇలా విత్తడంలో నిర్ధిష్టమైన విత్తనానికి మధ్య దూరం పాటించడం జరుగుతుంది. దీనికి ఉన్న ఇనుప క్లిప్పులు భూమి లోపలకు 2.5–5 సెం.మీ. లోతుకు మాత్రమే ప్రవేశించి, నిర్ధేశించిన విత్తనాల సంఖ్య (ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు) మాత్రమే విత్తడం జరుగుతుంది. ఈ విత్తే యంత్రం చాలా సమర్ధవంతంగా పని చేయడమే కాకుండా విత్తేందుకు కావలసిన సమయం చాలా వరకు ఆదా చేస్తుంది. రైతులు వర్షం పడిన వెంటనే రైతు కూలీల కోసం సమయాన్ని వృధా చేయకుండా విత్తనాన్ని తన పొలంలో విత్తుకోవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ. 8500/– రోజుకి 1–1 1/2 ఎకరం వరకు విత్తుకోవచ్చును.

మిని ట్రాక్టరుతో నడుపబడే "బహుళ ప్రయోజనాల యంత్రము" :

మన దేశంలో చిన్న సన్నకారు రైతులు సుమారు 80 శాతం ఉండడం మరియు వారి పొలాలు చిన్న చిన్న విస్తీర్ణం కలిగినందున పెద్ద పరికరాలు మరియు యంత్రాలు ఎక్కువగా ఉపయోగపడవు. అంతేకాక క్షీణించిన పశుసంపద, కూలీల సమస్య ఎక్కువగా ఉండటం వలన రైతాంగం అధిక కూలీలు అవసరమయ్యే పనులయిన విత్తడం, అంతరకృషి, కలుపు తీయడం, పంట కాలంలో ఒకటి రెండు మార్లు రసాయన మందులను పిచికారి చేయడం వంటి పనులను చాలా కష్టపడి ఎక్కువ ఖర్చు చేసి పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ కూలీల కొరతతో కూలీలు దొరకక అంతరకృషి, కలుపు తీయడం వంటి పనులను చేయలేక విడిచి పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఇలా వదిలిపెట్టడం వలన పంట దిగుబడి తగ్గి రైతుకు నష్టం జరుగుతుంది. రైతుల కష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, పండించిన పంటను సమర్ధవంతంగా కాపాడుకోవడం మరియు పంటను ఇంటికి చేర్చే వరకు తోడ్పడటానికి ఈ బహుళ ప్రయోజనాల యంత్ర పట్టీని దక్షిణ మండల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం, తిరుపతి వారు ఐ.సి.ఎ.ఆర్. ఆర్థిక సౌజన్యంతో రూపొందించడం జరిగింది.

ఈ యంత్రపు పట్టీని చిన్న రైతుకు ఉపయోగకరంగా ఉండేందుకు రూపొందించబడింది. ఈ యంత్రం ద్వారా పంట విత్తనాన్ని మరియు రసాయన ఎరువులను విత్తడం, పంటకు రసాయన మందును పిచికారి చేయడం, పంట సాళ్ళలో కలుపును తీయడంతో బాటు, సాళ్ళ మధ్య నేలను గుల్లబార్చడం వంటి పనులను సమర్ధవంతంగా నిర్వర్థించడానికి సహాయపడుతుంది.

1. విత్తేందుకు అమరిక : విత్తనాన్ని మరియు రసాయన ఎరువులను విత్తేందుకు వీలుగా ట్రఫ్‌ఫీడ్ (Trough feed) మీటరింగ్ కొలిచి నిర్ధిష్టమైన విత్తన మోతాదును విత్తేందుకు పరికరం అమర్చబడినది. దీని ద్వారా నిర్ధేశించిన సాళ్ళ దూరంలో నిర్ధేశించిన విత్తన మోతాదును విత్తవచ్చును. విత్తనాన్ని బట్టి (చిన్న లేదా పెద్ద పంట) విత్తేందుకు వీలుగా పలు చక్రాలు ఉంటాయి. సాళ్ళ దూరం మార్చేందుకు వీలుగా పట్టీ పైన క్లాంపుల దూరాన్ని సవరించి మార్చవచ్చును. విత్తనం సాళ్ళలో పడేందుకు వీలుగా కర్రులు అమర్చబడినవి. ఈ కర్రుల వెనక భాగంలో విత్తనం మరియు ఎరువులను సరఫరాకు గొట్టాలను అమర్చబడినది.

2. సాళ్ళ మధ్య అంతరకృషి చేయడానికి అమరిక : పంట కాలంలో కలుపు తీయడం, సాళ్ళ మధ్య నేలను కలియబెట్టి, గుల్లబార్చడం చాలా ముఖ్యమైన పని. ఈ విధంగా గుల్లబార్చడం వలన పంట వేరు వ్యవస్థలో గాలి మరలు వృద్ధి చెంది భూమిలోని తేమ మరియు పోషకాలను వేరు వ్యవస్థ సులభంగా తీసుకొని పంట దిగుబడి కూడా పెంపొందుతంది. ఈ యంత్రం ద్వారా అంతరకృషి సులువుగా చేయవచ్చును. ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. నుండి శక్తిని పొంది సాళ్ళ మధ్య దూరంలో నిర్ధిష్టమైన వేగంతో వంపు కర్రులు తిరుగడం వలన కలుపు మొక్కల నిర్మూలన గావించడమే కాక నేలను గుల్ల బారుస్తుంది. ఇలా గుల్లబార్చిన పొలంలో వర్షం పడినపుడు లేదా నీటి తడులు అందించినప్పుడు, మొక్కలు నీటిని బాగా సంగ్రహించి పంట దిగుబడి పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది.

3. పిచికారి చేసే యంత్రముగా : పంటలలో రసాయన మందుల పిచికారి, చీడ పీడలు మరియు క్రిమి కీటకాలను నిర్మూలనకు ఎంతో అవసరం. ఈ రసాయనాలు చాలా విషపూరితమైనవి అవడం వలన పిచికారి కూలీలతో చేసేటప్పుడు వారు అనారోగ్యానికి గురికావడం కూడా పరిపాటి. ఇప్పటి వ్యవసాయ నేపధ్యంలో రసాయనాల పిచికారికి కూలీలు ముందుకు రాక సకాలంలో నియంత్రించలేక రైతులు చాలా ఇబ్బందులకు

గురవడం పరిపాటి. ఈ తరుణంలో రసాయనాలను పొలంలో ట్రాక్టరు సహాయంతో పిచికారి చేయడం చాలా ఉపయోగకరం. ఈ రసాయనాల పిచికారికి ట్రాక్టరుకు పంపును అమర్చడం జరిగింది. ఇది మిని ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. ద్వారా శక్తిని పొంది పంపును నడుపుతుంది. దీని ద్వారా 6 నుండి 12 నాజిల్స్ వాడి పిచికారి చేయవచ్చును. ఈ రసాయన మందును నిల్వ చేయడానికి 200 లీ. ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ అమర్చబడి ఉండును.

4. రవాణా సాధనముగా : ఈ యంత్రంతో రసాయన మందులు చల్లేటప్పుడు మినహా మిగిలిన పనులకు వాడునపుడు పైభాగాన్ని బండి లాగా వాడవచ్చును. దీని ద్వారా విత్తనాలు, మందులు, పరికరాలు మొదలుకొని ధాన్యం, పండ్లు, కూరగాయలు మొదలగునవి సమర్ధవంతంగా ఇంటికి చేర్చవచ్చును.

ఇలా ఈ బహుళ ప్రయోజనాల యంత్రాల పట్టీని వాడి రైతాంగం లాభం పొందవచ్చును. ఈ పరికరం ఖరీదు సుమారు ఒక లక్ష రూపాయలు అవుతుంది.

IV. వరి పొలాలలో ఉపయోగపడే పనిముట్లు

1. వరి పొలాల్లో దమ్ము చేయడం (PUDDLING) :

ముందుగా రెక్కనాగలితో పొలాన్ని లోతుకు దున్ని ఎండకు ఎండబెట్టడం వలన మట్టి అడుగు భాగంలో ఉన్న చీడపీడల అవశేషాలు బయటపడి ఎండకు నశిస్తాయి. అదే కాక తుంగ వంటి కలుపు మొక్కల గడ్డలతో పాటు సమూలంగా బయటపడి నాశనమవుతాయి. ఇలా దుక్కి దున్నిన పొలంలో వరినాటు వేయడానికి ముందు నీటిని సుమారు 10 సెం.మీ. వరకు నిలిపి బాగా దమ్ము చేయాలి. మన రైతాంగం ఈ దమ్మును చేయడానికి కూడా చెక్కనాగలి లేదా ట్రాంప్లర్‌ను ఎడ్లతో లేదా ట్రాక్టరుకు ఇనుప చక్రాలను తగిలించి, తిరగతిప్పి దమ్ము చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల, నాణ్యమైన దమ్ము రాదు. దమ్ము ముఖ్య ఉద్దేశ్యము : నీటి సమ్మేళనంతో మట్టిని చిలికి తద్వారా నీటి అడుగు భాగంలో ఒండ్రుమట్టి పొరను ఏర్పరిచి, పై నిల్వ ఉంచిన నీరు లోపలి పొరల్లో ఇంకి పోకుండా చేయడం ఇందుకు ప్రత్యేకమైన నాగళ్లను మాత్రమే వాడాలి.

దమ్ము చేయడానికి వాడవలసిన పరికరాలుః

ఎ) ఎ.పి.ఎ.యు పడ్లరు (A.P.A.U PUDDLER) : ఎడ్లతో సేద్యంచేసే రైతులకోసం ప్రత్యేకించి నిర్మించిన పరికరం. వరి నారుని ప్రధాన పొలంలోకి మార్చినప్పటినుండి (నాట్లు వేసినప్పటినుండి) 5–10 సెం. మీటర్ల నీటిని నిల్వ ఉంచి వరి పైరును సాగుచేయడం పరిపాటి. కాకపోతే ఈ నీటి నిల్వను తగ్గకుండా కాపాడేందుకు మరియు నాట్ల సమయంలో మొక్క వేళ్ళు ఇమడడానికి మెత్తటి భూమిని పొందుపరిచేందుకు "వరిదమ్ము" చాలా అవసరం అనగా ఇలా దమ్ము చేయు గలిగిన దానికై ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎ.పి.ఎ.యు. పడ్లరును వాడి అనుకున్న విధంగా వరిదమ్మును చేయగలదు. ఈ విధంగా ఎ.పి.ఎ.యు పడ్లరుతో దమ్ము చేయడం వలన నేల అడుగు భాగంలో ఒక గట్టి మట్టి పొర ఏర్పడి నీటిని లోపలి పొరలలోకి పోకుండా చేసి తద్వారా ప్రధాన పొలంలో పెట్టే సాగునీటి మొత్తాన్ని సుమారు 30–40 శాతం ఆదా చేయవచ్చు. ఎ.పి.ఎ.యు పడ్లరు ఖరీదు రూ. 2,800/–.

బి. విష్ణు పడ్లరు (VISHNU PUDDLER) : దీనిని ట్రాక్టరుకు తగిలించుకొని వరి పొలంలో దమ్ము చేయడానికి ప్రత్యేకంగా "ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి యాజమాన్య పథకము", తిరుపతి వారు రూపొందించారు. ఈ యంత్రాన్ని నీటిని నిల్వ ఉంచిన పొలంలో దమ్మును సమర్థవంతంగా చేయవచ్చును. ఈ యంత్రంలో 36 లేదా 40 కర్రులు

కలిగి ముందుకు లాగడం వలన మధ్యలో అమర్చబడిన షాఫ్ట్ తిరిగి, దానితో పాటు అమర్చిన పలకలు లేదా తెడ్లను త్రిప్పుతుంది. ఇలా త్రిప్పేప్పుడు మట్టి ముద్దలను పైకి క్రిందకు కలియత్రిప్పి చిలకడం వలన దమ్ము నాణ్యత పెంపొందిస్తుంది, ఇలా దమ్ము చేసిన పొలాన్ని పలక సహాయంతో చదును చేసి 12-24 గంటలు కదపకుండా ఉంచి ఆపై పొలంలో నాట్లను వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడంవలన వరి నాట్లకు కావలసిన మెత్తటి పొర ఏర్పడుతుంది. అంతేకాక వరి సాగులో సాగునీటి ఆదా 40 శాతం వరకు మరియు దమ్ముచేసే సమయము 50 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చునని పరిశోధనాపూర్వకంగా నిరూపించబడింది. దీని ఖరీదు రూ. 18,000/- నుంచి 22,000/- వరకు ఉంటుంది

సి. రోటోవేటర్ (ROTOVATOR) : రోటోవేటరు మెట్ట సేద్యంలోనే కాక వరిదమ్ము చేయడానికి సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఇది ముందు వివరించిన విధంగా ట్రాక్టరు/పవర్ టిల్లర్ యొక్క పి.టి.ఓ. షాఫ్ట్ ద్వారా నడుపబడే యంత్రము దీనికి అమర్చబడిన ఒంపు కర్రల పి.టి.ఒ ద్వారా అందిన శక్తితో వేగంగా తిరిగి తిప్పి మట్టిగడ్డలను నూర్చి నీటిలో చిలకరిస్తుంది. ఇలా చేయడం వలన వరినాట్లుకు కావలసిన దమ్ము నాణ్యత పెరిగి నీటిని నేలలోపలికి ఇంకి పోకుండా పూర్తిగా అరికడుతుంది. అంతేకాక ఈ రోటోవేటర్‌ను వాడే పక్షంలో దుక్కిని నాగలితో దున్నే అవసరం కూడా ఉండదు. కాకపోతే నీటిని నిల్వ ఉంచిన పొలంలో రోటోవేటర్ సహాయంతో ట్రాక్టర్/పవర్ టిల్లర్ మొదటి గేరులో అంటే అతి తక్కువ వేగంలో దమ్ము మొదలు పెట్టాలి. ఆ తరువాత వేగం పెంచి దమ్ము నాణ్యతను పెంచవచ్చు. ఇలా చేయడం మూలంగా మామూలు పద్ధతితో పోలిస్తే 60 శాతము సమయాన్ని, 40 శాతము సాగునీటిని తగ్గించి, నాణ్యమైన దమ్మును పొందవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ॥ 1,00,000 వరకు ఉంటుంది.

డి. పళ్ళెపు దంతి (DISC HARROW) **:** ఈ పళ్ళెపు దంతిని మెట్ట సేద్యంలోనే కాక, వరిపొలాల్లో దమ్ము చేయడానికి కూడా సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. కాకపోతే, ఈ పళ్ళెపు దంతులలో సింగిల్ యాక్షన్ డిస్క్ హారో (ఒకే వరుసలో అమర్చబడిన పళ్ళాల దంతి) ని మాత్రమే దమ్మును చేయడానికి వాడవలెను. ఇలా అడుసు పొలంలో దమ్ము చేసిన తరువాత చదును చేసే పలకను వాడి నేల ఉపరితలాన్ని చదును చేయడం వరి పంట నీటి యాజమాన్యంలో చాలా ముఖ్యమైన పని. ఈ పరికరం ద్వారా సాగు నీటిని 20% వరకు ఆదా చేయవచ్చునని నిరూపించబడినది. పళ్ళెపు దంతి ఖరీదు రూ. 30,000/-.

2. పచ్చిరొట్ట ఎరువును కలిపే ట్రాంప్లర్ (TRAMPLER) **:**

రైతాంగం వరి పొలంలో నేల స్వభావాన్ని బట్టి పోషకాలు మరియు మట్టి భౌతిక పరిమాణాలను మెరుగు పరిచేందుకు జనుము లేదా జీలుగలను (లేదా) రైతుకు అందుబాటులో ఉన్న ఇతర పచ్చిరొట్ట ఎరువును కలుపడం పరిపాటి. ఈ పచ్చిరొట్టి ఎరువుకై పండించే నేలలో కలిపేందుకు దున్ని పొలంలో నీటిని నిల్వ ఉంచి ఈ ట్రాంప్లర్‌ను వాడాలి. దీనిలో ఎద్ద సహాయంతో నడిపేవి మరియు ట్రాక్టరు సహాయంతో నడిపేవి విడి విడిగా రూపొందించబడింది. ఈ ట్రాంప్లర్‌కు అమర్చిన పొడవాటి కత్తులు (బ్లేడ్స్), పరికరాన్ని లాగినపుడు నేలపై పరచబడిన పచ్చి ఆకును కత్తిరించి మట్టిలోపలకు త్రొక్కుతూ మట్టిని కొంతవరకు తిరగ తిప్పుతుంది. ఇలా ట్రాంప్లర్‌ను వాడి పచ్చిరొట్టె ఎరువును తొందరగా మట్టిలోకి కలపడమేకాక సమర్దవంతంగా కుళ్ళేందుకు తోడ్పడుతుంది. రైతాంగం దీని ఆకార నిర్మాణాలను చూసి పొరపాటుతో వరి దమ్ముకు చేసే యంత్రంగా వాడడం ఏ మాత్రం ఉపయోగకరం కాదు.

3. ఎ. వరి డ్రమ్ సీడరు (DRUM SEEDER) :

వరిని, నాట్ల పద్ధతిలో సాగు చేయడం మన రాష్ట్రంలో పరిపాటి, కాకపోతే ఈ పద్ధతికి ఎక్కువ కూలీల ఆవశ్యకత ఎంతయినా అవసరము. రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న వ్యవసాయ కూలీల కొరత వల్ల నాట్ల సమయంలో రైతాంగాన్ని చాలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. ఇలా ఇబ్బందుల నుండి బయట పడేందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వరి గింజలను సాళ్ళలో నేరుగా విత్తడానికి రైతాంగం సముఖత చూపుతున్నారు. ఇలా సాళ్ళలో మొలక ఎత్తిన వరి గింజలను నాటేందుకు డ్రమ్ సీడరును చాలా సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఈ డ్రమ్ సీడరును మొట్టమొదటగా అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధన సంస్థ (IRRI) వారిచే రూపొందించబడినప్పటికి, దానిపై పరిశోధనలను జరిపి, దీనిని ఫైబర్ ప్లాస్టిక్‌తో రూపొందించి తగువైన చక్రాలను అమర్చి, దమ్ముచేసిన పొలంలో కూడా అతిసులువుగా, ఆడ కూలీలు సైతం లాగేందుకు వీలుగా నిర్మించబడింది.

ఈ డ్రమ్ సీడరు ద్వారా ఒకే సారి ఎనిమిది వరుసలలో సాళ్ళమధ్య 20 లేదా 25 సెం.మీటర్ల దూరంలో విత్తేందుకు వీలవుతుంది. ఈ డ్రమ్ సీడరు నందు నాలుగు స్థూపాకారుడు డబ్బాలను మధ్య భాగంలో తిరిగే షాఫ్టుకు అమర్చి, ఈ షాఫ్టుకు ఇరువైపులా చక్రాలను అమర్చబడి ఉంటుంది. మనము నాటాలనుకున్న వరి విత్తినాన్ని 24 గంటలు నానబెట్టి 12 గం॥ మండె కట్టి, గింజల నుండి మొలక ఆరంభదశలో పరికరానికి అమర్చిన నాలుగు డబ్బాలలో నింపాలి. ఇలా డబ్బాలను 3/4 వరకు నింపి, పరికరాన్ని ముందుగా దమ్ముచేసి చదును చేసిన పొలంలో చక్రాల సహాయంతో పరికరానికి అమర్చిన, చేతిపిడి సహాయంతో లాగడం వలన చక్రాలు తిరిగి డబ్బాలు తిరిగి, డబ్బాలకున్న రంద్రాల ద్వారా పొలంలో వరుసగా పడుతుంది. ఈ వరుసలు పాడవకుండా పొలంలో వారం వరకు పలుచటి నీరు మాత్రమే పెట్టాలి. ఇలా పొలంలో నీరు పలుచగా ఉండడం వలన కలుపు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉండడంవలన, కలుపు మందును తగు మోతాదులో 5–6 వ రోజులలో వాడడం వలన సమర్థవంతంగా కలుపును నివారింప వచ్చును. డ్రమ్ సీడరును లాగడానికి ఒకరు, ఒకరు విత్తనం అందించడానికి అవసరము కావడం వలన వరి నాటే ఖర్చు బాగా తగ్గి సుమారు రూ. 1500/– నుండి రూ. 2000/– వరకు ఆదాచేయవచ్చునని పరిశోధనల ద్వారా నిరూపించబడింది. ఈ డ్రమ్ సీడరును ఉపయోగించి రోజుకు 2–3 ఎకరాల వరి నాటవచ్చును. ఇంతేకాక నాట్లు వరుసలలో వేయడం వలన వరుసల మధ్యలో కలుపు తీసేందుకు కోనోవీడరును సమర్థవంతంగా ఉపయోగించవచ్చును. ఈ విధానంలో రైతులు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు పొలం చదునుగా ఉండి తక్కువ తడి పొలమంతా పెట్టేందుకు వీలై ఉండాలి మరియు డబ్బాలలో నుండి గింజలు సక్రమంగా రాలేందుకు వీలుగా మొలక ఎక్కువ పొడవు లేకుండా జాగ్రత్త పడడం ఎంతయినా అవసరం.

బి. వరి నాటే యంత్రాలు (TRANSPLANTER) :

వరి సాగు చేసే రైతాంగం వరి నారును నారుమడి నుండి తీసి తిరిగి ప్రధాన పొలంలో నాటడానికి కావలసిన వ్యవసాయ కూలీల దొరకక, సరియైన సమయంలో నాట్లు వేయలేక చాలా ఇబ్బందులకు గురై నాట్లును ఇబ్బందికరంగా ముగిస్తున్నారు. దీనికి ముఖ్యమయిన కారణం, వరినాట్లు వేయడం శ్రమతో కూడకున్న పని మరియు బురదలో చేయవలసిన పని. మారుతున్న జీవనశైలి పెరుగుతున్న ఆర్థిక స్థితి గతులు, వరినాట్లు నాటేటువంటి పనులను చేపట్టడానికి సుముఖతను చూపడం లేదు. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వరినాటు

యంత్రాలు ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. దీనిని 25 సం॥ ముందరనే ప్రవేశపెట్టినప్పటికి మన రాష్ట్రంలో అంతగా రైతు ఆదరణ పొందలేదని చెప్పవచ్చును. ఈ వరినాటే యంత్రము, యాంత్రీకరణలో ముందంజ వేసిన పంజాబ్, హర్యానా మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలలో అనేక పరిశోధనలు చేసినప్పటికిని ప్రాచుర్యం మాత్రం అంతంత మాత్రమే.

కాకపోతే ఇప్పుడు మనదేశంలో తలెత్తిన వ్యవసాయ కూలీల లేమిని రైతాంగాన్ని ఈ నాట్ల యంత్రాల వైపు చూసేలా చేస్తున్నది. ఈ వరి నాటు యంత్రంలో ముఖ్యమయినది నారు పెంచడం. ఈ నారును ప్లాస్టిక్ ప్రత్యేక ట్రేలలో గాని లేదా నిర్ధారించిన పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే పెంచిన నారును యంత్రంద్వారా నాటేందుకు వీలవుతుంది. ఈ నారును నారుమడిలో కూడా ప్లాస్టిక్ షీటును పరచి దానిపై పలుచగా మట్టిని వేసి దాని పై మొలకెత్తిన వరి విత్తనాలను చల్లి పలుచగా నీరుతో తడపడం వలన నారును పెంచవచ్చు. ఇలా 15–20 రోజుల నారును అనగా (12–15 సెంటీ మీటర్లు పెరిగిన తరువాత) ట్రే కొలతల కనుగుణంగా కత్తిరించి యంత్రం ద్వారా చాలా సమర్థవంతంగా ఈ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్‌పై పెంచడంలో ఇబ్బందులతో పాటు మట్టి మందము విత్తనం సాంద్రత సరిసమానంగా ఉండేట్లు చేయడం చాలా కష్టమైన పని దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ట్రేపద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ పద్ధతిలో ప్లాస్టిక్ ట్రేలు సుమారు 600 గ్రా॥ల మట్టిని నింపి ఆపై విత్తనాన్ని పరచి ఆపై మట్టి మరియు ఎక్కువ పశువుల ఎరువు లేదా వర్మికంపోస్టు వేయడం ఆపై నీరు చిలకరించడం వరకు ఒకే కన్వేయర్ యంత్రం ద్వారా నిర్వర్తించవచ్చును. ఇలాంటి 80 ట్రేలు ఒక ఎకరా పొలానికి కావల్సివుంటుంది. ఈ ట్రేలను పొలంలో ఒక మూలన పలుచటి నీటిని కట్టి దాంట్లో వుంచి 15 నుంచి 25 రోజులు పెంచి నారును యంత్రం ద్వారా సమర్థవంతంగా నాటవచ్చును.

నారు నాటేందుకు ముందు పొలాన్ని బాగా దమ్ము చేసి, చదును చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంతేకాక పొలాన్ని ఆరబెట్టాలి. నాటే ముందు పలుచగా నీరు పెట్టడం వల్ల వరి నారు నాటే యంత్రం సులువుగా నడిపేందుకు వీలవుతుంది.

ఈ యంత్రం ద్వారా నాటినపుడు 8 సాళ్ళలో ఒకే మారు నాటడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రత్యేకించి అమర్చిన వేళ్ళులాంటి అమరిక ట్రే నుండి నారును తీసి పొలంలో నాటడం జరుగుతుంది. ఇక పోతే సాళ్ళలో నాటుకు నాటుకు మధ్య సుమారు 14 నుండి 23 సెం॥ మీటర్లు ఉంటుంది. ఈ నాట్లు పడే లోతును గమనించి మనకు కావలసిన విదంగా నేలను బట్టి లోతు మార్చుకొనేందుకు వీలవుతుంది. ఈ యంత్రం ద్వారా రోజుకు 2–6 ఎకరములు వరినాట్లను వేయవచ్చును. వ్యవసాయ కూలీలు ఖర్చు సుమారు 45 శాతం తగ్గుతుంది. దీని ఖరీదు రూ. 2,75,000/– నుండి రూ. 18,00,000/– వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి నాటేయంత్రం వాడేందుకు ఉన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సామూహికంగా ఒక గ్రామంలో ఒకటి లేదా రెండు యంత్రాలను ఉంచుకొని వాడటం ఎంతయినా ఆదాయకరం.

V. అంతర కృషికి వాడే పనిముట్లు

పంట ఏదైనా అంతర కృషి చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ ఇలా అంతర కృషి చేయడం వల్ల పంటపొలంలో కలుపు నివారించడమే కాక మొక్కవేళ్ళ దగ్గర నేలను గుల్లబారే విధంగా చేసి తద్వారా వేళ్ళు గాలిని పీల్చుకోవడేమే కాక బాగా లోపలికి ప్రాకి భూమిలోపల పొరల లోని నీటిని సమర్థవంతంగా పొందుతుంది. అంతేకాక మెట్ట

సేద్యంలో అయితే భూమిలోపలి పొరలనుండి సన్నటి నీటి రంద్రాల ద్వారా నీరు వాతావరణంలోకి కలుస్తుంది. ఈవిధంగా నష్టపోయే నీటిని అంతర కృషి ద్వారా అరికట్టవచ్చును. రైతాంగం పలు విధాలుగా అంతర కృషిని చేస్తారు. అనగా చేతి తొలిక నుండి ట్రాక్టరువరకు ఉపయోగించి చేస్తారు. ఈ అంతర కృషి సులభతరం చేయాలంటే, విత్తనాన్ని సాళ్ళలో విత్తాలి. అప్పుడే ఈ అంతర కృషిని యాంత్రీకరణ చేసేందుకు వీలవుతుంది. వీటియంత్రాలలో ముఖ్యమైనవి.

(ఎ) లాంగ్ హ్యాండల్ వీడరు :

స్టార్ వీడరు, సింగిల్ బ్లేడు వీడరు, కోనోవీడరు, రోటరీ వీడరు మొదలైనవి. ఈ పరికరాలను నిలుచున్న భంగిమలో ఉండి సాళ్ళమధ్య కలుపును తీయడమే కాక మొక్కల వేళ్ళవద్ద నేలగుల్ల బారే విధంగా చేయడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినది. దీనితో ఎన్నోరకాల కర్రులను రూపొందించి వాడుకోవచ్చును. ఈ స్టార్ వీడరు రెండు పళ్ళచక్రాలను చట్రంలో అమర్చి దీనికి పొడగాటి చేతి పిడిని, నిలబడి ఉపయోగించే వీలుగా రూపొందించి ఉంటారు. ఇలా నిలుచున్న బంగిమలో పని చేయడం వలన, పనికి కావలసిన శ్రమ అతి తక్కువ అవసరం ఉంటుంది. ఒక మనిషి దీని సహాయంతో రోజుకు 0.25–0.4 ఎకరాలు అంతర కృషి సమర్థవంతంగా చేయవచ్చును. అంతేకాక వంగుకొని తొలికతో చేసే శ్రమను పోలిస్తే సుమారు 50 శాతం తక్కువ శ్రమతో పూర్తిచేయవచ్చును.

(బి) ఎడ్లతో నడిపే అంతర కృషికి ఉపయోగపడే యంత్రాలు :

1. గుంటూరు / ఒంగోలు నాగలి : ఇది ఎడ్ల సహాయంతో పనిచేసే అంతర కృషికి గాను రూపొందించిన పరికరము. దీనిలో మూడు కర్రులు ఒక చట్రానికి బిగించి ఈ చట్రము రెండు చక్రాల పై అమర్చి, ఎద్దులు సులువుగా లాగేందుకు వీలుగా నిర్మించారు. ఈ కర్రుల అడుగు భాగంలో బాతు కాలిని పోలి మట్టిని కదిపి కలుపు మొక్కలు పెకలించే విధంగా ఉంటుంది ఈ కర్రుల మద్య దూరం పంట సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని బట్టి మార్చుకొనేందుకు వీలుగా రూపొందించారు. ఈ కర్రుల మధ్య చట్రం చక్రాలపై ఆధారపడి నడువడం వలన, ఎద్దులకు శ్రమ చాలా తక్కువ. ఈ పరికరంతో సుమారు గంటకు 0.36 నుండి 0.4 ఎకరములు అంతర సేద్యం చేయవచ్చును.

2. 3 లేదా 5 కర్రుల నాగలి : ఈ నాగలి ప్రత్యేకంగా ఎడ్లతో లాగేందుకు రూపొందించబడినవి ఈ నాగలిలో 3 లేదా 5 కర్రులు ఒక చట్రానికి బిగించి వాటి మద్య దూరం సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని అనుసరించి మార్చి అంతర కృషిచేయడానికి వీలుగా రూపొందించి ఉంటుంది. అందువలన ఏ పంటకైనా అంతరకృషి చేసేందుకు సమర్థవంతంగా వాడగలం. దీనిలో చక్రాలు రూపొందించనందువలన గంటకు 0.25 నుండి 0.3 ఎకరములు మాత్రమే సేద్యం చేయగలదు.

(సి). సెల్ఫ్‌ప్రోపెల్డ్ వీడరు : దీనిలో 3 నుంచి 5 హెచ్.పి. డీజిల్ ఇంజనును చట్రంపై బిగించి ఆ శక్తిని బెల్టు ద్వారా వెనుక రూపొందించబడిన రోటరీ వీడరును మరియు వీడరు ముందుకు నడిపేందుకు చక్రాలను అమర్చి చక్రాలను త్రిప్పే విధంగా అమర్చబడి ఉంటుంది. కాకపోతే దీని వేగము చాలా తక్కువ. దీనిలో కర్రులను పంట సాళ్ల మధ్య దూరాన్ని బట్టి మార్చుకొని అన్ని రకాల పంట సాళ్ళలో అంతరకృషికి వీలుగా మార్చుకొనేందుకు

వీలైతుంది. దీనిని చిన్న రైతులు తక్కువ శ్రమతో తమంతట తాము సేద్యం (వ్యవసాయం) చేసేందుకు వీలుగా రూపొందించబడినది. దీని ద్వారా గంటకు 0.15 నుండి 0.25 ఎకరములు అంతరకృషి చేయవచ్చును. ఇదికాక 5–6.5 హెచ్.పి. ఇంజను సహాయంతో నేరుగా కర్రులను నడుపబడే యంత్రము. దీని వేగము ఎక్కువ మరియు గంటకు 1 ఎకరము వరకు అంతరకృషి చేయవచ్చును. వీటి ఖరీదు రూ. 52,000/– నుండి రూ. 56,000/– వరకు ఉంటుంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన చక్రములు లేనందున యంత్రాన్ని నియంత్రించడం కష్టం అందువలన యంత్రం ముందుకు పోవడానికి నిర్దేశించిన చక్రాలు వున్న యంత్రము సులువుగా ఉపయోగించవచ్చు.

డి. ట్రాక్టరు సహాయంతో సాళ్ళలో అంతరసేద్యం చేసే యంత్రం :

అంతరకృషి చేయడం ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నప్పటికి మెట్ట భూమిలో తప్పనిసరి, ఎందుకంటే అంతరకృషి ద్వారా కలుపు మొక్కలను తొలగించడమేకాక, సాళ్ళ మధ్యలో భూమిని గుల్ల బార్చడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పడ్డ వర్షం లేదా సాగు నీరు బాగా ఇంకి మొక్క వేర్లకు అందించడం జరుగుతుంది. అంతేకాక అందించిన పోషకాలను మొక్క వేర్ల వరకు చేరి వృదా కాకుండా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అంతరసేద్యం మెట్ట సేద్యంలో అయితే వర్షాలు లేనప్పుడు పంట బెట్టకు గురైనపుడు భూమిలోపలి తేమ సన్నటి గొట్టాల ద్వారా ఆవిరై పంట మరికాస్త నీటి యద్దడికి గురైయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అంతరకృషి ద్వారా ఆ నాళాలను పూడ్చి తద్వారా భూమిలోపలి తేమను నిలుపు కొనేందుకు వీలవుతుంది.

ఈ పరికరం ట్రాక్టరు పి.టి.ఓ. సహాయంతో రెండు లేదా మూడు సాళ్ళను ఒకేమారు చేసేందుకు వీలవుతుంది. దీని ఖరీదు రూ. 70,000/– అవుతుంది. దీని ద్వారా రోజుకు 6 ఎకరములు వరకు అంతరకృషి చేయవచ్చు.కాకపోతే ఈయంత్రం వాడేందుకు పంటను సాళ్ళ పద్దతిలో మాత్రమే నాటి ఉండాలి మరియు సాళ్ళమధ్య 20 సెం.మీ గాని అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.

VI. పొలంలో సాగు నీటిని ఆదాచేసే పనిముట్లు

పొలం తయారీలో కొన్ని మేలైన మెళకువలు పాటించడం ద్వారా మరియు సరైన పనిముట్లు వాడడం ద్వారా కూడా సాగు నీటిని 20–40 శాతము ఆదా చేయవచ్చును. ఈ ప్రక్రియలో వాడ వలసిన పనిముట్లను పరిశీలిస్తే:

బేసిన లిస్టరు (BASIN LISTER) : ఈ పరికరాన్ని మెట్ట సేద్యంలో ఎక్కడ పడిన వర్షపునీటిని అక్కడనే వాడేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పరికరం. ఇది పొలంలో నాటిన సాళ్ళను మినహా పొలమంతా కాలువలు మరియు గట్లు చేయడానికి సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఈ పరికరంలో అమర్చబడిన మీట పొలంలో మట్టిని త్రొవ్వే కర్రును కిందకు పైకి మరల్చడం వలన మట్టిని కొద్ది కొద్దిగా తీసి చిన్న చిన్న గుంతలుగా చేస్తుంది. ఇలా చేసిన కాలువకు అడ్డుకట్ట కూడా వేస్తుంది. మెట్ట భూములలో పంట వరుసలను మినహాయించుకొని పొలమంతా చేయడం వలన గుంతలలో పడే అకాల వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండి. ఆ నీరు ప్రక్కనే ఉన్న మొక్కలకు ఎక్కువ కాలం అందుబాటులో ఉంటుంది.

ప్లాస్టిక్ మల్చ్ వేసే యంత్రము : కొత్త వ్యవసాయ విధానాలలో తేమ ఆదాచేసే ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ ఒకటి ముఖ్యంగా రైస్డ్ బెడ్ (ఎత్తయిన మట్టి బోదెల) పైన పండించే పంటలు మరియు కూరగాయలు పళ్ళ తోటల నుండి పంటలను నాటేటప్పుడు మట్టి బోదెలను వేస్తూ దానితో పాటు డ్రిప్ పైపును వాడి పండించడం పరిపాటి.

ఈ విధంగా మట్టి బోదెలను వేసే ఆపై డ్రిప్ పైపును మరియు ప్లాస్టిక్ షీట్‌ను పరిచి, షీట్ ప్రక్కన మట్టితో కప్పడం వంటి అన్ని పనులను ఒకే సారి చేయడం కోసం రూపొందించిన పరికరమే ఈ ప్లాస్టిక్ మల్చ్ పరికరం. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పంటకు లేదా మొక్కకు ఇచ్చిన తేమ ఆవిరి కాకుండా పంట మొదళ్ళలోనే ఉండి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాక కలుపు మొక్కలు వచ్చేందుకు వీలు లేకుండా చేస్తుంది. ఇలా ఉపయోపడడం వలన కలుపుతీసేందుకు అయ్యే ఖర్చును తగ్గించి నీటి ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో అమర్చబడిన చక్రం ద్వారా కావల్సిన దూరంలో గుంతలు చేసి వాటిలో పంట లేదా విత్తనం నాటేందుకు వీలౌతుంది.

దీని ఖరీదు రూ. 71,000/- ఉండి మామూలు 35 హెచ్‌పి ట్రాక్టరుతో లాగేందుకు వీలుగా రూపొందించబడింది. ఈ పరికరం ద్వారా 1 మీటరు లేదా 1.5 మీటర్లు లేదా 2 మీ. వెడల్పుగల మల్చింగ్ షీటును వేయవచ్చును.

స్ప్రేయర్స్ :- (మందులు పిచికారీ చేయు పరికరము)

పంట దిగుబడి అనేక విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.అందులో అతి ముఖ్యమైనది పంటను నాశనం చేసే పురుగులు మరియు క్రిమికీటకాల నుండి సంరక్షించుకోవడం. స్ప్రేయర్ అను ఈ పరికరము కలుపు నివారణ మందులను, ఎరువులను మరియు పురుగు మందులను సమాంతరంగా పిచికారీ చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. స్ప్రేయర్స్ ఉపయోగించే శక్తి ప్రకారం పలు విధములుగా విభజించబడినవి. న్యాప్ స్యాక్ స్ప్రేయర్స్, పవర్ స్ప్రేయర్స్, ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ బూమ్ స్ప్రేయర్స్ మొదలైనవి. న్యాప్ స్యాక్ స్ప్రేయర్ వీపున తగిలించుకుని ఎడమ చేతితో లీవర్‌ను పైకి కిందకి కదిలించడం వలన ట్యాంక్‌లో పీడనం ఏర్పడి పిచికారీ చేయవలసిన ద్రవం నాజిల్ ద్వారా సూక్ష్మ రేణువులుగా (తుంపర్లుగా) మారబడతాయి. రేణువుల పరిమాణం పీడనం మరియు నాజిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

న్యాప్ స్యాక్ స్ప్రేయర్ పొలంలో పంట నాశనం చేయు పురుగులను సమర్థవంతంగా ఎదురుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. న్యాప్ స్యాక్ స్ప్రేయర్ ధర రూ।। 500-2500/-లో మార్కెట్‌లో దొరుకుచున్నది. పవర్ స్ప్రేయర్ వీపున తగిలించుకుని ఎడమ చేతి సహాయంతో మందు కావలసిన ప్రదేశంలో వేయవచ్చును. పవర్ స్ప్రేయర్ పెట్రోల్ లేదా కిరోసిన్ ఇంజన్‌తో నడపబడుతుంది. ఈ పరికరము మార్కెట్‌లో రూ।। 5000-12,000/- ధరలో లభ్యమవుతుంది. ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ బూమ్ స్ప్రేయర్ ట్రాక్టర్ సహాయంతో నడుచును. ఈ పరికరము ట్రాక్టర్ వెనుక భాగంలో కావలసిన సమయంలో అమర్చుకోవచ్చును. ఈ పరికరము ట్రాక్టర్ పిటిఒ సహాయంతో ద్రవాన్ని పిచికారీ చేస్తుంది. దీని ధర ట్రాక్టర్ అశ్వ శ్రేణి మరియు ట్యాంక్ కెపాసిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

VII. పంట కోసే యంత్రాలు (HARVESTING EQUIPMENT) :

ముఖ్యంగా వరి, గోధుమ పంటను సమర్థవంతంగా కోసే యంత్రాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చిన్న ఇంజనుతో నడుస్తూ కోసే యంత్రం రీపరు (Reaper) నుండి పెద్ద కంబైనర్ (Combine Harvester) ల వరకు ఉన్నాయి. తద్వారా పంటను కోయటమే కాకుండా పంట నూర్పిడి కూడా వీలవుతుంది. వీటి ద్వారా రోజుకి ఒక హెక్టారు నుండి 10 హెక్టారులు వరకు పంటను కోయవచ్చును.

ఎ. రీపరు మరియు రీపర్ కంబైనర్ (REAPER CUM BINDER) : వరి చిన్న కమతాలలో పండించినప్పుడు, పెద్ద కంబైనర్‌ల వంటి యంత్రాలతో కోసి నూర్పిడి చేయడం అసాధ్యం (చాలా కష్టం). అదీకాక కంబైనులతో కోయడం వలన సుమారు 40–50 శాతం వరి గడ్డి పొలంలో వదిలి వేయవలసివస్తుంది. చిన్న సన్నకారు రైతులు ఇలా వరి గడ్డిని నష్టపోయేందుకు ఇష్టపడరు. ఇందుకుగాను అనగా చిన్న కమతాలలో మరియు వరి గడ్డిని నష్టపోకుండా కోసేందుకు రీపరు లేదా కంబైండర్ రూపొందించబడింది, ఇందులో రీపర్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా వరి పంటను గడ్డితో బాటు కోసి ఒక్క ప్రక్కకు నెట్టి వరుసగా పేరుస్తుంది దీనిని తీసుకొని ఆల్ క్రాప్ త్రెషర్ ద్వారా గాని లేదా కూలీలతో పెడల్ ఆపరేటర్ త్రెషర్ ఉపయోగించి నూర్పిడి చేయవచ్చును. అదే రీపర్ కమ్ బైండర్ అయితే వరి గడ్డిని కోసి కట్టలు కట్టి పొలంలో విడుస్తుంది. ఇలా కట్టలు కట్టడం వలన పొలం నుండి నూర్పిడి చేసే స్థలానికి సులువుగా చేర్చవచ్చును. అంతే కాక ధాన్యం నష్టపోకుండా నూర్పిడి చేయడం వీలవుతుంది. ఈ యంత్రాల ఖరీదు రూ॥ 1,00,000/– రీపర్ మాత్రమే, అదే రీపర్ కంబైండర్ అయితే రూ.3,50,000/–. దీని సామర్థ్యం రోజుకు 3 నుంచి 5 ఎకరాలు వరకు సమర్థవంతంగా చేయవచ్చును.

బి. కంబైన్డ్ హార్వేస్టర్ (COMBINED HARVESTER) : ఈ వరికోసే యంత్రాలలో ముఖ్యంగా చక్రాలను అమర్చినవి మరియు బెల్టు (Track) చక్రాల ద్వారా నడిచేయంత్రాలు ఉన్నాయి. చక్రాల కోసేయంత్రాలను తేలికపాటి నేలలో మరియు ఇసుకశాతం ఎక్కువగా ఉండే వరిపొలాలలో సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని నల్లరేగడి నేలల్లో అనగా చక్రాలు దిగబడిపోయే నేలల్లో వాడేందుకు వీలుకాదు. అదే బెల్టు చక్రాలు ఉన్న యంత్రాలను ఏ నేలలోనయినా సమర్థవంతంగా వాడి వరి, గోధుమ పంటను కోసి నూర్పిడి చేయవచ్చును. కాకపోతే ఈ యంత్రాలకు సంవత్సరము పొడవునా పని ఉండనందున పంట సమయంలో ఖాళీగా ఉంచవలసివస్తుంది. ఈ సమయంలో రైతుకు పెట్టిన పెట్టుబడినుండి అనగా 4 చక్రాలలో ఏ రెండు లేదా ఒక చక్రానికి నేలపై పట్టు దొరికినా పట్టు సహాయంతో పనిని పూర్తి చేయగలదు అనగా అవరోదాలను అధిగమించగలదు. ఆదాయం రాదు. కనుక ఇటీవల ట్రాక్టరును మీద ఉంచి, ట్రాక్టరు శక్తితో నడిపి, ఖాళీ సమయాలలో ట్రాక్టరును వ్యవసాయ పనులకు వాడేందుకు వీలుగా రూపొందించడం జరిగింది. దీని ఖరీదు రూ. 14 లక్షల నుండి రూ. 16 లక్షలు వరకు ఉంటుంది.

ఇదే కంబైన్డ్ హార్వేస్టర్లను కొద్ది పాటి మార్పులతో మొక్క జొన్న పంటను కోసి నూర్పిడి చేసేందుకు కూడా వాడవచ్చును. యంత్రాన్ని వాడి మొక్క జొన్న మొక్కతో పాటు కోసి దాని తరువాత నూర్చి మొక్క మరియు కంకి భాగాన్ని పొడి, వేరు చేసి నాణ్యమైన మొక్కజొన్న విత్తనాలను మాత్రమే ఒక దగ్గర సంచుల ద్వారా పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఇదే యంత్రాన్ని ముందరి కట్టర్ బార్‌ను మార్చి వరికోసి నూర్చే యంత్రంగా వాడుకొనేందుకు వీలైన నిర్మాణాలు కూడా మార్కెట్‌లో లభిస్తున్నాయి. దీని ఖరీదు రూ. 19 లక్షలు.

వరి గడ్డి కట్టలు కట్టే యంత్రము :

మన రాష్ట్రంలో వరి పంటను 60–70 శాతము కంబైన్ హర్వెస్టర్ ద్వారా కోసి నూర్పిడి చేయబడుతుంది. కానీ ఇలా చేయడం వలన పొలంలో వదిలివేయబడ్డ వరి గడ్డిని తీసి పశుగ్రాసంగా వాడడం చాలా శ్రమతో కూడినది మరియు ఎక్కువ కూలీల అవసరం పడుతుంది. ఇందువలన ఒక్కోసారి వరిగడ్డిని పొలంలో కాల్చేయడం

జరుగుతుంది. ఇలా నష్టపోకుండా, పొలంలో పడిన గడ్డిని తీసి కట్టలు కట్టేందుకు వీలుగా ఈ యంత్రమును రూపొందించడం జరిగింది. ఈ యంత్రము ట్రాక్టరు పి.టి.ఓ. సహయంతో నడుపబడుతుంది. ఈ యంత్రముతో వరి గడ్డి రెండు విధాలుగా కట్టలు కట్టబడుతుంది. ఒక రకంలో కట్టలు గుండ్రంగా చుట్టలుగా చేయబడుతుంది. మరొక రకంలో గడ్డిని చతురస్రాకారంగా కాని లేదా దీర్ఘచతురస్రాకారంగా కాని కట్టలను చేసి పొలంలో వదులుతుంది. ఈ యంత్రంలో ముఖ్యంగా కలెక్టరు, బైండర్/రామర్, అన్‌లోడర్ అనే పరికరాలుంటాయి.

వేరుశనగ కాయలను భూమి నుండి తీసే యంత్రాలు :

ఈ వేరుశనగ మన రాష్ట్రంలో వరి తరువాత ప్రధానమైన పంట. ఈ పంటను ముఖ్యంగా వర్షాదారిత ప్రాంతాలలో (మెట్ట సేద్యం) వేయడం పరిపాటి. ఈ వర్షాదారిత ప్రాంతాలలో పంట చివరి దశలో ఉన్నపుడు వర్షంపడక పంటను తీసేందుకు చాలా కష్టపడినా కూడా రైతు పంటను చేజిక్కించుకోలేడు. అటువంటి పరిస్థితులలో భూమి నుండి వేరుశనగ పంటను వేరు చేసి పొందడం చాలా ముఖ్యమైన పని. దీనిని వేరుశనగ కాయలను పీకే యంత్రం ద్వారా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించవచ్చును.

అనంత గుంటక : అకారంలో ఉండే బ్లేడును లేదా ఒకే బ్లేడు ఒక చట్రాన్ని అమర్చబడి దీనిని నడిపినపుడు సుమారు 30 సెం.మీ. లోతుకు తెగేట్లు నిర్మించబడినది. దీని ద్వారా సమయం వృధాకాకుండా సమర్థవంతంగా వేరుశనగను కాయలను భూమి నుండి వేరు చేయవచ్చును. ఇంతేకాక తేలికపాటి నేలలో అయితే గుంటకకు అమర్చిన బ్లేడు ద్వారా కూడా కొద్దిపాటి నిర్మాణాత్మకంగా మార్పుల ద్వారా లోతుకు చేరి వేరుశనగ పంటను సమర్థవంతంగా భూమి నుండి మొక్కలను వేరు చేయవచ్చును. దీని ద్వారా గంటకు ఒక ఎకరా వరకు వేరుశనగ పంటను వేరుచేయవచ్చును.

వేరుశనగ తీసి దులిపే యంత్రము (DIGGER CUM WINDROWER) **:** ఈ యంత్రము ట్రాక్టరు వెనుక తగిలించుకొని, పి.టి.ఓ నుండి శక్తిని తీసికొని నడుపబడుతుంది. ఈ యంత్రం దీనిలో పొందుపరచిన 'వి' ఆకారపు బ్లేడు భూమిలోకి దిగి ట్రాక్టరు ముందుకు నడిపేటప్పుడు బ్లేడు వెడల్పుకు పంటను సుమారు 25 సెం. మీటర్ల వరకు ఆ వచ్చిన పంట – మొక్కలను తిరిగే ఇనుప ఊసల భాగంలో చేరి తద్వారా మొక్కకు అంటుకున్న మట్టిని దులిపి వెనుక వరుసగా కుప్పగా వేస్తుంది. దీనికి ఉన్న 'వి' ఆకారపు బ్లేడు వెడల్పును మార్చుకొనే విధంగా రూపొందించి ఉంటారు. నేలరకాన్ని బట్టి ట్రాక్టరు అశ్వపుశక్తిని బట్టి, వరుసల మధ్య దూరాన్ని బట్టి మార్చుకోవల్సివుంటుంది. ఇలా చేయడం వలన కాయలు తెగి భూమిలో మిగిలిపోకుండా ఉంటాయి. ఈ పరికరాన్ని వాడటానికి ముఖ్యంగా పంటను వరుసలలో విత్తవలసి ఉంటుంది. వరుసలలో లేకపోతే ఈ పరికరం వాడినట్లయితే పంట నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.

ఈ యంత్రం ఖరీదు రూ. 1,68,000/– దీనిని ఉపయోగించి పంట తీసేపుడు ట్రాక్టరును మొదటి గేరులో మాత్రమే నడుపవలసి ఉంటుంది. అలా కాకపోతే 'వి' బ్లేడు పైకి లేసి మొక్కలను మాత్రమే కత్తరించి కాయలు భూమిలో మిగిలిపోయే ప్రమాదము ఉన్నది. కావున ఈ యంత్రాన్ని సమర్థవంతంగా వాడాలంటే కొన్ని మెళకువలు పాటించవలసి ఉంటుంది.

వేరుశనగ కాయలను వొలిచే యంత్రము : పంట పండించిన తరువాత చెట్టు నుండి కాయలను వొలిచే ప్రక్రియ చేలా ముఖ్యమైనది మరియు సున్నితమైన ప్రక్రియ. అనగా కాయలను చెట్టు నుండి వేరు చేయడం కూలీల ద్వారా చేస్తారు. అక్కడ ఇలా రైతు కూలీలపై ఆధారపడడం వలన, సకాలంలో పండించిన పంట తీసుకొనలేకపొతున్న నేపధ్యంలో తప్పనసరి రైతు యంత్రాలపై ఆధారపడవలసి వస్తుంది. కొందరు వేరుశనగ చెట్లను రాయి లేదా కట్టి దుంగకు కొట్టడం ద్వారా కొద్దిగా వేగంగా చేయగలరు కాకపోతే ఇలా చేయడం వలన కాయలు కొద్దిపాటి దెబ్బకు గురై తద్వారా పప్పు మొలకెత్తే స్వభావాన్ని నష్టాపోయే అవకాశంయున్నది. దీని ఖరీదు సుమారు రూ.1,55,000/-. నూర్పిడి, ప్రాంతాన్ని బట్టి తగుమైన విధానాన్ని అవలంబించవలసి ఉంటుంది. వేరుశనగ చెట్టు నుండి వేరుచేసే యంత్రాలను పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా మూడు రకాల యంత్రాలున్నాయి. అవి

1. వేరుశనగ స్ట్రిప్పర్
2. వేరుశనగ ఎండుకట్టెలనుండి వేరు చేసే యంత్రం
3. వేరుశనగ పచ్చికట్టెల నుండి వేరు చేసే యంత్రం
4. వేరుశనగ పప్పువోలిచే యంత్రం

1. వేరుశనగ స్ట్రిప్పర్ : ఈ యంత్రం ANGRAU ద్వారా రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. ఈ యంత్రం ఇద్దరు గాని లేదా ముగ్గురు కూలీలు శనగ కట్టలను కట్టుకొని తిరిగే వృత్తాకారపు డ్రమ్ పైన వుంచినప్పుడు, తిరిగే డ్రమ్‌పై ఉన్న ఇనుపకొక్కీలను వేరుశనగ కాయలను తాకి, చెట్టు నుండి కాయలను వేరు చేస్తుంది. ఇలా చేసేటప్పుడు కూలీల ద్వారా కాయలను వేరు చేసేందుకు కావలసిన ఒత్తిడిని మాత్రమే ఉపయోగించి సమర్థవంతంగా కాయలను చెట్టు నుండి వేరు చేయవచ్చు.

ఈ యంత్రాన్ని 2 హెచ్.పి. మోటారు ద్వారా గాని 1.1-3 హెచ్.పి ఇంజన్ సహాయంతోగాని నడిపేట్లు అమరికను కలిగించి ఉంటారు. ఈ యంత్రానికి వేరుశనగ మొక్కలను పట్టుకొనేవారు కాకుండా సహాయ నిమిత్తం అనగా వేరుశనగ పంటను అందిచడం కోసం ఇద్దరు కూలీలు అవసరం ఉంటుంది. దీని సామర్థ్యం 100-125 కే.జీలు ఒక గంట సమయంలో చేయగలదు.

ఈ యంత్రం ద్వారా మంచి నాణ్యమైన కాయలను పొందవచ్చును. కానీ ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించడంలో 5 మంది కూలీల అవసరం ఉండడం వలన పెద్ద పొలాల పంటనూర్పిడికి ఉపయోగపడదు. దీనిని చిన్న, సన్నకారు రైతులు, ఎక్కడైతే రైతు కుటుంబం వ్యవసాయ పనులకు తోడ్పడుతారో వారి చాలా సమర్థవంతంగా వాడేందుకు వీలవుతుంది. దీని ఖరీదు రూ.80,000/- వరకు ఉంటుంది.

2. డ్రైపాడ్ త్రెషర్ (ఎండు వేరుశనగ కట్టలనుండి కాయలు వేరు చేసే యంత్రము) : ఇది ఎండిన కట్టను అనగా, వేరుశనగ పంటను తీసి పొలంలో రెండు, మూడు రోజుల పాటు ఎండిన పంటనుండి కాయలు వేరు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటె పంట కోత సమయంలో ఎటువంటి వర్షాలు ఉండక కోసిన పంటను పొలంలోనే ఉంచి బాగా ఎండిన తరువాత అనగా ఎండు కట్టెనుండి యంత్రం ద్వారా కాయలను వేరు చేసేందుకు సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అనగా అనంతపురం, కర్నూలు వంటి జిల్లాలలో అనగా ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం లేని ప్రాంతాలలో ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ యంత్రం ట్రాక్టర్ పి.టి.ఓ శక్తి సహాయంతోకాని లేదా 5 హెచ్.పి.గల ఇంజన్ లేదా మోటార్ సహాయంతో గాని నడిపేందుకు వీలుగా రూపొందించి ఉంటారు. ఈ యంత్రం నడిపేందుకు అనగా ఎండుశనగ కట్టలను యంత్రంలో వేయడానికి ఒకరు అందించడానికి ఇద్దరు కూలీల అవసరం ఉంటుంది. ఈ యంత్రం ద్వారా గంటకు 500 కేజీల వరకు పొందవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని పచ్చిశనగ కట్టలనుండి కాయలు వేరుచేయాడానికి ఉపయోగపడదు.

3. **థ్రష్ పాడ్ త్రషర్ (పచ్చి వేరుశనగ కట్టల నుండి కాయలను వేరు చేసే యంత్రం)** : ఈ యంత్రం కూడా ట్రాక్టర్ సహాయంతోగాని లేక 7.5–10 హెచ్.పి. గల ఇంజన్‌తో గాని నడిపేందుకు వీలుగా రూపొందించబడి ఉంటుంది.కాకపోతే ఈ యంత్రంలో అమర్చిన డ్రమ్ మరియు కాన్‌కేవ్ పచ్చి చెట్లను సైతం నూర్చి కాయలను వేరు చేసేట్లు రూపకల్పన చేయబడి ఉంటుంది. ఈ యంత్రం ద్వారా కాయలను వేరు చేయడానికి నలుగురు కూలీల అవసరం ఉంటుంది. అనగా కట్టలను యంత్రంలో వేయడానికి ఒకరు వారికి అందించడానికి ఇద్దరు కూలీలు మరియు కాయలను బస్తలోకి నింపి వేరు చేయడానికి ఒకరు అవసరం ఉంటుంది.

ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి కాయలు వేరు చేయడానికి అప్పుడే తీసిన పచ్చి వేరుశనగ కట్టలు మాత్రమే ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. లేని పక్షంలో తిరిగే తీగ త్రషింగ్ డ్రమ్‌కు చుట్టుకొని కాయలు పగిలి నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉన్నది. ఈ యంత్రాని ఉపయోగించి పచ్చి కట్టె ద్వారా సుమారు గంటకు 250–300 కేజీల వరకు కాయలను వేరు చేయవచ్చును. ఈ ప్రక్రియలో పచ్చివేరుశనగ కట్టేను యంత్రంలో వేయడం వలన కాయలతో పాటు ఆకులు కూడా వేరు చేయబడి యంత్రంలో ఉత్పన్నమయ్యే గాలి ద్వారా వెనుక భాగం నుండి తోయబడుతుంది. ఇది పచ్చిఆకు అయినందున వాటిని పశుదాణాకి నిల్వపరుచుకొని వాడుకోనవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ. 1,68,000/–

4. **వేరుశనగ పప్పు ఒలిచే యంత్రం** (Groundnut- Decorticator) **:** వేరుశనగ కాయలనుండి పప్పువోలిచెందుకు ఎక్కువ సమయము మరియు ఎక్కువ కూలీలు కావలసి ఉంటుంది. దీనికి గాను సమర్థవంతంగా మరియు వేగంగా పనిచేసే యంత్రాలను రూపొందిచడం జరిగింది. ఈ యంత్రాలలో రెండు రకాలు :

ఎ. చేతితో నడిపే వేరుశనగ ఒలిచే యంత్రము

బి. మోటారుతో నడిపే వేరుశనగ ఒలిచే యంత్రము

ఎ. చేతితో నడిపే వేరుశనగ ఒలిచే యంత్రము : ఈ యంత్రము చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా రూపొందించబడినది. ఈ యంత్రాని అన్ని రకాలైన వేరుశనగ కాయలనుండి పప్పువోలిచెందుకు స్వల్పమార్పులతో ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో రోజుకు 40 కేజీలు లేదా 80 కేజీలు కాయలను వోలుచుకొనవచ్చును.

బి. మోటారుతో నడిపే వేరుశనగ ఒలిచే యంత్రము : ఇందులో గంటకు 25 కేజీల నుండి 250 కేజీల పప్పును వోలిచెందుకు వీలవుతుంది. దీనిలో సీడ్ డ్రమ్ మరియు కాన్‌కేవ్ మధ్య దూరాన్ని కాయల పరిమాణాన్నిబట్టి

మార్చి సమర్థవంతంగా నూర్పిడి చేయవచ్చును. దీనికి యంత్రం పరిమానాన్ని బట్టి 1 లేదా 2 హెచ్.పి. మోటారు లేదా ఇంజన్ సహాయంతో నడుపబడుతుంది.

చెఱకు సాగులో యాంత్రీకరణ

చెఱకు నాటే యంత్రములు 3 రకాలు అవి :

1. చెఱకు ముచ్చెలు (విత్తనం కొరకు) నరికే యంత్రము
2. చెఱకు ముచ్చెలు నాటే యంత్రము
3. బడ్ చిప్ పద్ధతి ద్వారా పెంచిన మొక్కలు (చెఱకు నారు) నాటే యంత్రము

1. చెఱకు ముచ్చెలు (విత్తనం కొరకు) నరికే యంత్రాలు :

ఈ పద్ధతి ద్వారా చెఱకును ముక్కలుగా (మూడుకళ్ల ముచ్చెలుగా) చేతికత్తులతో నరికి ఆపై పొలం తయారీ తరువాత బోదెలకు రెండు వైపులా కూలీల ద్వారా ఉంచి మొలక ఎత్తిన తరువాత మట్టిని ఎగదోయడం పరిపాటి. ఇలా కాకుండా తిరిగే కత్తిని అమర్చిన యంత్రమును ఉపయోగించి అతిసులువుగా, కావలసిన పరిమాణంలో చెఱకును కత్తిరించవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి అతి వేగంగా చెఱకు విత్తనాన్ని తయారు చేయవచ్చును. ఈ పద్ధతిలో చెఱకును నరికేందుకు మరియు తయారయిన పొలంలో పరిచేందుకు వ్యవసాయ కూలీలు అవసరం.

2. చెఱకు ముచ్చెలు నాటే యంత్రము (SET PLANTER) **:**

చెఱకును ముడు కన్నుల ముక్కలుగా చేసి వాటిని బోదెలలో సాళ్ళలో మధ్య దూరాన్ని బట్టి వరుసగా పరచడం ఆ తరువాత సాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న కాల్వలలో సాగు నీటిని అందించి పంటను పెంచడం పరిపాటి. ఇదే కాకుండా మొక్కల ప్రక్కభాగంలో ఎరువులను వేయడం పరిపాటి. చెఱకు వేసిన తరువాత సాళ్ళ మధ్య భాగంలో కలుపు నివారణ కొరకు, కలుపు మందును పిచికారీ చేస్తారు. ఇలా ప్రతి పనిని వేరువేరుగా వ్యవసాయ కూలీల ద్వారా చేసే బదులు పొలంలో సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని బట్టి బోదెలు కాల్వలు వేయడం, చెఱకును మూడు కన్నుల ముక్కలు చేయడం, వాటిని పొలంలో పరచడం, రసాయనిక ఎరువులు వేయడం, కలుపు మందు పిచికారి చేయడం వంటి అన్ని పనులను ఒకే ఒక చెఱకు ముచ్చెలు నాటే యంత్రం ద్వారా చేయవచ్చు. ఈ యంత్రాన్ని నడిపేందుకు 45 హెచ్.పి ట్రాక్టరు అవసరమవుతుంది. ఈ యంత్రాన్ని ట్రాక్టరు 3 పాయింట్ హిచ్ ద్వారా తగిలించుకొని పి.టి.ఒ. షాఫ్టును అమర్చుకొని ట్రాక్టరును నడపడం ద్వారా మొదటి గేర్ మరియు లోడ్ గేర్ ను మాత్రమే వాడుకొని పరికరాన్ని ముందుకి నడపడం ద్వారా, క్రింద అమర్చబడిన రెండు రెక్కల రిడ్జరు ద్వారా కాలువలు మరియు బోదెలను పొలంలో నిర్మిస్తుంది. ఈ కాలువలు మరియు బోదెల మధ్య దూరాన్ని అవసరాన్ని బట్టి మార్చేందుకు ఈ యంత్రంలో అమరిక కల్పించబడి ఉంటుంది. జంట సాళ్ళకయితే 2 అడుగుల,మామూలు రైతు ఈ యంత్రాన్ని వాడేందుకు ఇద్దరు కూలీల అవసరం. వారు యంత్రంపై అమర్చిన కుర్చీలపై కూర్చొని చెఱకు గడలను ఉంచే ట్రే నుండి ఒక్కో చెఱకును అడుగుభాగంలో ఉన్న గరాటు ద్వారా లోపల ఉంచడం ద్వారా, క్రింద ఉన్న తిరిగే కత్తి చెఱకును కత్తిరించి ముక్కలుగా చేసి యంత్రం ఏర్పరిచిన కాలువలలో పరుచుతుంది. ఆ తరువాత వెంటనే చెఱకును మట్టితో కప్పి ఆపై ఈ మట్టిని గట్టిగా నొక్కి మొలక ఎత్తడానికి అనువుగా చేస్తుంది.

ఈ విధంగా చెఱకు ముక్కలను పొలంలో నిర్ణీత సాళ్ళలో నాటేందుకు వీలవుతుంది. ఇలాచేయడంతో పాటు కావలసిన రసాయనికి ఎరువులను సాళ్ళలో వేసిన చెఱకు ప్రక్కన పడేట్లు చేస్తుంది. ఈ రసాయనిక ఎరువు నాట్లు వేసేందుకు కూర్చున్న వ్యక్తి కుర్చీ అడుగ భాగంలో ఉన్న పెట్టెలో వేయవలసి వస్తుంది. క్రింది అమర్చిన మీట ద్వారా (fluted roller metering mechanism) ఎరువు పంపిణీ మోతాదుని నిర్ధారించ వచ్చును.

ఈ పరికరం మధ్యభాగంలో ఉండే గొట్టాన్ని (6 ఇంచుల పి.వి.సి పైపు) ఒక రసాయనిక ద్రవాన్ని నిల్వ ఉంచేందుకు ట్యాంక్‌గా వాడి అందులోని ద్రవ్యాన్ని క్రింద అమర్చబడిన గొట్టం ద్వారా సాళ్ళ మధ్య భాగంలో ఉన్న పొలంపై పిచికారి చేసి కలుపు నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది. పిచికారి చేయబడే బిందువులు పెద్దవిగా ఉండి కలుపు మందు పిచికారికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ విధంగా చెఱకు నాటేటపుడు చేయవలసిన నాలుగు ముఖ్యమైన పనులను ఒకే యంత్రం ద్వారా మరియు ఒకే సమయంలో సమర్థవంతంగా నిర్వహించ వచ్చును. ఈ యంత్రము ఖరీదు రూ. 2.5 లక్షలు ఉండి రెండు సాళ్ళలో వేసేందుకు ఇద్దరి కూలీల ద్వారా సుమారు రోజుకు 4 ఎకరాలు నాటేందుకు వీలవుతుంది.

3. చెఱకు నారు నాటే యంత్రము (BUDCHIP PLANTER) :

చెఱకు పంట అనేక చెఱకు నాటే ఆధునిక పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా ఎక్కువ దిగుబడులను పొందడానికి వీలవుతుంది. ఈ పద్ధతులలో బడ్‌చిప్ పద్ధతిని అవలంబించి సాగు చేయడం వలన అనేక లాభాలు పొందవచ్చునని పరిశోధనల ద్వారా తేలింది. ఈపద్ధతిలో ముఖ్యంగా చెఱకు కన్నులను మాత్రమే కత్తిరించి వాటిని ట్రేలలో నారును 30 రోజుల నుండి 45 రోజులు పెంచి ఆ తరువాత పొలంలో నేరుగా నాటుతారు. ఇలా చేయడం వలన విత్తనానికి కావలసిన చెఱకు మోతాదు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అదే కాక ఈ కణుపులు తీసిన చెఱకును బెల్లం చేయడానికి కాని లేదా పాకం చేయడానికి గాని వాడడం వలన చెఱకు వృధా అయ్యే అవకాశం లేదు. ఇంతే కాక ఈ పద్ధతిలో నారును షేడ్ నెట్ క్రింద పెంచి ఆ తరువాత ప్రధాన పొలంలోనికి మార్చడం ద్వారా వంద శాతం మొలకతో సమానంగా పొలంలో మొక్కల సాంద్రతను పాటించబడడమే కాక 1 నెలనుండి 1 1/2 నెలల వరకు ప్రధాన పొలంలో పంట కాలం తగ్గించవచ్చును. తద్వారా ప్రధాన పొలంలో పంటను పెంచడానికి అయ్యే ఖర్చును తగ్గించవచ్చును మరియు సాగునీటి వ్యయం తగ్గి పంటలో నీటి సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కాకపోతే ఈ పద్ధతిలో నాటేందుకు రైతు సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని 4–5 అడుగులకు పెంచి కాలువలు చేసి నిర్దిష్టమైన మొక్కకు చిన్న గుంతలు చేసి దానిలో నాటవలసి రావడం వలన కూలీలు వంగి శ్రమించవలసివస్తుంది. దీని వలన అధికంగా ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది. ఇందు వలన కొంత మంది రైతులు ఈ పద్ధతిని అవలంబించడానికి సుముఖత చూపడం లేదు. ఈ శ్రమను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు చెఱకు నారు నాటే యంత్రాన్ని కొన్ని మార్పులు చేసి తరువాత చెఱకు నారును నాటేందుకు ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ఒక ట్రాక్టరుతో నడుపబడే యంత్రము. ఈ నారు నాటే యంత్రాన్ని పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా

* నిర్దిష్ట సాళ్ళ దూరంలో కాల్వలు చేసే రెండు రెక్కల కర్రు,
* కాల్వలో నాటే మొక్కలు మధ్య దూరాన్ని నిర్దేశించే అమరిక,

* మొక్క నాటేటప్పుడు కావలసిన నీటి సరఫరా (సుమారు 200 మి.లీ.)
* కావలసిన ఎరువు సరఫరా జరగడానికి అనువుగా రూపొందించడం జరిగింది.

ఈ యంత్రము వెనుక భాగంలో అమర్చిన రెండు కుర్చీలలో కూర్చొని చెఱకు నారును ముందు భాగంలోని ట్రేలు అమరిక నుండి తీసి తిరిగి గుంటలలో (రంధ్రాలలో) వేయడం జరుగుతుంది. యంత్రం ద్వారా తెరువబడిన సాళ్ళలో నారు మొక్కను వేయడం జరుగుతుంది. ఇలా తెరువబడిన సాళ్ళలో గొట్టం నుండి నీరు వెలువడి మొక్క (నారు) క్రింది భాగంలో నింపి ఆపై వెనక భాగంలో అమర్చబడిన రెండు రబ్బరు చక్రాల ద్వారా మొక్క ప్రక్క మట్టిని నొక్కి మొక్క దృఢంగా పొలంలోఉండే విధంగా నాటడం జరుగుతుంది. ఇలా పోసే నీటిలో కావలసిన మోతాదులో ఎరువులను ద్రవ రూపంలో కలిపి మొక్క వేళ్ళకు అందించడం ద్వారా ఎరువు వినియోగ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచవచ్చును.

ఇలా మొక్క నాటి నీరుపోసి ఎరువు అందించ గల అమరికలు విడివిడిగా కాల్వలు చేసే రెండు రెక్కల కర్రులు ఛట్రానికి అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ కర్రుల దూరాన్ని కావలసిన సాళ్ళ దూరాన్ని బట్టి మార్చుకొనేందుకు వీలుగా క్లాంపుల సహాయంతో ఛట్రానికి బిగించబడి ఉంటుంది.అనగా 2 అడుగుల నుండి 5 అడుగుల దూరం వరకు సాళ్ళమధ్య దూరం ఏర్పరచ వచ్చును. సాళ్ళలో మొక్కకు మొక్కకు మధ్యదూరాన్ని నారు వేసే గరాటులోని మూత తెరుచుకొనే సమయాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ దూరం నిర్దేశించడం ఛట్రంలో బిగించిన పళ్ళ (Gear wheel) చక్రాల అమరిక ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ పళ్ళచక్రాలను మార్చడం ద్వారా యంత్రం క్రింద భాగంలో పొందింపబడిన చక్రం (Groundwheel) మరియు పలుచక్రాల నిష్పత్తి ఆధారంగా మూత తెరచుకొని గరాటులో వేసిన మొక్కను కాల్వలలోనికి పడేలా చేసి కావలసిన దూరాన్ని సమన్వయ పరుస్తుంది. అనగా సాళ్ళల్లో 15 సెం.మీ. నుండి 50సెం.మీ. వరకు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య దూరాన్ని నిర్దేశించవచ్చును.

ఈ పరికరాన్ని వాడడం ద్వారా చెఱకు నారు నాటడానికి కూలీలకు అయ్యే ఖర్చును సుమారు 5 వేల రూపాయల వరకు తగ్గించవచ్చును. ఇంతే కాక బడ్ చిప్ పద్ధతి ద్వారా వచ్చే లాభాలను సమర్థతతో పొందవచ్చును. మరియు చెఱకు కోసే యంత్రాన్ని వాడేందుకు వీలుగా 4 అడుగులు లేదా ఎక్కువ సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని నిర్ధేశించవచ్చు. ఈ విధంగా చెఱకు సాగు పూర్తి యాంత్రీకరణకు తోడ్పడుతుంది.

చెఱకు నరికే (కోట్టే) యంత్రము (SUGAR CANE HARVESTER) **:**

ఈ యంత్రం చెఱకు పంటను నరికి పై ఆకును వొలిచి మరియు పంటను ఆకును వేరు చేసి, చెఱకును ముక్కలను మాత్రమే ట్రాక్టరు (infield tractor) లలో నింపేంత వరకు చేస్తుంది. దీనిలోని అధిక అశ్వపు శక్తి గల 70 నుండి 230 హెచ్.పి.ల వరకు శక్తి గల ఇంజనును ఉపయోగించడం ద్వారా పంట నరకడమే కాకుండా ఆకును వేరుచేసి, చెఱుకు ముక్కలు చేసి ట్రయిలర్‌లలోకి ఎక్కించడం వరకు సమర్థవంతంగా ఈ యంత్రం పనిచేస్తుంది. అంతేకాక పంట ఆకులను వేరు చేసి వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా (1”–2”) చేసి పొలంలో పరుస్తుంది. ఇందు వలన ఈ చిన్న ముక్కలు మల్చ్‌గా ఉపయోగపడడమే కాక, ఈ ఆకును నేలలో కలిపేందుకు వీలవుతుంది. ఇలా చెఱకు ఆకును ముక్కలు చేసి నేలలో కలుపడం ద్వారా నేల స్వభావం పై మంచి మార్పులు సంభవించి సేంద్రియ తత్వం పెరిగి నేలలో కార్బను శాతం పెరిగి దిగుబడులను పెంచడంలో తోడ్పడుతుంది.

ఈ చెఱకు నరికే యంత్రం ముఖ్యంగా ముందరి భాగంలో చెఱకును నేలకు సమాంతరంగా నరికేందుకు తిరిగే కత్తులు రెండు పళ్ళాలపై అమర్చి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా తిరిగి కత్తిరిస్తుంది. ఇలా తిరిగే కత్తుల వద్దకు పంటను నెట్టడానికి శంఖాకారంలో ఉన్న పెద్ద రెండు స్థూపాలు తిరుగుతూ యంత్రం ముందుకు కదిలినప్పుడు పొలంలో పంటను కత్తుల పైకి నెట్టుతుంది. ఈ కదిలే కత్తుల సముదాయపు పళ్ళాల ఎత్తును, వేగాన్ని, ఛట్రం ఎత్తును మార్చడానికి హైడ్రాలిక్ పంపులను, వాటిని నియంత్రించే మీటలు యంత్రాన్ని నడిపే డ్రైవరు దగ్గర అమర్చబడి ఉంటుంది. వాటిని ఉపయోగించి పొలాన్ని బట్టి, పంటను బట్టి యంత్రంలో కావలసిన మార్పులను చేసి సమర్థవంతంగా చెఱకును నరకగలుగుతారు. ఈ యంత్రానికి ముందు భాగంలో చెఱకు అడుగు భాగంలో కొట్టే అమరికతో బాటు పై భాగంలో తిరిగే కత్తులను చెఱకు పై భాగంలోని మొదలు ఆకులను కత్తిరించడం జరుగుతుంది.

ఈ యంత్రం రెండు రకాలు

1. చక్రాలతో రూపొందించిన చెఱకు నరికే యంత్రం
2. బెల్టు (track) చక్రాలతో రూపొందించిన చెఱకు నరికే యంత్రం

ఈ రెండు యంత్రాల పనితీరు ఒకే విధంగా ఉన్నా వీటి సామర్థ్యం వాటిలో ఇమడ్చబడి ఇంజను దాని అశ్వపు శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

చెఱకు చెత్తను పొడి చేసే యంత్రం (TRASH SHREDDER) **:**

చెఱకు పంట ఒకమారు పంటను తీసుకొని మరుదాము పంటగా (కార్శిపంట)గా రెండు లేదా మూడు సార్లు తీసికొనే విధానం మన రాష్ట్రంలో వుంది. ఈ మరదాము పంట పెంచడానికి ముందు అనగా చెఱకు ముఖ్య పంటను కోసిన తరువాత పొలంలో ఉన్న చెత్త (చెఱకు ఆకుల, పంట అవశేషాలు) ను కాల్చి సాళ్ళమధ్య భాగాన్ని దున్నడం పరిపాటి. ముమ్ముందు పండించే పంటకు లాభం అని రైతుకి తెలిసినప్పటికి కూడా ఈ చెత్తను భూమిలోనికి చేర్చడానికి సరైన పద్ధతి లేకుండా కాల్చివేస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని అవలంబించేందుకు చెఱకు చెత్తను ముక్కలుగా చేసి పద్ధతిలో 3 అడుగులు లేదా చెఱకు నరికే మిషనును వాడేందుకు వీలుగా 4 లేదా 5 అడుగులు సాళ్ళ మధ్య దూరాన్ని మార్చుకోవడానికి వీలును కల్పించబడి ఉంటుంది. దానిని నేలలో కలపడం ద్వారా లేదా నేలపై పరచి మల్చింగ్ పద్ధతిలో ఉపయోగించడం ద్వారా సత్ఫలితాలను పొందవచ్చునని పరిశోధనా పూర్వకంగా నిరూపించబడింది. ఈ పద్ధతిని సులువుగా అవలంబించేందుకు ష్రెడ్డర్ (చెత్తను పొడి చేసే యంత్రం) ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

ఈ యంత్రము ట్రాక్టరు సహాయంతో నడుపబడే యంత్రము. దీనిలో ముఖ్యంగా ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. ద్వారా శక్తిని పొంది తిరిగే షాఫ్టు ఉంటుంది. ఈ షాఫ్టుకు మడతపడే కర్రులు కలిగి ఉంటాయి. ఈ యంత్రాన్ని ట్రాక్టరుకు తగిలించుకొని చెఱకు కొట్టి చెత్త నిండి ఉన్న పొలాల్లో నడుపడం ద్వారా ఈ మడత పడే కర్రులు బలంగా చెత్తను నేలకు కొట్టడం ద్వారా చెత్త మరియు చెఱకుపంట అవశేషాలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించబడుతాయి. ఇలా కత్తిరించబడిన చెత్తను ఈ యంత్రం వెనుక భాగంలో ఉన్న రోలరు కొక్కి (అణగ గొట్టి) నేలపై నిర్దిష్టతోవలో పరుపులాగా మారుస్తుంది. ఇలా ఏర్పడిన చెత్త బాగాన్ని మల్చింగ్ లాగా వాడవచ్చును లేదా దీనిపై శిలీంద్రాల ద్రవాన్ని పిచికారీ చేసి తొందరగా చెత్త జీర్ణించికొని పోయి నేలలో కలసిపోయేట్లు చేయవచ్చును.

ఈ ష్రెడ్డరు గంటకు ఒక ఎకరము వరకు సమర్ధవంతంగా చెత్తను పొడి చేసి చదును చేస్తుంది. దీని వెడల్పు 4, 6 లేదా 8 అడుగులు వరకు వస్తుంది. దీని ఖరీదు రూ. 1,50,000/– నుండి రూ. 2,75,000/– వరకు ఉంటుంది.

రటూన్ మానేజర్ (RATOON MANAGER) :

చెఱకు పంట మొదటి పంటను తీసిన తరువాత అదే పంట మొదళ్ళను పెంచి రెండు లేదా మూడు కార్శి పంటలను (మరదాము పంటగా) సాగు చేయడం పరిపాటి. మనరాష్ట్రంలో ఉత్తరతెలంగాణా ప్రాంతము మరియు మహారాష్ట్రంలో ఈ విధంగా 5 లేదా 6 మరుదాము పంటలను తీసే అలవాటు ఉన్నది. చెఱకు నాటేందుకు అయ్యే ఖర్చును పూర్తిగా లేకుండా చేయవచ్చును. కాకుంటే సకాలంలో కార్శి యాజమాన్యం చేపట్టగలిగితే కార్శి పంటను సైతం మొదటి పంట దిగుబడులకు ధీటుగా పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

మరదాము యాజమాన్యంలో మొదటిది మరియు ముఖ్యమైనది మొదటి పంట మోడులను (పంట తీసేసిన తరువాత పొలంలో ఉన్న భాగం) భూమికి సమాంతరంగా తీసివేయడం లేదా చెక్కడం. ఇలా మొక్కలను భూమికి సమానంగా తీసివేయక పోతే మోడులపై మొలచిన పంట ధృఢంగా పెరగక పంట పడిపోతుంది. దీనికి గాను క్రింద వరకు (భూ మట్టానికి) నరకడం వలన పిలకలు భూమి లోపల నుండి ధృఢంగా పెరిగి పంట నిటారుగా ఉంటుంది. మొక్కపై ఆశించు శిలీంద్రాల బారి నుండి రక్షించడానికి శిలీంద్ర మందులను మొక్క మొదళ్ళకు అందించ వలసి ఉంటుంది. పాత వేర్లు పోషకాలను పీల్చుకొనే సామర్థ్యం తగ్గడం వలన క్రొత్త వేళ్ళను వృద్ధి చేయడం కోసం పాత పంట వేళ్ళను కత్తిరించడం చాలా అవసరం. అంతే కాక పాత వేర్లును కత్తిరించడం వలన క్రొత్త వేర్లను వృద్ధి చెందడంతో పాటు భూమి లోపల ఉన్న ప్రధాన వేరును నిటారుగా లోతున పెంపొందించి తద్వార పంటకు కావలసిన పోషకాలను లోపటి పొరల నుండి సమకూర్చబడుతుందని పరిశోధనల ద్వారా నిరూపించబడినది.ఇలా పంట వేర్లు నిటారుగాలోపలికి వ్యాపించడం ద్వారా మొక్కకు నేలలో పట్టు అధికమైన గాలి కాలంలో అనగా అక్టోబరు, నవంబరు మాసాలలో పంట పడిపోకుండా కూడా తోడ్పడుతుంది. ఇంతేకాక సాళ్ళ మధ్య భాగంలో ఉన్న కలుపును నివారించి, కావలసిన రసాయనిక ఎరువులు మరియు సేంద్రియ ఎరువులను నిర్ధారించిన మోతాదులో మొక్కకు అందుబాటులో ఉండేట్టు వేయవలసి ఉంటుంది. మట్టిని మొదళ్ళకు ఎగదోసి పంటను పడిపోకుండా చూడవలసి ఉంటుంది.

ఇలా మరదాము పంటకు చేయవలసిన ముఖ్యమైన ఐదు పనులను ఒకేసారి చేయడానికి రూపొందించిన యంత్రమే ఈ రటూన్ మానేజర్. ఈ యంత్రంలో అడుగు బాగంలో తిరిగే కత్తుల (రెండు లేదా మూడు) ద్వారా పంట మొదళ్ళను కత్తరించడం జరుగుతుంది. ట్రాక్టరు పి.టి.ఒ. (Power Take Off) నుండి శక్తిని గేరు బాక్సు ద్వారా తిరిగే కత్తులకు అందించడం వలన కత్తులు వేగంగా తిరిగి పంట యొక్క మొదళ్ళను కత్తిరిస్తుంది. ఇలా కత్తరించిన పంట మొదళ్ళపై చీడపీడల నాశన కారిణిని పిచికారి చేయబడుతుంది. ఈ రసాయనిక ద్రవాన్ని క్రింద అమర్చబడిన రబ్బరు గొట్టం ద్వారా మొక్కపైకి పడేట్లు పిచికారి చేయబడుతుంది. ఈ రసాయన మందు ప్రవాహాన్ని పొందుపరచబడిన మీటరు ఉపయోగించి నియంత్రించవచ్చును.

ఇక వేళ్ళ మొదళ్లను కత్తరించడానికి ఈ యంత్రం మధ్య భాగానికి రెండు వైపుల రెండు పళ్ళాలను అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ పళ్ళాల రూపకల్పన వేర్లను కత్తిరించడానికి వీలుగా పళ్ళెల చివరి భాగం కత్తరించబడి

(Notched type disc) రంపపు కత్తిని పోలి సులువుగా సమర్థవంతంగా పని చేయగలుగుతుంది. ఈ పళ్ళాల మధ్య ఉన్న దూరాన్ని కావలసిన విధంగా మార్పు కల్పించబడి ఉంటుంది. తరువాత పంట సాళ్ళ మధ్య ఉన్న పొలాన్ని మరియ పంట ఆకులను ముక్కలు చేసి కలియదున్ని మట్టిలో కలిపేందుకు రెండు పళ్ళాలను అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ పళ్ళాల అమరికను ఛట్రంపైన ఉన్న మీట ద్వారా మార్చి సాళ్ళమధ్య దూరంలో ఇమిడేటట్లు చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇలా మొదటి పంట ఆకులను మరియు అవశేశాలను మట్టిలో కలపి పొలం యొక్క సత్తువను పెంపొందించడానికి వీలవుతుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా నేలలోని కార్బన్ పరిమాణం పెరిగి పంట దిగుబడి పెరగడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

ఈ యంత్రం ద్వారా పైపేర్కొనబడిన పనులతో బాటు రసాయనిక ఎరువులను నిర్ధారించిన మోతాదులో పొలంలో మొక్క మొదళ్ళ వద్ద చల్లడానికి అమరిక కలిగి ఉంది. దీనికి గాను గరాటు 'Y' ఆకారంలో ఒక ఎరువును నిల్వ ఉంచేందుకు గరాటు నిర్మించబడి ఉంటుంది. దీని అడుగు భాగంలో రూపొందించబడిన మీటను కావలసిన మోతాదును మాత్రమే చల్లేందుకు వీలుగా అమరిక రూపొందించబడి ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా మట్టిని మొక్క మొదళ్ళ దగ్గర ఎగదోయడానికి ఏర్పాటు కూడా ఉంటుంది.

ఈ విధంగా ఒక్క యంత్రాన్ని ఒకసారి ఉపయోగించి అయిదు పనులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ. 1,72,000/-. దీని సామర్థ్యం రోజుకు 3-4 ఎకరముల వరకు పనులు పూర్తి చేయవచ్చును. ఈ పరికరాన్ని వాడడం వలన పాత పంట మోడు చెక్కేందుకు అదే విధంగా మట్టి ఎగదోయడానికి, పాత పంట వేర్లను కత్తిరించడానికి, శిలీంద్ర ద్రావకం పిచికారికి, సాళ్ళ మధ్య పొలాన్ని దున్ని కలియ త్రిప్పడానికి, చివరగా ఎరువులు వేసేందుకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం రూ. 10,000/- అనగా, యంత్రాన్ని వాడడం వలన ఎకరానికి రూ. 1,000/- ఖర్చు మాత్రమే సరిపోయి రమారమి రూ. 9,000/- ఆదా అవుతుంది.

ఉత్పాదకత పెంచే మరియు ఖర్చు తగ్గించే వ్యవసాయ యంత్రీకరణ పద్ధతులు :

మెట్ట సేద్యంలో నీటినిల్వకు సబ్‌సాయిలర్ వినియోగం

మెట్ట సేద్యంలో అతి ముఖ్యమైన అంశము ఈ వర్షపు నీటి సద్వినియోగము మరియు పొలంలో తేమను కాపాడుట. ఈ వర్షపు నీటిని భూమి పైపడిన వెంటనే తీసి పట్టడం ఒక ప్రక్రియ. ఇలా వొడిసి పట్టిన నీటిని కుంటలలో నిల్వ ఉంచి ఈ నీటిని పంట బెట్టకు గరియ్యే సమయంలో అనగా అత్యవసర సమయంలో ఒక తడి లేదా రెండు తడులను ఇవ్వడం ద్వారా కొద్ది పాటి పంటను దక్కించుకోవచ్చు. ఇలాకాక పరివాహక ప్రాంతంలో పడిన నీటిని చెక్ డ్యాముల ద్వారా ఇంకుడు గుంతల ద్వారా నిల్వపరచడం పరిపాటి కాకుంటే ఇందుకు కొంత పొలం వదలవలసి వస్తుంది. ఇలా కాక, పారే నీటిని పడిన పొలంలోనే నిల్వ ఉంచేందుకు వీలుగా సబ్‌సాయిలింగ్ ద్వారా 40-60 సెం.మీ. (నిలువాటి లోతు) సాళ్ళలో వాలుకు అడ్డంగా చేయడం ద్వారా ప్రవహించే వర్షపు నీటిని పొలం లోపలి పొరలకు చేరేటట్లు చేసి తద్వారా తేమను పొందుపరచి మెరుగైన ఫలితాలను సాధించవచ్చును. అంటే పొలం తయారీలో కొన్ని మెళకువలు (సబ్‌సాయిలింగ్‌ను) పాటించడం ద్వారా వర్షపు నీటిని పడిన పొలంలోనే ఇంకేటట్లు చేసి తద్వారా పొలం లోపలి పొరలలో తేమ ఉండేట్లు చేయవచ్చును.

మెట్ట భూమి తయారీలో రైతు పద్ధతి

వర్షాధారపు మెట్ట పొలాల్లో ఉపరితలం పడిన నీరు అక్కడికక్కడే నీలిచే సౌకర్యం లేక వాలు వైపుకు ప్రవహించి నీటి ప్రవాహంలో కలిసి వాగులు చేరడం పరిపాటి. ఇలా పడిన వర్షపునీరు వృధా కాకుండా వాలుకు అడ్డంగా సేద్యం చేయడం (దున్నడం) ద్వారా నీటి ప్రవాహం వేగాన్ని తగ్గించి కొద్దిపాటి నీటిని వినియోగించవచ్చును. కాకపోతే వ్యవసాయ రంగంలో జరిగే ఆధునిక మార్పుల కారణంగా రైతాంగం ట్రాక్టరు పై ఆధారపడి, కల్టివేటరును దుక్కిని దున్నే పరికరంగా భావించి తద్వారా దున్నడం జరుగుతోంది. కాని కల్టివేటర్ అంతర కృషి చేయడానికి రూపొందించబడిన పరికరం. ఈ కల్టివేటర్ నేలను దున్నడానికి వాడినప్పుడు పై పొరలలో అనగా 5-10 సెం.మీ. వరకు మాత్రమే నేలను గుల్లబార్చగలదు. కానీ శాస్త్ర ప్రకారం ప్రతి పైరు వేరు వ్యవస్థను 15-25 సెం.మీ. వరకు వృద్ధి చేసుకోగలదు. అంతేకాక ప్రకృతి సిద్ధమైన వాతావరణ పీడనంలో మార్పుల కారణంగా భూమి లోపలి పొరలు మెల్లమెల్లగా గట్టిపడి వేరు పెరుగుదలకు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉత్పన్నమై మొక్క పెరుగుదల లోపింపజేస్తుంది. ఈ విధంగా పైరు (పైననే దున్నబడిన) 5-10 సెం.మీ. లోతు వరకు మాత్రమే వేరు వ్యవస్థ వృద్ధిచేసి తద్వారా పోషకాలను తీసుకొని పైమట్టి నిరుపయోగమైపోతుంది. ఇందువల్ల పంట ఉత్పాదకత తగ్గుతుంది. అంతే కాకుండా వర్షం ద్వారా సమకూరిన నీరు ఈ గట్టి పొరల కారణంగా భూమి లోపలికి ఇంకిపోకుండా పైనే వాలు వైపునకు ప్రవహించి, పొలంలో నుండి వాగులో కలిసి పోయేందుకు దోహదపడుతుంది. ఇలా నీరు వృధా అవడమే కాక నీటి ప్రవాహం పైపొరల ద్వారా ప్రవహించడం వలన నేలలోని పోషకాలు సైతం కొట్టుకుపోయి వాగులలోకి చేరడం వలన నేల నిస్సారమై, పంట పెరుగుదల తగ్గి నష్టం చేకూరుతుంది.

సబ్ సాయిలర్ ద్వారా భూమిలో నీటి నిల్వను పెంపొందించడం : వర్షపు నీటిని పొలంలో ఇంకేటట్లు చేసేదే సబ్‌సాయిలింగ్ పద్ధతి. దీనిలో మొదటిది వేసవిలో దుక్కులు ఒక మార్గము. కాకపోతే దుక్కులు దున్నడానికి కావలసిన రెక్క నాగలి లేదా పళ్ళెపు నాగలి వంటి పరికరాలతోబాటు దున్నిన తరువాత పెద్ద మట్టిగడ్డలను నూర్చి, చదును చేయవలసి ఉంటుంది. ఇలా చేయడానికి రైతు మొగ్గుచూపడం లేదు. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా నేలను 'సబ్‌సాయిలర్' ద్వారా 40-60 సెం.మీ. లోతు వరకు నిటారుగాదున్నడం ద్వారా లోపలి గట్టి పొరలను చేధించడం జరుగుతుంది. ఇలా చేదించిన సాళ్ళ ద్వారా పడిన వర్షము అదే పొలంలో లోపలికి 40-60 సెం.మీ. ఇంకడానికి దోహదపడుతుంది. ఇలా వర్షపు నీరు పడిన పొలంలోనే ఇంకేటట్లు చేయడం వలన నీటి ప్రవాహం ద్వారా నష్టపోయే భూసారాన్ని అరికట్టవచ్చును. అంతేకాక పొలం లోపలి పొరలకు వర్షపు నీటి ప్రవేశం ద్వారా పొలంలో 40-60 సెం.మీ. లోతు వరకు తేమ నిల్వ ఉండి పంట వేర్లకు బెట్ట సమయంలో అందించి పంట నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంతేకాక సబ్‌సాయిలింగ్ ద్వారా లోతుగా నిటారుగా దున్నడం వలన లోతుగా గుల్లబారడం జరుగుతుంది. తద్వారా మొక్కవేర్లకు గాలిని అందించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పంట వేర్లకు అధిక లోతుకు పెంపొందించుకొని, తేమ మరియు పోషకాలను లోతు పొరల నుండి పొంది పంట సమృద్ధిగా పెరుగుతుంది.

కంది మరియు వేరుశనగ పంటలలో సబ్‌సాయిలింగ్ ద్వారా ప్రయోజనాలు (ప్రయోగ ఫలితాలు)

ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానము తిరుపతిలో వ్యవసాయ ఇంజనీరింగువారు చేపట్టిన

సబ్‌సాయిలింగ్ పై ప్రయోగాల ఫలితాలు పరిశీలిస్తే ఈ క్రింద విధంగా ఉన్నాయి. సగం పొలంలో వర్షాధారిత కంది పంట విత్తనం నాటేప్పుడు సగం పొలంలో 2 మీ॥ ఎడంలో సబ్‌సాయిలర్ ద్వారా సుమారు 40–60 సెం॥మీ నిలువుగా దున్నడం జరిగింది. మిగిలిన అన్ని పొలం ప్రక్రియలు, పొలమంతా సమానంగా పాటించడం జరిగింది. పంట ఆగష్టు నెలలో నాటినప్పటికి నవంబరు, డిసెంబరు వరకు మామూలుగా సమానంగా కనబడినప్పటికి డిసెంబరు, జనవరి, ఫిబ్రవరి మాసాలలో ఎటువంటి వర్షాలు లేనందున ఈ క్రింది పంట మార్పు గమనించడం జరిగింది. అనగా సబ్ సాయిలింగ్ చేసిన సగబాగంలో కంది పంటలో ఆఖరి (కాయ) దశలో వచ్చిన రెండు నెలలు బెట్టను కూడా తట్టుకొని పంట నికర దిగుబడిని నమోదు చేయబడింది. అదే విధంగా సబ్ సాయిలింగ్ చేయని పొలంలో పంట బెట్ట పరిస్థితులనకు గురై పంట నష్టం భారీగా చేకూరింది.

వేరుశనగ సాగులో నాటిన నెల రోజుల్లో ఒక నెల బెట్ట సబ్‌సాయిలర్ వాడిన పొలంలో వేరుకుళ్ళు తెగులు ప్రభావాన్ని పంట తట్టుకొనే సామర్థ్యాన్ని కల్పించింది. అంటే బెట్ట సమయంలో కూడా తేమ ఉండడం వలన బెట్ట తరువాత వర్షం పడినప్పటికీ ఏవిధమైన తెగులు ప్రభావితం చేయలేదు. అంతేకాక తేమవున్న కారణంగా సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య కూడా సబ్‌సాయిలింగ్ చేసిన పొలంలో 5–6 రెట్లు అధికంగా ఉండడం గమనించాము. ఈ కారణంగా సబ్‌సాయిలర్ వేసిన పొలంలో సుమారు 25 రోజులకు వేరుశెనగ బెట్టకు గురై కూడా సబ్‌సాయిలర్ వేయని పొలం కంటే ఆశించిన దిగుబడి పొందవచ్చునని నిరూపించబడింది.

ఈ విధంగా మెట్ట ప్రాంతాల్లో రైతు పొలం తయారీలో సబ్‌సాయిలింగ్ చేయడం ద్వారా పొలంలో పడిన వర్షపునీటిని ఆ పొలంలోనే వాడుకొని లాభపడవచ్చును.

సబ్‌సాయిలింగ్ (నేలలో గట్టి పొరలను ఛేదించడం)

1. 40 సెం.మీ.ల నుండి 60 సెం.మీ.ల లోతుకు నిటారుగా దున్ని భూమిలోని గట్టి పొరను ఛేదించవచ్చు.
2. ఇలా చేయడం వలన పొలంలో పడిన వర్షపు నీరు ఛేదించిన సాళ్ళద్వారా అదే పొలంలోనే ఇమిడి తేమను నిల్వ ఉంచేందుకు రిజర్వాయరులాగా తోడ్పడుతుంది.
3. ఈ విధంగా సబ్‌సాయిలింగ్ ద్వారా భూమి లోపల (40–60 సెం.మీ. వరకు) గుల్ల బార్చడం ద్వారా పంట మొక్కల వేర్లను లోపలి వరకు వృద్ధి చేసుకునేందుకు దోహదపడుతుంది.
4. వేర్ల వృద్ధి ఎక్కువగా జరగడం ద్వారా లోపలి పొరలలోని తేమను పొంది పంట పటిష్టంగా తయారై ఎక్కువ రోజులు బెట్టను తట్టుకోగలుగుతుంది.
5. సబ్‌సాయిలింగ్ చేయడం ద్వారా పంట వేర్లు భూమిలోపలి వరకు వ్యాప్తి చెంది నేలలోని తేమ మరియు పోషకాలను తీసుకొనేందుకు దోహదపడుతుంది. ఇలా లోపలి వరకు నేలను గుల్లబార్చడం వలన వేర్ల ద్వారా ఆక్సిజన్‌ను పీల్చుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
6. సబ్‌సాయిలింగ్ (40–60 సెం.మీ.వరకు) సబ్‌సాయిలర్ అనే నాగలితో సమర్థవంతంగా చేయవచ్చును. దీని ఖరీదు రూ. 15,000/– నుండి రూ. 35,000/– వరకు ఉంటుంది.
7. ఈ సబ్‌సాయిలర్ వాడకాన్ని సాధారణంగా ఉపయోగించే 40 హెచ్.పి. ట్రాక్టరు శక్తి సరిపోతుంది. ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఒక ఎకరం పొలాన్ని సుమారు 1.30 గంట సమయంలో కావలసిన లోతైన 1 మీటరు దూరంలో సాళ్ళను పొందవచ్చును.

గుంతలు తీయు పరికరము :- (పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్)

ఈ పరికరము ఉద్యానవన మొక్కలు, ఫెన్సింగ్ మరియు తీగ తోటలకు పందిరి వేయటానికి ఉపయోగించవచ్చును. ఈ పరికరము ట్రాక్టర్ లేదా ఇంజన్‌తో నడుపబడుతుంది. ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ పోస్ట్ హోల్ డ్రిగ్గర్ ట్రాక్టర్ వెనుక భాగాన మూడు పాయింట్ల మౌంటింగ్‌తో తగిలించి పిటిఒ శక్తితో గుంటలు తీయు భాగమునకు భ్రమనమును అందించును. ఈ పరికరంతో గంటకు 12 గుంతలు తీయవచ్చును. గుంట పరిమాణం ఆగర్ పరిమాణంపై ఆధారపడిఉంటుంది. ఈ పరికరమును ఉపయోగించడం వలన రైతుకు పెట్టుబడుల ఖర్చులు తగ్గించవచ్చును. ఇంజన్ సహాయంతో నడిచే పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్ ధర రూ. 10,000-25,000ల వరకు ఉంటుంది. ట్రాక్టర్‌తో పనిచేయు పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్ ధర రూ. 30,000-1,00,000/- వరకు ఉండవచ్చును.

శనగ పంటలో యాంత్రీకరణ : పప్పుశనగ రాష్ట్రంలో కర్నూలు, కడప, అనంతపురం మరియు ప్రకాశం జిల్లాలలో ఎక్కువగా పండించేవారు. ఇప్పుడు గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాలలో కూడా పంట విస్తీర్ణం బాగా పెరిగింది.

ఈ శనగపంట నేల తయారీ నుండి పంట కోసి మార్పిడి చేసేంత వరకు అన్ని వ్యవసాయ పనులకూ కావలసిన యంత్రాలు ఉన్నాయి.

నేల తయారీ : రెక్కనాగలి లేద పళ్ళెపు నాగలితో వేసవి దుక్కి దున్ని ఆపై నేలను రోటా వేటరుతో గుల్ల బార్చి వదిలేయడం జరుగుతుంది. ఆపై పంట విత్తేటప్పుడు అక్టోబరు 15 నుండి విత్తనం మరియు ఎరువు వేయు పరికరం ను వాడి సమర్ధవంతంగా శనగను సాళ్ళలో విత్తడం జరుగుతుంది. ఈ పంటలో కలుపు తీయడానికి కల్టివేటరు వాడి సాళ్ళలో తీయవచ్చును. అదేవిధంగా సస్యరక్షణకు ట్రాక్టరు సహాయంతో నడపుబడే పవర్ స్ప్రేయరును వాడి సమర్ధవంతంగా చేయవచ్చును. ఈ మందు పిచికారి చేయడం బూమ్ స్ప్రెయర్ నాజిల్‌ని గాని లేదా ఆసిల్లేషన్ నాజిల్ గాని ట్రాక్టరు వెనుక భాగంలో అమర్చి తద్వారా పిచికారి చేయవచ్చును. తద్వారా గంటకు ఒక ఎకరా వరకు పిచికారి చేయవచ్చును.

పంట కోయుట మరియు మార్పిడి : పంటను కోయడానికి మనుషుల సహాయంతో కోసి పొలంలో కుప్పలు వేసి తరువాత 4-6 రోజుల తరువాత శనగ పంటకు రూపొందించబడిన నూర్చే యంత్రం ద్వారా చాలా సమర్ధవంతంగా మార్చవచ్చును.

శనగ పంటను కోసే బ్లేడు : ట్రాక్టరు సహాయంతో పంటను కోసేందుకు వీలుగా రూపొందించబడినది. దీని ద్వారా పంటను ఊడ్చి మధ్య వరుసలలో వదులుతుంది. ఇలా కోసిన ఊడ్చిన పంటను పంటనూర్చే యంత్రంలో మనుషుల ద్వారా వేసి నూర్చేందుకు వీలవుతుంది. ఈవిధంగా చేయడం ద్వారా పంటను కోసే కూలీలను తగ్గించవచ్చును.

శనగ పంట కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్ : శనగ పంటలో 90% యాంత్రీకరణ సాధించబడింది అని తెలుపడానికి ముఖ్యమయిన కారణం శనగ కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్ రావడమే. ఈ కంబైన్ ద్వారా గంటకు 1 ఎకరా వరకు కోసి నూర్పిడి కూడా చేయబడుతుంది. ఈ యంత్రము ముఖ్యంగా పెద్ద పొలాల్లో సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తు మరియు సమయం వృధా కాకుండా పనిచేస్తుంది. యంత్రాన్ని ఎ.పి.ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ కార్పోరేషన్, విజయవాడ వారు కొనుగోలు చేసి కస్టమ్ హయిరింగ్‌కు ఇస్తున్నారు. శనగ రైతులు ముఖ్యంగా గుంటూరు, కృష్ణా మరియు ప్రకాశం జిల్లా రైతులు ఈ సౌకర్యాన్ని వాడుకోవచ్చును.

పంట వ్యర్థాలను నూర్చి భూమిలో కలిపే యంత్రము : మన పూర్వీకులు పంట వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా నేలలో కలిపి వృధా కాకుండా నేల యొక్క ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ వ్యవసాయంను నిర్వర్తించేవారు. కానీ ఇప్పటి రోజులలో అగ్రికల్చరల్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ వలన సమయం తక్కువ అవడం వలన రైతు ఈ వ్యర్థాలను కాల్చివేయడం జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వలన నేలలోని మైక్రోబియల్ సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గి, నేలలోని కార్బన శాతం తగ్గి మరియు పై నేలలో పోషకాలు తగ్గి నేల ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. అంతేకాక పై పొరలలో ఉన్న సేంద్రీయ పదార్థం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. కాబట్టి నేల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకొని పంట వ్యర్థాలను నేలలోకి చేర్చడం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ విషయంలో వరి పంట కోసిన తరువాత లేదా చెఱకు పంట కోత తరువాత పంట వ్యర్థాలను కాల్చడం పరిపాటి. ఇలా కాక పంట వ్యర్థాలను అలానే నేలలో కలపడానికి వీలుపడదు. అందుకు ఈ వ్యర్థాలను చిన్న ముక్కలుగా పొడి చేసి దానిని నేలలో కలపడానికి సమర్థవంతంగా అవలంభించేందుకు యంత్రాన్ని రూపొందించడం జరిగింది.

ఈ యంత్రంలో ముందు భాగం పంట వ్యర్థాలను చిన్న చిన్న ముక్కలు చేయడానికి వేగంగా తిరుగులాడే రోలరును అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ రోలరు ఉపరితలంపై రకరకాల కత్తులను ప్రయోగించి పంట వ్యర్థాలను ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడేలా అమర్చబడింది. అలానే వెనుక భాగంలో అమర్చిన యంత్ర భాగం, పంట వ్యర్థాల ముక్కలను నేలలోకి కలపడానికి వీలుగా రూపొందించబడింది. ఈ యంత్రాన్ని ముఖ్యంగా వరి పంట కోసేసిన తరువాత పొలంలో ఉన్న తేమను మరియు పోషకాలను వ్యర్థం కాకుండా (దున్నకుండా) వరి పంట మొదళ్ళను నూర్చి నేలలో కలపడానికి కూడా సమర్థవంతంగా వాడవచ్చును. ఇలా చేయబడిన పొలం రబీ పంటలో అపరాల సాగును భూమిని దున్నకుండా సమర్థవంతంగా విత్తేందుకు వీలవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొత్తం పని ఒక్కసారి వాడి నిర్వర్తించడం వలన రబీలో పంటను సమయం వృధా కాకుండా విత్తి మంచి పంటను పండించవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని లాగడానికి 40 హెచ్.పి. అశ్వపు శక్తి గల ట్రాక్టరును ఉపయోగించి పి.టి.ఒ. ద్వారా శక్తిని పొంది యంత్రాన్ని నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది.

ఇలా పంట వ్యర్థాలను నేలలో / పొలంలో కలపడం ద్వారా పొలం ఆరోగ్యం మెరుగు పడడమే కాకుండా, కర్బన శాతం పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. ఇంతేకాకుండా పొలంలో నీటిని నిల్వపరిచే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. కావున మారుతున్న వ్యవసాయ విధానాల వలన పొలాన్ని నిర్వీర్యపరచకుండా పొలంలో పోషకాలను పెంచడంతో పాటు అతీ తక్కువ సమయంలో రెండవ పంటను పండించి తద్వారా లాభసాటి ఉత్పత్తులను పొందవచ్చును.

బోదె సాగు విత్తే యంత్రము : సమగ్ర యాంత్రీకరణ అవలంభించే తరుణంలో మారుతున్న వ్యవసాయ పద్ధతులు మరియు అవసరాలకు అనువైన పనిముట్లు రూపొందించడం చాలా అవసరం. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా బోదె సాగును సులభతరం చేయడం కోసం బోదె సాగు విత్తే యంత్రాన్ని రూపొందించడం జరిగింది.

అనగా మారుతున్న నీటి సాగును అనుసంధానపరచుకొని బోదె సాగును రైతాంగం అవలంభిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కూరగాయలు, పూలు తోటలలో మరియు వేరుశనగ పంట సాగులో ఈ పద్ధతిని అవలంభిస్తున్నారు. అనగా తుంపర సేద్యం నుండి బిందు సేద్యం వైపు మరలుతున్న తరుణంలో సులువుగా నీటిని పంటకు అందించడానికి

మరియు వేళ్ళ పంట అయిన వేరుశనగ లాంటి పంటను తీసే సమయంలో సులభతరం చేసి "డిగ్గర్ కం షేకర్" లాంటి యంత్రాలను సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించవచ్చును. అదేకాకుండా వేరుశనగ లాంటి వేర్లపై పండే పంటలు ఇలాంటి బోదెల సాగులో నాణ్యత మరియు ఉత్పాదకత మెరుగ్గా పొందవచ్చునని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించబడింది. కాకపోతే ఇంతవరకు ఈ బోదెలను వేయడానికి ప్రత్యేకంగా పరికరాలను వాడి ఆ తరువాత కూలీల సహాయంతో నాట్లు / పప్పు వేయడం పరిపాటి. ఇందులోనూ కూలీల కొరత ఎక్కువగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో బోదెలు వేయడం వాటిపై నాట్లు వేయడం వంటి పనులు కూలీలతో చేయడం చాలా ఖర్చుతో కూడిన విషయం.

బోదె సాగు విత్తే యంత్రము : ఈ యంత్రంలో బోదెలు వేయడం మొదటిది. అందుకు పరికరంలో రెండు రెక్కలు ఎదురు ఎదురుగా అమర్చి వాటి మధ్య దూరాన్ని మార్చేందుకు వీలుగా చట్రంపై రంధ్రాలను వేసి ఈ రంధ్రాలను మార్చి బిగించడం ద్వారా బోదె వెడల్పును కావలసినట్టు మార్చవచ్చును. అనగా చిన్న 40 సెం.మీ. బోదె నుండి 1 మీ. (100 సెం.మీ.) వరకు వేయవచ్చును. ఈ బోదె ఎత్తును నిర్ధారించడానికి ఒక పలకను అమర్చబడింది. ఈ పలకను క్రిందకు పైకి మార్చి బోదె ఎత్తును 30 సెం.మీ. నుండి 10 సెం.మీ. వరకు మార్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇలా ఈ పలకను మార్చి బోదె ఎత్తును పంటకు కావలసిన విధంగా మార్చుకొనవచ్చును.

ఇంతేకాకుండా బోదె పైన 5 వరుసల నుండి ఒక వరుస వరకు మార్చి విత్తుకొనవచ్చును. ఇలా మార్చేటప్పుడు వరుసల మధ్య దూరం 20 సెం.మీ. నుండి 80 సెం.మీ. వరకు మార్చవచ్చును. ఈ యంత్రాన్ని ట్రాక్టరు సహాయంతో లాగడం ద్వారా పొలంలో మట్టిని అమర్చబడిన రెక్కలు మధ్య భాగానికి ఎగదోయడం ద్వారా పోత మట్టి బోదెగా తయారవుతుంది. ఇలా తయారయిన బోదెపై అమర్చబడిన పలక బోదె ఎత్తును కావలసిన విధంగా (10-30 సెం.మీ. వరకు) మార్చవచ్చును. దీనిపై అమర్చిన గొర్రు సహాయంతో పప్పును మరియు ఎరువును విత్తవచ్చును. ఇలా విత్తిన తరువాత సాలును మట్టితో వెనుక భాగంలో అమర్చిన రోలురు కప్పుతుంది. ఇలా ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి నిర్ధిష్ట ఎత్తు కలిగిన బోదెను బోదెపై సాళ్ళను పొందుపరచి పప్పును మరియు ఎరువును విత్తి దానిని కప్పడం (మట్టితో) కూడా ఒకేమారు చేయబడుతుంది. ఇంతేకాక బోదెకు ఇరువైపులా కాల్వలను పొందుపరుస్తుంది. ఇలా చేసిన బోదెలపై పంట పండించడం ద్వారా ఎక్కువ వర్షం పడినప్పటికి పంట ముంపుకు గురికాకుండా ఉంటుంది. అదే సమయంలో బిందు సేద్యం ఉపయోగించి సమానంగా పంటకు నీటిని అందించవచ్చును. అంతేకాకుండా వేరుశనగ లాంటి వేరు పంటలను సమర్ధవంతంగా పండించి మరియు సులువుగా పంటను తీయవచ్చును. ఈవిధానం యంత్రాలను (డిగ్గర్ కమ్ షేకర్) ఉపయోగించడానికి చాలా అనువైనది. ఈ యంత్రాన్ని అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగము, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి వారిచే రూపొందించడం జరిగింది.

ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలు మరియు యంత్రాలపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

యూనివర్శిటీ హెడ్ & ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ఫార్మ్ మెషినరీ & పవర్ ఇంజనీరింగ్)

ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి. ఫోన్ నెం. : 94409 14961

వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల సాంకేతికత వినియోగం మరియు ప్రామాణిక నిర్ధేశకాలు

వ్యవసాయ సుస్థిరత, భూమిపై మానవ నాగరికత ఉనికిని నిర్ణయిస్తుంది. భారతదేశంలో వ్యవసాయం మానవుల ప్రధాన జీవన విధానం. వాతావరణంలో మార్పు, అధిక్యార్థకమైన వ్యవసాయం మరియు మోనో-క్రాపింగ్ వ్యవస్థల యొక్క చెడు ప్రభావాలు వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక అంశాలపై బహుళ- పరిమాణ ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. అనగా భూమి, నీరు మరియు పర్యావరణం, అకాల వర్షాలు మరియు శీతోష్ణస్థితి ఉల్లంఘనల కారణంగా, సకాలంలో విత్తనాలు నాటుట, పంటల రక్షణ మరియు ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు అతి తక్కువ కాలంలోఅతిపెద్ద ప్రాంతంలో చేపట్టాల్సి వస్తుంది.

భారతదేశంలో గణనీయమైన జనాభా ప్రత్యక్ష వ్యవసాయ కార్యకలాపాల నుండి ఉపసంహరించబడుతుంది మరియు అందువల్ల, 2050 నాటికి భారత దేశం రైతులు / వ్యవసాయ నిపుణుల కొరతను ఎదుర్కొంటుంది. మొత్తం శ్రామిక శక్తిలో వ్యవసాయ కార్మికుల శాతం 2018 లో 50.0 శాతం నుండి 2050 నాటికి 25.7 శాతానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. దేశీయ డిమాండ్ ప్రకారం భారతదేశం 1950 లో 36.1 కోట్ల జనాభాకు 50.8 మిలియన్ టన్నుల నుండి 2019-20 లో 135 కోట్ల జనాభాకు 295.87 మిలియన్ టన్నులకు ఆహార ఉత్పత్తిని పెంచింది. మున్ముందు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి, ప్రస్తుత స్థాయి నుండి 2050 నాటికి భారతదేశం తన వార్షిక ఆహార ఉత్పత్తిని 333 మిలియన్ టన్నులకు పెంచాలి. ఒక ప్రక్క రుతుపవనాల ఆగమన - తిరోగమన వ్యత్యాసాలు దాని వల్ల వచ్చే అకాల వర్షాలు మరియు శీతోష్ణస్థితి ఉల్లంఘనలు, వ్యవసాయ కార్మికుల కొరత, వనరులను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం తద్వారా సాగు ఖర్చు విపరీతంగా పెరగటం వంటి అంశాలు రైతుని మరియు వ్యవసాయ రంగాన్ని అస్తిరపరుస్తున్నాయి. సమయం ఆదా మరియు వనరుల వినియోగాన్ని తగ్గించే సాంకేతికతలు అభివృద్ధి చెందకపోతే దేశ ఆహార భద్రతకు భంగం వాటిల్లే విధంగా మరియు వ్యవసాయ రంగాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.

ఆహార మరియు వాణిజ్య పంటలకు తరచూ చీడపీడలు సోకుతుండటం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు వాటి నివారణకు రసాయనాలను పిచికారి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇటీవల విరివిగా ఉపయోగిస్తున్న డ్రోన్ల ద్వారా ఆ సమస్యకు ఓ చక్కని పరిష్కారం దొరికింది. యు.ఎ.వి. లేదా డ్రోన్ (మానవరహిత వైమానిక వాహనం) అనేది ఎగిరే పరికరం, ఇది ఆటోపైలట్ మరియు జి.పి.ఎస్. కోఆర్డినేట్ల సహాయంతో ముందుగా సెట్ చేసిన ఎత్తులో, వేగంతో మరియు దిశలో ఎగురుతుంది. డ్రోన్ పరికరం సాధారణ రేడియో తరంగాల నియంత్రణల ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఏదైనా లోపం లేదా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి సంభవించినప్పుడు లేదా ఏదైనా అడ్డు వచ్చినప్పుడు, దీన్ని మానవీయంగా పైలట్ చేసి ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.

వ్యవసాయ డ్రోన్ అనేది పంట ఉత్పత్తిని పెంచడానికి మరియు పంట పెరుగుదలను పర్యవేక్షించడానికి వ్యవసాయానికి వర్తించే మానవరహిత వైమానిక వాహనం. సెన్సార్లు మరియు డిజిటల్ ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలు

రైతులకు వారి క్షేత్రాల యొక్క గొప్ప చిత్రాన్ని ఇవ్వగలవు. పంట దిగుబడి మరియు వ్యవసాయ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఈ సమాచారం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

వ్యవసాయ డ్రోన్ టెక్నాలజీతో విత్తనాలు, ఎరువులు వేయడం, పురుగు, తెగుళ్ళు, కలుపు మందులు మరియు ద్రవ లేదా నీళ్ళలో కరిగిపోగల ఎరువుల పిచికారీ మరియు పంట పర్యవేక్షణ, నేల పర్యవేక్షణ, వాటర్‌షెడ్ పర్యవేక్షణ, కాలువ విడుదలల పర్యవేక్షణ, నీటి వనరుల అభివృద్ధి ప్రణాళిక మరియు పర్యవేక్షణ కోసం పరీవాహక మరియు ఆదేశ ప్రాంతాల సర్వే, పంట క్షేత్రాల 3-డి మ్యాపింగ్ మరియు ఖచ్చిత వ్యవసాయ సాంకేతికతను రైతులకు చేరవేయవచ్చును.

ముఖ్యంగా రసాయనాలను పిచికారి చేయడం వల్ల కలిగే శ్వాసకోశ సంబంధింత వ్యాధులకు చెక్ పెట్టినట్లవుతుంది. కూలీ ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో, దీని వినియోగం ద్వారా రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా బాగా తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా. వరి లాంటి పంటలకు బురదలో నడుస్తూ. రసాయనాలు పిచికారి చేయాల్సిన సమస్యకు ఇది చక్కని పరిష్కారం. దీని ద్వారా రైతులకు పని ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఎత్తు ఎక్కువగా వుండే పంటలలో (మొక్కజొన్న, జొన్న, చెరకు, ఉద్యాన పంటలు మొదలగుననవి..) డ్రోన్‌లతో పిచికారి చాల సులభంగా మరియు త్వరగా చేయవచ్చును.

వ్యవసాయంలో డ్రోన్ యొక్క ప్రయోజనాలు :

(1) వ్యవసాయ డ్రోన్ టెక్నాలజీతో పురుగు, తెగుళ్ల, కలుపు మందులు, ఎరువులు వేయడం, విత్తనాలు మరియు ద్రవ లేదా నీళ్ళలో కరిగిపోగల ఎరువుల పిచికారి చేయవచ్చును. **(2)** 10 లీటర్ల ట్యాంక్ సామర్థ్యం గల డ్రోన్‌తో, 1 ఎకరాన్ని 6-10 నిమషాల్లో (16.2 - 19.8 కిలో మీటర్లు / గంటకు @ 0.6-1.0 మీటరు పంట మీద ఎత్తులో) పిచికారి చేయవచ్చును. **(3)** వ్యవసాయ డ్రోన్ తో పిచికారి తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది మరియు 95% నీటిని, శక్తిని మరియు సమయాన్ని ఆదా చేయవచ్చును. **(4)** ఇది పురుగు మందులు లేదా శిలీంధ్ర నాశకాలు లేదా కలుపు సంహారకాలు 100-200 లీటర్లు / ఎకర నుండి 10 లీటర్లు / ఎకరానికి చల్లడానికి నీటి అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. **(5)** వ్యవసాయ డ్రోన్ తో పిచికారి చేయడం ద్వారా సిఫార్సు చేయబడిన పురుగు, తెగుళ్ళు మరియు కలుపు మందు మోతాదు మీద 25% వినియోగాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంది. **(6)** వ్యవసాయ డ్రోన్ తో సహజ వనరుల యొక్క సమగ్ర జాబితాను సులభమైన మరియు తక్కువ ఖర్చుతో, త్వరితంగా చేస్తుంది. **(7)** వ్యవసాయ డ్రోన్ పొలాలను ఒకేసారి త్వరగా మరియు సులభంగా విశ్లేషించే సామర్థ్యాన్ని రైతులకు ఇస్తుంది. **(8)** ఇది అత్యధిక ఖచ్చితత్వంతో మరియు వనరులను సకాలంలో వర్తింపజేయడానికి రైతులకు సహాయపడుతుంది, తద్వారా ఖచ్చితమైన వ్యవసాయాన్ని చేపట్టడంలో సహాయపడుతుంది. **(9)** పంటలు, నేలలు మరియు వాతావరణం యొక్క తక్కువ ఎత్తులో రిమోట్ సెన్సింగ్ నిర్వహించడానికి డ్రోన్లు మల్టీస్పెక్ట్రల్ / హైపర్‌స్పెక్ట్రల్ / థర్మల్ / లిడార్ కెమెరాలను మోయగలవు. **(10)** నేల తేమ సెన్సార్లతో కూడిన డ్రోన్లు ఒక క్షేత్రంలోని ఏ భాగాలకు ఎక్కువ నీరు అవసరమో గుర్తించగలవు మరియు తద్వారా నీటి పారుదల ఆటోమేషన్‌కు సహాయపడుతుంది. **(11)** వ్యవసాయ డ్రోన్ తో నేల లక్షణం మరియు నేల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ చాలా సులభం

మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది అవుతుంది. **(12)** డ్రోన్ ఆధారిత సెన్సార్ వ్యవస్థలతో పర్యావరణాన్ని సులభంగా మరియు చాలా దగ్గరగా పర్యవేక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. **(13)** వరి / పప్పుధాన్యాల ప్రత్యక్ష విత్తనాలను చల్లవచ్చును మరియు అటవీ ప్రాంతాల్లో విత్తన బాంబులను విసిరి అటవీ ప్రాంతాలలో మొక్కలను త్వరితగతిన నాటవచ్చును. **(14)** రైతులు తమ పొలాలను త్వరగా మరియు సమర్ధవంతంగా స్కౌట్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. క్షేత్రాల స్థితిని నిర్ణయించడంలో ఇది సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది. **(15)** డ్రోన్ ఆధారిత థర్మల్ కెమెరాలు పొలంలోని తడి మరియు పొడి ప్రాంతాలను (పాచెస్) కనుగొనడంలో సహాయపడతాయి. రైతులకు నీరు వృథా కాకుండా ఉండటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. **(16)** ఇది స్మార్ట్ మరియు ఖచ్చిత వ్యవసాయానికి సహాయపడే పర్యావరణ డేటాను పర్యవేక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. **(17)** డ్రోన్లు, జి.ఐ.ఎస్. (జియోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్) మ్యాపింగ్‌ను సమగ్రపరిచింది. ఇది అన్ని రకాల భౌగోళిక మరియు ప్రాదేశిక డేటాను నిల్వ చేయడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి సహాయపడుతుంది. **(18)** ఇది దిగుబడిని పెంచడానికి మరియు వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఖర్చులను తగ్గించడంలో మ్యాపింగ్‌లో రైతులకు సహాయపడుతుంది. **(19)** హోమ్ బటన్ నొక్కితే, డ్రోన్ మనం ఎక్కడనుండి టేక్ ఆఫ్ చేసామో అక్కడకే తిరిగి రాగలదు. **(20)** ఇది ఇతర ఐ.ఒ.టి. పరికరాలతో సులభంగా ఏకీకృతం చేస్తుంది మరియు డ్రోన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వ్యవసాయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు మెషిన్ లెర్నింగ్ యొక్క అనువర్తనం సులభం అవుతుంది. **(21)** డ్రోన్ తో పిచికారి వల్ల మందు మొక్క యొక్క పై భాగం, మధ్య భాగం మరియు క్రింది భాగంలో సాంప్రదాయ పిచికారి యంత్రాల కంటే మెరుగుగా తడుపుతుంది మరియు ఏకరీతిన తడుపుతుంది.

వ్యవసాయంలో డ్రోన్ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు :

(1) వ్యవసాయ డ్రోన్ ప్రారంభ ఖర్చు ఎక్కువ. ఒక వ్యవసాయ డ్రోన్ యూనిట్ విలువ దాదాపు ఇప్పటి రేటు ప్రకారం 7 లక్షలు అవ్వొచ్చు (1 డ్రోన్ + 1 జనరేటర్ + 5 సెట్స్ బ్యాటరీలు + *2 బ్యాటరీ ఛార్జర్లు (* డ్రోన్ తో పిచికారి సమయంలో బ్యాటరీలను వేగంగా అందించడానికి అదనపు 5 సెట్ల బ్యాటరీలను ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది) **(2)** దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి, క్రాష్ ల్యాండింగ్ లేదా డ్రోన్ తప్పిపోకుండా ఉండటానికి శాస్త్రీయంగా డి.జి.సి.ఎ. అనుమతులు ఉన్న శిక్షణ పొందిన పైలట్ అవసరం. **(3)** చాలా వ్యవసాయ డ్రోన్‌లు తక్కువ ఎగిరే సమయాన్ని పేలోడ్‌లో 10 నిమిషాలు కలిగి ఉంటాయి **(4)** దీనిని ఉపయోగించడానికి అన్ని రకాల ప్రభుత్వ క్లియరెన్స్ మరియు డి.జి.సి.ఎ. (డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్) నుండి అనుమతి అవసరం. **(5)** క్లిష్టమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వీటిని ఎగరవేయడం కష్టం. **(6)** అగ్రికల్చరల్ డ్రోన్ దృశ్యమాన దృష్టిలో (VLOS) మాత్రమే పనిచేస్తుంది. **(7)** ముఖ్యంగా వరిలో సంశ్లేషణ కాలం (పూత దశ) లో మందు పిచికారి ఉదయం 11.00 గంటల తర్వాత మాత్రమే చేయాలి లేదా మొదటి 3 రోజులు పిచికారి నివారించాలి.

పది ప్రధాన పంటలైన వరి, ప్రత్తి, మిరప, మినుము, కంది, జొన్న, మొక్కజొన్న, శనగ, వేరుశనగ మరియు చెఱకులో సిఫారసు చేసిన ప్రామాణిక నిర్ధేశకాలు :

<table>
<tr>
<td>1. పది ప్రధాన పంటలో వివిధ దశలలో కలుపు మందులు, పురుగు మందులు, తెగుళ్ళ మందులు మరియు నీటిలో కరిగే పోషకాలు డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయుటకు డ్రోనును ఎగుర వేయవలసిన ఎత్తు, వేగము మరియు మందు పడే వెడల్పుల ప్రామాణికలు (విత్తన దశ నుండి పూత దశ ముందు దశ వరకు మరియు పూత దశ నుండి కోత దశ వరకు పాటించాల్సిన ప్రామాణిక నిర్ధేశకాలు)</td>
<td>
1. విత్తిన/ నాటిన దగ్గర నుండి పూత దశ ముందు వరకు
<table>
<tr><th>సం.</th><th>వివరములు</th><th>ప్రామాణికం</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>డ్రోనును పంట మీద నుండి ఎగుర వేయవలసిన ఎత్తు</td><td>0.6 మీ.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>డ్రోను వేగం</td><td>5.5 మీ./సె.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>డ్రోను పిచికారి విస్తరించు వెడల్పు</td><td>2.8 మీ.</td></tr>
</table>
2. పూత దశ నుండి కోత దశ వరకు
<table>
<tr><th>సం.</th><th>వివరములు</th><th>ప్రామాణికం</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>డ్రోనును పంట మీద నుండి ఎగుర వేయవలసిన ఎత్తు</td><td>1 మీ.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>డ్రోను వేగం (సగటున)</td><td>4.5-5.5 మీ./సె.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>డ్రోను పిచికారి విస్తరించు వెడల్పు</td><td>3.2 మీ.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>2. డ్రోన్లతో పిచికారి చేయవలసిన రోజువారీ సమయము</td><td>ఉదయం కాలంలో కానీ మరియు సాయంత్ర కాలంలో కానీ పిచికారి చేయుటకు అనుకూలము. వరిలో మాత్రం పంట పూత / ఈనిక దశలో ఉన్నప్పుడు మొదటి రెండు రోజులు పిచికారి చేయరాదు మరియు తరువాత చేయవలసి వస్తే, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి చేయవలెను. (పూత దశలో)</td></tr>
<tr><td>3. డ్రోను ప్రయాణించవలసిన దిశ</td><td>1. గాలి వేగము 10 కి.మీ./ గం. కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు పొలము యొక్క పొడవాటి గట్టుకు సమాంతర మార్గములో డ్రోనును ప్రయాణింపచేయాలి.
2. గాలి వేగం 10 కి.మీ. / గం. కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గాలి వీచే దిశలో డ్రోనును ప్రయాణింపవలెను.</td></tr>
<tr><td>4. డ్రోను ప్రయాణించవలసిన అత్యధిక దూరం (పైలట్ నుండి)</td><td>పైలట్ నుంచున్న ప్రదేశం నుండి 200 మీ. వరకు మాత్రమే ప్రయాణింపచేయాలి మరియు డ్రోనును కంటి దృష్టి రేఖలో కనిపించే వరకు మాత్రమే ప్రయాణింపచేయాలి.</td></tr>
<tr><td>5. డ్రోనుతో పిచికారి చేసేటప్పుడు వచ్చే ఉరవడి (డ్రిఫ్ట్)</td><td>డ్రోను ప్రయాణిస్తూ పిచికారి చేసే వెడల్పు భాగము నుండి 0.5-1.0 మీ. వరకు ఉంటుంది. (గాలి వేగము 5-7.5 కి.మీ./ గం. ఉన్నప్పుడు)</td></tr>
</table>

6. డ్రోనుతో పిచికారి చేసేటప్పుడు ఉండవలసిన ఉత్తమమైన గాలి వేగము మరియు ఉష్ణోగ్రత వివరాలు	(1) 3-10 కి.మీ./గం. (2) 25^0 - 40^0 సెం.గ్రే. **3. డ్రోనుతో పిచికారి చేయడానికి ఉష్ణోగ్రతలు :** **1. 25^0 సెం.గ్రే. కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు :** • వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత 25^0 సెం.గ్రే. కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆకుల మీద తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండే సందర్భాల్లో పిచికారి చేయరాదు. • మంచు ఉన్నప్పుడు డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయరాదు. **2. 40^0 సెం.గ్రే. కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు :** • వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత 40^0 సెం.గ్రే. కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఉదయం 11 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు పిచికారి చేయరాదు. ఒక వేళ చేసిన యెడల పిచికారి చేయు మందు ఆవిరైపోవును మరియు డ్రోను ప్రొపెల్లర్స్ మరియు జాయింట్లు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
7. డ్రోనుతో ఒక ఎకరానికి మందులు / పోషకాలు చల్లడానికి పట్టు సమయము	**నికర సమయం :** 6 నిమిషాలు ఎకరాకు **స్థూల సమయం :** 10 నిమిషాలు ఎకరాకు (మందు కలుపుటకు, నింపుటకు, నాజిల్ సరి చేయుటకు, బ్యాటరీ మార్చుటకు).
8. సిఫారసు చేయబడిన పిచికారి ద్రావణ పరిమాణం	ఎకరాకు 10 లీటర్లు (లేదా) హెక్టారుకు 25 లీటర్లు (సిఫారసు చేయబడిన డ్రోన్ వేగం, ఎత్తు, వెడల్పు పాటించినప్పుడు)
9. డ్రోన్‌లతో కలుపు మందులు, కీటక తెగుళ్ళ నాశకాలు మరియు నీళ్ళలో కరిగే పోషకాలు పిచికారి చేయడానికి సిఫారసు చేసిన మందుల మోతాదు	మనిషి వీపు మీద మోసే మోటారు స్ప్రెయర్లతో పిచికారి చేయుటకు సిఫారసు చేసిన (సి.ఐ.బి.&ఆర్.సి.) మందుల మోతాదు లేదా ఆంగ్రూ వారు ఇచ్చిన మోతాదులో చీడపీడల ఉధృతిని బట్టి 75%-100% మందు 10 లీటర్ల నీళ్ళతో కలిపి డ్రోన్లతో ఎకరాకు పిచికారి చేయడానికి అవకాశం ఉంది.
10. వ్యవసాయ డ్రోన్ యొక్క క్షేత్ర సామర్థ్యం	పక్కపక్కన ఉన్న పొలాలలో పిచికారికి గంటకు 6 ఎకరాలు కొంచెం దూరంలో ఉన్న పొలాలకు పిచికారి చేస్తే గంటకు 5 ఎకరాలు పూర్తి చేయవచ్చు. సరాసరిన రోజుకు 30 ఎకరాలు ఒక డ్రోన్‌తో 7 సెట్ల బ్యాటరీలతో పిచికారి పూర్తి చేయవచ్చు.
11. డ్రోన్‌లతో పిచికారి చేయడానికి సిఫారసు చేసిన నాజిల్	ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ (పిచికారి కోణం : 110^0 - 120^0 వి.పి. 110015 వి.పి.)
12. వ్యవసాయ డ్రోన్‌కు ఉండవలసిన సరైన / ఉత్తమమైన నాజిళ్ళ సంఖ్య మరియు వాటిని అమర్చే విధానం	వ్యవసాయ డ్రోన్‌తో పిచికారిచేసేటప్పుడు 4 నాజిల్స్‌ను నాలుగు మోటార్ల క్రింద నిటారుగా అమర్చితే గాలి శక్తి శీలమైన బలాలను ఉపయోగించుకొని నిటారుగా మందు ద్రావణ బిందువులు మొక్కకు క్రింది భాగం వరకు చొచ్చుకొనిపోతాయి. తద్వారా సమాంతరంగా మరియు నిటారుగా ఏకరీతిన పిచికారి చేయవచ్చు.

13. వ్యవసాయ డ్రోన్‌కు అమర్చిన నాజిల్ ఉత్సర్గ సామర్థ్యం	0.4 లీ./ని. 50–75 పి.ఎస్.ఐ. బి.ఎల్.డి.సి. మోటారులు పని చేసే ఉత్సర్గ పంపు. (గరిష్ట సామర్థ్యం 5 లీ./ని.)
14. వ్యవసాయ డ్రోన్ యొక్క సరైన బరువు (మంచిగా ఎగిరే స్థిరత్వం కోసం)	లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీలతో పని చేయు ఆరు భుజాలు కలిగిన డ్రోన్ యొక్క పూర్తి బరువు 23–29 కిలోలు లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉన్న యెడల మొక్కలు మరియు పంట వంగి పడిపోకుండా పిచికారి చేయవచ్చు మరియు బ్యాటరీ రీచార్జ్ అయ్యే సమయం కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంక ఇతర విడి భాగాల మార్పిడి (ప్రొపెల్లర్స్ మోటార్లు) ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు.
15. వ్యవసాయ డ్రోన్‌లో ఉపయోగించే మోటార్లు	డ్రోన్ మోటారు మరియు వాటి వేగాన్ని నియంత్రించే పరికరం జత చేసి ఒకే భాగంగా ఉండే మోటార్లు వినియోగించిన యెడల ఎగుర వేసే సమయంలో ప్రమాదాలను తొలగించవచ్చు.
16. ప్రొపెల్లర్లను పరిశీలించి మార్చాల్సిన గడువు (పిచికారి చేసిన ఎకరాల ఆధారంగా)	350 ఎకరాలు 400 ఎకరాలు పిచికారి చేసిన తరువాత కార్బన్ కాంపోజిట్ ప్రొపెల్లర్లు మరియు వాటి అడాప్టర్లు మార్చవలసి ఉంటుంది. 6 నెలల కంటే ఎక్కువగా వినియోగంలో లేని మరియు నిలువ చేసిన ప్రొపెల్లర్లను వినియోగించరాదు. వీటిని ఉపయోగించిన యెడల ప్రొపెల్లర్లు వెంటనే విరిగిపోవును.
17. లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీల గరిష్ట రీచార్జీ సైకిల్ సంఖ్య (10 ని. ఎకరానికి ఎగుర వేసి రీచార్జీ చేసే వినియోగ పద్ధతిలో)	400 సైకిళ్ళు 400 ఎకరాలు పిచికారి చేయుట. (సిఫారసు చేసిన విధంగా రీచార్జి చేసిన యెడల) 400 ఎకరాలు పిచికారి చేసిన తరువాత 1600 యం.ఎ.హెచ్. సామర్థ్యం గల బ్యాటరీలను కొత్త వాటితో మార్చాలి.
18. గాలి యొక్క వేగం మరియు ఉష్ణోగ్రత వల్ల పిచికారి యొక్క ఉరవడి (డ్రిఫ్ట్)	5 కి.మీ. / గం. గాలి వేగం మరియు 35^0 సెం.గ్రే. ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు కనీసం 50 సెం.మీ. వురువడి (డ్రిఫ్ట్) ఇరువైపుల ఉంటుంది. మరియు 7.5 కి.మీ. / గం. గాలి వేగం ఉన్నప్పుడు కనీసం 1 మీ. ఉరవడి (డ్రిఫ్ట్) ఇరువైపుల ఉంటుంది. గాలి వేగం 10 కి.మీ. /గం. మించి ఉన్నప్పుడు డ్రోను వేగాన్ని 4.5 మీ./సె. నుండి 5.5 మీ./సె. మరియు 5.5 మీ./సె. నుండి 6.5 మీ./సె. కు మార్చవలెను.
19. డ్రోన్ నుండి పైలట్ మరియు కో–పైలట్, రైతులు, ఇతర జీవులు ఉండవలసిన దూరం.	డ్రోన్ పైలట్ మరియు కో–పైలెట్ : డ్రోన్ ఎగిరే చోటు నుండి 10 మీ. దూరంలో ఉండవలెను. రైతులు మరియు ఇతరులు : డ్రోన్ ఎగిరే చోటు నుండి 20 మీ. దూరంలో ఉండవలెను లేదా పైలెట్ /కో పైలెట్ ఆదేశాల మేరకు దూరాన్ని పాటించవలెను.

20. నీటి వంపు మరియు నాజిల్స్‌ను శుభ్రపరచుట	• ప్రతిరోజూ పిచికారి చేసిన తరువాత అన్ని నాజిల్స్‌ను శుభ్రపరచుకోవాలి. • ప్రతి ఎస్.పి./డబ్ల్యూ.పి./డబ్ల్యూ.పి. +స్ప్రేడర్ / డబ్ల్యూ.జి.పి. పిచికారి తరువాత నాజిల్స్‌ను ప్లాస్టిక్ టూత్ బ్రెష్‌తో శుభ్రపరచుకోవాలి. • మురికి నీటిని ఉపయోగించినప్పుడు పంపును నాజిళ్ళతో బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. • ప్రతీ 500 ఎకరాల పిచికారి తరువాత నీటి పంపును శుభ్రపరచుకోవాలి. • నాజిల్లను మార్చాలంటే నీటి ఉత్సర్గ పరీక్షలు జరుపుకొని నిర్ధారించవలెను.
21. డ్రోన్‌తో మందు పిచికారి చేసినప్పుడు పంటపై నిలువు దిశలో మందు విస్తరణ	పంటపై చల్లే మందు నిలువుగా క్రింది భాగానికి చేరేందుకు నాజిళ్ళను డ్రోన్ మోటార్ల క్రింద అమర్చవలెను.
22. డ్రోన్‌తో ఏవిధమైన సాంకేతిక సూత్రం కలిగిన మందు రకాలను వాడవచ్చు ?	ఎస్.ఎల్., ఎస్.సి., ఇ.సి., డబ్ల్యూ.జి. డబ్ల్యూ.పి. డబ్ల్యూ.డి.జి. ఎస్.పి., ఎస్.జి. మరియు జడ్.సి. (సి.ఎస్.+ఎస్.సి.), ఓ.డి. మరియు డి.సి. రకాలను సి.ఐ.బి. &ఆర్.సి. / ఆంగ్రూ సిఫారసు చేసిన మోతాదులో 25% తగ్గించి డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయవచ్చు.
23. డ్రోన్‌తో పిచికారికి ఎకరాకు అయ్యే ఖర్చు	రూ. 350-450/- ఎకరం ప్రస్తుత ధరల విధానాల ప్రకారం
24. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్	720 గం./ సంవత్సరానికి (నెలకు 20 రోజులు, రోజుకు 6 గంటలు, రోజుకు 30 ఎకరాలు పిచికారి చేసిన యెడల ఖరీఫ్ మరియు రబీ కాలాలలో) వరి – పప్పు ధాన్యం / మొక్కజొన్న ప్రాంతాలలో లేదా 4320 ఎకరాలు / సంవత్సరానికి
25. మానవ వీపు మీద మోసే మోటారుతో కూడిన పిచికారి యంత్రంకు మరియు డ్రోన్‌కు భర్తీ నిష్పత్తి	10 : 1
26. ఒక డ్రోన్ యూనిట్‌ను ఎన్ని ఎకరాలకు ఉపయోగించవచ్చు ?	ప్రతీ 300 ఎకరాలకు 1 డ్రోన్ యూనిట్ – 10 రోజుల పిచికారి వ్యవధి.
27. డ్రోన్ యొక్క పూర్తి బరువు (నీటి బరువుతో కలిపి)	23 – 29 కిలోలు
28. డ్రోన్ యొక్క పే లోడ్ (మోయగల నీటి యొక్క బరువు)	12 కిలోలును మించరాదు.

1. వ్యవసాయ డ్రోనుతో పొలంలో పిచికారి చేయబోయే ముందు చేయవలసిన కనీస తనిఖీలు మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు (ఈ కోడ్‌లు ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు. చే తయారు చేయబడినవి) :

డ్రోన్ కోడ్	కార్యాచరణ (తనిఖీలు మరియు జాగ్రత్తలు)	సిబ్బంది యొక్క జవాబు
కోడ్ 0.	పైలట్, భద్రత దుస్తులు మరియు సంరక్షణా సిబ్బంది భద్రత మరియు పంట రక్షణ దుస్తులు ధరించడం.	అవును / కాదు.
కోడ్ 1.	నో – ఫ్లై జోన్‌ల కోసం పైలట్ తనిఖీ చేయాలి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 2.	గాలి వేగం మరియు దృశ్యమానతను తనిఖీ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 3.	పగుళ్ళు, వంగిన భాగాలు, ఇతర సమస్యలు డ్రోన్‌ని తనిఖీ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 4.	రిమోట్ కంట్రోలర్, డ్రోన్, మొబైల్ మరియు పవర్ బ్యాంక్ యొక్క బ్యాటరీ వోల్టేజీని పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిందా లేదా తనిఖీ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 5.	డ్రోన్ భుజాలు మరియు రెక్కలను తెరిచి వాటిని బిగించండి, సమలేఖనం మరియు నిఠారుగా ఉందా అని తనిఖీ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 6.	డ్రోన్ రిమోట్ కంట్రోలర్‌ను ఆన్ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 7.	డ్రోన్‌కి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయబడిన బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 8.	రిమోట్ కంట్రోలర్ తో మొబైల్‌ను కనెక్ట్ చేయండి మరియు మిషన్ ప్లానింగ్ అప్లికేషన్‌ను తెరవండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 9.	కంపాస్ కాలిబ్రేషన్ కోసం తనిఖీ చేయండి (డ్రోన్ మునుపు పిచికారి చేసిన ప్రదేశం నుండి 10 కి.మీ. దూరం వెళ్ళి ఉంటే చేయాలి).	అవును / కాదు.
కోడ్ 10.	సిఫార్సుల ప్రకారం పురుగు మందులను నీటిలో సమ మిశ్రమం వచ్చే వరకు కలపండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 11.	గరాట మరియు జాలీ ఉపయోగించి మిశ్రమ ద్రవాన్ని ట్యాంక్‌లోకి నింపండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 12.	నాజిల్‌లో గాలి బుడగల అడ్డంకులు ఉంటే రిలీజ్ వాల్వ్‌ను వదులు చేసి పిచికారి పంపు మోటారును ఆన్ చేసి గాలి బుడగలు పోయి నాజిల్ నుండి ద్రవం పిచికారి అయ్యేంతవరకు ఆగి తరువాత మోటారు పంపును ఆపివేయవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 13.	డ్రోన్ టేకాఫ్ మరియు ల్యాండింగ్ ప్రదేశాన్ని అడ్డంకుల లేకుండా తనిఖీ చేయండి.	అవును / కాదు.
కోడ్ 14.	డ్రోన్ ఎగిరే చోటు నుండి మరియు పిచికారి చేయు పొలం సరిహద్దుల నుండి రైతులు, వీక్షించువారు, పశువులు, ఇతర జీవులు కనీసం 20 మీ. దూరంలో ఉండాలని ఆదేశించుట మరియు అలా ఉన్నారని నిర్ధారించుకొనుట.	అవును / కాదు.

కోడ్ 15.	డ్రోన్ ఎగిరే చోటు నుండి మరియు పిచికారి చేయు పొలం సరిహద్దుల నుండి పైలట్ మరియు కో – పైలట్ 10 మీ. దూరంలో ఉండేలా నిర్ధారించుకొనుట.	అవును / కాదు.
కోడ్ 16.	పిచికారి చేయు పొలాన్ని మిషన్ ప్లానింగ్ యాప్ లో మ్యాపింగ్ చేయుట.	అవును / కాదు.
కోడ్ 17.	"యాటిట్యూడ్" మోడ్‌లో డ్రోన్‌ను "ఆర్మ్" చేయుట.	అవును / కాదు.
కోడ్ 18.	డ్రోనును ఎగుర వేసే ముందు మరియు అన్ని ముఖ్యమైన డ్రోన్ కదలికలను గురించి) పైలట్ అందరికీ వినపడేలా హెచ్చరికలు ఇవ్వవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 19.	పిచికారి చేసేటప్పుడు పిచికారి మిశ్రమం యొక్క శాతం ఇంకా డ్రోను ఎగిరే ఎత్తును గమనించుట.	అవును / కాదు.
కోడ్ 20.	పిచికారి పూర్తి అయిన తరువాత లేదా పిచికారి మిశ్రమం అయిపోయినప్పుడు డ్రోనును భద్రంగా నిర్దేశించుకున్న చోటులో దింపి నిలుపవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 21.	డ్రోనును నేల మీదకు దింపిన మోటార్లను ఆపేందుకు తరువాత "డిసార్మ్" చేయవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 22.	పిచికారి మిశ్రమాన్ని మరలా ట్యాంకులో నింపి డ్రోనులో పూర్తిగా రీచార్జి చేసిన బ్యాటరీలను అమర్చవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 23.	ఒక వేళ మిషన్ పూర్తి అవకపోతే హెచ్చరికలు ఇస్తూ మిషన్‌ను కొనసాగించవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 24.	పిచికారి పూర్తి అయిన తరువాత డ్రోనును, రిమోటును మరియు ఫోనును సాంకేతికంగా సంబంధాన్ని వేరు చేయవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ 25.	డ్రోనును శుభ్రపరుచుకొని భద్రపరచు స్థితిలోకి అమర్చి రవాణా వాహనంలోకి భద్రంగా ఎక్కించవలెను.	అవును / కాదు.
కోడ్ రెడ్	డ్రోను నేలపైన పడిపోవుట లేదా చెట్టుకు ఢీ కొనుట లేదా నియంత్రించలేని విధంగా డ్రోను ఎగురుతున్నప్పుడు	డ్రోనును నేల పైన నిలువరించవలెను.
కోడ్ ఆరెంజ్.	సాధారణ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డ్రోనును అత్యవసరంగా నేల మీద నిలుపవలెను.	అవును–నేలపై నిలువరించు/ కాదు–కొనసాగు.
కోడ్ బ్లూ	డ్రోను ఎగిరే సమయంలో శబ్దంలో మార్పు కలుగుట.	డ్రోనును నేల పైన నిలువరించవలెను.
కోడ్ పసుపు	రిమోటుకు మరియు డ్రోనుకు గల సాంకేతిక సంబంధాన్ని కోల్పోవుట.	అవును / కాదు.

పట్టిక 1 . 10 ప్రధాన పంటలపైన డ్రోన్‌తో పురుగు / తెగుళ్ళ మందుల పిచికారికి డ్రోన్ నిర్వహణకు ప్రామాణిక నిర్దేశకాలు :

సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
పంటలు	వరి	మొక్కజొన్న	జొన్న	చెఱకు	కంది	మినుము	శనగ	ప్రత్తి	మిరప	వేరుశనగ
1. డ్రోన్ ఎగిరే వేగం (మీ./సె.)										
చల్లే సమయంలో	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.0-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5	4.5-5.5
సాధారణీకరించిన వేగం (సగటున)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
టర్నింగ్ తిరిగే సమయంలో	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
టర్నింగ్ తిరిగే సమయంలో నాజిల్ ఆన్ /ఆఫ్	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)	OFF (ఆపవలెను)
2. పంటపై డ్రోన్ ఎగరవలసిన ఎత్తు	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.	0.6-1.0 మీ.
అన్ని దశలకు సాధారణీకరించబడిన డ్రోన్ ప్రయాణ ఎత్తు (పంటపై నుండి)	**మంచి పిచికారి నిక్షేపంగా జరగాలి అంటే, పంట మీద 1.0 మీ. లేదా 3 అడుగులు ఎత్తులో డ్రోన్ పిచికారి చేసుకోవాలి**									
3. సిఫారసు చేసిన పిచికారి ద్రావణ ఘన పరిమాణం లీ./హె.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
పంటలు	వరి	మొక్కజొన్న	జొన్న	చెఱకు	కంది	మినుము	శనగ	ప్రత్తి	మిరప	వేరుశనగ
4. నాజిల్స్										
పంటల పిచికారికి సిఫారసు చేసిన నాజిల్ రకం	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan	Flat fan
నాజిల్ వివరణ	110015 VP									
బిందు పరిమాణం పురుగు / తెగుళ్ళ / కలుపు మందులకు	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350	175 - 350
ఒక నాజిల్ ఉత్సర్గ రేటు (లీ./ నిమిషానికి)	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45	0.40 - 0.45
డ్రోన్ నాజిల్ పిచికారి ఫ్యాన్ కోణం	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120
డ్రోన్ ఒక మార్గం పిచికారి వెడల్పు, (మీ.)	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2	2.8 - 3.2
నాజిల్స్ సంఖ్య	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
డ్రోన్ నాజిల్స్ పీడనం, బార్	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
పంటలు	వరి	మొక్కజొన్న	జొన్న	చెఱకు	కంది	మినుము	శనగ	ప్రత్తి	మిరప	వేరుశనగ
నాజిల్స్‌ని మూలల్లో ఎలా ఉంచాలి	నాజిల్‌ను ఆపి వేసి, ములుపు తిరగగానే నాజిల్‌ను ప్రారంభించాలి									
నాజిల్స్‌ని డ్రోన్‌లో ఏవిధంగా అమర్చాలి	డ్రోన్ మోటర్ల క్రింది భాగంలో నాజిల్ రాడ్ ద్వారా నాజిల్‌ను అనుబంధించాలి									
నాజిల్స్‌ని ఎప్పుడెప్పుడు శుభ్రపరచాలి	• ప్రతి రోజు ఒకసారి టూత్ బ్రష్ యొక్క ప్లాస్టిక్ పళ్ళతో శుభ్రపరచాలి. • పొడి / కణికలు లాంటి నీటిలో కరిగే మందులను పిచికారి చేసినప్పుడు, ప్రతి పిచికారి తర్వాత టూత్ బ్రష్ ప్లాస్టిక్ యొక్క పళ్ళతో శుభ్రపరచాలి.									
నాజిల్ పిచికారి ఫ్యాన్ దిశ	డ్రోన్ ప్రయాణ దిశకి అడ్డంగా (లంబ కోన దిశలో)									
నాజిల్స్‌ను మార్చడానికి ప్రమాణం	ప్రతి 200 ఎకరాలు పిచికారి తర్వాత నాజిల్స్‌ను శుభ్రపరిచిన తర్వాత ఉత్సర్గ పరీక్ష జరిపి, వుత్సర్గం కనుక +/- 10% ఉంటే, నాజిల్స్‌ను మార్చుకోవాలి.									
5. డ్రోన్‌తో పిచికారికి అనువైన సమయ నిబంధనలు										
వర్షాకాలంలో :	8 am - 11 am & 2 pm - 6 pm (వర్షం లేని సమయంలో)									
చలికాలంలో :	8 am - 11 am & 2 pm - 6 pm (ఉష్ణోగ్రత విలోమ పరిస్థితులలో)									

సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
పంటలు	వరి	మొక్కజొన్న	జొన్న	చెఱకు	కంది	మినుము	శనగ	ప్రత్తి	మిరప	వేరుశనగ
ఎండా కాలంలో :	7 am - 11 am & 4 pm - 6 pm (ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు)									
పూత దశలో	పరాగ సంపర్కం సమయం చురుకుగా ఉన్నప్పుడు డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయరాదు									
6. వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులలో డ్రోన్‌తో ఎలా / ఎప్పుడు పిచికారి చేయాలి.										
ఉష్ణోగ్రత	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c	$<35^0$ c
వాతావరణంలో తేమ శాతం	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%	50-85%
గాలి వేగం	<2.8 m/s (<10 kmph) - క్షేమ రకం 2.8-5 m/s (10-18 kmph) జాగ్రత్తలతో డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయాలి									
వర్షం పడేటప్పుడు / ఆకులు తేమగా ఉన్నప్పుడు	డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయరాదు									
దృశ్యమానత	మంచు / పొగ మంచు వల్ల కానీ, ఇంకా ఏ ఇతర కారణాల వల్ల కానీ కంటికి కనిపించే దృశ్య రేఖ దృశ్యమానత <5 కి.మీ. కంటే తక్కువ ఉంటే, డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయరాదు									
డ్రోన్‌తో పిచికారికి డ్రోన్‌ను డ్రోన్ పైలట్ నుండి ప్రయాణింప చేయవలసిన గరిష్ట దూరం	200 మీ.									

సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
పంటలు	వరి	మొక్కజొన్న	జొన్న	చెఱకు	కంది	మినుము	శనగ	ప్రత్తి	మిరప	వేరుశనగ
ఎలాంటి ఉష్ణోగ్రతా పరిస్థితులను నివారించాలి	$<10^0$ c మరియు $>40^0$ c									
7. స్థల నిర్ధిష్ట పరిగణాలు										
సాదా మైదానం భూమి మీద డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయునప్పుడు	అడ్డంకులు (చెట్లు, కరెంటు స్తంభాలు, హై వోల్టేజ్ లైన్స్, కర్రలు, సిగ్నల్ రాడ్స్ తదితర) నుండి డ్రోన్‌ను తప్పించాలి									
వాలు తలం	వాలు తలంలో ఉన్న భూములలో డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయాలంటే, టెర్రాయిడ్ రాడార్‌ను తప్పనిసరిగా వాడాలి									
నలుచదరమైన పొలంలో	స్వయం ప్రతిపత్తి / సగం స్వయం ప్రతిపత్తితో డ్రోన్ ప్రయాణించే విధంగా డ్రోన్ పిచికారి చేసుకోవాలి									
నలుచదరం లేని పొలంలో డ్రోన్‌తో పిచికారి చేయాలి అంటే	మానవ చేతి సంజ్ఞల ద్వారానే డ్రోన్ ప్రయాణాన్ని నియంత్రించే విధంగా డ్రోన్ పిచికారి చేయాలి									

మరింత సమాచారం కొరకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

సీనియర్ శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.

సెల్ నెం : 97049 12463

చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ జోడింపు యంత్రాలు

రాగులు, కొర్రలు, అండు కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, వరిగలు మరియు ఆరికలను చిరుధాన్యాలుగా పరిగణిస్తారు. చిరుధాన్యాలకు భారతదేశం మరియు విదేశాలలో రోజురోజుకు గిరాకి పెరుగుతోంది. ప్రజలు ఆరోగ్య విషయములో ఉత్తమ మరియు నాణ్యమైన చిరుధాన్యాల కోసం వెతుకుతున్నారు. చిరుధాన్యాల పంటను కోసి, నూర్పిడి చేసిన తరువాత చూస్తే అందులో చిన్న చిన్న ఇసుక రేణువులు, చెత్త, మట్టి పెళ్ళలు ఉండును. పంటను శుద్ధి చేయటానికి మరియు వాటిని వండుకోవడానికి లేక ఆహార పదార్థాలను తయారు చేయడానికి అనువుగా మార్చడానికి కొన్ని యంత్రాలు అవసరమవుతాయి.

చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత :

చిరుధాన్యాల పొట్టు మానవులకు జీర్ణం కాదు కాబట్టి మానవ వినియోగానికి అనువుగా ఉండాలంటే పొట్టుతో కూడిన చిరుధాన్యాలను ప్రాసెసింగ్ చేయడం చాలా అవసరం. చిరుధాన్యాలను ప్రాసెసింగ్ చేయడమంటే శుభ్రపరచడం, గ్రేడింగ్ చేయడం, పైపొట్టును తొలగించడం, బియ్యం, నూకలు మరియు ఊకను వేరుచేయడం. చిరుధాన్యాల పరిమాణం చాల చిన్నవిగా ఉండటం వలన వాటిమీద ఉండే పొట్టును సాంప్రదాయక పద్ధతిలో తొలగించడం చాలా కష్టమైన పని. పల్లెలలో సాధారణంగా స్త్రీలు చిరుధాన్యాల గింజలను రోలులో వేసి రోకలితో దంచి బియ్యాని పొందుతారు. చిరుధాన్యాల గింజల పైపొట్టు (ఊక) లోపలవుండే బియ్యానికి గట్టిగ అతుక్కొని ఉండడం వలన ఈ పద్ధతిలో చిరుధాన్యాల పొట్టు తీయడం కష్టంతో కూడుకొన్నది. కావున యంత్రాలను వాడవలసి ఉంటుంది. చిరుధాన్యాల ప్రాసెస్ చేయటానికి కావలసిన యంత్రాలు మరియు వాటి పనితీరును క్రింద ఇవ్వబడినవి.

1. శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (ప్రి క్లీనర్) : ఇందులో రెండు రకాల జల్లెడలు మరియు ఏస్పిరేటర్ ఉండును. ఇది 2 హెచ్.పి., 1 హెచ్.పి. మోటార్ల ఆధారంగా పని చేస్తుంది. మోటర్లు పని చేసినపుడు జల్లెడలు ముందుకు వెనుకకు కదులుతూ, ఏస్పిరేటరు వేగముగా తిరుగుతూ దాదాపు 210-220 కిలోల ధాన్యాన్ని ఒక గంటలో శుభ్రపరచును (దుమ్ము, ధూళి, ఇసుక రేణువులు, మట్టి పెళ్ళలు, రాళ్లు, తాలు గింజలు, చెత్తను చిరుధాన్యాల నుండి వేరు చేయును). దీని ధర సుమారు రూ. 1,40,000/-.

2. పొట్టు తీయు యంత్రము : చిరుధాన్యాలపైన ఉండే పొట్టును తీసివేయుటకు రెండు రకాల యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నవి. అవి

(ఎ) చిరుధాన్యాల మిల్ (బి) చిరుధాన్యాల పొట్టు తీయు యంత్రము.

(ఎ) చిరుధాన్యాల మిల్ : ఈ యంత్రము ఒరిపిడి / రాపిడి ద్వారా గింజ నుండి పొట్టును వేరు చేయును. పొట్టును మరియు బియ్యపు మిశ్రమాన్ని సైక్లోన్ సెపరేటర్ అను భాగము వేరుచేయును. పనితనము గంటకు 50-60 కిలోలు. ఇది 1 హెచ్.పి మోటరుతో పనిచేయును. దీని ధర సుమారు రూ. 1,40,000/-.

(బి) చిరుధాన్యాల పొట్టు తీయు యంత్రము : ఈ యంత్రము మార్కెట్లో రెండు రకాలుగా దొరుకుచున్నది. అవి (1) సింగిల్ స్టేజ్ డిహల్లర్ (2) డబుల్ స్టేజ్ డిహల్లర్. ఈ యంత్రాలు సెంట్రిఫ్యూగల్ సిద్ధాంతము ద్వారా పనిచేసి గింజ నుండి పొట్టును వేరు చేయును. చిరుధాన్యాల పరిమాణము, తేమ శాతము, రకాలను బట్టి యంత్ర పనితీరు మారును. ఏస్పిరేటర్ బియ్యాన్ని మరియు పొట్టును వేరుగా విభజించును.

సింగిల్ స్టేజ్ డిహల్లర్ పనితనము గంటకు 60–70 కిలోలు. ఇది 3 హెచ్.పి. మోటరుతో పనిచేయును. దీని ధర సుమారు రు. 1,50,000/–. డబుల్ స్టేజి డిహల్లర్ పనితనము గంటకు 105–110 కిలోలు. ఇది 7.5 హెచ్.పి. మోటరుతో పనిచేయును. దీని ధర సుమారు రూ. 2,60,000/–. డబుల్ స్టేజి డిహల్లర్ లో 100 కిలోల కొర్రలను ఆడిస్తే 74 కిలోల బియ్యము మరియు 1.3 కిలోల నూక వచ్చును. 100 కిలోల సామలను ఆడిస్తే 60 కిలోల బియ్యము మరియు 3 కిలోల నూక వచ్చును. 100 కిలోల ఊదలను వేస్తే 52 కిలోల బియ్యము మరియ 4 కిలోల నూక వచ్చును. 100 కిలోల అండుకొర్రలను ఆడిస్తే 45 కిలోల బియ్యము మరియు 5 కిలోల నూక వచ్చును.

3. ధాన్యాలను మెత్తబరిచే / పాలిష్ చేసే యంత్రము : ఆరికలు, ఊదలు, వరిగలు మరియు అండుకొర్రల వంటి చిరుధాన్యాల పైపొర కొంత గట్టిగా ఉండటం వలన వాటిని ఈ యంత్రములో వేసి చిరుధాన్యాల పైపొట్టును మెత్తబరచవచ్చు. అలా మెత్తబడిన ధాన్యాలను డిహల్లర్లో వేసి పైపొట్టును వేరు చేయవచ్చును. ఒకవేళ అలా బియ్యము మీద ఉన్న తౌడును తీసివేయాలంటే ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చును. ఇది 3 హెచ్.పి. మోటరుతో పనిచేయును. దీని పనితనము గంటకు 40 కిలోలు. దీని ధర సుమారు రూ. 1,10,000/–.

4. శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (పోస్ట్ క్లీనర్) : ఇది బియ్యాన్ని, నూకను, పొట్టును వేరుచేస్తాయి. ఇందులో రెండు రకాల జల్లెడలు మరియు ఏస్పిరేటర్ ఉండును. ఇది పనిచేయడానికి 2 హెచ్.పి., 0.5 హెచ్.పి. మోటర్లు బిగించబడి ఉండును. మోటర్లు పనిచేసినపుడు జల్లెడలు ముందుకు వెనుకకు కదులుతూ, ఏస్పిరేటరు వేగముగ తిరుగుతూ బియ్యాన్ని, నూకను, పొట్టును వేరు చేయును. దీని పనితనము గంటకు 205–220 కిలోలు. దీని ధర దాదాపు రూ. 1,50,000/–.

పైన చెప్పిన యంత్రాలు బిగించుకోవడానికి కావలసిన విద్యుత్తు పరికరాలు, కాంక్రీట్ ఫౌండేషను ఖర్చు దాదాపు రూ. 50,000/– వరకు అవుతుంది. చిరుధాన్యాలను పండించిన రైతులు ఈ యంత్రాలను వాడి ప్రాసెసింగ్ చేసి విక్రయిస్తే వారి ఆదాయము ఇంకా పెరుగుతుంది. చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యంత్రాల వివరాలు మరియు వాటి పనితీరు వివరాలు క్రింది పట్టికలలో ఇవ్వడం జరిగింది.

పట్టిక 1. చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యంత్రాల వివరాలు

యంత్రం పేరు	మోటర్ శక్తి	మోటర్ వేగం	ఫేస్
శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (ప్రి క్లీనర్)	డిస్టోనర్ – 2 హెచ్.పి. గ్రేడర్ – 1 హెచ్.పి.	డిస్టోనర్ –1,420 ఆర్.పి.ఎమ్. గ్రేడర్ – 1,410 ఆర్.పి.ఎమ్.	3
డబుల్ స్టేజ్ డీహల్లర్	7.5 హెచ్.పి.	1,450 ఆర్.పి.ఎమ్.	3
ధాన్యాలను మెత్తబరిచే / పాలిష్ చేసే యంత్రము	3 హెచ్.పి	1,450 ఆర్.పి.ఎమ్.	3
శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (పోస్ట్ క్లీనర్)	డిస్టోనర్ – 2 హెచ్.పి. గ్రేడర్ – 0.5 హెచ్.పి.	డిస్టోనర్ – 1,380 ఆర్.పి.ఎమ్. గ్రేడర్ – 1,420 ఆర్.పి.ఎమ్.	3

పట్టిక 2. చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యంత్రాల పని తీరు

యంత్రం పేరు	చిరుధాన్యాల రకం	మిల్లింగ్ సామర్థ్యం (కి.గ్రా./గం.)	సామర్థత (%)
శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (ప్రి క్లీనర్)	కొర్రలు, అండు కొర్రలు	210–220	94–95
	సామలు, ఊదలు	210–215	95–96
డబుల్ స్టేజ్ డీహల్లర్	కొర్రలు, అండు కొర్రలు	104–108	99
	సామలు, ఊదలు	105–110	99
శుద్ధి మరియు గ్రేడింగ్ చేయు యంత్రము (పోస్ట్ క్లీనర్)	కొర్రలు, అండు కొర్రలు	210–220	94
	సామలు, ఊదలు	205–210	94

చిరుధాన్యాల విలువ జోడింపు యంత్రాలు :

1. వేయించు యంత్రము (రోస్టర్) : చిరుధాన్యాలలో ఉండే యాంటీ–న్యూట్రియంట్ కంటెంట్‌లను, చేదు గుణాలను తగ్గించడానికి మరియు పిండిలో ఉండే అధిక తేమను తగ్గించి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడానికి రోస్టర్ ఉపయోగపడును. ఇది గ్యాస్‌తో మరియు మోటరుతో పనిచేయును. దీని ధర దాదాపు రూ. 75,000–1,00,000/–. దీని సామర్థ్యం గంటకు 25–50 కిలోలు.

2. రవ్వ చేయు యంత్రము : ఇది చిరుధాన్యాల బియ్యాన్ని రవ్వకు అనువైన రేణువులుగా విభజించును. గ్రేడర్ యొక్క జల్లెడలను మార్చుకోవడం ద్వారా, వివిధ పరిమాణాల కణికలు లభించును. దీని ధర సుమారు రూ. 75,000– 1,50,000/–.

3. పల్వరైజర్ : ఈ యంత్రం చిరుధాన్యాల బియ్యాన్ని మెత్తని పొడిగా మార్చును. హెల్త్ మిక్స్ / ఫ్లేక్స్ తయారీకి అనువుగా పొడిని పొందవచ్చు. సింగిల్ స్టేజ్, డబుల్ స్టేజ్ మరియు మల్టీ మిల్ టైప్ పల్వరైజర్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధర సుమారు రూ. 2,50,000/-. దీని సామర్థ్యం గంటకు 75-100 కిలోలు.

4. పిండిని జల్లించే యంత్రము : పిండిని వివిధ గ్రేడ్‌లుగా (ముతక మరియు మెత్తగా) జల్లెడ పట్టడానికి ఈ యంత్రంలో వివిధ జల్లెడలు ఉండును. దీని ధర సుమారు రూ. 1,30,000/-. దీని సామర్థ్యం గంటకు 100-150 కిలోలు.

5. వివిధ రకాల పిండిని కలిపే యంత్రము : ఇది వివిధ చిరుధాన్యాల పిండిని అవసరమైన నిష్పత్తిలో బాగుగా కలుపును. దీని ధర సుమారు రూ. 1,30,000/-. దీని సామర్థ్యం గంటకు 50 కిలోలు.

ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

- ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌ను ప్రతిరోజూ, పని ప్రారంభించే ముందు మరియు పని పూర్తయిన తర్వాత కూడా శుభ్రం చేయాలి. అపరిశుభ్ర వాతావరణం పురుగుల పెరుగుదలను దోహదము చేస్తుంది కనుక, అక్కడి ఆహార ఉత్పత్తుల జీవిత కాలాన్ని తగ్గించును.
- ఒక వేళ యంత్రాలను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించకుండా ఉంటే, యంత్రాల మీద దుమ్ము పేరుకుపోకుండా ఉండటానికి వాటి మీద ప్లాస్టిక్ పట్టాలతో కప్పాలి.
- ప్రాసెసింగ్ పూరైన తర్వాత అన్ని సంచులను సరిగ్గా మూసి వేయాలి.
- యంత్రాలకు ఉపయోగిస్తున్న వివిధ బెల్ట్‌లు మరియు బేరింగ్‌లలో ఒక విడిభాగాన్ని కలిగి ఉండాలి.
- ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ నుండి ఆహార ఉత్పత్తులను త్వరగా బయటకు తరలించాలి. లేదంటే పురుగులు వాటి మీద దాడి చేసి వాటి నాణ్యతను తగ్గించును.
- ప్రాసెసింగ్ మెషిన్‌లతో పనిచేసేటప్పుడు చీరలు, పంచెలు మెషిన్ బెల్ట్‌లలో మరియు బ్లోయర్‌లలో చిక్కుకోకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- ప్రాసెసింగ్ సమయంలో ఉపయోగించే జల్లెడలు కొన్ని మార్లు మూసుకుపోతుంటాయి. కనుక వాటిని బ్రష్‌తో క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి.
- ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌లో ఎల్లప్పుడూ టూల్ కిట్ అందుబాటులో ఉంచాలి.

చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ మరియు విలువ జోడింపు యంత్రాల వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఎఫ్.పి.టి.), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

తిరుపతి - 517 502, ఫోన్ నెం : 94401 81098

వ్యవసాయంలో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగం

ప్రపంచ జనాభా పెరుగుదల మరియు జీవన శైలిలో మార్పు కారణంగా, సంప్రదాయ ఇంధన వనరులు అనూహ్యంగా తరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికి, మనకు అందుబాటులో ఉన్న బొగ్గు, ముడిచమురు, మరియు సహజవాయు నిల్వలు అతి త్వరలో హరించుకు పోనున్నాయి. ఇటువంటి తరుణములో, సంప్రదాయ ఇంధన వనరులకు ప్రత్యామ్నయముగా పునరుత్పాదక లేక ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల వినియోగం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యం సంతరించుకొన్నది. సూర్య కాంతి, పవన, భూఉష్ణ, జలము, జీవ వ్యర్థ పదార్థముల నుండి శక్తి మొదలగు వాటిని పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు అంటారు. ఈ పునరుత్పాదక ఇంధనములు పునరుత్పత్తి కలిగి ఎప్పటికి తరగని వనరులుగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వనరుల నుండి వచ్చే శక్తి ద్వారా వ్యవసాయమునకు సంబంధించిన వ్యవసాయ పనిముట్లు పనిచేయుటకు శక్తిని సరఫరా చేయవచ్చు. అలాగే గ్రీన్ హౌస్ డ్రయర్ ఉపయోగించి నాణ్యమైన ఆహార పదార్థములు మొదలగు వాటిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. శక్తి మూలము, దానిని ఏ ఏ ఇతర శక్తులుగా మార్చగలం, అలా సాంకేతికంగా మార్చిన శక్తి నుండి ఏ ఏ వ్యవసాయ మరియు ఆహార శుద్ధి పరికరాలు లభిస్తున్నాయి మొదలగు వాటిని దిగువ పట్టికలో పొందుపరిచాము.

సం.	శక్తి మూలము	ఏ ఏ ఇతర శక్తులుగా మార్చగలం	వ్యవసాయ మరియు ఆహార శుద్ధి పరికరాల లభ్యత
1.	సూర్యకాంతి నుండి శక్తి	• ఉష్ణ శక్తి • యాంత్రిక శక్తి • విద్యుత్ శక్తి	• నీరు తోడుటకు సోలార్ పంప్స్ • తడి పంటలు ఆరబెట్టుటకు, మసాల దినుసులు ఆరబెట్టుటకు, • రిఫ్రిజిరేషన్ ద్వారా ఐస్ క్రీములు తయారు, మొదలగు నవి.
2.	పవన శక్తి	• యాంత్రిక శక్తి • విద్యుత్ శక్తి	• నేరుగా గ్రైండర్, మిల్లులు, నీరు తోడుటకు పంపులు, • విద్యుత్ శక్తితో నడిచే నీరు తోడు పంపులు
3.	సూక్ష్మ జల శక్తి	• యాంత్రిక శక్తి • విద్యుత్ శక్తి	• నేరుగా గ్రైండర్, మిల్లులు • విద్యుత్ మోటారుతో ప్రాసెసింగ్
4.	జీవ వ్యర్థ పదార్థముల నుండి శక్తి	• ఉష్ణ శక్తి • విద్యుత్ శక్తి • ద్రవ ఇంధనములు • బయోగ్యాస్	• పండ్లు మరియు మసాల దినుసుల తడి ఆరబెట్టు యంత్రాలు • ఫెర్మెంటర్ • విద్యుత్ మరియు ఇథనాల్‌తో నడిచే మోటార్లు మరియు రవాణా వాహనాలు • ఎనోరిబిక్ డైజెస్టార్ నుండి వచ్చే బయోగ్యాస్ ద్వారా లైటింగ్, కుకింగ్ మరియు హీటింగ్
5.	మిశ్రమ శక్తులు	• సూర్య కాంతి నుండి శక్తి లేదా పవన శక్తితో కూడుకున్న సంప్రదాయ ఇంధన వనరుల జనరేటర్	

పైన తెలిపిన శక్తి మూలముల నుండి ఆవిర్భృతమై ముఖ్యముగా మార్కెట్ లో లభ్యమవుతున్న వ్యవసాయ మరియు ఫుడ్ ప్రాససింగ్ సంబంధిత పరికరముల వివరములు క్రింద పొందుపరిచాము.

సోలార్ వాటర్ పంపింగ్ సిస్టం : సోలార్ వాటర్ పంప్ సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్ ఫలకల ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్‌ను ఉపయోగించుకొని పని చేస్తుంది. సోలార్ వాటర్ పంప్ ద్వారా చెరువులు, నదులు, మరియు బోర్ బావుల నుండి నీటిని పంప్ చేయవచ్చును. సోలార్ వాటర్ పంప్ సిస్టం లో ఫోటో వోల్టాయిక్ ఫలకలు (సూర్య కాంతి నుండి విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుటకు), ఇన్వర్టర్ (డిసి ని ఎసి గా మార్చుటకు), మోటార్ మరియు పంప్ ముఖ్యముగా ఉంటాయి. బ్యాటరీని అవసరమునకు తగినట్లు ఏర్పాటు చేయవచ్చు. సోలార్ వాటర్ పంప్ టైప్, నీటి లోతు, దానికి కావలసిన పంప్ సామర్థ్యం, మరియు డిస్చార్జ్, లీటర్లు (సుమారుగా) వివరములు దిగువ పట్టికలో పొందుపరిచాము.

సం.	పంప్ టైప్	పంప్ సామర్థ్యం	హెడ్, మి. / అడుగులు	డిస్చార్జ్, లీటర్లు (సుమారుగా) ఒక దినములో
1.	డిసి సర్ఫేస్	1.0 హెచ్. పి	10 /33	70,000
2.	డిసి సర్ఫేస్	2.0 హెచ్. పి	15 / 50	150,000
3.	డిసి సర్ఫేస్	3.0 హెచ్. పి	21/ 70	110,000
4.	ఎసి/ డిసి సబ్-సర్ఫేస్	1.8 హెచ్. పి	30.3 / 100	50,000
5.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	2.0 హెచ్. పి	15 / 50	110,000
6.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	3.0 హెచ్. పి	33.3 /100	100,000
7.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	4.0 హెచ్. పి	45 /148	100,000
8.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	5.0 హెచ్. పి	60 /200	100,000
9.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	6.0 హెచ్. పి	75 / 250	70,000
10.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	7.5 హెచ్. పి	91 / 300	85,000
11.	ఎసి సబ్-సర్ఫేస్	10.0 హెచ్. పి	121 / 400	85,000

సోలార్ ఫిష్ డ్రయర్ : ఆహార పదార్థములను నిల్వ చెయుటకు అనేక పద్దతులను ఉపయోగిస్తారు. అన్ని పద్ధతులలో కన్నా ముఖ్యమైన పద్ధతి, ఆహార పదార్థములను ఎండ బెట్టి, తేమ శాతమును తగ్గించి నిల్వ చేయటము. ఆహార పదార్థములలో కోత అనంతరము మరియు మాంస పదార్థములలో మొదటగా తేమ శాతము ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తేమ శాతమును సురక్షితముగ నిల్వ చేయగల తేమ శాతమునకు తగ్గించి నిల్వ చేయవలెను. అధిక తేమ శాతం ఉన్న ఆహార పదార్థములను, సరైన ఉష్ణోగ్రత, తేమ శాతం కలిగిన గాలిని ప్రసరింప జేసి, పరిశుభ్రమైన వాతవరణములో ఎండ బెట్టుట చాల అవసరము.

ప్రస్తుతము చాలా రకముల చేపలు సముద్రము మరియు మంచి నీటి చేపల చెరువుల నుండి లభ్యమవుతున్నాయి. చేపలు చాల త్వరగా చెడిపోయే స్వభావము కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి, చేపలను తక్కువ

ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కానీ లేదా ఎండ బెట్టి కాని నిల్వ చేయగలము. ప్రస్తుతము తీర ప్రాంతములలో చేపలను ఆరు బయట ఎండ బెట్టి నిల్వ చేయడము మామూలుగా జరుగుచున్నది. ఈ పద్ధతి వలన నాణ్యతా పరముగాను మరియు పరిమాణము పరముగాను చాలా నష్టాలు వచ్చుచున్నవి. సాంప్రదాయ డ్రయర్లకు, ఉష్ణ శక్తిని విద్యుత్ లేదా వంట చెరుకు ద్వారా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతి చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది కావున, చాలా రకముల సోలార్ ఫిష్ డ్రయర్ లు అందుబాటులోకి వచ్చినవి. ఇందులో "క్యాబినెట్ డ్రయర్", "డైరెక్ట్ టైప్ సోలార్ డ్రయర్", "గ్రీన్ హౌస్ డ్రయర్", "సోలార్ టన్నెల్ డ్రయర్", "హైబ్రిడ్ సోలార్ డ్రయర్", మరియు "సోలార్ మొబైల్ డ్రయర్" లు ముఖ్యమైనవి. ఈ డ్రయర్ లు వివిధ కెపాసిటీలలో మార్కెట్‌లో లభిస్తున్నవి.

మల్టీపర్పస్ సోలార్ స్ప్రేయర్ : వ్యవసాయములో పురుగుమందులు, క్రిమి సంహార మరియు కలుపు మందుల పిచికారి తరుచుగా జరుగుచుండును. ఇందుకు గాను వేర్వేరు రకముల పిచికారి యంత్రములను ఉపయోగించెదరు. ఇప్పటి వరకు, ఈ యంత్రములు ద్రవ ఇంధనములు మరియు బ్యాటరి నుండి వచ్చు శక్తితో పని చేసే విధముగా ఆవిష్కృతములై లభించుచున్నవి. అలాగే, ఇప్పుడు సౌర శక్తితో పనిచేసే పిచికారీ యంత్రములు కూడా విరివిగా లభించుచున్నవి. ఈ పిచికారి యంత్రాలు ఫోటోవొల్టాఇక్ ఫలక మరియు బ్యాటరీలతో అమర్చబడి వేర్వేరు ట్యాంక్ కెపాసిటిలతో ఉన్నాయి. ఈ పిచికారి యంత్రములు వేర్వేరు సామర్థ్యములతో కలుపు మందుల పిచికారికి, మరియు క్రిమి సంహారక పిచికారికి సరిపోవు విధముగా లభ్యమవుతున్నాయి. అదే విధముగా ఒకటి కన్నా ఏక్కువ నాజిల్స్ అమర్చిన బూమ్ స్ప్రేయర్లు, ఎద్దులతో నడుపబడునవి, మరియు మనుషులు లాగుతూ పిచికారి చేయు విధముగా కూడ లభించుచున్నవి.

సోలార్ పవర్ జెనరేషన్ సిస్టం : వివిధ సాంప్రదాయ మరియు సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల నుండి విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి జరుగుచున్నది. ఇప్పటి వరకు బొగ్గు, జల, మరియు అణు ఇంధనముల నుండి ఎక్కువ శాతము విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుచున్నది. సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులు తరిగిపోవడం మరియు ఆ పద్ధతుల ద్వారా విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి వాయు కాలుష్య కారకము కావడము వలన, సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల నుండి విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి యొక్క ఆవశ్యకత పెరిగినది. ఇందుకు అనుకూలముగా, భారత ప్రభుత్వము 2030 సంవత్సరమునకు 40 శాతం విద్యుత్ ఉత్పత్తిని సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల నుండి చేయుటకు నిర్ణయము చేయడము జరిగినది. ఈ లక్ష్యమును చేరుకొనుటకు పవన విద్యుత్తును గాలిమరల ద్వారా మరియు సౌర విద్యుత్తును సోలార్ ఫలకల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయుటకు చిన్న, మధ్య, మరియు భారి తరహా ప్లాంట్లను దేశ మంతట స్థాపించి నిర్వహించడము జరుగుచున్నది. ముఖ్యముగా సౌర విద్యుత్తును రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. మొదటి పద్ధతిలో, సోలార్ కాన్సంట్రేటర్ లేదా రిఫ్లెక్టర్ ద్వారా సౌర కాంతిని నీటిపై ఫోకస్ చేసి, ఆవిరిని ఉత్పత్తి చేసి, ఆవిరి ద్వారా టర్బైనును తిప్పి, జెనరేటరు ద్వార ఉత్పత్తి. రెండవ పద్ధతిలో, సోలార్ ఫొటొవోల్టాఇక్ సెల్ నేరుగా ఫోటాన్ శక్తిని విద్యుత్ శక్తి గా మారుస్తుంది. ఈ విధములుగా ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్ శక్తిని వివిధ పొలము కార్యక్రమములకు ఎటువంటి సరఫరా నష్టాలు లేకుండా ఉపయోగించవచ్చును.

సోలార్ రెఫ్రిజిరేషన్ సిస్టం : ఆహార పదార్థములు, పండ్లు, మరియు కూరగాయలు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలలో దీర్ఘకాలం పాటు నిల్వచేయవచ్చును. పండ్లు మరియు కూరగాయలు మొక్కనుండి వేరుచేసిన వెంటనే రసాయనాల వలన, సూక్ష్మ క్రిములు, మరియు స్వతహాగ ఉన్న ఎంజైముల వలన పాడవడం మొదలవుతుంది. ఈ చర్యలు

అన్నీ అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద చాలా ఎక్కువగాను మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద చాల నెమ్మదిగాను జరుగుతాయి. అదేవిధముగా పండ్లు మరియు కూరగాయలు పొలములో కోసిన వెంటనే అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉండును. ఇటువంటి పరిస్థితులలో సాధ్యమైనంత త్వరగా పండ్లు మరియు కూరగాయలను తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్దకు తీసుకు రావడము మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద నిల్వచేయడము ఎంతో అవసరము. కావున ఇందుకు కాను రైతు క్షేత్రములలో రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థ ఎంతో అవసరం. కాని రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థ పనిచేసెందుకు చాలా విద్యుత్ అవసరం ఉంటుంది. మరియు క్షేత్ర స్థాయిలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థ ఉండకపోవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్తితులలో సౌరశక్తితో పనిచేసే సోలార్ రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థ అనేది ఒక క్రొంగొత్త సదవకాశము. ఈ రెఫ్రిజిరేసన్ వ్యవస్థ పండ్లు మరియు కూరగాయల నుండి నిరంతరాయంగా ఉద్భవించే వేడిని మరియు అవి నిల్వ చేసిన పరిసరముల నుండి నిరంతరాయముగా వేడిని బయటికి పంపించి, నిల్వ చేసిన పదార్థములను త్వరగా పాడవకుండా కాపాడుతుంది. ఈ రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థలో సోలార్ ఫోటోవొల్టాయిక్ ఫలకలు, కంప్రెస్సర్, మోటార్, నిల్వ చేసె గది, బ్యాటరీలు, ఛార్జర్, మరియు కంట్రోలర్ ఉంటాయి. ముఖ్యముగా, సోలార్ రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థలో ఇన్సులేషన్ మామూలు వ్యవస్థలకన్నా అధికంగా ఉండాలి. నిల్వ గది కొలతలు, నిల్వ గది నుండి చల్లదనం బయటికి పోకుండా కావలసిన ఇన్సులేషన్, కంప్రెస్సర్ సైజు మరియు దానిని సమర్థవంతముగా నడుపుటకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవలసిన సోలార్ ఫలకల యొక్క ఎన్నిక చాల ముఖ్యమైనది. ఈ విధముగా నిర్మించుకున్న సోలార్ రెఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థ, పండ్లు మరియు కూరగాయలను నిల్వ చేసుకొనుటకే కాకుండా , ఏవైన త్వరగా చెడిపోగల వస్తువులను కూడ నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది.

బాక్స్ టైప్ సోలార్‌కుక్కర్ : సోలార్‌కుక్కర్లో సహజంగా లభించే సౌరశక్తిని వినియోగించికొని ఎటువంటి గ్యాస్, కిరోసిన్, విద్యుత్ ఖర్చు లేకుండా ఆహార పదార్థములను ఉడికించవచ్చు. సోలార్ కుక్కర్లు వేరు వేరు సైజులలో లబ్యమవుచున్నాయి. చిన్న సైజు కుక్కర్‌తో 5 మందికి మరియు పెద్ద సైజు కుక్కర్‌తో 10 నుండి 15 మందికి ఆహార పదార్థములను ఉడికించి తయారు చేయవచ్చును. ఎండ యొక్క తీవ్రతను బట్టి సోలార్ కుక్కర్లో ఉష్ణోగ్రతలు 150 నుండి 200 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల వరకు నమోదు అవుతుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అన్నము ఉడికించుటకు దాదాపుగా 45 నిమిషముల నుండి 1 గంట కాలం పడుతుంది. అదే విధముగా కంది పప్పు ఉడికించుటకు, దాదాపుగా 1 నుండి 2 గంటల సమయం పడుతుంది.ఇవే కాకుండ, ఇతర పదార్థములు, ఇడ్లీ, కేక్, బిస్కెట్లు, మాంసము, మొదలగునవి ఉడికించవచ్చు. ఒకటికన్నా ఎక్కువ వంటలు ఒకేసారి వేరు వేరు అల్యూమినియం బాక్సులలో ఉంచి తయారు చేయవచ్చు.

పైన తెలుపబడిన వివిధ సోలార్ పరికరముల తో పాటు విండ్ మరియు బయో గ్యాస్ ద్వారా నడిచే పరికరములు మరియు యంత్రాలు ఎన్నో ఇప్పుడు ఆవిష్కృతమై మార్కెట్ లో లభ్యమవుతున్నాయి. పూర్తి వివరములకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా.

వ్యవసాయంలో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగం వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

అసోసియేట్ డీన్, డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఆర్.ఇ.ఇ.), బాపట్ల – 522 101. ఫోన్ నెం : 99896 25205

హైడ్రోపోనిక్స్ విధానంలో పంటల సాగు

హైడ్రోపోనిక్స్ అనగా "నీటి పని" అని అర్థం. సాధారణ భాషలో చెప్పాలంటే, మట్టి లేకుండా నీటిలో మరియు పోషక ద్రావణంలో మొక్కలను పెంచే ఒక ఆధునిక సాగు పద్ధతి. ఈ పద్ధతి వ్యవసాయ రంగంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగం మరియు భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఆహార ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. హైడ్రోపోనిక్స్ భవిష్యత్తులో ఆహార ఉత్పత్తిలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న జనాభాకు ఆహారం అందించడానికి, నీటి కొరతను ఎదుర్కోవడానికి మరియు పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి హైడ్రోపోనిక్స్ ఒక ముఖ్యమైన పరిష్కారంగా ఉంటుంది.

హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలకు అవసరమైన ఖచ్చితమైన పోషకాలను అందించడం వలన, అవి ఆరోగ్యంగా, బలంగా మరియు ఉత్పాదకంగా ఉంటాయి. హైడ్రోపోనిక్స్‌లో పోషకాలు నేరుగా మొక్కల వేర్ల వద్ద అందించబడతాయి. మొక్కలు తమకు అవసరమైన పోషకాలను మాత్రమే గ్రహిస్తాయి. పోషక ద్రావణం నిరంతరం పునర్వినియోగించబడుతుంది, కాబట్టి మొక్కలకు ఎల్లప్పుడూ పోషకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అందువలన మొక్కలు పోషకాలను సులభంగా గ్రహించగలవు కాబట్టి, అవి వేగంగా పెరుగుతాయి. మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మరియు ఎక్కువ దిగుబడిని ఇస్తాయి. హైడ్రోపోనిక్స్ వ్యవస్థలలో నీటి స్థాయిని ఖచ్చితంగా నియంత్రించవచ్చు, కాబట్టి మొక్కలకు ఎప్పుడూ నీటి కొరత ఉండదు.

హైడ్రోపోనిక్స్‌లో పండించే పంటల ప్రయోజనాలు : (1) హైడ్రోపోనిక్స్ మొక్కలకు నేరుగా పోషకాలను అందిస్తుంది, ఇది వేగవంతమైన పెరుగుదల మరియు అధిక దిగుబడికి దారి తీస్తుంది. **(2)** నియంత్రిత వాతావరణం సంవత్సరం పొడవునా పంటలను పెంచడానికి అనుమతిస్తుంది. **(3)** నియంత్రిత వాతావరణం పురుగులు, వ్యాధులు మరియు కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది, ఫలితంగా అధిక నాణ్యత గల పంటలు వస్తాయి. **(4)** హైడ్రోపోనిక్స్ వ్యవస్థలలో పురుగులు మరియు తెగుళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి పురుగు మరియు తెగుళ్ళ మందుల అవసరం తక్కువగా ఉంటుంది. **(5)** హైడ్రోపోనిక్స్ మొక్కలకు సరైన పోషకాలను అందించడం ద్వారా పోషక విలువలు మరియు రుచిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. **(6)** హైడ్రోపోనిక్స్ నీటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుంది, సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతుల కంటే చాలా తక్కువ నీటిని ఉపయోగిస్తుంది. **(7)** నియంత్రిత వాతావరణం ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించడంలో సహాయ పడుతుంది, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. హైడ్రోపోనిక్స్ సాంప్రదాయిక వ్యవసాయంతో పోలిస్తే పర్యావరణానికి చాలా మంచిది. **(8)** ఒక చిన్న హైడ్రోపోనిక్ గార్డెన్ దాదాపు ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. హైడ్రోపోనిక్స్‌ను చిన్న ప్రదేశాలలో కూడా సాగు చేయవచ్చు, టెర్రస్‌లు మరియు ఇళ్ల లోపల కూడా. **(9)** ఇంటి లోపల లేదా గ్రీన్‌హౌస్‌లో పెంచుతున్నట్లయితే, హైడ్రోపోనిక్ మొక్కలను ఏడాది పొడవునా పెంచుకోవచ్చు.

హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థల రకాలు :

మొక్కలకు నీటిని అందించే విధానం ఆధారంగా అనేక రకాల హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అత్యంత **సాధారణ రకాల హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థలు :**

న్యూట్రియంట్ ఫిల్మ్ టెక్నిక్ : ఈ వ్యవస్థలో, పోషక ద్రావణం పలుచని పొరలో మొక్కల వేర్లపై ప్రవహిస్తుంది. ఇది మొక్కల వేర్లకు ఆక్సిజన్ మరియు పోషకాలను అందిస్తుంది. న్యూట్రియంట్ ఫిల్మ్ టెక్నిక్ పద్ధతి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థ. ఈ పద్ధతిలో, మొక్కలను ఉంచే ఛానెల్‌ల ద్వారా పోషక ద్రావణం నిరంతరం పంపింపబడుతుంది. పోషక ద్రావణం ఛానెల్ ముగింపుకు చేరుకున్నప్పుడు, అవి వ్యవస్థ యొక్క ప్రారంభానికి తిరిగి పంపబడతాయి.

డీప్ వాటర్ కల్చర్ : ఈ వ్యవస్థ హైడ్రోపోనిక్స్‌లో ఒక పద్ధతి, ఇక్కడ మొక్కల వేర్ల మూలాలు నేరుగా పోషకాలు మరియు ఆక్సిజన్ అధికంగా ఉండే నీటిలో మునిగి ఉంటాయి. ఈ పద్ధతిలో గాలి పంపు, ఎయిర్ స్టోన్ ద్వారా వేర్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయబడుతుంది. దీని ద్వారా వేగవంతమైన పెరుగుదల మరియు ఆరోగ్యకరమైన మొక్కలకు మద్దతు ఇచ్చే వాతావరణం సృష్టించబడుతుంది. టమోటాలు, దోస, కీరా దోస మరియు కాప్సికమ్ వంటి పెద్ద మొక్కలకు ఈ పద్ధతి అనువైనది మరియు అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

ఎబ్ అండ్ ఫ్లో : ఫ్లడ్ మరియు డ్రెయిన్ అని కూడా పిలువబడే ఎబ్ మరియు ఫ్లో సిస్టమ్ అనేది హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కల వేరు మూలాలు ఉండే ట్రేలో నిర్దిష్ట క్రమములో పోషకాలు అధికంగా ఉండే నీటిని నింపి రిజర్వాయర్‌కు తిరిగి పంపుతుంది. ఈ వ్యవస్థలో పోషకాలు మరియు ఆక్సిజన్ వేరుకు అందచేస్తుంది. బలమైన పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు వేరుకుళ్ళు తెగులును తగ్గిస్తుంది. మూలికల నుండి పెద్ద కూరగాయల వరకు విస్తృత శ్రేణి మొక్కలకు ఇది అనుకూలం.

ఏరోపోనిక్ వ్యవస్థ : ఈ వ్యవస్థలో, మొక్కల వేర్లు గాలిలో వేలాడుతాయి. పోషక ద్రావణం మంచులో పిచికారి చేయబడుతుంది లేదా వేర్లపై పొగమంచుగా అందించబడుతుంది. ఇది మొక్కల వేర్లకు ఆక్సిజన్ మరియు పోషకాలను అందిస్తుంది.

డ్రిప్ పద్ధతి : ఈ పద్ధతిలో పోషక ద్రావణం నెమ్మదిగా మరియు స్థిరంగా మొక్కల వేర్లకు చిన్న రంధ్రాల ద్వారా అందించబడుతుంది. డ్రిప్ పద్ధతి హైడ్రోపోనిక్స్‌లో రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి : **బయటి డ్రిప్ :** ఈ వ్యవస్థలో పోషక ద్రావణం మొక్కలు పెరుగుతున్న మాధ్యమం యొక్క ఉపరితలంపై చిన్న రంధ్రాల ద్వారా అందించబడుతుంది. **లోపలి డ్రిప్ :** ఈ వ్యవస్థలో పోషక ద్రావణం మొక్కలు పెరుగుతున్న మాధ్యమం లోపల చిన్న రంధ్రాల ద్వారా అందించబడుతుంది.

విక్ కల్చర్ : విక్ కల్చర్ ఒక రకమైన హైడ్రోపోనిక్స్. విక్ వ్యవస్థ అనేది హైడ్రోపోనిక్ పెరుగుతున్న ఏర్పాటును సూచిస్తుంది, ఇది విక్ అని పిలువబడే మృదువైన ఫాబ్రిక్ స్ట్రింగ్ ఉపయోగించుకుంటుంది. విక్ వ్యవస్థలో, ఒక పత్తి లేదా నైలాన్ విక్ ద్రావణం నుండి నీటిని మరియు పోషకాలను గ్రహించడంలో మరియు తరువాత కంటైనర్లు లేదా ట్రేలలో ఉన్న మొక్కలకు సరఫరా చేయడంలో సహాయ పడుతుంది.

హైడ్రోపోనిక్స్ వ్యవసాయంలో అనుకూలమైన పంటలు : వాస్తవంగా ఏదైనా మొక్క హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థలో పెరుగుతుంది, అయితే కొన్ని మొక్కలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలను ఎంచుకునేటప్పుడు, మీ వాతావరణం, మీ అనుభవ స్థాయి మరియు మీరు పెంచాలనుకుంటున్న మొక్కల రకాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి వేగంగా పెరిగే మొక్కలు ఈ పద్ధతికి బాగా సరిపోతాయి. హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలకు చిన్న వేర్లు వ్యవస్థ ఉంటుంది, కాబట్టి చిన్న వేర్లు వ్యవస్థ ఉన్న మొక్కలు ఈ పద్ధతికి బాగా సరిపోతాయి.

ఆకుకూరలు : లెట్యూస్, పాల కూర, తోట కూర, బచ్చలికూర, ఖేల్, స్విస్ చార్డ్, క్యాబేజీ, పాలకూర, సెలెరీ, కొత్తిమీర, పుదీనా మొదలైనవి.

కూరగాయల మొక్కలు : టమోటాలు, వంకాయ, బెండకాయలు, దోసకాయలు, బఠానీలు మొదలైనవి.

మూల మొక్కలు : బంగాళదుంపలు, చిలగడదుంపలు, క్యారెట్లు, ముల్లంగి, పసుపు, అల్లం మొదలైనవి.

పండ్లు : ద్రాక్ష, రాస్ప్‌బెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, చిన్న బొప్పాయి, మిరియాలు, పుచ్చకాయలు, బ్లూ బెర్రీలు మొదలైనవి.

మూలికలు : బాసిల్, తులసి, పార్స్లీ, ఒరెగానో, రోజ్మేరీ, చివ్స్, స్వీట్ మార్జోరామ్, వాటర్‌క్రెస్, మెంతులు మొదలైనవి.

చాలా మంది వాణిజ్య హైడ్రోపోనిక్ సాగుదారులు హైడ్రోపోనిక్ సాంకేతికతను నియంత్రిత వాతావరణంతో కలిపి ఉపయోగించడం ద్వారా అత్యధిక నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను సాధించారు. ఈ కలయిక అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

హైడ్రోపోనిక్ గ్రోయింగ్ మీడియంలు : సాంప్రదాయ తోటలో, మొక్కల మూలాలు మట్టిలో ఉంటాయి. మట్టి మొక్క నిలబడడానికి మద్దతు ఇస్తుంది మరియు మొక్కల మూలాలు ఆహారం మరియు నీటికోసం మట్టిలో వెతుకుతాయి. హైడ్రోపోనిక్స్‌లో, మట్టికి బదులుగా మొక్కలకు మద్దతు మరియు స్థిరత్వం అందించడానికి వివిధ రకాల మాధ్యమాలు ఉపయోగించబడతాయి. ఈ మాధ్యమాలు గాలి మరియు నీటిని సులభంగా ప్రసరించేలా ఉండాలి, అలాగే మొక్కలకు కొంత మద్దతును అందించాలి. వీటిలో వర్మిక్యులైట్, రంపపు దుమ్ము, ఇసుక, పీట్ నాచు. రాక్‌వూల్, పెర్లైట్ మరియు విస్తరించిన మట్టి గులకరాళ్ళు ఉన్నాయి.

విస్తరించిన మట్టి గులకరాళ్ళు : ఇవి కాల్చిన మట్టితో తయారు చేయబడతాయి, చాలా తేలికపాటి, రంధ్రాలు కలిగి ఉంటాయి.

రాక్‌వుల్ : ఇది ఒక రకమైన ఖనిజం, ఇది సులభంగా నీటిని మరియు గాలిని పీల్చుకుంటుంది మరియు విడుదల చేస్తుంది. ఇది ప్రారంభ దశలో మొలకలలకు బాగా సరిపోతుంది.

వర్మిక్యులైట్ : ఇది ఒక ఖనిజ లోహం, ఇది సూక్ష్మరంధ్రాలు కలిగి ఉంటుంది, నీటిని బాగా నిలుపుకుంటుంది.

రంపపు దుమ్ము : ఇది ఒక సహజ ఖనిజ పదార్థం, ఇది చాలా రంధ్రాలు కలిగి ఉంటుంది, మంచి నీటి పారుదలను అందిస్తుంది.

పెర్లైట్ : ఇది ఒక ఖనిజ లోహం, ఇది నీటిని నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

పీట్ నాచు : ఇది ఒక సేంద్రీయ పదార్థం, ఇది చాలా తేలికగా అనగా బరువు తక్కువగా ఉంటుంది మరియు నీటిని నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలను పెంచేటప్పుడు పరిగణించవలసిన అంశాలు

• మొక్కలకు అవసరమైన నీటి పరిమాణం • పెరుగుతున్న మాధ్యమం యొక్క సరైన పారుదల • మొక్క కోసం వాంఛనీయ ఉష్ణోగ్రత మరియు కాంతి • తాజా గాలి • ఆశ్రయం మరియు మద్దతు • పురుగులు మరియు తెగుళ్ళ నియంత్రణ • మొక్కకు అవసరమైన నీటిలో కరిగే ఖనిజాలు • పోషక ద్రావణం యొక్క సరైన ఉదజని సూచిక (పి. హెచ్.)

నీరు : హైడ్రోపోనిక్ గార్డెన్‌లో వీలైనంత స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. కలుషితమైన నీరు మొక్కలకు హాని కలిగించవచ్చు లేదా చంపవచ్చు. నీటిలో ఉప్పు మొక్కల మూలాల నుండి నీటిని గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయి.

ఉష్ణోగ్రత మరియు కాంతి : ఆదర్శ ఉష్ణోగ్రత మీరు ఎంచుకునే పంటలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టమోటాలు, దోసకాయలు, పాలకూర, బీన్స్ మరియు బఠానీలు వంటి చాలా సాధారణ తోట పంటలు సగటు పగటి ఉష్ణోగ్రత 78^0 F మరియు సగటు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 64^0 F. శీతాకాలపు కూరగాయలు, క్యాబేజీ, బేసల్ మొలకలు మరియు బ్రోకలీ వంటివి బాగా పండుతాయి. ఈ పంటలన్నీ వెచ్చని వాతావరణంలో వృద్ధి చెందుతాయి మరియు చల్లని ఉష్ణోగ్రతలకు గురైతే అవి ఒత్తిడికి గురవుతాయి లేదా చనిపోతాయి. శీతాకాలపు కూరగాయలు, క్యాబేజీ, బేసిల్ మొలకలు మరియు బ్రోకలీ వంటివి, కొద్దిగా చల్లని ఉష్ణోగ్రతలలో పెంచవచ్చు. ఈ పంటలకు సగటు పగటి ఉష్ణోగ్రత 65^0 F మరియు సగటు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 55^0 F అవసరం. చల్లని ఉష్ణోగ్రతలు ఈ పంటల రుచి మరియు ఆకృతిని మెరుగుపరుస్తాయి. హైడ్రోపోనిక్ వ్యవస్థ కోసం ఉష్ణోగ్రతను ఎంచుకునేటప్పుడు, మీరు ఎంచుకున్న పంటల నిర్దిష్ట అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా లేదా చాలా తక్కువగా ఉంటే, మొక్కలు బాగా పెరగవు

తాజా గాలి : మొక్కల చుట్టూ తగినంత గాలి ప్రసరణ అవసరం, అలాగే రూట్ జోన్‌లో సరైన గాలిని అందించడం అవసరం. వాతావరణంలో గాలి మరియు వెలుతురు కావలసినంత లేకపోతే మొక్కలకు బూజు మరియు తెగులు కలుగుతుంది.

ఆశ్రయం మరియు మద్దతు : వాణిజ్య అనువర్తనంలో, చాలా మంది హైడ్రోపోనిక్ రైతులు తమ పంటలను నియంత్రిత పర్యావరణ గ్రీన్‌హౌస్‌లో పండిస్తారు. ఇది ఆశ్రయాన్ని మాత్రమే కాకుండా, మొక్కకు ఆదర్శవంతమైన, ఒత్తిడి లేని వాతావరణాన్ని కూడా అందిస్తుంది. అనేక హైడ్రోపోనిక్ గార్డెన్‌లు చాలా చిన్నవిగా మరియు చాలా శుభ్రంగా ఉన్నందున, వాటిని ఇండోర్‌లో, డాబా లేదా కిటికీలో ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు,

తెగులు మరియు వ్యాధి నియంత్రణ : హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మట్టి లేనందున, మట్టి ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్ళు ఉండవు. అయితే, కొన్ని తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధులు ఇప్పటికీ హైడ్రోపోనిక్ మొక్కలను ప్రభావితం చేస్తాయి. పోషకాల లోపం మొక్కల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అధిక పోషకాలు మొక్కలకు విషపూరితం కావచ్చు. వైరస్లు మొక్కల కణాలను దెబ్బతీస్తాయి మరియు వాటి పెరుగుదలను ఆపివేస్తాయి. హైడ్రోపోనిక్ గార్డెన్ నుండి చనిపోయిన లేదా చనిపోతున్న ఆకు పదార్థాలను మరియు ఏవైనా అనారోగ్యకరమైన మొక్కలను ఎల్లప్పుడూ తొలగించండి.

సరైన ఉదజని సూచిక (పి.హెచ్.) :

వివిధ ఉద్యానవన పంటల కోసం లక్ష్య ఉదజని సూచిక (పి.హెచ్.) పరిధులు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి

- బీన్స్ 5.8–6.2
- దోసకాయ 5.7–6.2
- పాలకూర 5.7–6.2
- బఠానీలు 6.3–6.5
- ముల్లంగి 5.8–6.2
- టమోటా 5.8–6.0
- క్యాబేజీ 6.3–6.5
- వంకాయ 5.7–5.9
- పుచ్చకాయ 5.4–5.6
- మిరియాలు 5.8–6.2
- స్ట్రాబెర్రీ 5.8–6.2

హైడ్రోపోనిక్ పోషక మిశ్రమాలు : హైడ్రోపోనిక్స్‌లో మొక్కలు మట్టిలో పెరగడానికి బదులుగా పోషక ద్రావణంలో పెరుగుతాయి. ఈ ద్రావణం నీటితో తయారు చేయబడింది, ఇందులో మొక్కలకు అవసరమైన అన్ని ఖనిజాలు కరిగి ఉంటాయి.

హైడ్రోపోనిక్ పోషక మిశ్రమాలను రెండు విధాలుగా తయారు చేయవచ్చు :

ప్రీ–మిక్స్‌డ్ ఫార్ములాను ఉపయోగించుట : అనేక నమ్మదగిన ప్రీ–మిక్స్ హైడ్రోపోనిక్ సూత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మీ సొంత పోషక మిశ్రమాన్ని రూపొందించుట :

మీరు మీ స్వంత పోషక మిశ్రమాన్ని రూపొందించాలనుకుంటే, మీరు ఈ క్రింది దశలను అనుసరించాలి :

1. పోషకాలను జాగ్రత్తగా తూకం వేయండి లేదా కొలవండి.
2. నిష్పత్తులు సరిగ్గా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రత్యేక పైల్స్ లేదా కంటైనర్లలో పోషకాలను ఉంచండి.
3. ఏ భాగాలు విడిచిపెట్టబడలేదని లేదా రెండు సార్లు కొలవబడలేదని నిర్ధారించుకోండి.
4. ఖచ్చితత్వం 5% లోపల ఉండాలి.
5. నిష్పత్తులు సరిగ్గా ఉన్నాయని మీరు నిర్ధారించుకున్నప్పుడు, మిక్సింగ్ కంటైనర్లలోని నీటిలో మీ పోషకాలను పోసి గట్టిగా కదిలించండి. పోషకాలు గోరు వెచ్చని నీటిలో బాగా కరిగిపోతాయి.

6. పోషక సాంద్రత స్థాయిని కొలవండి మరియు దానిని రికార్డ్ చేయండి. ఇ.సి.(విద్యుత్ వాహకత) లేదా టి.డి.ఎస్. (మొత్తం కరిగిన ఘన పదార్థాలు) మీటర్‌తో మీ పోషక ద్రావణం ఎంత బలంగా లేదా బలహీనంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి దాన్ని కొలవవచ్చు.

హైడ్రోపోనిక్ పోషక మిశ్రమాలను రూపొందించేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు :

- మీరు ఎంచుకున్న పోషక మిశ్రమం మీరు పెంచుతున్న మొక్కల రకానికి అనుకూలంగా ఉండాలి.
- పోషకాల సాంద్రత స్థాయి మొక్కల పెరుగుదల దశకు అనుగుణంగా ఉండాలి.
- పోషక ద్రావణం పి. హెచ్. స్థాయి సరైన పరిధిలో ఉండాలి.
- పోషక ద్రావణాన్ని క్రమం తప్పకుండా పునరుద్ధరించండి.

పట్టిక 5.2 ఇ.సి. స్థాయిల కోసం కొన్ని సాధారణ మార్గదర్శకాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి

	పండ్ల మొక్కలు (టమోటా, దోసకాయ వంటివి)	ఆకులతో కూడిన మొక్కలు (పాలకూర, తులసి వంటివి)
ప్రారంభ వృద్ధి (మొలక దశ)	1600 –1800 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1120 –1260 పి.పి.యం.	1400–1600 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 980 –1120 పి.పి.యం.
సగటు ఇ.సి.	2500 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1750 పి.పి.యం.	1800 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1260 పి.పి.యం.
ఫలించే సమయంలో	2400 –2600 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1680 –1820 పి.పి.యం.	---
తక్కువ కాంతి పరిస్థితులు (శీతాకాలం)	2800 –3000 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 2000 పి.పి.యం.	2000 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1320 పి.పి.యం.
అధిక కాంతి పరిస్థితులు (వేసవి)	2200 –2400 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1700 పి.పి.యం.	1600 మిల్లీ.మోస్./సెం.మీ. 1120 పి.పి.యం.

హైడ్రోపోనిక్స్ విధానంలో పంటల సాగు వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

శాస్త్రవేత్త (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), O/o డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ,

పరిపాలనా భవనం, లాం, గుంటూరు మరియు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ (అగ్రి ఇంజనీరింగ్), డా॥ ఎన్.టి.ఆర్.

వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, బాపట్ల, ఫోన్ నెం : 98483 90891, 95338 77666

వివిధ సాగు పరిస్థితులలో వైవిధ్యమైన పంటల ఎంపిక

సగటు వర్షపాతము, నేలల స్వభావం మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఆరు వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలుగా విభజించారు. వివిధసాగు పరిస్థితులలో, ప్రతి వ్యవసాయ వాతావరణ మండలంలో గల ప్రతి జిల్లాకు అనుకూలమైన పంటల వివరాలు క్రింది పట్టికలో పొందుపరచబడినవి.

క్ర. సంఖ్య	వ్యవసాయ వాతావరణ మండలం, జిల్లా	ముఖ్యమైన సాగు పరిస్థితి	ప్రధాన పంటలు	అనుకూలమైన మరికొన్ని పంటలు
I	**ఉత్తరకోస్తా మండలం**	కాలువల క్రింద ఎర్ర నేలలు / ఎర్ర గరప నేలలు	వరి, చెఱకు	రాగి, మొక్కజొన్న,కంది, వరి–మినుము/పెసర/ నువ్వులు / జనుము / వేరుశనగ / రాగి
	1. శ్రీకాకుళం జిల్లా	చెరువుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	వేరుశనగ, నువ్వులు, అపరాలు, మొక్కజొన్న, వరి, రాగి/జనుము, మొక్కజొన్న–ఉలవలు
		వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	మొక్కజొన్న, ప్రత్తి	గోగు, అపరాలు, కంది ప్రత్తి, వేరుశనగ, నువ్వులు
	2. విజయనగరం జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర గరప నేలలు	వేరుశనగ మొక్కజొన్న, ప్రత్తి	నువ్వులు, గోగు, వరి–పెసర, కంది, కొర్ర, సజ్జ, రాగి–ఉలవ, మొక్కజొన్న–అపరాలు
		చెరువుల క్రింద ఎర్ర గరప నేలలు	వరి	మొక్కజొన్న,వరి–పెసర/ మినుము / జనుము / రాగి, మొక్కజొన్న, వరి–అపరాలు–నువ్వులు
		కాలువల క్రింద ఎర్ర గరప నేలలు	వరి, చెఱకు, మొక్కజొన్న	వేరుశనగ, ప్రత్తి, మొక్కజొన్న, వరి–పెసర, మినుము / జనుము / రాగి
	3. విశాఖపట్నం జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, రాగి	సజ్జ, చిరుధాన్యాలు, నువ్వులు కంది, పెసర, మొక్కజొన్న – అపరాలు, సజ్జ+కంది /చెఱకు + అపరాలు, వర్షాధార వరి, చెఱకు
		బావుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, చెఱకు, మొక్కజొన్న	మొక్కజొన్న, రాగి, అపరాలు, వేరుశనగ, వరి–మొక్కజొన్న–నువ్వులు, వేరుశనగ–ఉలవ
		చెరువుల క్రింద ఎర్రనేలలు	వరి, రాగి, మొక్కజొన్న	వేరుశనగ, నువ్వులు, అపరాలు, వరి–నువ్వులు+కట్టె జనుము
	4. అనకాపల్లి జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	చెఱకు, రాగి	సజ్జ, చిరుధాన్యాలు, నువ్వులు కంది, పెసర, మొక్కజొన్న – అపరాలు, సజ్జ+కంది /చెఱకు + అపరాలు, వర్షాధార వరి

		బావుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, చెఱకు	మొక్కజొన్న, రాగి, అపరాలు, వేరుశనగ, నువ్వులు
		చెరువుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, చెఱకు	రాగి, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, నువ్వులు, పెసర–వరి–నువ్వులు
		కాలువల క్రింద ఒండ్రు మరియు నల్ల నేలలు	వరి, చెఱకు	వరి–మినుము / పెసర /రాగి /నువ్వులు /మొక్కజొన్న/ప్రొద్దుతిరుగుడు / జనుము/ వేరుశనగ, చెఱకు+అపరాలు
II	**గోదావరి మండలం**			
	1. తూర్పు గోదావరి జిల్లా	గోదావరి డెల్టా మధ్య ప్రాంతం	వరి	చెఱకు, వరి – మినుము /పెసర, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న
		బోర్ల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	మొక్కజొన్న, నువ్వులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు, పొగాకు, ప్రత్తి
		చెరువుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	వరి, అపరాలు, నువ్వులు, వేరుశనగ, పొగాకు, మొక్కజొన్న
		వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	మినుము	నువ్వులు, కంది, చిరుధాన్యాలు, మొక్కజొన్న
		గోదావరి డెల్టా	వరి	వరి–అపరాలు, పచ్చిరొట్ట పంటలు, మొక్కజొన్న
	2. కాకినాడ జిల్లా	గోదావరి డెల్టా ప్రాంతం	వరి–వరి వరి–చెఱకు	వరి–మొక్కజొన్న–అపరాలు
		కాలువల క్రింద నల్ల ఒండ్రు నేలలు	వరి–వరి వరి–చెఱకు	వరి–మొక్కజొన్న–కూరగాయలు
		బోర్లు క్రింద నల్ల నేలలు	వరి–వరి వరి–అపరాలు/ కూరగాయలు	ప్రత్తి–అపరాలు, చెఱకు, వరి–మొక్కజొన్న
		చెరువుల క్రింద ఎర్ర బంకుమన్ను నేలలు	వరి– వరి/అపరాలు	వరి–మొక్కజొన్న/నువ్వులు/అపరాలు, కూరగాయలు
		వర్షాధార ఎర్ర బంకమన్ను నేలలు	వరి–వరి/ అపరాలు/ నువ్వులు	వరి, మొక్కజొన్న, కూరగాయలు

	3.డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా	గోదావరి డెల్టా చివరి ప్రాంతాలు–డెల్టా నల్లరేగడి బంక నేలలు	వరి	వరి – వరి – అపరాలు
		గోదావరి డెల్టా చివరి ప్రాంతాలు–ఉప్పుతో కూడిన చౌడు నేలలు	వరి	వరి – వరి – అపరాలు
		గోదావరి డెల్టా ఎగువ మరియు మధ్య ప్రాంతం – డెల్టా నల్ల రేగడి నేలలు	వరి	వరి – వరి – అపరాలు
		బోర్ల క్రింద సాగు చేయు లంక భూములు – నల్లరేగడి నేలలు	మొక్కజొన్న, అపరాలు, కూరగాయలు	ఖాళీ అపరాలు/కూరగాయలు, మొక్కజొన్న – అపరాలు – కూరగాయలు
	4. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా	కాలువల క్రింద ఒండ్రు నేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి	వరి–వరి, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, ఆవాలు, నువ్వులు, రాగులు, అపరాలు
		కాలువల క్రింద తేలికపాటి నల్ల నేలలు	వరి	వరి, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, ఆవాలు, అపరాలు, నువ్వులు, రాగులు
		ఎత్తిపోతల నీటిపారుదల క్రింద ఎర్రనేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి	వరి–అపరాలు, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న, నువ్వులు
	5. ఏలూరు జిల్లా	కాలువల క్రింద ఒండ్రు నేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి	వరి–వరి, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, ఆవాలు, అపరాలు, నువ్వులు, రాగులు
		కాలువల క్రింద తేలికపాటి నల్ల నేలలు	వరి	వరి–పచ్చిరొట్ట ఎరువులు
		ఎత్తిపోతల నీటిపారుదల క్రింద ఎర్రనేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి	వరి–అపరాలు, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న, నువ్వులు

III	**కృష్ణా మండలం**	కాలువల క్రింద నల్లనేలలు, ఒండ్రు నేలలు	వరి–వరి, వరి, అపరాలు, వరి–మొక్కజొన్న	వరి–వరి–పశుగ్రాస పంటలు / అపరాలు, వచ్చిరొట్ట పంటలు, వరి–జొన్న
	1. గుంటూరు జిల్లా	కాలువల క్రింద తేలికపాటి నేలలు	వరి	మిర్చి, వరి–అపరాలు / వేసవి నువ్వులు
		వర్షాధార నల్ల నేలలు మరియు ఎర్ర నేలలు	ప్రత్తి, మిర్చి, కంది, శనగ, పెసర, పొగాకు, మినుము	మొక్కజొన్న / అపరాలు, ధనియాలు, ఆవాలు, పశుగ్రాస పంటలు, పసుపు, కొర్ర–శనగ (నల్ల నేలలు), మిర్చి, వరి–శనగ
	2. బాపట్ల జిల్లా	కాలువల క్రింద నల్లనేలలు, ఒండ్రు నేలలు	వరి–వరి, వరి, అపరాలు, వరి–మొక్కజొన్న	వరి–వరి–పశుగ్రాస పంటలు / అపరాలు, వచ్చిరొట్ట పంటలు, వరి–జొన్న
		కాలువల క్రింద తేలికపాటి నేలలు	వరి	ప్రత్తి, మిర్చి, పసుపు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, వరి–అపరాలు / వేసవి నువ్వులు
		వర్షాధార నల్ల నేలలు మరియు ఎర్ర నేలలు	ప్రత్తి, మిర్చి, కంది, శనగ, పెసర, పొగాకు, మినుము	వరి–మొక్కజొన్న / అపరాలు, ధనియాలు, కుసుమ, ఆవాలు, పశుగ్రాస పంటలు, పసుపు, కొర్ర–శనగ (నల్ల నేలలు), ప్రొద్దుతిరుగుడు, మిర్చి, వరి–శనగ
	3. పల్నాడు జిల్లా	కాలువల క్రింద నల్లనేలలు, ఒండ్రు నేలలు	వరి–వరి, వరి, అపరాలు, వరి–మొక్కజొన్న	వరి–వరి–పశుగ్రాస పంటలు / అపరాలు, వచ్చిరొట్ట పంటలు, వరి–జొన్న
		కాలువల క్రింద తేలికపాటి నేలలు	వరి	ప్రత్తి, మిర్చి, పసుపు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, వరి–అపరాలు / వేసవి నువ్వులు
		వర్షాధార నల్ల నేలలు మరియు ఎర్ర నేలలు	ప్రత్తి, మిర్చి, కంది, శనగ, పెసర, పొగాకు, మినుము	వరి–మొక్కజొన్న / అపరాలు, ధనియాలు, కుసుమ, ఆవాలు, పశుగ్రాస పంటలు, పసుపు, కొర్ర–శనగ (నల్ల నేలలు), ప్రొద్దుతిరుగుడు, మిర్చి, వరి–శనగ

	4. కృష్ణా జిల్లా	కాలువల క్రింద తూర్పు ప్రాంత ఒండ్రు ఎర్ర నేలలు	ప్రత్తి	వేరుశనగ, కంది, మినుము, పెసర
		కాలువల క్రింద తూర్పు ప్రాంత నల్ల నేలలు	వరి, చెఱకు	మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జ, మినుము, పెసర, ప్రత్తి, రాగి
	5. ఎన్.టి.ఆర్. జిల్లా	కాలువల క్రింద నల్లనేలలు	వరి	వరి-వరి, ప్రత్తి, మిర్చి, మొక్కజొన్న, శనగ
		కాలువల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, కంది, మినుము, మొక్కజొన్న	ప్రత్తి-మొక్కజొన్న, ప్రత్తి-మినుము
		వర్షాధార నల్ల నేలలు	మినుము, పెసర, మొక్కజొన్న, శనగ, కంది	మినుము - శనగ, మినుము - మొక్కజొన్న
		వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	మినుము, పెసర, మొక్కజొన్న, చెఱకు, పసుపు	మొక్కజొన్న - శనగ, మినుము, పెసర, నువ్వులు, జొన్న
		కాలువల క్రింద ఒండ్రు నేలలు	వరి	వరి-వరి, వరి-మొక్కజొన్న, పచ్చిరొట్ట పంటలు, వేరుశనగ
	6. ప్రకాశం జిల్లా	నీటి పారుదల క్రింద బరువు నేలలు	వరి, మిరప, మొక్కజొన్న	వరి-నువ్వులు, వరి-మొక్కజొన్న/ అపరాలు, ప్రొద్దుతిరుగుడు, పసుపు, పశుగ్రాస పంటలు, వరి-మొక్కజొన్న
		నీటిపారుదల క్రింద తేలిక నేలలు	వరి, ప్రత్తి, మిరప, మినుము, కంది	వరి-నువ్వులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, వరి-అపరాలు
		వర్షాధార బరువు నేలలు	శనగ, ప్రత్తి, కంది, పొగాకు, ఆముదం	మినుము, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న, ఆముదం, కంది, ఆముదం + కంది, కొర్ర - శనగ, కుసుమ, ఆవాలు, ధనియాలు, వరి-శనగ
		వర్షాధార తేలికపాటి నేలలు	కంది, జొన్న, పెసర, నువ్వులు	సజ్జ, కంది + సజ్జ, ఆముదం, పెసర, నువ్వులు, వేరుశనగ + కంది, వేరుశనగ-పెనర, అలనంద, చిరుధాన్యాలు

IV	దక్షిణ మండలం			
	1. తిరుపతి జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ	సజ్జ, జొన్న, గడ్డి జొన్న, కంది, ఉలవ, అలసంద, కొర్ర, నువ్వులు, పెసర, రాగి, మినుము
		బావుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, సజ్జ, నువ్వులు, మొక్కజొన్న, పెసర, రాగి, మినుము
		చెరువులు, కాలువల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, రాగి, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు
	2. చిత్తూరు జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ	సజ్జ, జొన్న, గడ్డి జొన్న, కంది, ఉలవ, అలసంద, కొర్ర, నువ్వులు, పెసర, రాగి, మినుము
		బావుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, సజ్జ, వేరుశనగ, నువ్వులు, మొక్కజొన్న, పెసర, రాగి, మినుము
		చెరువులు, కాలువల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, రాగి, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు
	3. అన్నమయ్య జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ	ఉలవ, కంది, మొక్కజొన్న, ఆముదం
		బావుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, నేపియర్ గడ్డి, పశుగ్రాస జొన్న
		చెరువులు, కాలువల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి	చెఱకు, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు
	4. ఎస్.పి.ఎస్.ఆర్. నెల్లూరు జిల్లా	నీటి పారుదల క్రింద బరువు నేలలు, ఒండ్రు ఇసుక నేలలు	వరి వేరుశనగ	చెఱకు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, పెసర, మినుము
		వర్షాధారపు నల్ల నేలలు	మినుము, ప్రత్తి, శనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు	మొక్కజొన్న, పొగాకు, కంది
		వర్షాధారపు ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, నువ్వులు	పెసర, కంది, చిరుధాన్యాలు, సజ్జ, ఉలవ, అలసంద

	5. వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా	వర్షాధార నల్ల నేలలు	శనగ, ప్రత్తి, ప్రొద్దుతిరుగుడు	జొన్న, మినుము, కొర్ర, ధనియాలు, కంది, కుసుమ
		వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, కంది	ఆముదం, చిరుధాన్యాలు, పెసర, సజ్జ, అనప, అలసంద,
		కాలువలు, బావులు, చెఱువుల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, వేరుశనగ	ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, మినుము, నువ్వులు, వేరుశనగ, సజ్జ, జొన్న, పసుపు, పశుగ్రాస పంటలు
		కాలువలు, బావుల క్రింద నల్ల నేలలు	వరి	మొక్కజొన్న, ప్రత్తి, మినుము, శనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, జొన్న, నువ్వులు, పశుగ్రాస పంటలు
V	**అత్యల్ప వర్షపాత మండలం**	వర్షాధార నల్ల నేలలు	ప్రత్తి, శనగ, జొన్న, ఆముదం	మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, పొగాకు, ధనియాలు, వేరుశనగ, మినుము, కంది, ఆముదం, కుసుమ, వాము
	1. నంద్యాల జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, కంది, ప్రత్తి, ఆముదం, టమోట	వేరుశనగ+కంది, ఆముదం+కంది, ప్రొద్దుతిరుగుడు, జొన్న, సజ్జ, సజ్జ+కంది, చిరుధాన్యాలు, కొర్రలు
		నీటి పారుదల క్రింద నల్ల నేలలు	వరి, వరి-వరి, మొక్కజొన్న	వరి - వేరుశనగ / ఆవాలు / ప్రొద్దు తిరుగుడు, మినుము, ప్రత్తి, మిర్చి, పసుపు, ఉల్లి, మొక్కజొన్న
		నీటి పారుదల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, మొక్కజొన్న	వరి - వేరుశనగ / పెసర / ప్రొద్దు తిరుగుడు, మిర్చి, ఉల్లి, మొక్కజొన్న
	2. కర్నూలు జిల్లా	వర్షాధార నల్ల నేలలు	ప్రత్తి, శనగ, ఆముదం, జొన్న	మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, పొగాకు, ధనియాలు, వేరుశనగ, మినుము, కంది, ఆముదం, కుసుమ, వాము
		వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, కంది, ప్రత్తి, టమాట	వేరుశనగ+కంది, ఆముదం+కంది, ప్రొద్దుతిరుగుడు, జొన్న, సజ్జ, సజ్జ+కంది, చిరుధాన్యాలు, కొర్రలు

		నీటి పారుదల క్రింద నల్ల నేలలు	వరి, వరి–వరి, మొక్కజొన్న	వరి–వేరుశనగ/ఆవాలు/మినుము, ప్రొద్దుతిరుగుడు, ప్రత్తి, మిర్చి, పసుపు, ఉల్లి, మొక్కజొన్న
		నీటి పారుదల క్రింద ఎర్ర నేలలు	వరి, మొక్కజొన్న	వరి–వేరుశనగ/పెసర/ప్రొద్దుతిరుగుడు, మిర్చి, ఉల్లి, మొక్కజొన్న
	3. అనంతపురం జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, వేరుశనగ+కంది, కంది, ఆముదం	ఆముదం, కంది+ఆముదం, కంది+సజ్జ, సజ్జ, చిరుధాన్యాలు, కొర్ర+కంది, పెసర
		వర్షాధార నల్ల నేలలు	కంది, ఆముదం, ప్రత్తి, శనగ	జొన్న, మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, ధనియాలు, మినుము, కుసుమ, కొర్ర–శనగ, ప్రత్తి, పెసర
		నీటి పారుదల క్రింద ఎర్ర నేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న	వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, పెసర, మినుము, ఉల్లి, ప్రత్తి, మిర్చి, ఆవాలు
	4. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వేరుశనగ, వేరుశనగ+కంది, కంది, ఆముదం	ఆముదం, కంది+ఆముదం, కంది+సజ్జ, సజ్జ, చిరుధాన్యాలు, కొర్ర+కంది, పెసర, మొక్కజొన్న
		వర్షాధార నల్ల నేలలు	కంది, ఆముదం, ప్రత్తి, శనగ	జొన్న, మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, ధనియాలు, మినుము, కుసుమ, కొర్ర–శనగ, ప్రత్తి, పెసర, మొక్కజొన్న
		నీటిపారుదల క్రింద ఎర్ర నేలలు మరియు నల్ల నేలలు	వరి, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న	వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, పెసర, మొక్కజొన్న, మినుము, ఉల్లి, ప్రత్తి, మిర్చి, ఆవాలు
VI	**మిక్కిలి ఎత్తైన గిరిజన మండలం**	వర్షాధార ఎర్ర నేలలు	వరి, రాగి, కూరగాయలు	సజ్జ, చిరుధాన్యాలు, కంది, మొక్కజొన్న, వలిశెలు, రాజ్మా చిక్కుడు, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న+కంది, వేరుశనగ+లైమా చిక్కుడు, మొక్కజొన్న–వలిశెలు, రాగి–వలిశెలు /రాజ్మా చిక్కుడు, వేరుశనగ–వలిశెలు /రాజ్ మా చిక్కుడు
	1. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా			
	2. మన్యం పార్వతీపురం జిల్లా	కాలువల క్రింద ఎర్ర గరప నేలలు	వరి, చెఱకు, మొక్కజొన్న	వేరుశనగ, ప్రత్తి, మొక్కజొన్న, వరి–పెసర, మినుము /జనుము / రాగి, పసుపు, కంద, ఆయిల్ పామ్

		చెరువుల క్రింద ఎర్ర గరప నేలలు	వరి, చెఱకు	జొన్న, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, వరి – పెసర / మినుము / జనుము / రాగి / నువ్వులు
		వర్షాధార ఎర్ర గరప నేలలు	మొక్కజొన్న, ప్రత్తి, కంది	నువ్వులు, గోగు, వేరుశనగ, కొర్ర, సజ్జ, రాగి–ఉలవ, మొక్కజొన్న–అపరాలు
		గిరిజన వర్షాధార కొండవాలు ఎర్ర గరప నేలలు	మెట్ట వరి, ప్రత్తి	కంది, రాగి, సామలు, సజ్జ, కొర్రలు, మిశ్రమ సేద్యం, బొబ్బర్లు లేదా అలసంద

వివిధ సాగు పరిస్థితులలో వైవిధ్యమైన పంటల ఎంపికపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

అసోసియేట్ డీన్ & యూనివర్శిటి హెడ్ (సేద్య శాస్త్రం), వ్యవసాయ కళాశాల, నైరా – 532 185

శ్రీకాకుళం జిల్లా, సెల్ నెం. 77320 80474

రబీలో వరి కన్నా మెరుగైన ఆరుతడి పంటలు

రబీలో బావుల క్రింద, చెరువుల క్రింద, తేలిక భూముల్లో సైతం వరి సాగు చేయబడుతోంది. రబీ కాలంలో నీటి వనరులు సరిగ్గాలేకపోవటం, విద్యుత్ కొరత ఎక్కువగా ఉండటంవల్ల ఈ వనరుల క్రింద వరిసాగు లాభదాయకం కాదు. ఈ క్రింది పట్టికలో రబీ కాలంలో వివిధ పంటలకు కావలసిన నీటి పరిమాణం, ఒక ఎకరం వరికి వినియోగించే నీటితో సాగు చేయగలిగే ఆరుతడి పైర్ల విస్తీర్ణం మరియు నీరు పెట్టుటకు ఖర్చయ్యే విద్యుచ్ఛక్తి యూనిట్ల వివరాలు చూపబడ్డాయి.

పంట	అవసరమైన సాగు నీటి పరిమాణం (మి.మీ.)	విద్యుచ్ఛక్తి యూనిట్లు	ఎకరా వరికి ఇచ్చే నీటితో సాగు చేయగల ఆరుతడి పంటల విస్తీర్ణం (ఎకరాలలో)
ధాన్యపు పంటలు			
1. వరి	1200	900	–
2. మొక్కజొన్న	600	450	2.0
3. గోధుమ	400	300	3.0
4. జొన్న	500	375	2.4
5. సజ్జ	300	225	4.0
6. రాగులు	400	187	3.0
7. కొర్ర	150	112	8.0
నూనె గింజల పంటలు			
1. వేరుశనగ	500	375	2.4
2. నువ్వులు	300	225	4.0
3. ఆవాలు	400	300	3.0
4. ప్రొద్దుతిరుగుడు	400	300	3.0
5. సోయా చిక్కుడు	400	300	3.0
6. ఆముదము	300	187	4.0
7. కుసుమలు	200	150	6.0
పప్పు ధాన్యాల పంటలు			
1. కంది	300	225	4.0
2. అలసందలు	300	225	4.0
3. పెసలు	150	112	8.0
4. మినుములు	200	112	6.0
5. శనగలు	200	112	6.0
6. కట్టె జనుము (విత్తనం కొరకు)	200	112	6.0
కూరగాయ పంటలు			
1. వంగ	600	450	2.0
2. బెండ	600	450	2.0
3. ఉల్లి	600	450	2.0
4. టమాటో	800	600	1.5
5. పచ్చిమిర్చి (కూర మిర్చి)	800	600	1.5

రబీ కాలంలో వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటల సాగు వలన ప్రయోజనాలు

- అధిక విస్తీర్ణంలో పంటలను సాగు చేసి ఎక్కువ లాభాన్ని పొందవచ్చును.
- వరి కన్నా ఆరుతడి పంటల సాగుకు అవసరమైన నీరు, విద్యుచ్ఛక్తి మరియు పెట్టుబడులు తక్కువ.
- వరి సాగుబడికి కావలసిన నీటితో కనీసం 2 నుండి 8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయవచ్చు.
- పంట మార్పిడి వలన పంటల నాశించే పురుగులు, తెగుళ్ళు తగ్గుతాయి.
- నిత్యావసరాలైన పప్పులు, నూనె గింజలు మరియు కూరగాయల కొరత తగ్గుతుంది.
- పప్పు ధాన్యపు పంటలతో పంట మార్పిడి చేయటం వలన భూసారం వృద్ధి అవుతుంది.
- ఖర్చుని తగ్గించుకోవడానికి దుక్కి దున్న కుండా, కాలాన్ని వృధా చేయకుండా "జిరోటిల్లేజ్" పద్ధతిలో ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయడం ద్వారా లాభాలను పెంచుకోవచ్చు.

వరి కోసిన తర్వాత ఆరుతడి పైర్లు సాగు పద్ధతులు

రిలే పంట : 1) కోస్తా ప్రాంతాల్లో వరి కోయడానికి వారం రోజుల ముందు నుంచి బురద పదునులో మినుము మరియు పెసర లాంటి పప్పుజాతి పైర్ల విత్తనాలను విత్తనశుద్ధి చేసి (కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. మాంకోజెబ్/ కార్బండెజిమ్ వంటి తెగుళ్ళ మందులతో మరియు 5 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 5 గ్రా. ధయోమిథాక్సామ్ కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసినట్లయితే సుమారు 15-20 రోజుల వరకు తెగుళ్ళు మరియు రసం పీల్చే పురుగుల బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చు) పొలమంతా సమానంగా వెదజల్లుతారు. విత్తేముందు రైజోబియం కల్చరు (20 గ్రా. కిలో విత్తనానికి)తో విత్తనశుద్ధి చేయాలి. పల్లాకు తెగులును తట్టుకునే మినుము రకాలు ఎల్.బి.జి.-787, ఎల్.బి.జి. 884, టి.బి.జి.-104, జి.బి.జి.-1 వంటి రకాలను, పెసరలో డబ్ల్యు.జి.జి.-42, ఐ.పి.ఎమ్. 2-14, ఎల్.జి.జి. 574 వంటి రకాలను వరి మాగాణులలో వేసుకోవాలి.

విత్తన మోతాదు : పెసర 10 నుండి 12 కిలోలు ఎకరానికి, మినుము 16-18 కిలోలు ఎకరానికి.

కలుపు నివారణ : వెడల్పాకు గడ్డి జాతి కలుపు ఉన్నప్పుడు 200 మి.లీ. ఇమాజితాఫిర్ 5% 200 లీ. నీటిలో కలిపి పంట 20-25 రోజులప్పుడు పొలంలో తేమ ఉన్నప్పుడు 2-4 ఆకుల దశలో పిచికారి చేయాలి. ఊద మరియు గడ్డిజాతి కలుపు మొక్కల నివారణకు ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9% ద్రావకం ఎకరాకు 250 మి.లీ. లేదా క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% ద్రావకం ఎకరానికి 400 మి.లీ./200 లీ॥ నీటితో కలిపి విత్తిన 15-20 రోజులకు పిచికారి చేయాలి. ఉత్తర కోస్తాలో కనిపించే 'రంగం మినుము' అనే కలుపు మరియు ఇతర కలుపు నివారణకు విత్తిన 25-30 రోజుల మధ్య సోడియం ఎసిప్లోరిఫిన్ + క్లోడినాఫాప్ ప్రోపార్జిల్ కలుపు మందును లీటరు నీటికి 1.5-2.0 మి.లీ. చొప్పున పిచికారి చేసుకోవాలి. బంగారు తీగ నిర్మూలనకు వరి పనలను తీసిన వెంటనే ఎకరాకు 1.5 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% మందును 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి సమానంగా చల్లాలి.

మినుము పంటకు నీటి లభ్యతను బట్టి విత్తిన 30 రోజులకు మరియు 50 రోజులకు తేలికపాటి తడులివ్వాలి.

సస్యరక్షణ : పెసర, మినుము పైర్లను ఆశించే మారుకా మచ్చల పురుగు నివారణకు మొగ్గ, పూత దశలో వేప నూనె 5 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి లేదా 5 శాతం వేప గింజల కషాయం పిచికారి చేయాలి. పంటలో గూళ్ళు గమనిస్తే ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ 2 మి.లీ. లేదా క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. లేదా థయోడికార్బ్ 1.0 గ్రా. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే రైనాక్సీఫిర్ లేదా స్పైనోసాడ్ 0.3 మి.లీ. లేదా ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.4 గ్రా. లేదా ఫ్లూబెండమైడ్ 0.2 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి. పల్లాకును వ్యాప్తి చేసే తెల్లదోమ నివారణకు ఎసిఫేట్ 1 గ్రా. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. పల్లాకు తెగులును వ్యాప్తి చేసే తెల్ల దోమ నివారణకు ట్రైజోఫాస్ 1.5 మి.లీ. లేదా ఎసిటామిప్రిడ్ 0.2 గ్రా. లేదా థయోమిథాక్సామ్ 0.2 గ్రా. ఎదో ఒక దానిని లీటరు నీటికి కలిపి తెల్ల దోమ ఉధృతిని బట్టి మందును మార్చి మార్చి పిచికారి చేయాలి. బూడిద తెగులు నివారణకు కార్బండెజిమ్ లేదా థయోఫానేట్ మిథైల్ 1 గ్రా. లేదా కెరాథేన్ 1 మి.లీ. లేదా హెక్సాకొనజోల్ 2 మి.లీ. లేదా మైక్లోబుటానిల్ 1 గ్రా. లేదా డైఫెన్‌కొనజోల్ 1 మి.లీ. లేదా ప్రొపికొనజోల్ 1 మి.లీ. చొప్పున లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

2) రాయలసీమ జిల్లాల్లో నల్లరేగడి నేలల్లో వరి కోసే 10 రోజులకు ముందు ఆవాలు మరియు నువ్వులు విత్తనాలను పొలంలో రిలే పంటగా విత్తుతారు.

విత్తన మోతాదు : 1) ఆవాలు : 1–1.5 కిలోలు / ఎకరానికి; 2) నువ్వులు : 1.5–2 కిలోలు / ఎకరానికి

విత్తే పద్ధతి : విత్తనాలను 5–6 కిలోల సన్నని ఇసుకలో కలిపి పొలమంతా సమానంగా వెదజల్లుతారు. ఆ సమయంలో ఉండే బురద పదునులో విత్తనాలు వారంలో మొలకెత్తుతాయి. వరి కోసిన పిమ్మట బాగా పెరుగుతాయి. అయితే నువ్వుల విత్తనాలను 1.5 కిలోల బియ్యపు నూకలతో కలిపి చల్లుకుంటే పొలమంతా సమానంగా వెదజల్లబడతాయి కనుక ఈ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

జీరో టిల్లేజి సాగు పద్ధతి : వరి కోత యంత్రాన్ని ఉపయోగించి వరి పైరును కోసిన తరువాత దుక్కి చేయకుండ విత్తే పద్ధతిని జీరో టిల్లేజి సాగు పద్ధతి అంటారు.

సాగు చేయదగిన పంటలు : మొక్కజొన్న, రాగి, జొన్న.

వరికోసిన తరువాత వరి దుబ్బులు మళ్ళీ చిగురించకుండా చేయడానికి పారాక్వాట్ అనే కలుపు మందు 1.0 లీటరు 200 లీ।। నీటిలో కలిపి (పారాక్వాట్ మందు 5 మి.లీ./ లీ.) ఎకరానికి దుబ్బులు బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

విత్తు సమయం : వరి కోసిన తర్వాత తగినంత తేమ ఉన్నట్లయితే నేరుగా విత్తుకొని తర్వాత కలుపు మందు 1–3 రోజుల లోపల పిచికారి చేసుకోవచ్చు లేదా ముందుగానే కలుపు మందు పిచికారి చేసి తర్వాత రోజు విత్తుకోవచ్చు.

గమనిక: ఈ పద్ధతిలో విత్తేటప్పుడు భూమిలో తగినంత తేమ లేని పక్షంలో పైపాటుగా ఒక తడి ఇచ్చి విత్తుకోవాలి.

విత్తే పద్ధతి : 1) చేతితో నడిపే విత్తు పరికరాల ద్వారా విత్తుకోవడం మంచిది. దీని వలన సమయం బాగా ఆదా అవుతుంది. (సాలుకు సాలుకు మధ్య తేలిక నేలల్లో 60 సెం.మీ., బరువు నేలల్లో 75 సెం.మీ. దూరం ఉండాలి).

2) సాలు పద్ధతిలో కర్రపుల్ల సాయంతో చేతితో విత్తే పద్ధతి.

జీరో టిల్లేజి మొక్కజొన్న : వరి మాగాణుల్లో మొక్కజొన్నను నవంబరు నుండి జనవరి మొదటి వారం వరకు వేసుకోవచ్చు. తాడును ఉపయోగించి లేదా విత్తనం వేసే యంత్రంతో గాని వరుసకు వరసకు మధ్య 60 సెం.మీ. మరియు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 20 సెం.మీ. ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. ఎకరానికి 100 కిలోల నత్రజని, 35 కిలోల భాస్వరం, 35 కిలోల పొటాష్ నిచ్చే ఎరువులను వాడాలి. అట్రాజిన్ 0.8–1.0 కిలో/ఎకరానికి అనగా (అట్రాజిన్ 4–5 గ్రాములు లీటరు నీటిలో కలిపి విత్తిన రెండు రోజుల్లోపు నేలపై పిచికారి చేయాలి) లేదా పారాక్వాట్ 0.5 లీ. + అట్రాజిన్ 0.5 కిలో కలుపు మందును (పారాక్వాట్ 2.5 మి.లీ. + అట్రాజిన్ 2.5 గ్రా./ లీటరు నీళ్ళలో) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నేలపై పిచికారి చేయవచ్చు. తద్వారా విత్తిన 20–25 రోజుల వరకు ఎలాంటి కలుపు సమస్య రాదు. పంట వేసిన 20–25 రోజులకు, కలుపు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎకరానికి టోప్రోమిజోన్ 30 మి.లీ. లేదా టెంబోట్రియాన్ అనే కలుపు మందు ఎకరానికి 115 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నేలలో తేమ ఉన్నప్పుడు కలుపుపై పిచికారి చేయాలి. విత్తిన నెల రోజులకు వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలు గమనిస్తే 2,4 – డి సోడియం సాల్ట్ ఎకరాకు 500 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటిలో కలుపు పిచికారి చేయాలి.

వరి మాగాణిలో జొన్న : వరి మాగాణుల్లో లేదా దుక్కి చేసిన తరువాత రబీలో వరికి బదులు జొన్న పంట ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. ఎన్.–14, ఎన్.–15 మరియు సి.ఎస్.హెచ్. 31ఆర్. వంటి రకాలు అనుకూలం. ఎకరానికి 3–4 కిలోల విత్తనం వాడాలి. కలుపు నివారణకు అట్రాజిన్ 50% పొడి మందును ఎకరానికి 800 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటికి కలిపి విత్తిన 2 వ రోజున పిచికారి చేయాలి. పంటను ఆశించే కత్తెర పురుగు నివారణకు 20–30 రోజుల దశలో 5% వేపగింజల కషాయాన్ని లేదా వేప నూనె ఒక లీటరు నీటికి 5 మి.లీ. కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వరి మాగాణిలో చోడి (రాగి) : వరి కోతకు సిద్ధమైనపుడు ఆఖరి తడి తీసి వేసిన తరువాత, మరుసటి రోజు 24 గంటలు ఎకరానికి 4 కిలోలు నానబెట్టిన చోడి విత్తనములు వరి చేను మీద వెదజల్లుకోవాలి. నానబెట్టిన విత్తనాలను 24 గంటలు తరువాత పొడి గుడ్డ మీద 15 నిముషాలు ఆరబెట్టినట్లయితే విత్తనం ముద్దగా లేకుండా వెదజల్లుటకు సులువుగా ఉంటుంది. చోడి విత్తనం వెదజల్లిన తరువాత నేల స్వభావాన్ని బట్టి వరి చేను 7–12 రోజులకు కోతకు వస్తుంది. చేనులో కోసిన వరి పనలను పొలములో 4 లేక 5 రోజులు ఆరబెట్టిన తరువాత తీసివేయాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే వెదజల్లిన చోడి విత్తనములు మొలకెత్తి రెండు ఆకుల వయస్సు కలిగి ఉంటుంది. వరి పనల క్రింద చోడి మొక్కలు చనిపోకుండా ధృడంగా ఉంటాయి. విత్తనము వెదజల్లిన 3-4 వారాల వ్యవధిలో పలుచగా నీరు బెట్టి నేల స్వభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2 లేక 3 రోజుల తరువాత 25 కిలోల యూరియా మరియు 8-10 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఎరువును పైపాటుగా వెదజల్లి కూలిలతో గొప్పు (అంతరకృషి) చేసేటప్పుడు వత్తుగా ఉన్న పైరును పలుచగా చేసి, పలుచగా ఉన్న చోట నాటుకున్నట్లయితే మొక్కల సాంద్రత పొలమంతా సమానంగా ఉంటుంది.

నేల స్వభావాన్ని బట్టి 3-4 వారాల వ్యవధిలో నీరు పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చోడి (రాగి) పండించటానికి అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎకరానికి 10-15 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి పొందవచ్చును. సువర్ణముఖి, భారతి, శ్రీచైతన్య, ఇంద్రావతి రకాలలో ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. విత్తనములు వెదజల్లిన రోజు నుండి కోతకు 105-110 రోజుల సమయం పడుతుంది.

కట్టెజనుము (విత్తనం కొరకు) : ఇటీవలి కాలంలో వరి మాగాణుల్లో విత్తనం కొరకు కట్టెజనుము కూడా సాగు చేస్తున్నారు. డిసెంబరు 15 వ తేదీలోగా విత్తినట్లైతే ఎకరానికి 5-6 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి సాధించవచ్చు. వరి కోసే 2-3 రోజుల వరకు ఎకరానికి 10-12 కిలోల విత్తనాన్ని వెదజల్లే చ।మీ।। 33 మొక్కలు ఉండేటట్లుగా చూడాలి.

నేల తయారీ : మంచి దుక్కి అవసరం అయ్యే పంటల్లో నువ్వులు, ఆవాలు, ధనియాలు తర్వాత వేరుశనగ ముఖ్యమైనది. వరి కోసిన తర్వాత దమ్ము చేసిన మాగాణి భూమి ఎండిపోయినపుడు గట్టి ముద్దగా తయారవుతుంది. కాబట్టి నేల తయారీలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. భూమిలో తగినంత తేమ వున్నప్పుడు దున్నటం ముఖ్యం. తేమ ఎక్కువగా ఉన్న పుడు నాగలితో దున్నుటకు పనికిరాదు. అలాగే భూమి బాగా ఎండినట్లయితే దున్నినప్పుడు పెద్ద పెద్ద మట్టి గడ్డలు ఏర్పడతాయి. అందు వలన తగిన సమయంలో లోతుగా నాగలితో రెండు సార్లు దున్నాలి. నేలదుక్కి సరిగా తయారు కాని పక్షంలో మొలక శాతం బాగా తగ్గి, నిర్ణీత విస్తీర్ణానికి ఉండవలసినంత మొక్కల సాంద్రత ఉండదు. దాని వలన దిగుబడి బాగా తగ్గిపోతుంది.

కనుక నేల తయారీకి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. తిరుగుదంతితో రెండు వైపులా దున్నడం ద్వారా గడ్డలన్నీ పగిలి నేల మెత్తగా తయారవుతుంది. తర్వాత చదును చేసి, బోదెలు, చాళ్ళు ఏర్పరచి విత్తనాలను బోదెలపై విత్తుకొంటే పంట పెరుగుదల, దిగుబడి బాగా ఉంటుంది.

ఆరుతడి పంటలపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,
అనకాపల్లి. ఫోన్ : 08942 -223203, సెల్ : 98496 36324

జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల ద్వారా హానికారక పురుగుల నివారణ

ప్రకృతిలోని పరాన్నజీవులు, బదనికలు మరియు కొన్ని రకాల వైరల్, బాక్టీరియల్, ఫంగల్ వ్యాధులు పంటలపై వచ్చే చీడపురుగులను ఆశించి వాటిని అదుపులో ఉంచటంలో తమ వంతు పాత్రను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి సహజ శత్రువులను సస్యరక్షణలో ఒక అంశంగా వినియోగించుకొంటూ చీడపీడల ఉధృతిని తగ్గించుకోవటాన్ని జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల ద్వారా సస్యరక్షణ చేసుకోవటం అని చెప్పవచ్చు.

గరిష్ఠ విషప్రభావం గల పురుగు మందులను విచక్షణారహితంగా పిచికారీ చేయడం వలన పరాన్నజీవులు, బదనికలు పూర్తిగా నాశనమవుతున్నాయి. పైపెచ్చు, చీడపురుగులు క్రమంగా ఈ మందులకు తట్టుకొనే శక్తిని సంతరించుకొని వీటిని అదుపుచేసే మిత్ర పురుగులు పంటపొలాల్లో నాశనమవటం వలన చీడ పురుగులు తిరిగి విజృంభిస్తున్నాయి. కాబట్టి చీడపురుగులను అదుపులో ఉంచేందుకు తక్కువ విషప్రభావం గల మందులను అవసరాన్ని బట్టి మాత్రమే వినియోగిస్తే కొంతవరకు ఈ పరాన్నజీవులను మరియు బదనికలను కాపాడుకొంటూ వాటి ద్వారా వచ్చే లాభాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఈ విధంగా జీవనియంత్రణను సమగ్ర సస్యరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన సాధనంగా వాడుకోవచ్చు. పురుగు మందుల అవశేషాలు లేకుండా సేంద్రియ పద్ధతుల ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ దృష్ట్యా జీవనియంత్రణ పద్ధతుల ప్రాముఖ్యత మరింత పెరిగిందనే చెప్పవచ్చు. జీవనియంత్రణ పద్ధతులను రసాయనిక పురుగు మందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాడటం వలన పర్యావరణ సమతుల్యత కూడా పాటించబడుతూ రైతు సోదరులు పురుగు మందుల అవశేషాలు లేని నాణ్యత గల ఉత్పత్తులను సాధించవచ్చు.

పరాన్న జీవులనుపయోగించి చీడపురుగులను నియంత్రించటం :

ప్రతి పురుగు జీవిత చరిత్ర, గ్రుడ్డుదశ; గొంగళి పురుగు దశ, కోశస్థదశ (నిద్రావస్థదశ) మరియు రెక్కల పురుగుదశ అనబడే నాలుగు దశలలో పూర్తి అవుతుంది. సహజసిద్ధంగా ప్రతి దశ, శత్రు పురుగులకు లోనవుతూ ఉంటుంది. చీడపురుగు యొక్క గ్రుడ్ల మీద పరాన్న జీవుల దాడి వలన గొంగళి పురుగు దశ రాకుండ నాశనమై, అందులోనుండి పరాన్న జీవులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. వీటిని గ్రుడ్డు పరాన్నజీవులుగా వ్యవహరిస్తారు. గ్రుడ్డు దశను నశింపచేసే పరాన్న జీవుల్లో ముఖ్యమైనది ట్రైకోగ్రామా గ్రుడ్డు పరాన్నజీవి. ఇది వివిధ రకాల పంటలలో పలురకాల పురుగులపై గ్రుడ్డు దశలో ఆశించి వాటిని నాశనం చేస్తుంది. 'ట్రైకోకార్డు'లుగా వ్యవహరించబడే పరాన్న జీవులు ఆశించిన గ్రుడ్ల కార్డులను రైతు సోదరులు పంట పొలాలలో ఆకు అడుగు భాగంలో అమర్చుకొన్నట్లయితే, ఆశించిన ఫలితాలను పొందవచ్చు. పరాన్నజీవులను రైతులు తమంత తాము కూడా ఈ క్రింది విధానం ద్వారా పెంపొందించుకోవచ్చు.

"ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్" పరాన్నజీవి గుడ్లను ట్రైకోకార్డుల రూపంలో ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లిలోని బయోలాజికల్ కంట్రోల్ లేబోరేటరీ వారు ఉత్పత్తి చేసి, రైతులకు సరఫరా చేస్తున్నారు. బాగా ఎండిన మొక్కజొన్నలు లేదా జొన్నలు మరపట్టించి పిండిని ఆరబెట్టాలి. ప్రత్యేకంగా తయారుచేయబడిన చెక్క డబ్బాలు లేక ప్లాస్టిక్ బేసిన్‌లో ఆరపెట్టిన పిండిని వేయాలి. బియ్యపు పురుగు గ్రుడ్లను పిండి మీద జల్లి

మూతపెట్టాలి. గాలి సోకటానికి వీలుగా రంధ్రాలుండే మూతలను డబ్బాలను మూయటానికి వాడాలి. ప్లాస్టిక్ బేసిన్ అయితే పల్చటి గుడ్డను మూతగా ఉపయోగించాలి. సుమారు 40 రోజుల తరువాత వీటి నుండి రెక్కల పురుగులు బయటకు రావటం మొదలవుతుంది. ప్రతి రోజు ఈ పురుగులను సేకరించి గ్రుడ్లను పెట్టటానికి జల్లెడ అమర్చిన గరాటునందు వేయాలి. తల్లి పురుగులు పెట్టిన గ్రుడ్లను తీసికొని శుభ్రంచేసి, సన్నటి జల్లెడ ద్వారా జల్లించి వాలుగా ఉన్న పేపరు పైన క్రిందకు జారవిడిచి ఆ విధంగా వచ్చే మంచిగ్రుడ్లను వేరు చేయాలి. ఈ గ్రుడ్లలో కొన్నిటిని పరాన్న జీవులను పెంచటానికి, మరికొన్నిటిని పిండిపురుగులను పెంచటానికి ఉపయోగించాలి. గ్రుడ్లను జిగురు రాసిన కార్డు (15×5 సెం.మీ.) ల పైన చల్లి అతికించి, ఆరిన తరువాత గాజు గొట్టాల్లో ఉంచాలి. ట్రైకోగ్రామా పరాన్న జీవులను ఈ కార్డున్న గాజు గొట్టాల్లో వదిలి దూది బిరడాతో మూయాలి. పరాన్న జీవులకు ఆహారంగా తేనెను గాజు కాగితంపైన బొట్లు బొట్లుగా ఉంచి గాజుగొట్టాల్లో ఉంచాలి. ఒక రోజు తరువాత గ్రుడ్లున్న కార్డును తీసి వేరొక గాజు గొట్టంలో ఉంచి దూది బిరడాతో మూయాలి. నాల్గవ రోజునకు పరాన్నజీవి గల గ్రుడ్లు నలుపు రంగుకు మారతాయి. వీటిని ట్రైకోకార్డులంటారు. 8 నుంచి 9 రోజుల్లో ఈ ట్రైకోకార్డుల నుండి ట్రైకోగ్రామా పురుగులు బయటకు వస్తాయి. ఈ పరాన్నజీవిని పంట పొలాలలో వాడుకోవాలి అనుకొన్నపుడు రెండు రోజుల ముందు అనగా 7వ రోజున ట్రైకోకార్డును చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేసి పంట పొలాల్లో 5 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఆకు అడుగు భాగాన పిన్ చేయాలి. ట్రైకోగ్రామా పరాన్న జీవులు మరుసటి రోజున బయటకు వచ్చి హానికారక పురుగుల గ్రుడ్లను వెతికి ఆశించి నాశనం చేస్తాయి. వరిపైరు నాటిన 20 రోజుల నుంచి పైరును పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. కాండం తొలుచు పురుగు గుడ్లను ఆకు చివర్లలో, ఆకుముడత పురుగు గుడ్లు ఆకు ఈనె వెంబడి ఉంటాయి. ఆకులమీద గుడ్లు లేదా పైరులో రెక్కల పురుగులు కనిపించిన వెంటనే పరాన్నజీవి గ్రుడ్లను పైరులో వదలాలి. వరిలో చీడపురుగుల నివారణకు ఎకరానికి 40 వేల ట్రైకోగ్రామా గ్రుడ్లు కావాలి. ఒక్కో " ట్రైకోకార్డు " మీద 20 వేల గ్రుడ్లు ఉంటాయి. రెండు ట్రైకోకార్డులను 16 చిన్నముక్కలుగా చేసుకొని ఆకుల అడుగు భాగాన ఎండ ప్రత్యక్షంగా పడకుండా స్టాప్లర్‌తో పిన్నింగ్ చేయాలి. ఈ విధంగా అమర్చిన 2-3 రోజుల్లో ట్రైకోకార్డుల్లోని గ్రుడ్ల నుండి ట్రైకోగ్రామా పరాన్నజీవులు బయటకు వస్తాయి. ఇవి పైరుకు హాని కలిగించే పురుగుల గ్రుడ్లను వెదికి వాటి నుండి రసం పీల్చి చంపివేసి, పరాన్నజీవులు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ విధంగా ట్రైకోగ్రామా కార్డులను వారం-పది రోజుల వ్యవధిలో 3 నుండి 6 సార్లు పొలంలో వరి నాటిన 30 రోజుల నుండి 60 రోజుల మధ్య కాలంలో వరి పొలంలో అమర్చినట్లయితే కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత పురుగు పూర్తిగా నివారించవచ్చు. వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు ట్రైకోగ్రామా జపానికమ్‌ను, ఆకుముడత పురుగు నివారణకు ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్‌ను ఉపయోగించాలి.

మొక్కజొన్న పంటనాశించు కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు ట్రైకోగ్రామా కార్డులను మొలకెత్తిన 7 రోజుల నుండి ఎకరం పొలంలో 40 వేల ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్నజీవి గ్రుడ్లను వారం-పది రోజుల వ్యవధిలో 3 సార్లు పెట్టినట్లయితే కాండం తొలుచు పురుగును నివారించవచ్చు.

మొక్కజొన్నను ఇటీవల ఆశించిన కత్తెర పురుగు నివారణకు ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్నజీవిని ఎకరానికి 40 వేల గ్రుడ్లను మొక్కజొన్న మొలకెత్తిన 7 రోజుల నుండి రెండుసార్లు 7-10 రోజుల వ్యవధిలో వదలాలి.

చెఱకు పంటలో పీకపురుగు, కాండం తొలుచు పురుగులను ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్నజీవి సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది. చెఱకు నాటిన నెల రోజుల నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 6–8 సార్లు ఎకరాకు 20 వేల ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్నజీవులను వదలాలి. చెఱకు పంటలో కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు చెఱకు నాటిన 120 రోజుల నుండి 2–4 సార్లు ఎకరాకు 20 వేల ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్న జీవులను 7–10 రోజుల వ్యవధిలో వదలాలి. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన నెలలలో (ఏప్రిల్–జూన్) ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునే పరాన్న జీవులను చెఱకు పంటలో ఎకరాకు 20 వేల పరాన్న జీవులను 8 సార్లు, 7–10 రోజుల వ్యవధిలో చెఱకు నాటిన 30 రోజుల నుండి మరియు 4 సార్లు, కణుపులు ఏర్పడే దశలో వదలాలి. ప్రత్తి పంటల మీద వచ్చే శనగపచ్చ పురుగు, గులాబి రంగు కాయ తొలుచు పురుగులను ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ గుడ్డు పరాన్న జీవులను ఎకరానికి 60 వేలు చొప్పున విత్తిన 45 రోజుల నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 4 నుండి 6 సార్లు పెట్టి పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు. వేరుశనగ పంట నాశించు ఆకుముడత పురుగును ట్రైకోగ్రామా ఖిలోనిస్ పరాన్న జీవులు 20 వేలు ఉన్న ట్రైకోకార్డును విత్తిన 30 రోజుల నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 3 నుండి 6 సార్లు పెట్టి నివారించవచ్చు. టమాట, వంగ, బెండ మొదలైన కూరగాయ పంటల మీద వచ్చే కాండం తొలుచు పురుగు, కాయ తొలుచు పురుగు, శనగపచ్చ పురుగులను 20 వేల గ్రుడ్లు ఉన్న ట్రైకోకార్డును ఎకరానికి చొప్పున పూత సమయం నుండి 7–10 రోజుల వ్యవధిలో 3 నుండి 6 సార్లు పెట్టి పూర్తిగా నివారించవచ్చు.

ప్రకృతి సిద్ధంగా గ్రుడ్లను ఆశించే పరాన్న జీవులు మరియు బదనికలు; గొంగళి పురుగును ఆశించే పరాన్న జీవులు మరియు బదనికలు; కోశస్థ దశ నాశించే పరాన్న జీవులు మరియు బదనికలు; రెక్కల పురుగును నాశనం చేసే సాలె పురుగులు, బల్లులు, తొండలు, గొల్లభామలు, తునీగలు మరియు పక్షులు పంట పొలంలో సస్యరక్షణ చేపడతాయి. కనుక ఈ మిత్ర పురుగులను పంట పొలాలలో సంరక్షించుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

బాక్టీరియాలను ఉపయోగించి చీడపురుగులను నియంత్రించటం :

చీడపురుగు బ్యాక్టీరియాను నోటి ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే రోగానికి గురి అవుతుంది. బ్యాక్టీరియా చీడపురుగు శరీరములోనికి ప్రవేశించినప్పటి నుండి 7 గంటలలోపు రోగలక్షణాలు కనబడతాయి. పురుగు పక్షవాతానికి గురి అవుతుంది. శరీరం మెత్తగా మారి ఎండిపోతుంది. శరీరం లోపల ద్రవం నల్లగా మారి చెడువాసన వస్తుంది. ఒక్కోసారి శరీరంలోని ద్రవం పాల మాదిరి బయటకు వస్తుంది.

బాసిల్లస్ తురిన్‌జెనిసిస్ (బీ.టీ.) అనే బాక్టీరియా మందులు ద్రవ రూపంలోను, పొడి రూపంలోను డైపెల్, బయోలెప్, బయెబిట్, అగ్రీ, హాల్ట్, బయోఆస్ప్, డెల్‌ఫిన్ అనే వివిధ పేర్లతో లభ్యమవుతున్నాయి. వీటిని ఎకరాకు 400గ్రాములు లేదా 400 మి.లీ. లీటరు మందును 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి (2 మి.లీ. / లీటరు), 2–3 సార్లు సాయంత్రపు వేళలో పిచికారీ చేస్తే, చీడపురుగులు వ్యాధికి గురి అయి చనిపోతాయి. ప్రత్తి, కంది, శనగ, కూరగాయల మీద వచ్చే శనగపచ్చ పురుగు, పొగాకు లద్దెపురుగు కత్తెర పురుగులను వీటి వాడకం ద్వారా నివారించవచ్చు. కంది నాశించు మారుక మచ్చల పురుగు, కాయ తొలుచు పురుగులను ఐ.సి.ఎ.ఆర్.

–ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్. బీ.టీ. జి. 4 ను లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. చొప్పున 3 సార్లు పూతకు ముందు, పూత దశ మరియు కాయ ఏర్పడే దశలలో పిచికారి చేసి సమర్థవంతంగ నియంత్రించవచ్చు. మొక్కజొన్న నాశించు కత్తెర పురుగును కూడా బీ.టీ. (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.–ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్., బీ.టీ. 25) పిచికారి చేసి నియంత్రించవచ్చు. ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్. బీ.టీ. 25 @ 2 మి.లీ./లీటరు నీటికి చొప్పున 2–3 సార్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేసి మొక్కజొన్న కత్తెర పురుగును అరికట్టవచ్చు.

శిలీంధ్రాలను ఉపయోగించి చీడపురుగులను నియంత్రించుట :

శిలీంధ్రాలు పురుగు శరీరంపై దాడి చేసి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. శిలీంధ్రపు రకాన్ని బట్టి పురుగు శరీరంపై తెలుపు, నలుపు లేదా రంగులలో బూజు పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఈ శిలీంధ్రపు బూజు పురుగు శరీరం లోపల బయటా కూడా ఏర్పడుతుంది. దీని వలన పురుగు శరీరం గట్టిగా అవుతుంది. శిలీంధ్రాలలో ఫంగస్ వ్యాధి కలుగజేసే మందులు కొన్ని పొడి రూపంలో లభ్యమవుతున్నాయి. మెటారైజియమ్ ఎనైసోప్లియా ను ఉపయోగించి వేరుశనగ, చెఱకు వంటి పంటల నాశించు వేరుపురుగు, కొబ్బరినాశించు ముక్కు పురుగును నివారించవచ్చును. అంతేకాకుండా వివిధ పంటల నాశించు చెదలు నియంత్రణకు జీవకీటక నాశనిలు ఉత్తమ సాధనం.

మెటారైజియమ్ ఎనైసోప్లియానుపయోగించి కొబ్బరిపై వచ్చే ముక్కుపురుగు (రైనోసిరస్), వేరుశనగపై వచ్చే వేరుపురుగును నివారించవచ్చు. అదే విధంగా, బెవేరియా బాసియానా వరి మరియు ప్రత్తి పంటలలో రసం పీల్చు పురుగుల కోసం, వర్జిసిల్లియం లెకాని ద్రాక్షలో పిండి పురుగులను నివారించుకోవటానికి 5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పిచికారి చేయాలి. వాడుకోవచ్చు. మోటారైజియమ్ ఎనైసోప్లియా (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్., ఎమ్.ఎ. 35) మరియు బెవేరియా బాసియానా (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్., బి.బి. 45) ను ఉపయోగించి మొక్కజొన్న పంటలో కత్తెరపురగును నివారించవచ్చు. ఈ ఫంగస్ వ్యాధి కలుగ చేసే జీవరసాయనాలు సాధారణంగా పొడి రూపంలో లభ్యమవుతాయి. వీటిని వాడుకుంటూ పురుగు ఉధృతిని తగ్గించుకోవటానికి 5గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి, 2–3 సార్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో చేసుకోవాలి. ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లిలో బయోలాజికల్ కంట్రోలు లేబొరేటరీ వారు మెటారైజియమ్ ఎనైసోప్లియే, బెవెరియ బేసియానా, ఐసేరియ ఫ్యూమోసొరేసియ ను ఉత్పత్తి చేసి, రైతులకు సరఫరా చేస్తున్నారు. 1 కిలో మెటారైజియమ్ ఎనైసోప్లియే (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్,. ఎమ్.ఎ.4) కల్చర్‌ను 100 కిలోల పశువుల ఎరువులో కలుపుకొని ఎకరం పొలంలో చెరకు నాటే సమయంలో లేదా తొలకరి వర్షాలు పడినప్పుడు నెల రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు కాలువల్లో వేయుట వలన వేరు పురుగును, చెదలను నివారించవచ్చు. చెరకు, వేరుశనగ పంటల నాశించు వేరు పురుగును పూర్తిగా నివారించవచ్చు. కొబ్బరిని ఆశించే సర్పిలాకార తెల్లదోమ నివారణకు, ఎంటమోఫాథోజెనిక్ శిలీంధ్రం, ఐసోరియ ఫ్యూమోసోరోసే (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.–ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్. పి.ఎఫ్.యు. 5) 5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 15 రోజుల వ్యవధిలో 2–3 సార్లు పిచికారి చేసి నివారించువచ్చు.

వైరస్‌ని ఉపయోగించి చీడపురుగులను నియంత్రించటం : శనగపచ్చ పురుగు, ఆముదం మీద వచ్చే నామాల పురుగు, లద్దె పురుగు, కత్తెర పురుగులను నివారించటానికి న్యూక్లియార్ పాలిహెడ్రోసిస్ వైరస్ ద్రావణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.

న్యూక్లియార్ పాలి హెడ్రోసిస్ వైరస్ (ఎన్.పి.వి.) ద్రావణ తయారి : దీనిని రెండు విధాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. 1. శాస్త్రీయంగా ఎక్కువ మోతాదులో తయారుచేయటం, 2. రైతులు స్వయంగా తయారు చేసుకోవటం.

1. శాస్త్రీయంగా ఎన్.పి.వి. ద్రావణ తయారి : ఎన్.పి.వి. ద్రావణం తయారు చేయటానికి 7-8 రోజుల వయస్సుగల పొగాకు లద్దెపురుగు లేక 5-7 రోజుల వయస్సు గల శనగపచ్చ పురుగు లార్వాలను ఎన్నుకొని వాటిని 8 గంటల పాటు ఆహారం లేకుండా వుంచాలి. పొగాకు లద్దెపురుగు లార్వాలకు వైరస్ వ్యాధి సోకించుటకు ఆముదం ఆకులను ఎన్.పి.వి. ద్రావణంలో 15-20 నిమిషాలు ముంచి ఆకులు ఆరాక వాటిని ఒక 4-5 ఇంచిలు లోతైన, 12 ఇంచిలు వెడల్పాటి, ప్లాస్టిక్ పాత్రలో వుంచి 50 నుండి 70 లార్వాలను ఆకులపై వదలాలి. శనగపచ్చ పురుగు లార్వాలకు వ్యాధి సోకించేందుకు మూడవ దశకు చేరిన లార్వాలను విడివిడిగా చిన్న ఖాళీ సీసాల్లో వుంచాలి. వాటికి నీటిలో నానిన శనగ గింజలను వైరస్ ద్రావణంలో ముంచి రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు గింజలను ఆహారంగా ఇవ్వాలి. వైరస్ కలిగిన ఆహారాన్ని లార్వాలకు రెండురోజులు పెట్టి ఆ తరువాత వైరస్ లేని ఆహారాన్నివ్వాలి. వైరస్ కలిగిన ఆహారం తిన్న 4 లేక 5 రోజులకు లార్వాలకు వైరస్ వ్యాధిసోకి 7 లేక 8 రోజులకు చనిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వ్యాధి సోకి చనిపోయిన 200 లార్వాలను మంచి నీరుగల పాత్రలో వేసి వారం రోజులపాటు ఉంచాలి. ఈ విధంగా చేయటంవలన వైరస్ సోకిన లార్వాలు కుళ్ళి పాత్ర అడుగుభాగానికి చేరుతాయి. వైరస్ కణాలు వున్న ద్రావకాన్ని మిక్సీలో వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు త్రిప్పి వడపోయాలి. ఈ విధంగా వడకట్టిన ద్రావణానికి మంచినీరు కలిపి 7 రోజులు చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ వుంచాలి. ఆ తరువాత పైన తేలిన తెట్టును తీసివేసి అడుగుభాగంలో వున్న చిక్కటి పదార్థానికి మరి కొంచెం మంచినీటిని కలిపి 500 ఆర్.పి.ఎం. వద్ద 5 నిమిషాలపాటు సెంట్రీఫ్యూజ్ చేయాలి. పైన తేలిన తేటను వేరే గాజు గొట్టంలోకి మార్చి దానిని సెంట్రీఫ్యూజ్‌లో వుంచి 2500 ఆర్.పి.ఎమ్. వద్ద 15-20 నిమిషాలపాటు సెంట్రీఫ్యూజ్ చేసి గొట్టం అడుగుభాగాన చేరిన వైరస్‌ను తీసుకొని గాజు సీసాల్లో నింపి ఫ్రిజ్‌లో భద్రపరచుకొని పైరుపై పురుగు కనిపించినప్పుడు ఈ ద్రావకాన్ని తగిన మోతాదులో నీరు కలుపుకుంటూ ఉపయోగించాలి.

2. రైతులు స్వయంగా ఎన్.పి.వి. ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకొనటం : రైతులు పొలంలో వైరస్ వ్యాధి సోకి తలక్రిందులుగా వేలాడుతున్న శనగపచ్చ పురుగు మరియు పొగాకు లద్దె పురుగు లార్వాలను సేకరించుకోవాలి. ఈ లార్వాలను ఒక పాత్రలోనికి తీసుకొని మంచి నీళ్ళు కలిపి మెత్తగా నూరి ద్రావణం తయారు చేసి పలుచని గుడ్డ ద్వారా వడపోయాలి. 200 వ్యాధిసోకిన పురుగుల నుండి వచ్చిన ద్రావణానికి 200 లీ. నీటిని, 1 కిలో బెల్లం మరియు 100 మి.లీ. టీపాల్ లేదా రాబిన్‌బ్లూ చేర్చి ఎకరం పొలంలో పిచికారీ చేయాలి. టీఫాల్ లేదా రాబిన్‌బ్లూ అందుబాటులో లేని పరిస్థితులలో తేలికపాటి సబ్బు ద్రావణాన్ని కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుకోవచ్చు.

పైరులో అమర్చిన లింగాకర్షక బుట్టలోనికి 8-10 రెక్కల పురుగులు ఆకర్షించబడిన రెండు వారములలో గాని లేక పైరుపై పురుగు గ్రుడ్లను గమనించటం జరిగిన వారం రోజుల్లో వైరస్ ద్రావణాన్ని పైరుపై పిచికారి చేయాలి.

ఎన్.పి.వి. వ్యాధి సోకిన లార్వా లక్షణాలు : ఎన్.పి.వి. వ్యాధి సోకిన పురుగులు మెత్తబడి నల్లగా మారతాయి. పురుగు శరీర అడుగుభాగం గులాబీ రంగులోకి మారుతుంది. ఇవి మొక్కల పై భాగానికి పాకి పై నుండి క్రిందకు వేలాడుతూ చనిపోతాయి లేదా ఆకుల మీద నల్లగా కరుచుకు పోయినట్లుంటాయి. వ్యాధిసోకిన

పురుగుచర్మాన్ని తాకినట్లయితే వదులుగా వుండి చర్మం పగిలి శరీరం నుండి తెల్లని ద్రవం బయటకొస్తుంది.

ఎన్.పి.వి. ద్రావణం ఉపయోగించే సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు : ఎన్.పి.వి. ద్రావణాన్ని మొక్క అంతటా సమంగా తడిచేట్లు పిచికారీ చేయాలి. పిచికారీ చేసేప్పుడు మధ్యమధ్యలో ద్రావణాన్ని కర్రతో బాగా కలపాలి. సాయంత్రం వేళలో వాతావరణం చల్లగా వున్నప్పుడు మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి. సూర్యరశ్మిగల సమయంలో పిచికారి చేసినట్లయితే సూర్యరశ్మిలో వున్న అతి నీలలోహిత కిరణాలు వైరస్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఎన్.పి.వి. ద్రావణం పిచికారీ చేసే ముందు మాత్రమే నీటితో కలిపి తయారు చేసుకోవాలి. నిలువ వుంచిన ద్రావణాన్ని పిచికారి చేస్తే వైరస్ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. అవసరాన్ని బట్టి 10 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 సార్లు పిచికారీ చేసుకొనవచ్చు.

కీటకనాశని నులి పురుగులు (ఈ.పి.ఎన్.) : కీటకాలను ఆశించే నులిపురుగులను కూడా జీవ రసాయనాలుగా సస్యరక్షణలో వినియోగించవచ్చు. హెటిరోరాబ్డయిటిస్, స్టీనర్‌నీమా వంటి నులి పురుగులు కీటక నాశనులుగా హానికర పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ కీటక నాశన నులిపురుగులను రైతాంగానికి అందుబాటులోకి ఐ.సి.ఎ.ఆర్. - ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్., బెంగుళూరు వారు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు మరియు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి. కీటక నాశక నులిపురుగులైన హెటిరోరాబ్డయిటిస్ ఇండికా (ICAR-NBAIR H38) ను 5 కిలోల పొడిమందును 60 కిలోల తడి ఇసుకలో కలిపి ఎకరం పొలంలో చెరకు నాటిన సమయంలో గాని, తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే గాని సాళ్లలో రెండు సార్లు నెల రోజుల వ్యవధిలో వేసుకున్నట్లయితే వేరుపురుగును చెదలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు. కీటక నాశని నులి పురుగులైన హెటిరో రాబ్టయిటిస్ ఇండికా (ఐ.సి.ఎ.ఆర్.- ఎన్.బి.ఎ.ఐ.ఆర్., హెచ్. 38) ను 4 కిలోలు/ 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి 2-3 సార్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేసి మొక్కజొన్న నాశించు కత్తెరపురగును అరికట్టవచ్చు.

పైన చెప్పుకొన్న ఈ పరాన్న జీవులు మరియు జీవ రసాయనాలు రైతు సోదరులకు లభ్యం చేయాలన్న ఉద్దేశ్యంతో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 20 జీవనియంత్రణ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు నెలకొల్పబడ్డాయి. ఇవి ఇంబ్రహీం పట్నం (విజయవాడ), గుంటూరు, కాకినాడ, నిడదవోలు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, నంద్యాల, కడప, అనంతపూర్, విజయనగరం మరియు విశాఖపట్నం పట్టణాలలో నెలకొల్పబడి ఆయా ప్రాంత రైతులకు జీవనియంత్రణ ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధరలకు విక్రయిస్తున్నాయి. ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క జీవనియంత్రణ ప్రయోగశాల, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి నుండి ఈ కేంద్రాలకు సాంకేతికపరంగా సలహాలందిస్తూ జీవనియంత్రణ సాధనాలు ఉత్పత్తి చేయటానికి అవసరమైన "ఇనాక్యులమ్ కల్చరు (మూల పదార్థాలు) ప్రతి పంటకాలంలో అందిస్తూ జీవనియంత్రణ పద్ధతుల ప్రాచుర్యానికి దోహదం చేస్తున్నది.

జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల వినియోగంలో జాగ్రత్తలు :

1. ట్రైకోగ్రామా గ్రుడ్డు పరాన్న జీవిని పొలంలో వదిలే ముందు నష్టపరిచే పురుగు గ్రుడ్డు దశలో ఉన్నదీ, లేనిది గమనించి వదలాలి.

2. లింగాకర్షక బుట్టలు 3-5/ ఎకరానికి చొప్పున అమర్చి నష్టపరిచే పురుగు యొక్క తల్లి పురుగుల ఉనికిని గమనించి ట్రైకోకార్డులను పొలంలో విడుదల చేయాలి.

3. ట్రైకోకార్డులను అమర్చడానికి ముందుగాని, 15 రోజుల వరకు గాని పురుగు మందులను పొలంలో పిచికారి చేయరాదు.

4. వివిధ పంటలలో సస్యరక్షణకు సిఫారసు చేసిన మోతాదు ప్రకారం తగిన సమయ వ్యవధులలో ట్రైకోకార్డులను విడుదల చేయాలి.

5. సాయంత్రం సమయమున ట్రైకోకార్డును ఆకు క్రింది భాగంలో అమర్చాలి. (స్టేప్లర్ పిన్ను చేయాలి).

6. జీవ నియంత్రణ ఉత్పత్తుల నాణ్యత పరంగా మరియు పర్యావరణ పరంగా రసాయనిక పురుగు మందుల కంటే శ్రేయమైనప్పటికి వీటి నిల్వ ఉండే సామర్థ్యం తక్కువని చెప్పుకోవాలి. ఒక్క వైరస్ ద్రావకం తప్పించి మిగిలిన జీవ రసాయనాలన్నీ 6 నెలలు నుంచి అధికారికంగా 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉండవు. కాబట్టి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గాని వాడుకొనేటప్పుడు గాని వాటి నిల్వ ఉంచే తేదీని పరిశీలించుకొని జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది.

పైన తెలిపిన జీవనియంత్రణ సాధనాలే కాకుండా పొగాకు కషాయం, వేపగింజల కషాయాలు మరియు కొన్ని రకాల వృక్షసంబంధిత కషాయాల ద్వారా కూడా చీడపీడలను నివారించుకోవచ్చు.

పొగాకు కషాయం తయారి : పొగాకు కషాయం తయారు చేయుటకుగాను 500 గ్రాముల పొగాకును 4–5 లీటర్ల నీటిలో 24 గంటలు నానబెట్టాలి. 320 గ్రాముల బార్ సబ్బు పొడిని వేరే పాత్రలో కలియబెట్టి తయారు చేసుకున్న పొగాకు కషాయానికి కలపాలి. ఈ ద్రావణాన్ని 6–7 రెట్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకొనవచ్చు.

వేపగింజల కషాయం తయారి : వేపగింజలను తీసుకొని, పొడిగా చేసి, కిలో పొడిని పలుచని గుడ్డ సంచిలో పోసి, మూతిని కట్టి 20 లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టిన సంచిని వీలైనన్నిసార్లు గట్టిగా పిండాలి. అలా చేయటం వలన పొడిలో వున్న అజాడిరెక్టిన్ మూలపదార్థం కషాయంలోకి బాగా వస్తుంది. పూర్తిగా పిండిన తరువాత పిప్పి కలిగిన సంచిని పారవేయాలి. ఈ విధంగా 5% వేపగింజల కషాయం తయారవుతుంది. ఈ ద్రావణానికి 20 గ్రా. సబ్బుపొడి కలిపి బాగా కరిగించాలి. ఈ కలిపిన కషాయాన్ని పలుచని గుడ్డ ద్వారా వడపోయాలి. లేనట్లయితే కషాయంలో వుండిపోయిన పదార్థాలు స్ప్రేయర్ నాజిల్‌లో చిక్కుకొని పిచికారీకి అంతరాయం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా అవసరమైనంత ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకొని పిచికారీ చేయవచ్చు.

కావున వివిధ జీవనియంత్రణ పద్ధతులను మన అవసరాలకు అనుగుణంగా సమగ్రసస్యరక్షణ ప్రక్రియలో ఒక ప్రధానాంశంగా వాడుకొన్నట్లయితే పురుగు మందుల వాడకాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకొనవచ్చు. జీవనియంత్రణ పద్ధతులను పాటించటంవలన వాతావరణ కాలుష్యం తగ్గటం, పర్యావరణ సమతుల్యత పెరగటమే కాకుండా అవశేషరహిత ఉత్పత్తులను సాధించి, ప్రపంచ వాణిజ్య రంగంలో మనదేశ ఉత్పత్తులకు మంచి ధర పలికేటట్లు చూసుకోవచ్చు.

జీవనియంత్రణ పద్ధతిలో పురుగుల నివారణపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి,

విశాఖపట్నం జిల్లా. ఫోన్ నెం. 08924–223532, సెల్ నెం. 96180 61963

జీవ రసాయనాలు – చీడపీడల నివారణలో వాటి ప్రాముఖ్యత

వ్యవసాయంలో చీడపీడలు ఆశించడం వలన జరిగే పంట నష్టం దాదాపు 30 నుంచి 35 శాతం వరకు ఉంటుంది. వీటి వలన రైతాంగానికి దిగుబడులు తగ్గటమే కాకుండా వచ్చిన దిగుబడులలో కూడా నాణ్యత లోపించి ఆర్థికంగా రైతుకు అపార నష్టం కలుగజేస్తాయి అనటంలో అతిశయోక్తి ఏమాత్రం లేదు. గడిచిన దశాబ్దం వరకు రసాయనిక పురుగు మందులను పిచికారీ చేయటం ద్వారా చీడపీడలను నివారించుకోవటమన్నది ఒక ఆనవాయితీగా వస్తూ వచ్చింది. విచక్షణా రహితంగా పురుగు మందులు వాడటం వలన, పురుగులు నిరోధక శక్తిని పెంచుకుని చీడపీడల ఉధృతి పెరిగింది. ఇంతేకాకుండా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో పురుగు మందుల అవశేషాలు పెరిగి నాణ్యతాపరంగా ఎగుమతులలో సమస్యలు రావటం పరిపాటి అయింది. ప్రస్తుత ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ హయాంలో ఉత్పత్తుల నాణ్యతకు ఉన్న ప్రాముఖ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ చీడపీడల ఉధృతిని తగ్గించుకోవాలంటే రైతు సోదరులు రసాయన పురుగు మందుల మీద మాత్రమే ఆధారపడకుండా ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులను అనుసరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సస్యరక్షణలో పర్యావరణానికి హాని చేయకుండా, మిత్ర పురుగులను సంరక్షించుకుంటూ, తమకున్న ఆర్థిక వనరులలో చీడపీడలను నియంత్రించు కోవాలంటే జీవనియంత్రణ పద్ధతులు సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పలు పంటల సమగ్ర సస్యరక్షణలో జీవనియంత్రణ ఒక ప్రధానాంశంగా సిఫారసు చేస్తున్నారు.

ప్రకృతిలో సమతుల్యత భాగంగా పురుగులు మరియు శిలీంధ్రాలకు కూడా సహజ శత్రువులు నెలవై వాటిని అదుపులో ఉంచుతాయి. కాని విచక్షణా రహితమైన మానవ చర్యల వలన వాటి నిష్పత్తి తగ్గి ఆశించిన ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నాము. ఈ నేపధ్యంలో ప్రతి జిల్లాలో జీవనియంత్రణ ప్రయోగశాలల ద్వారా మరియు వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల్లోని జీవనియంత్రణ ప్రయోగశాలల ద్వారా పరాన్న జీవులు, బదనికలు, సూక్ష్మజీవుల ఆధారిత క్రిమిసంహారక, శిలీంధ్రనాశినులు తయారు చేసి రైతులకు లభ్యమయ్యేలా ప్రాచుర్యానికి తెచ్చారు.

ఇవి పురుగుకు రోగం కలుగచేసే క్షమత కలిగిన సూక్ష్మజీవులను ఆధారంగా చేసుకొని తయారు చేయబడతాయి. పురుగులలో రోగాలను కలుగుచేసే సూక్ష్మజీవులు స్థూలంగా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు. అవి. 1. వైరస్‌లు 2. బాక్టీరియాలు 3. కీటక నాశక శిలీంధ్రాలు మరియు 4. కీటకాల నాశించు నులి పురుగులు. ఇవే కాకుండా పంటల నాశించే వివిధ తెగుళ్ళను నివారించటానికి మరియు పంట పొలాలలో విపరీత నష్టం కలుగచేసే నులి పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించటానికి నిర్దేశించబడిన జీవసంబంధ మందులు కూడా వాడకంలో ఉన్నాయి.

వైరస్ ఆధారిత జీవరసాయనాలు : మానవాళికి ఏ రకంగా వైరస్ సూక్ష్మజీవుల వలన రోగాలు సంభవిస్తాయో, అదే శైలిలో పురుగులకు కూడా వివిధ రకాల వైరస్‌లు సోకి రోగకారకాలవుతాయి. వాటిలో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగినవి 1. యన్.పి.వి. (న్యూక్లియర్ పాలి హెడ్రోసిస్ వైరస్) 2. సైటో ప్లాస్మిక్ వైరస్ (సి.పి.వి.) 3. గ్రాన్యులోసిస్ వైరస్ (జి.వి.)

యన్.పి.వి. ద్రావకము : యన్.పి.వి. ద్రావకం పిచికారీ చేసుకోవటం ద్వారా వివిధ పంటలనాశించే లద్దె పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చును. ప్రత్తిని ఆశించే శనగపచ్చ పురుగు ఉధృతిని తగ్గించటానికి హెచ్.ఎన్.పి.వి.

ను మరియు పొగాకు లద్దెపురుగు ఉధృతిని తగ్గించటానికి యన్.ఎన్.పి.వి.ను ఎకరాకు 200 ఎల్.ఇ. (లార్వల్ ఇక్వివాలెంట్) వాడుకుంటూ సమర్థవంతంగా తగ్గించుకోవచ్చును. అదేవిధంగా ప్రొద్దుతిరుగుడు, టమోటా మరియు ఇతర పంటలలో శనగపచ్చ పురుగు నివారణకు ఈ యన్.పి.వి. ద్రావకం ఎకరాకు 200 ఎల్.ఇ. కనుక పిచికారీ చేసుకొన్నట్లయితే వీటి ఉధృతిని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ఆముదం పంటనాశించే నామాల పురుగు, వేరుశనగనాశించే ఎర్రగొంగళి పురుగులకు కూడా ఇదే మోతాదులో వాటిని ఉద్దేశించబడిన యన్.పి.వి. ద్రావకాలను వాడి ఉధృతిని నియంత్రించుకోవచ్చును.

యన్.పి.వి ద్రావణం ఉపయోగించే సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- ఈ ద్రావణాన్ని మొక్క అంతటా సమంగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.
- పిచికారి చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ద్రావణాన్ని కర్రతో బాగా కలపాలి. సాయంత్రం వేళలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పిచికారి చేయాలి.
- సూర్యరశ్మి గల సమయంలో పిచికారి చేసినట్లయితే సూర్యరశ్మిలో ఉన్న అతినీలలోహిత కిరణాలు వైరస్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. పిచికారి చేసేటప్పుడు రాబిన్ బ్లూను కలిపితే అతి నీలలోహిత కిరణాల నుండి వైరస్ కాపాడబడును.
- యన్.పి.వి. ద్రావణం పిచికారి చేసే ముందు మాత్రమే నీటితో కలిపి తయారు చేసుకోవాలి. నిలువ ఉంచిన ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేస్తే వైరస్ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. అవసరాన్ని బట్టి 10 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 సార్లు పిచికారి చేసుకోవచ్చును.

బాక్టీరియా ఆధారిత జీవరసాయనాలు : జీవరసాయనాలలో సింహ భాగం బాక్టీరియా ఆధారిత జీవరసాయనాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. పొడి మరియు ద్రవరూపంలో లభ్యమయ్యే ఈ జీవరసాయనాలలో ఎక్కువగా బి.టి. ఫార్ములేషన్స్ లేదా బి.టి. మందులు వాడుకలో ఉన్నాయి. శనగపచ్చ పురుగు, పొగాకులద్దె పురుగు, నామాల పురుగు వంటి పురుగుల లార్వాలను ఇది ఆశించి వాటిని రోగగ్రస్తం చేయటం ద్వారా పురుగు ఉధృతిని తగ్గిస్తుంది. మార్కెట్‌లో వివిధ కంపెనీల ద్వారా ఈ బి.టి. ఫార్ములేషన్ రైతాంగానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. పొడి లేక ద్రవరూపంలో డైపెల్, డెల్ఫిన్, బయోబిట్, బయోఆస్ప్, అగ్రీ హాల్ట్ వంటి పలుపేర్లతో ఇవి మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి. పంటలలో దీనిని వాడుకోవాలనుకొన్నప్పుడు 2 గ్రా. మందును లీటరు నీటికి లేక 2 మి.లీ. మందు లీటరు నీటికి కలిపి చేను పూర్తిగా తడిచేలా పిచికారీ చేసుకోవాలి. పంటకు కావలసిన నీటిని బట్టి దాదాపు 1000 గ్రాములు లేదా 1000 మి.లీ. ప్రతి హెక్టారుకు వాడుకోవలసి వస్తుంది.

కీటకనాశక శిలీంధ్రాలు (ఎంటమోపాథోజెనిక్ ఫంగస్) : పురుగులనాశించే వివిధ రకాల శిలీంధ్రాలను పొడి రూపంలో తయారుచేసి, వాడి పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించు కోవటం ఈ మధ్య ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా మూడు రకాల శిలీంధ్రజాతులు, *బవేరియా బాసియానా*, మెటారైజియం ఎనైసోప్లియే మరియు వర్టిసిల్లియం లెకాని నీటిలో కరుగు పొడి (డబ్ల్యు.పి.) రూపంలో లభ్యమవుతున్నాయి. ఇవి పంటలలో పిచికారీ చేసుకొన్నపుడు హానికారక పురుగులను ఆశించి, బూజులాగా ఏర్పడి పురుగును నిర్వీర్యం చేస్తాయి. పంట పొలంలో పురుగుల ఉధృతి పెరుగుతుండడం గమనించినపుడు ఈ పొడి మందును 5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలుపుకొని పిచికారి చేసుకొంటే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వీటిలో *బవేరియా బాసియానా* ఆకులను కొరికి తినే గొంగళి పురుగులకు,

మెటారైజియం ఎనైసోప్లియే మట్టిలో, మొక్క మొదలులో ఉండే వేరు పురుగు వంటి చీడలను సమర్థవంతంగా అరికట్టుతుంది. వర్టిసిల్లియం లెకాని వివిధ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. బవేరియా బాసియానాను ఉపయోగించి వరిలో సుడి దోమ మరియు ఆకు ముడత పురుగులను అదేవిధంగా మిర్చి వంటి పంటలలో శనగపచ్చ పురుగు మరియు పొగాకు లద్దె పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు. వర్టిసిల్లియం లెకాని జీవరసాయనం ఇటీవలి కాలంలో ద్రాక్ష మరియు మామిడిలో పిండి పురుగు నివారణకు విరివిగా వాడటం జరుగుతున్నది. మార్కెట్లో ఈ కీటక నాశక శిలీంధ్రాలు భీమ, బిబిసి, విశ్వ అభయ్, వర్టికేర్, స్పైడర్, రేసర్, బయో పవర్, బొవెరిన్, బయోవన్డర్, బయో గార్డ్ రిచ్, బయో మ్యాజిక్, గ్రీన్ మెటా, దేవాస్త్ర, బయోకేచ్, వర్టిసెల్ వంటి వివిధ పేర్లతో దొరుకుతున్నాయి.

కీటక నాశక నులి పురుగులు (ఎంటమోపాథోజెనిక్ నిమటోడ్స్) : కీటకాలను ఆశించే నులిపురుగులను కూడా జీవరసాయనాలుగా వాడుకొనే దశలో పురోగతి సాధించటం జరిగింది. హెటిరోర్హాబ్టైటిస్ మరియు స్టీనర్‌నీమా ప్రజాతులకు చెందిన నులిపురుగులు హానికారక పురుగుల ఉధృతిని తగ్గించటంలో క్షమత కలిగి ఉండటం ప్రయోగాత్మకంగా నిర్ధారణలు జరిగాయి. ఈ నులిపురుగులు పదార్థ రూపంలో రూపొందించి రైతాంగానికి అందుబాటులో పెట్టటానికి విస్తృత పరిశోధనలు జరగుతున్నాయి. ఇవి మార్కెట్లో లభ్యమవటానికి మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు.

తెగుళ్ళ నివారణలో ఉపయోగించే ముఖ్యమైన జీవ రసాయనాలు :

తెగుళ్ళ నివారణలో ముఖ్యంగా ట్రైకోడెర్మా జాతికి చెందిన శిలీంధ్రాలు మరియు సూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్ బ్యాక్టీరియాను విరివిగా వాడుతున్నారు.

ట్రైకోడెర్మాను విత్తనం మరియు భూమి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే తెగుళ్ళ నివారణకు వాడతారు. ట్రైకోడెర్మా ఆరుతడి పంటలలో మరియు తోట పంటలలో ముఖ్యంగా వేరుకుళ్ళు, వడలు తెగులు, నారుకుళ్ళు వంటి తెగుళ్ళ నివారణలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని వేరుశనగ, అపరాలు, శనగ, పొగాకు, మిరప, టమాటో నారుమళ్ళు, చీనీ, బత్తాయి వంటి తోట పంటలలో వాడవచ్చును. ట్రైకోడెర్మా జీవ శిలీంధ్ర నాశినిని 2 కిలోలు, బాగా చివికిన పశువుల ఎరువు 90 కిలోలు మరియు 10 కిలోల వేపపిండి కలిపిన మిశ్రమములో బాగా కలిపి దానిపై గోనె సంచులు కప్పి 15 రోజులు వృద్ధి చేసి, తరువాత సుమారు ఎకరా నేలకు 200 కిలోలు ఈ మిశ్రమాన్ని ఆఖరి దుక్కిలో వేసుకొన్నట్లయితే భూమిలో ఉన్న హానికారక శిలీంధ్రాలు నియంత్రించబడి, పంట వేసినపుడు తెగుళ్ళు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ట్రైకోడెర్మా పొడిని కిలో విత్తనానికి 10 గ్రా. కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకొన్నట్లయితే పలు రకాల తెగుళ్ళ నుంచి పంటను రక్షించుకోవచ్చు. సూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్ బాక్టీరియాను వాడినట్లయితే ఇవి పంటను ఆశించే వివిధ రకాల తెగుళ్ళను నివారించడమే కాకుండా మొక్క పెరుగుదలకు అవసరమయిన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేసి దిగుబడి పెంచడానికి దోహదపడుతుంది. వరి పంటను ఆశించే వివిధ రకాల అగ్గి తెగులు మరియు కాండము కుళ్ళు నివారణకు సూడోమోనాస్ ఫ్లోరెసెన్స్ అనే బాక్టీరియా ఆధారిత జీవ రసాయనాన్ని 5 గ్రా. లీటరు నీటికి కలుపుకొని పిచికారి చేసుకొంటే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. సూడోమోనాస్ బాక్టీరియా సాధారణంగా వాడే పురుగు మందులతో మరియు ఇతర జీవనియంత్రనాలతో కలిపి వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

జీవసంబంధ క్రిమి సంహారక / శిలీంధ్ర నాశనుల మందుల కొనుగోలు మరియు వాడకంలో రైతు సోదరులు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు: ఉత్పత్తుల నాణ్యత పరంగా మరియు పర్యావరణ పరంగా జీవ సంబంధ క్రిమి సంహారక మందులు/ శిలీంధ్ర నాశనులు, రసాయనిక పురుగు మందుల కంటే శ్రేష్ఠమైనప్పటికి వీటికి నిల్వ ఉండే సామర్థ్యం చాలా తక్కువని చెప్పుకోవాలి. ఒక్క వైరస్ ద్రావకం తప్పించి మిగిలిన జీవరసాయనాలన్నీ 6 నెలల (టాల్క్ ఫార్ములేషన్) నుంచి అధికాధికంగా 1 సంవత్సరం (లిక్విడ్ ఫార్ములేషన్) కంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉండవు. కాబట్టి వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గాని, వాడుకొనేటపుడు గాని వాటి నిల్వ ఉంచే తేదీని పరిశీలించుకొని జాగ్రత్తపడాల్సిన అవసరం ఉంది. జీవరసాయనాలు అనుకున్నంత ప్రాచుర్యం లోనికి రాకపోవటానికి మరొక ముఖ్యకారణం నాణ్యతాపరంగా ఉన్న సమస్యలు. సరైన పద్ధతులు, నిర్దేశించబడిన పరికరాలు మరియు సామగ్రి వాడకుండా కొన్ని సంస్థలు నాణ్యతలేని జీవరసాయనాలను తయారుచేసి రైతులను మోసగించటం కూడా ఈ మధ్య కాలంలో గమనించటం జరిగినది. ఇటువంటి పోకడలను నియంత్రించి రైతాంగానికి నాణ్యత కలిగిన జీవరసాయనాలను అందించే ప్రక్రియలో భాగంగా పైన పేర్కొన్న జీవరసాయలన్నింటిని పురుగు మందుల చట్టం పరిధిలోనికి తేవటం జరిగింది. నకిలీ పురుగు మందులు పట్టుకొంటే ఏరకమైన శిక్షలు మరియు జరిమానాలు అమలులో ఉన్నాయో, అవన్నీ కూడా నకిలీ జీవరసాయనాలు అమ్మిన వ్యక్తులకు కూడా వర్తిస్తాయి. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఏ జీవరసాయనాన్ని తయారుచేయటం కానీ, నిల్వ ఉంచటం కానీ, అమ్మటం కానీ చేయటం జరిగితే చట్ట ప్రకారమైన చర్యలకు అవకాశమున్నది. రసాయనిక పురుగు మందులు కొనేటప్పుడు ఏవిధమైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నామో అవే జాగ్రత్తలు (ఉదాహరణకు పాకెట్‌పైన పంజీకరణ సంఖ్య, తయారీ తేదీ, ఎప్పటి వరకు నిల్వ ఉంచవచ్చు, వాడకంలో జాగ్రత్తలు, ఇత్యాది వివరాలు) జీవరసాయనాలు కొనేటప్పుడు కూడా రైతు సోదరులు పాటించాలి. తగిన రశీదు లేకుండా జీవరసాయనాలను కొనుగోలు చేయటం వలన నాణ్యతాపరంగా ఏదేని అనుమానాలు వచ్చినపుడు జవాబుదారీతనం ఉండకుండా పోతుంది. పై జాగ్రత్తలు తీసుకొన్నప్పటికీ నాణ్యతాపరంగా ఏదేని అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నాణ్యనియంత్రణ (Quality Cotrol) చేయించుకొని ముందుకు సాగినట్లైతే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని జీవ నియంత్రణ ప్రయోగశాల ఈ కేంద్రానికి సాంకేతిక సహాయం అందిస్తూ సమిష్టిగా రైతాంగానికి నాణ్యత గల జీవ రసాయనాలు అందించటంలో తమ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా జీవరసాయనాలను రైతు సోదరులు సమగ్ర సస్యరక్షణలో ఒక భాగంగా పొందు పర్చుకొని పంట పొలాలలో వాడుకున్నట్టయితే వీలైనంత వరకు తక్కువ పెట్టుబడితో పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుకొంటూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తూ ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చును.

జీవసంబంధ క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం ద్వారా చీడపీడల నియంత్రణపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మొక్కల తెగుళ్ళ శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.

సెల్ నెం : 97057 99100

ఆహార ఉత్పత్తుల్లో సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాలు భాద్యతాయుతంగా సస్యరక్షణ మందుల వాడకం

స్వాతంత్రం రాకముందు ఆహార పదార్థాలను దిగుమతి చేసుకునే స్థాయిలో ఉన్న మన దేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించటమే కాకుండా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదగటంలో 1960-80 దశకాల్లో శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలతో పాటు రసాయనిక సస్యరక్షణ మందులు మరియు ఎరువుల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది. మొదట్లో సస్యరక్షణ మందుల వాడకాన్ని నిర్దేశించే చట్టాలు లేవు. అయితే 1957-58 లో మన దేశం దిగుమతి చేసుకున్న గోధుమల్లో పురుగు మందు ప్రమాదవశాత్తు కలవటం వల్ల, ఆ గోధుమలు తిన్న కొంతమంది కేరళ, మద్రాసు రాష్ట్రాల్లో అస్వస్థతకి గురయ్యారు. అప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ప్రొఫెసర్ ఠాకూర్ గారి అధ్యక్షతన నిపుణుల కమిటీ వేశారు. తద్వారా "పురుగు మందుల చట్టం - 1968" రూపొందించటం జరిగింది. మానవులకు లేదా జంతువులకు ప్రమాదాన్ని నివారించే ఉద్దేశంతో పురుగు మందుల దిగుమతి, తయారీ, అమ్మకం, రవాణా, పంపిణీ మరియు వినియోగాన్ని నియంత్రించే చట్టంగా "పురుగు మందుల చట్టం" 1971 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి మన దేశంలో వివిధ రకాల పంటలపై వచ్చే కీటకాలు, తెగుళ్ళు, కలుపు నియంత్రణకు సస్యరక్షణ మందులు సిఫారసు చేయబడుతున్నాయి. ఈనాటి వరకు సెక్షన్ 9(3) ప్రకారం 318 రకాల సస్యరక్షణ మందులు నమోదు చేయబడ్డాయి. ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషణ చేసుకుంటూ కాలానుగుణంగా కొన్ని రకాల మందుల తయారీ, దిగుమతి మరియు వాడకాన్ని నిషేదించటమే కాకుండా కొత్తగా వచ్చే మందులని ఆమోదించటం కూడా జరుగుతుంది.

హరిత విప్లవం తర్వాత కాలానుగుణంగా వచ్చిన పంట మార్పులు, వాతావరణ మార్పుల ద్వారా ఉత్పన్నమైన చీడపీడల నివారణకు విచక్షణారహితంగా సస్యరక్షణ మందుల వాడకం వల్ల గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నాం. 1970 లో దేశంలో వ్యవసాయానికి 10 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సస్యరక్షణ మందుల మూల పదార్థం వాడగా, అదే 1990 లో 70 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సస్యరక్షణ మందులు వాడాము. తర్వాత శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన అనేక మంచి మార్పుల వల్ల తక్కువ మోతాదుతో మెరుగైన ఫలితాన్ని అందించే పర్యావరణ హిత మందులు రావటం వల్ల ఈ సంవత్సరం దాదాపు 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల మందులు వ్యవసాయంలో వాడాము.

గత మూడు దశాబ్దాలుగా విచక్షణా రహితంగా పంటలపై సస్యరక్షణ మందులు వాడటం వల్ల వచ్చిన అనర్థాలను అనేక రూపాల్లో చూడటం జరిగింది, ముఖ్యంగా జీవ సమతుల్యత దెబ్బతినటం వల్ల కొత్త రకాల పురుగులు, తెగుళ్ళు ఉద్భవించటం, పర్యావరణ కాలుష్యం వల్ల కొన్ని రకాల జీవ జాతులపై దుష్ప్రభావం, ఆహార పదార్థాల్లో సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాల వల్ల మానవ ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాలను చూశాం. మనం తినే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాలు ఉండటం వల్ల ప్రతి రోజూ కొంత సూక్ష్మ మొత్తాల్లో శరీరంలోకి ప్రవేశించటం వల్ల అనేక రకాల దీర్ఘకాలిక రుగ్మతలను కలుగచేస్తాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

మన దేశం ఆహార భద్రత సాధించటానికి సస్యరక్షణ మందుల పాత్ర ఎంతో ఉంది. అయితే వాటిని భాద్యతాయుతంగా వాడకపోవటం వల్ల వచ్చిన అనర్థాలను కూడా చూస్తున్నాం. 1995 లో ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ఆవిర్భవించిన తర్వాత అంతర్జాతీయంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వాణిజ్యంలో నాణ్యతా ప్రమాణాల ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. దీనిలో భాగంగా సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాలకి సంబంధించి వివిధ రకాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై

"గరిష్ఠ అవశేషాల పరిమితులను" (MRL) ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) మరియు ప్రపంచ వ్యవసాయ మరియు ఆహార సంస్థ (FAO) సంయుక్తంగా నిర్వహించే "కోడెక్స్ కమీషన్" వారు నిర్ధారిస్తున్నారు. అలాగే మన దేశంలో పురుగు మందుల చట్టం ప్రకారం సిఫారసు చేయబడిన వివిధ రకాల సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాల గరిష్ఠ పరిమితులను వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉన్న ఎఫ్.ఎస్.ఎస్.ఎ.ఐ. (FSSAI) వారు నిర్ధారిస్తారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో (ఎగుమతులు, దిగుమతులు) సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాలు పరిమితికి మించి ఉంటే ఆ ఉత్పత్తులు తిరస్కరించబడతాయి. గత రెండు దశాబ్దాలుగా మన దేశం నుంచి ఎగుమతి అయిన కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు (బియ్యం, కారంపొడి, ద్రాక్ష మొ॥) కొన్ని సార్లు సస్యరక్షణ మందుల అవశేషాల సమస్య వల్ల తిరస్కరించబడ్డాయి. ఆహార ఉత్పత్తుల స్వయం సమృద్ధి సాధించిన తర్వాత సురక్షితమైన ఆహారం మీద వినియోగదారుల ప్రాధాన్యత పెరిగింది. 2006 నుంచి భారత ప్రభుత్వం అనేక వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు పరిశోధనా సంస్థల సహకారంతో ప్రతి నెలా దేశంలో సేకరించిన నమూనాలని (కూరగాయలు, పండ్లు, బియ్యం, అపరాలు, గోధుమలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పాలు) అవశేషాల కొరకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. గత 15 ఏళ్ళుగా వచ్చిన ఫలితాలను గమనిస్తే దాదాపు 25 నుంచి 30 శాతం కూరగాయల నమూనాల్లో అవశేషాలు ఉన్నట్లు తేల్చారు. అయితే, వీటిలో 5 శాతం నమూనాల్లో అవశేషాలు పరిమితులకు మించి ఉన్నాయి.

మన రాష్ట్రంలో పండే ముఖ్యమైన మిర్చి, బియ్యం, మామిడి, పసుపు, కూరగాయల ఎగుమతి ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని వేల కోట్ల విదేశీ ధనాన్ని ఆర్జిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర వ్యవసాయ ప్రగతికి మరియు ప్రజలకు సురక్షితమైన ఆహారాన్ని అందించడానికి రైతాంగం భాద్యతాయుతంగా సస్యరక్షణ మందులను వినియోగించడంపై కొన్ని సూత్రాలను నిర్దేశించారు.

1. సిఫారసు చేయబడిన సస్యరక్షణ మందు మాత్రమే వాడాలి. (ఉదాహరణకు పురుగు మందు చట్టం ప్రకారం వరిలో సిఫారసు చేయబడిన పురుగు మందుల వివరాలను పట్టిక లో చూడగలరు.) **2.** మందు వాడే ముందు తప్పకుండా లేబుల్ కాగితం చదవాలి. (ఎనిమిది భాషల్లో వివరాలున్న ప్రతి డబ్బాతో వచ్చే, మడతలున్న లీఫ్‌లెట్ ని చదవాలి. ఏ పంటపై, ఏ చీడపీడలకి, ఎంత మోతాదులో వాడాలి, వాడిన తర్వాత పంట కోయడానికి ఎంత కాలం వేచి ఉండాలి లాంటి అత్యంత ముఖ్యమైన వివరాలు లీఫ్‌లెట్ లో ఉంటాయి.) **3.** మందు కలిపేటప్పుడు, పిచికారి చేసేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. **4.** మందు వాడిన తర్వాత పంట /కాయ కోయటానికి నిర్దేశించిన కాలం వేచియుండాలి. (ఉదాహరణకు పట్టిక లో వరి పంటపై సిఫారసు చేయబడిన వివరాలు ఉన్నాయి. లీఫ్‌లెట్ కాగితంలో చివరన కూడా ఈ వివరాలు ఉంటాయి.) **5.** కూరగాయల్లో మందు వాడిన తర్వాత కనీస '5' రోజుల తర్వాతనే పంట కోయాలి. **6.** పండ్ల తోటల్లో మందు వాడిన తర్వాత కనీసం '15' రోజుల తర్వాతనే పంట కోయాలి. **7.** కూరగాయల్లో "మోనోక్రోటోఫాస్" నిషేధం, కావున ఈ మందు వాడరాదు. **8.** ఆకుకూరల్లో పురుగు, తెగుళ్ళ మందులు వాడరాదు. **9.** వరిలో "ట్రైసైక్లోజోల్" మరియు "బుప్రొఫెజిన్" మందులను వాడరాదు. **10.** మార్కెట్‌లో కొన్న కూరగాయలను, ఆకుకూరలను, పండ్లను ఇంటిలో వాడే ముందు 2 శాతం ఉప్పు ద్రావణంతో కడగాలి.

కొన్ని ముఖ్యమైన మెళకువలను పాటిస్తూ భాద్యతాయుతంగా సస్యరక్షణ మందులని వాడినట్లయితే సస్యరక్షణ మందుల ప్రభావం నుంచి పర్యావరణాన్ని, అవశేషాలు లేని సురక్షితమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వాణిజ్య లావాదేవీల్లో మన దేశ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ఏ విధమైన ప్రతికూల ప్రభావం లేకుండా రక్షించుకొనవచ్చును.

పట్టిక : పురుగు మందు చట్టం ప్రకారం వరిలో సిఫారసు చేయబడిన పురుగు మందులు.

పురుగు మందు	పురుగు / తెగులు పేరు	గ్రాములు మూల పదార్థం హెక్టారుకి	మందు వాడిన తర్వాత పంట కోయటానికి వేచి ఉండాల్సిన కాలము (రోజుల్లో)
అసిఫేట్ 75% ఎస్.పి.	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, దీపం పురుగులు	500-750	15
అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్.పి.	సుడిదోమ	10-20	7
బెన్‌ఫురాకార్బ్ గుళికలు 3% జి.ఆర్.	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, సుడిదోమ	1000	20
బెంజిపైరిమొక్సాన్ 10 ఎస్.సి.	సుడిదోమ	75-100	31
బైఫెన్‌థియురాన్ 8.8% సి.ఎస్.	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	44	21
బైఫెన్‌థియురాన్ 10% ఇ.సి.	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, దీపం పురుగులు	50	21
కార్బోఫ్యూరాన్ గుళికలు 3% సి.జి.	సుడిదోమ, ఉల్లికోడు, కాండం తొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు, తాటాకు తెగులు	750	-
కార్బోసల్ఫాన్ గుళికలు 6% సి.జి.	ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు, తాటాకు తెగులు, ఆకుముడత	1000	37
కార్బోసల్ఫాన్ 25% ఇ.సి.	ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు, తాటాకు తెగులు, ఆకుముడత, సుడిదోమ	200-250	14
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ గుళికలు 4% జి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	750-1000	-
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% ఎస్.పి.	కాండంతొలుచు పురుగు	318-375	35-89
క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.సి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	30	47
క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 0.4% జి.ఆర్.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	40	53
క్లోరిపైరిఫాస్ 10% జి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, ఉల్లికోడు	1000	30
క్లోరిపైరిఫాస్ 75% డబ్ల్యూ.జి.	కాండంతొలుచు పురుగు	375-400	15
క్లోరిపైరిఫాస్ 20% ఇ.సి.	తాటాకు తెగులు , ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు	250-375	15
క్లోరిపైరిఫాస్ 50% ఇ.సి.	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు	375-400	15

క్రొమాఫెనోజైడ్ 80% డబ్ల్యూ.పి.	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు	75-100	32
క్లోథియానిడిన్ 50% డబ్ల్యూ.డి.జి.	సుడిదోమ	10-12	12
సయాంట్రనిలిప్రోల్ + లుఫెనురాన్ (16.9% + 16.9% ఎస్.సి.)	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు	20 (10+10)	39
డెల్టామెత్రిన్ 11% ఇ.సి.	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు	15	13
డెల్టామెత్రిన్ 1.8% ఇ.సి	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు	10-12.5	7
డైనోటెఫ్యురాన్ 20% ఎస్.జి.	సుడి దోమ	30-40	21
ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 1.9%ఇ.సి.	ఆకుముడత, తాటాకు తెగులు	8	48
ఏథోఫెన్‌ప్రాక్స్ 10% ఇ.సి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు, ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు, ఉల్లికోడు	50-75	15
ఫెనోబుకార్బ్ 50% ఇ.సి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	250-750	30
ఫెన్‌ప్రొపాత్రిన్ 30% ఇ.సి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	100	30
ఫెన్‌ప్రొపాత్రిన్ 10% ఇ.డబ్ల్యూ.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	100	58
ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్.సి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు, కాండం తొలుచు పురుగు, ఉల్లికోడు	50-75	32
ఫిప్రోనిల్ 18.87% ఎస్.సి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు	50	46
ఫిప్రోనిల్ గుళికలు 0.3% జి.ఆర్.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు, ఉల్లికోడు	50-75	32
ఫిప్రోనిల్ 80% డబ్ల్యూ.జి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	40-50	19
ఫ్లొనికామిడ్ 50% డబ్ల్యూ.జి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	75	36
ఫ్లూబెండియమైడ్ 20% డబ్ల్యూ.జి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	25	30
ఫ్లూబెండియమైడ్ 39.35% ఎస్.సి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	24	40
ఫ్లూబెండియమైడ్ గుళికలు0.7%జి.ఆర్.	కాండంతొలుచు పురుగు	85-100	25
ఫ్లుపైరిమిన్ గుళికలు 2% జి.ఆర్.	కాండంతొలుచు పురుగు, సుడి దోమ	100-150	77
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70% డబ్ల్యూ.జి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	21-24.5	7
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎస్.సి.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	21-26.2	37
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్.	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	22-25	40
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3% జి.ఆర్.	కాండంతొలుచు పురుగు	45	26

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.1% ఇ.సి	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	60	39
ఇండాక్సికార్బ్ 15.8% ఇ.సి.	ఆకుముడత	30	14
లాంబ్డా సైహలోత్రిన్ 2.5% ఇ.సి.	తాటాకు తెగులు , ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు	12.5	15
లాంబ్డా సైహలోత్రిన్ 5% ఇ.సి.	తాటాకు తెగులు , ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు	12.5	15
మోనోక్రోటోఫాస్ 36% ఎస్.ఎల్.	ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు	250-500	-
ఫెంథయోట్ 50% ఇ.సి.	గొట్టపు పురుగు	500	-
పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యూ.జి.	సుడిదోమ	150	19
క్వినాల్ఫాస్ 25% ఇ.సి.	సుడిదోమ, తాటాకు తెగులు, కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	325-500	40
క్వినాల్ఫాస్ 1.5% డి.పి.	సుడిదోమ	300	40
టెట్రానిలిప్రొల్ 18.18% ఎస్.సి.	కాండంతొలుచుపురుగు, ఆకుముడత	50-60	43
థయోక్లోప్రిడ్ 21.7% ఎస్.సి.	కాండంతొలుచు పురుగు	120	30
థయోసైక్లం హైడ్రోజన్ అక్సలేట్ 50% ఎస్.పి.	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	500	30
థయోమిథాక్సామ్ 70% డబ్ల్యూ.ఎస్	దీపం పురుగులు, తామర పురుగులు	105	-
థయోమిథాక్సామ్ 75% ఎస్.జి.	దీపం పురుగులు, సుడిదోమ	113	60
థయోమిథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యూ.జి.	ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కాండంతొలుచు పురుగు, దీపం పురుగులు, సుడిదోమ	25	14
అసిఫేట్ + ఫిప్రోనిల్ (50%+5% డబ్ల్యూ.డి.జి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, సుడిదోమ	500+50	27
అసిఫేట్ + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (50%+1.8% ఎస్.పి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	518	-
అసిటామిప్రిడ్ + క్లోరోపైరిఫాస్ (0.4%+20% ఇ.సి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	10+500	10
బైఫెంథ్రిన్ + క్లోరోపైరిఫాస్ (3%+30% ఇ.సి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	24+240 - 30+300	21
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ + ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ (7.5%+0.25% జి.ఆర్.)	కాండంతొలుచు పురుగు	18.75+562	35

కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ + ఫిప్రోనిల్ (4+0.5% సి.జి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	675-900	27
సైపర్‌మెత్రిన్ + ఇండాక్సికార్బ్ (10+10%)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	37.5+37.5	37
క్లోరిపైరిఫాస్ + సైపర్‌మెత్రిన్ (50+5% ఇ.సి.)	కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	312+32 - 375+38	15
డైనోటెఫ్యురాన్ + అసిఫేట్ (4+50% ఎస్.జి.)	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	35+400	28
డైనోటెఫ్యురాన్ + పైమెట్రోజిన్ (15+45% డబ్ల్యూ.జి.)	సుడిదోమ, దీపంపురుగులు, కంకి పురుగు	200	24
ఇథిప్రోల్ + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (40+40% డబ్ల్యూ.జి.)	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	50+50	15
ఫిప్రోనిల్ + థయామిథాక్సామ్ (4+4% ఎస్.సి.)	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు	44+44	45
ఫిప్రోనిల్ + ఫ్లూనికామైడ్ (15+15% డబ్ల్యూ.డి.జి.)	సుడిదోమ, దీపం పురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	60+60	33
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ + లాంబ్డా సెహలోత్రిన్ (6+4% ఎస్.ఎల్.)	దీపంపురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత కంకి పురుగు, తాటాకు తెగులు	18+12	10
నొవాల్యురాన్ + ఇండాక్సికార్బ్ (5.25+4.5% ఎస్.సి.)	ఆకుముడత, కాండంతొలుచు పురుగు	22.97+19.69	40
ఫెంథయోట్ + సైపర్‌మెత్రిన్ (45+6% ఇ.సి.)	దీపం పురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుముడత	450+60	-
అసిటామిప్రిడ్ + క్లోరిపైరిఫాస్ (0.4+20% ఇ.సి.)	సుడిదోమ, దీపంపురుగులు, కాండంతొలుచు పురుగు	10+500	10
క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ + లాంబ్డా సెహలొత్రిన్ (9.3+4.6% జెడ్.సి.)	దీపం పురుగులు , ఆకుముడత కాండంతొలుచు పురుగు	28-35	53
క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్+థయోమిథాక్సామ్ (0.5 +1% జి.ఆర్.)	దీపం పురుగులు , ఆకుముడత, కాండంతొలుచుపురుగు, సుడిదోమ	30+60	60

ఈ విషయాలపై మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది అడ్రసును సంప్రదించగలరు :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం) & డీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్,

పరిపాలనా భవనం, లాం, గుంటూరు. సెల్ నెం : 94410 26576

తేనెటీగల పెంపకంలో మెళకువలు

మానవునికి మేలుచేయు కీటకాలలో అతిముఖ్యమైనవి తేనెటీగలు. వీటి నుండి తేనె మాత్రమే కాకుండ ఇతర ముఖ్యమైన ఉప ఉత్పత్తులు మైనము, పుప్పొడి, రాజాహరం, విషం మరియు ప్రాపోలిస్ లభ్యమౌతాయి. మధురమైన తేనె మానవునికి సమతులాహారాన్ని అందించటమే కాకుండా మిగిలిన ఉప ఉత్పత్తుల ఇతర పరిశ్రమల (కాస్మెటిక్) స్థాపనకు కూడ ఉపయోగపడుతాయి. అంతేకాకుండ పంటలలో పరపరాగ సంపర్కము జరిగి అధిక దిగుబడులు రావడానికి తేనెటీగలు ఉపయోగపడతాయి.

తేనెటీగల జాతులు : తేనెటీగల్లో నాలుగు జాతులు ఉన్నాయి. అవి

1. కొండతేనెటీగలు : ఎపిస్ డోర్సేటా, 2. చిన్న / విసనకర్ర తేనెటీగలు : ఎపిస్ ఫ్లోరియా, 3. పుట్ట తేనెటీగలు : ఎపిస్ సెరేనా ఇండికా, 4. ఐరోపా తేనెటీగలు : ఎపిస్ మెల్లిపెరా. మొదటి రెండు రకాలు పెంచటానికి అనుకూలమైనవి కావు. చివరి రెండింటిని పెంచవచ్చు. తేనెటీగలు సంఘజీవులు. ప్రతి తేనెపట్టులో ఒక రాణి ఈగ, కొన్ని వందల పోతుటీగలు, కొన్నివేల కూలి ఈగలు కలిసి జీవిస్తాయి. క్రింది లక్షణాలను బట్టి ఈ మూడు రకాల ఈగలను గుర్తించవచ్చు.

వ.సం.	లక్షణం	రాణి ఈగ	పోతుటీగ	కూలి ఈగ
1	పరిమాణం	కూలి/పోతుటీగల కన్నా పొడవైనది	రాణి ఈగ కన్నా చిన్నది, కూలి ఈగ కన్నా పొడవైనది. వెడల్పుగా దృఢంగా ఉంటుంది.	కూలి/పోతుటీగల కన్నా చిన్నది.
2	కళ్ళు	తలపై ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉంటాయి.	మూత్రపిండాకారం గలిగి, ఒక దానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయి.	తలపై ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉంటాయి.
3	ఉదరం	మెరిసే బంగారువన్నె కలిగి, చివరి వైపుకు క్రమేపి సన్నబడుతుంది. పొడవు ఎక్కువ.	చివర గుండ్రంగా వెంట్రుకలు కలిగి ఉంటాయి.	నల్లటి చారలు కలిగి ఉంటుంది.
4	రెక్కలు ఉదరాన్ని	కొంత వరకు కప్పుతాయి.	పూర్తిగా కప్పుతాయి	పూర్తిగా కప్పుతాయి
5	నోటి భాగాలు మకరందం సేకరణకు	అనువుగా ఉండవు.	అనువుగా ఉండవు.	అనువుగా ఉంటాయి.
6	వెనుక జత కాళ్ళు పుప్పొడి సేకరణకు	అనువుగా ఉండవు.	అనువుగా ఉండవు.	అనువుగా ఉంటాయి.
7	విషపు కొండి	ప్రత్యర్థి రాణిని కుట్టడానికి ఉపయోగిస్తుంది.	ఉండదు.	రక్షణకు ఉపయోగిస్తుంది.
8	మైనపు గదులు	పొడిగా ఉంటాయి.	కూలిఈగ గది కన్నా ఎత్తుగా ఉండి కుంభాకారంలో మైనంతో కప్పబడి ఉంటాయి.	సమాంతరంగా మైనంతో కప్పబడి ఉంటాయి.

తేనెటీగల రకాలు – తేనెపట్టు నిర్వహణ

రాణి ఈగ : ఇది సంపూర్ణంగా వృద్ధి చెందిన ఆడ ఈగ. జీవిత కాలంలో ఒకేసారి గాలిలో పోతుటీగతో సంపర్కం జరుపుతుంది. అపుడు తన జీవిత కాలమంతా సరిపడా మగ బీజ కణాలను గ్రహించి, బీజ కోశంలో నిలువచేసుకుంటుంది.

రాణి ఈగ ముఖ్య కర్తవ్యం గుడ్లుపెట్టడం, పట్టు అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర వహించడం. రాణి ఈగ ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లను పెట్టడం విశేషం. ఫలదీకరణం చెందిన గుడ్లు కూలి ఈగలుగా, ఫలదీకరణం చెందని గుడ్లు పోతుటీగలుగాను వృద్ధి చెందుతాయి. రాణి ఈగ తన జీవితకాలమంత కూలి ఈగలు ఉత్పత్తి చేసే రాజాహారంతో బతుకుతుంది.

పోతు టీగలు : రాణి ఈగతో సంపర్కం చేయటం తప్ప, ఇతర పనులు చేయవు. జీవితకాలం 2–3 నెలలు.

కూలి ఈగలు : ఇవి సంపూర్ణంగా వృద్ధి చెందని ఆడ ఈగలు. పునరుత్పత్తి తప్ప, తేనెపట్టులోని పనులన్ని ఇవే చేస్తాయి. ఆరువారాలు జీవిస్తాయి. మొదటి మూడు వారాలు పట్టు లోపలి పనులు అనగా మైనపు గదులను శుభ్రపరచటం, లద్దెపురుగులకు ఆహారాన్నందించటం, మైనపు గదులను నిర్మించటం తరువాత మూడు వారాలు పట్టు వెలుపలి పనులు అనగా శత్రువుల నుండి పట్టును రక్షించటం, పుప్పొడి, మకరందం, నీరు సేకరించే బాధ్యతలను నిర్వహిస్తాయి.

జీవిత చక్రం : తేనెటీగల జీవితంలో నాలుగు దశలుంటాయి. అవి గుడ్డు, లద్దె పురుగు, కోశస్థదశ మరియు రెక్కల పురుగు / ఈగదశ.

తేనెటీగలు వివిధ దశల్లో గడిపే సమయం (రోజుల్లో)

దశలు	రాణి ఈగ	కూలి ఈగ	పోతుటీగ
గుడ్డు	3	3	3
లద్దెపురుగు	5	5–6	7
కోశస్థ దశ	7–8	11–12	14
ఈగ వెలువడటం	16 వ రోజు	21 వ రోజు	24 వ రోజు

తేనెటీగల పెంపకానికవసరమైన పరికరాలు

1. **తేనెటీగల పెట్టె :** ఇది తేనెటీగల గృహం. దీనిలోని భాగాలు

   అడుగుబల్ల : ఇది పెట్టె క్రింది భాగం. తేనెటీగలు పెరిగే అరక్రిందివైపు మూయటానికి ఉపయోగపడ్తుంది. ఈగలు పెట్టె నుండి వెలుపలికి వెళ్ళటానికి, లోపలికి రావటానికి అనువుగా దీని ముందు భాగంలో చిన్న ద్వారముంటుంది. తేనెటీగలు పెరిగే అరకన్నా, ఇది 10 సెం.మీ. పొడవుగా ఉంటుంది. అందువలన పెట్టె లోపలికి గాని, వెలుపలికి గాని వెళ్ళే ముందు తేనెటీగలు కొద్దిసేపు ఆగటానికనువుగా ఉంటుంది. ద్వారంవైపు వాలు ఉండేటట్లు అమర్చాలి. అందువలన వర్షపు నీరు పెట్టె లోపలికి ప్రవేశించదు.

తేనెటీగలు పెరిగే అర : ఇది నలువైపుల మూయబడి, క్రింది మరియు పై భాగం తెరవబడి ఉంటుంది. తేనెటీగలు పెరిగే చట్రాలు అమర్చటానికి వీలుగా ఉంటుంది. పుట్ట తేనెటీగల పెట్టెలో 8 చట్రాలు, ఐరోపా తేనెటీగల పెట్టెలో 10 చట్రాలు అమర్చవచ్చు.

తేనెటీగల చట్రాలు : ప్రతి చట్రంలో పైన ఒక బద్ద, పక్కన రెండు బద్దలు, క్రింద ఒక బద్ద ఉంటాయి. పై బద్ద క్రింది బద్ద కన్నా పొడవుగా ఉండి, తేనెటీగలు పెరిగే అరలో అమర్చినపుడు వేలాడటానికి అనువుగా ఉంటుంది. తేనెటీగలు దీనిపై మైనంతో షడ్భుజాకారపు గదులు నిర్మిస్తాయి. అవి తేనెటీగల సంతానోత్పత్తికి, పుప్పొడి, మకరందం నిలువచేయటానికి ఉపయోగపడతాయి.

తేనె నిల్వచేసే అర : ఇది తేనెటీగలు పెరిగే అరను పోలి ఉంటుంది. తేనె చట్రాలు అమర్చటానికనువుగా ఉంటుంది. ఐరోపా తేనెటీగల పెట్టెలో తేనెటీగలు పెరిగే అర మరియు తేనె నిల్వ చేసే అర ఒకే పరిమాణంలో ఉంటాయి. కాని పుట్ట తేనెటీగల పెట్టెలో తేనె నిలువచేసే అర, ఈగలు పెరిగే అరకన్నా చిన్నది. మకరందం సమృద్ధిగా లభించే సమయంలో దీనిని తేనెటీగలు పెరిగే అరపై అమర్చాలి.

తేనెచట్రం : ఇది తేనెటీగల చట్రాన్ని పోలి ఉంటుంది. దీని మధ్యలో మైనంతో షడ్భుజాకారపు గదులు నిర్మించి తేనెను నిల్వచేస్తాయి.

లోపలి మూత : ఇది తేనెటీగలు పెరిగే అర / తేనె నిల్వచేసే అర పై భాగం మూయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మధ్యలో ఇనుపజల్లెడ అమర్చిన రంధ్రం గాలి ప్రసరణకు అనువుగా ఉంటుంది.

పై మూత : ఇది తేనెపట్టును ఎండ, వాన, గాలి నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. దీనికి రెండు వైపుల జల్లెడతో కప్పబడిన రంధ్రాలు గాలి ప్రసరణకుపయోగపడతాయి.

డమ్మీ బోర్డు : ఇది తేనెటీగల చట్రం పరిమాణంలో ఉంటుంది. పెట్టెలో చట్రాల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నపుడు దీనిని అమర్చాలి. అందువలన పెట్టెలోని ఉష్ణోగ్రతను తేనెటీగలకనువుగా క్రమబద్ధీకరించుకుంటాయి.

2. స్టాండు : దీనిపై తేనెటీగల పెట్టె అమర్చినపుడు, పెట్టె నలువైపులకు గాలి ప్రసరణ అనువుగా ఉంటుంది. పెట్టెలను వర్షపునీరు నుండి రక్షిస్తుంది.

3. రాణిని వేరు పరిచే జల్లెడ : ఇది తేనెటీగల పెరిగే అర నుండి రాణి ఈగ తేనె అరలోనికి ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తుంది. అందువలన రాణి ఈగ తేనె అరలో గుడ్లు పెట్టలేదు. కూలి ఈగలు మాత్రం ఒక అర నుండి రెండవ అరలోనికి తిరగటానికవకాశముంటుంది.

4. పొగడబ్బా : ఇది ఈగలపై పొగ బారించటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువలన పెట్టెలోని ఈగల కరకుతనం తగ్గి, పరిశీలించటానికనువుగా ఉంటుంది.

5. ముసుగు : ఇది ముఖంపై తేనెటీగలు కుట్టకుండా ఉపయోగపడుతుంది.

6. చేతి తొడుగులు : ఇవి ఈగలు చేతులకు కుట్టకుండా ఉపయోగించవచ్చు.

7. ప్లాస్టిక్ డబ్బా : మకరందం లభించనప్పుడు, పంచదార పాకం ఈగలకు పట్టటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

8. తేనెతీసే యంత్రం : తేనె చట్రంలో మైనపు అట్టలు చెడకుండా తేనె తీయటానికుపయోగపడుతుంది. ఐరోపా/పుట్ట తేనెటీగల చట్రాలనుండి తేనె తీయటానికి వేరు వేరు పరిమాణాలు గల యంత్రం అవసరం.

9. గిన్నెలు : వీటినే యాట్‌వెల్స్ అనికూడా పిలుస్తారు. ఈ గిన్నెల్లో పరిశుభ్రమైన నీరు పోసివుంచాలి. తేనెటీగలకు వీటినుంచి నీరు లభించటమేకాకుండా చీమలు మరియు చెదలు బారి నుండి రక్షణకు కూడా ఈ గిన్నెలు ఉపయోగపడతాయి. ఈ గిన్నెలను స్టాండు క్రింద అమర్చాలి.

అనువైన ప్రదేశం : వివిధ రకాల పుష్పాల్లో లభించే పుప్పొడి, మకరందం తేనెటీగల ఆహారం. పుప్పొడి, మకరందం అందించగల పైరులు/మొక్కలు/తోటలున్న ప్రదేశం తేనెటీగల పెంపకానికనువైనది. అందువలన, తేనెటీగల పెంపకానికి ముందుగా పుప్పొడి, మకరందం అందించే మొక్కలను గుర్తించి పూర్తి అవగాహన ఏర్పరుచుకోవాలి.

సం.	మొక్క పేరు	మకరందం / పుప్పొడి	మకరందం	పుప్పొడి
1	ఫలమొక్కలు	నిమ్మ, నారింజ, బత్తాయి, జీడిమామిడి, అరటి, దానిమ్మ, తాడి, పుచ్చ, రేగు	ఉసిరి, నేరేడు, వెలగ, గానుగ, కుంకుడు, టేకు, యూకలిప్టస్, ములగ	కొబ్బరి, పామాయిల్, జామ
2	కూరగాయలు	దోస, గుమ్మడి, బీర, పొట్ల, కాకర	–	వంగ, మిరప, టమాట్లో
3	సుగంధ ద్రవ్యాలు	–	ధనియాలు, ఉల్లి	–
4	నూనె గింజలు	ప్రొద్దుతిరుగుడు, ఆవాలు, నువ్వులు, కుసుమలు	–	ఆముదం
5	అపరాలు	పెసర, మినుము, కంది బఠాణి, పిల్లిపెసర, ఉలవ	–	–
6	ధాన్యాలు	–	–	జొన్న, మొక్కజొన్న, సజ్జ, కొర్ర
7	కలుపు మొక్కలు	గడ్డి చామంతి, వామిటి, పల్లేరు, ఉత్తరేణి, తుత్తుర బెండ	–	–
8	ఇతరజాతి మొక్కలు	జనుము, వేప, బ్రెజిల్ మొక్క	–	–

తేనెటీగల యాజమాన్యం

ఈ క్రింది సూచించిన విషయాలు దృష్టిలో వుంచుకొని, పాటించి తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా లాభము పొందవచ్చు.

ఎ. మంచి స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకొనడం :

1. తేనెటీగల పెంపకమును ప్రారంభించబోయే స్థలంలో తగినన్ని పుష్పజాతులుండి అవి ఎక్కువ మకరందమును మరియు పుప్పొడిని తేనెటీగలకు అందించగల్గేలా వుండాలి.
2. ఆ ప్రాంతము రోడ్డు మార్గం ద్వారా సులువుగా చేరుకునేలాగ వుండాలి.
3. చిత్తడి లేకుండా పొడిగా వుండాలి.
4. నేలపై ఎండు ఆకులు, పుల్లలు లేకుండా చేసుకోవాలి లేనిచో ఎండాకాలం అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చును.
5. విద్యుత్ స్టేషన్‌లకు, ఇటుకబట్టీలకు మరియు రైల్వే ట్రాకుకు దూరంగా తేనె పెట్టెలు పెట్టుకోవాలి.
6. స్వచ్ఛమైన పారే నీరు దగ్గరలో తేనెటీగలకు లభ్యమయ్యేలా వుండాలి.
7. పెనుగాలుల నుండి ఈదురు గాలుల నుండి తేనె పట్టుల రక్షణ కొరకు సహజసిద్ధమైన లేక కృత్రిమంగా పెంచిన వృక్షాలు వుండాలి.
8. ఉదయకాలపు మరియు సాయంత్రపు సూర్యరశ్మి ఆ ప్రాంతంలో పడేలా వుండాలి.
9. వ్యాపార సరళిలో పెంచే తేనె పట్టులు ఒక యూనిట్ నుండి మరొక యూనిట్‌కి కనీసం 2-3 కి.మీ. దూరం ఉండాలి.
10. నిల్వ యున్న మురికి నీటి గుంటలు, రసాయనాలు తయారుచేసే పరిశ్రమలు మరియు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రాంతాలలో తేనె పట్టులు పెట్టుకొనరాదు.

బి. మంచి లక్షణాలున్న తేనెటీగల ఎంపిక :

తేనె టీగల పెంపకాన్ని రెండు రకాల తేనె టీగలతో ప్రారంభించుకొనవచ్చును. అవి ఏమనగా పుట్ట తేనెటీగలు మరియు ఐరోపా తేనెటీగలు. తేనె పరిశ్రమను ప్రారంభించబోయే స్థలంలో లభించే పుష్ప జాతులను బట్టి, రైతుల ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి రెండు జాతులలో ఒక దానిని ఎంపిక చేసుకొనవచ్చును. కాని తేనె పరిశ్రమలో రాణించాలంటే రెండు జాతులలోనూ నాణ్యమైన తేనె టీగలు మరియు ప్రత్యేకంగా రాణి ఈగను బట్టి వుంటుంది. పుట్ట తేనెటీగల ఒక్కొక్క పట్టు నుండి సంవత్సరానికి 5 - 6 కిలోల తేనె లభిస్తుంది. అదే ఐరోపా తేనె పట్టు ఒక్కొక్కటి 15-20 కిలోల తేనెను సంవత్సరానికి ఇస్తుంది. పట్టులను ఒకచోట నుండి మరొక చోటికి మార్చుతూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ తేనె దిగుబడి ఐరోపా పట్టుల నుండి పొందవచ్చును.

మంచి తేనెటీగల మరియు రాణి ఈగ ఎంపిక :

1. తేనెటీగల పెంపకంలో శిక్షణ పొందిన తరువాత, తేనెటీగల పెంపకం దారులవద్ద నుండి వ్యాధి సోకని తేనెపట్టులను కొనుగోలు చేసుకొనవలెను.
2. తేనె దిగుబడిని ఎక్కువగానిచ్చే వ్యాధి నిరోధక శక్తిగల, ఎక్కువ గుడ్లు పెట్టే లేత వయస్సుగల రాణి ఈగ పట్టునుండి మాత్రమే పట్టులను అభివృద్ధి పరచుకొనవలెను.
3. మంచి ఫలవంతమైన రాణి ఈగలను పట్టులలో వుంచుకొనవలెను.
4. ఇన్ బ్రీడింగ్‌ను నివారించుకొనుటకుగాను ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా పెరిగే పట్టులను పెంచుకొని అభివృద్ధి చేసుకొనవలెను.

సి. తేనె పట్టుల యాజమాన్యము

1. BIS / ISI ప్రమాణములతో స్థానికంగా లభించే తక్కువ బరువు గల దారువు (season wood) గల చెక్కతో తేనె పెట్టెలను చేయించుకొనవలెను.
2. అడుగుబల్లను, పిల్లల గదితో కలిపి మేకులు కొట్టరాదు.
3. ఒక నిర్ణీత ప్రాంతంలో 50–100 వరకు మాత్రమే తేనె పట్టులుండేలా చూసుకోవాలి.
4. ప్రతి వరుసకు మరియు తేనె పెట్టెకు, తేనె పెట్టెకు మధ్య దూరం 10 మీటర్లు మరియు 3 మీ॥ ఎడంవుండేలా పట్టులను అమర్చుకోవాలి.
5. మితిమీరిన సంఖ్యలో తేనె పట్టులను ఒక ప్రాంతంలో పెట్టరాదు.

తేనెపట్టు తనిఖీ / పరిశీలన

1. తరుచుగా అడుగుబల్లలను, పై మూతను శుభ్రం చేసుకొనుట ద్వారా, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించుట ద్వారా తేనెటీగలు పెంచే ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా వుంచుకోవాలి.
2. క్రమముగా పట్టులను పరిశీలించి, పట్టులలో ఏదైనా అసాధారణ పరిస్థితిని లేదా తేనెటీగల ప్రవర్తనలో ఏవైనా మార్పులుంటే వెంటనే తెలుసుకొనవలెను.
3. పట్టుల పరిశీలనకు 20 మరియు 30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత గల దినాలలో చేపట్టవలెను.
4. చలిగా, గాలి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు మరియు మబ్బులు వున్నపుడు పట్టులను పరిశీలించరాదు.
5. తేనెటీగలు కుట్టే స్వభావాన్ని అణచుటకు అవసరమైనపుడు మాత్రమే పొగనువాడాలి.
6. పట్టులలోని ఫ్రేములను తీసేటపుడు కుదుపులతో కాకుండా, నెమ్మదిగా తీసి పరిశీలించుకొనవలెను.
7. తేనె పట్టులను పరిశీలించినపుడు ఫ్రేముల మధ్య ఈగల నలిగిపోకుండా చూసుకోవాలి. లేనిచో పట్టులోని ఈగలు కుట్టడానికి దారితీస్తుంది.

8. వ్యాధి సోకిన పట్టులను, ఆరోగ్యకరమైన పట్టుల నుండి వేరుచేసుకోవాలి.

9. ఆరోగ్యకరమైన మరియు వ్యాధి గల పట్టులను విడివిడిగా పరిశీలించుకొనవలెను.

10. తగిన రక్షణనిచ్చే దుస్తులు మరియు ముసుగును ధరించి పట్టులను పరిశీలించుకొనవలెను.

డి. తాజా మంచి నీటి ఏర్పాటు

ఆరోగ్యకరమైన తేనె పట్టులను కల్గియుండాలంటే లోతులేని పళ్ళాలను తాజా నీటితో నింపి ఎల్లప్పుడూ తేనెటీగలను అందుబాటులో వుంచాలి. ఎందుకనగా నీరు ఈ క్రింది విధముగా తేనెటీగలకు ఉపయోగపడుతుంది.

1. తేనె పట్టులలో తగినంత తేమను కల్పించి తద్వారా పట్టులోని గ్రుడ్లు పొదగబడడానికి దోహదపడుతుంది.

2. తేనె మరియు పుప్పొడి మిశ్రమాన్ని తగిన పాకంలో లేత కూలి ఈగలు తయారుచేసుకొనటానికి నీరు అవసరం ఉంటుంది. ఇలా తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని లేత కూలి ఈగలు పట్టులోని లద్దెపురుగులకు ఆహారంగా అందిస్తాయి.

3. తేనె పట్టులు పెట్టుకున్న ప్రాంతంలో 37 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత పెరిగినపుడు తేనె టీగలు నీటి నుండి ఆవిరిని తయారుచేసి పట్టును చల్లపరచుకుంటాయి.

ఇ. పుప్పొడి మరియు మకరందము లభించని కరవుకాలంలో తేనెటీగల యాజమాన్యం

1. తేనె పట్టులలో మకరందము/తేనె, నిల్వలు తగినన్ని లేనపుడు మరియు ఆ ప్రాంతంలో మకరందము లభ్యం కానపుడు 50 శాతం పంచదార పాకాన్ని పట్టులకు అందించాలి.

2. పంచదార పాకంను పట్టులకు ఇచ్చినపుడు తేనె టీగలు పాకంలో మునిగి చనిపోవుటను నివారించుకొనుటకు గాను పాకంను లోతులేని పళ్ళాలలో పోసి గడ్డిని పాకంలో వుంచుట ద్వారా తేనెటీగలు గడ్డిమీద కూర్చొని సులువుగా పాకాన్ని తీసుకుంటాయి.

3. ఆరుబయట పంచదార పాకాన్ని తయారుచేయకూడదు. దోచుకొనబడడాన్ని మరియు చీమల బారిన పట్టులు పడకుండా వుండునట్లు తేనె పట్టుల ప్రాంతంలో పాకం ఒలికిపోకుండా చూసుకోవాలి.

4. ప్రొద్దుగుంకిన తర్వాత మాత్రమే పట్టులకు పంచదార పాకాన్ని అందివ్వాలి.

5. పట్టులన్నింటికీ ఒకేసారి పంచదార పాకాన్ని ఇవ్వాలి.

6. పట్టులకు తేనెను గాని, తేనె కలిపిన పంచదార పాకాన్ని గాని ఇవ్వరాదు.

7. క్రొవ్వులేని సోయాపిండి : 3 పాళ్ళు బ్రూయర్స్ ఈస్ట్ : 1 పాలు
స్కిం పాలపొడి : 1 పాలు పంచదార : 22 పాళ్ళు

తేనె : 50 పాళ్ళ నిష్పత్తితో చేయబడిన పదార్థమును పుప్పొడికి బదులుగా పుప్పొడి నిల్వలు తగినన్ని లేని మరియు పుప్పొడి లభ్యంకాని సీజనులో పట్టలకు అందించాలి.

8. గంధకపు పొడితో పొగబారించిన ఖాళీ మైనపు అట్లను గాలి చొరవని గదులలో ఎప్పటికప్పుడు భద్రపరచుకొనవలెను.

9. పాతబడిన నల్లగా మారిన మైనపు అట్టలను తొలగించుకొనవలెను.

ఎఫ్. పట్టును వలస తీసుకొని పోవునపుడు తీసికొనవలసిన జాగ్రత్తలు

1. పట్టలకు ఆహారం లభ్యంకాని ప్రదేశం నుండి సమృద్ధిగా ఆహారం (పుప్పొడి, మకరందము) లభించే ప్రాంతాలకు మార్చుకొనవలెను.

2. పట్టలను మార్చుటకు ముందు ఆయా ప్రాంతాలను సర్వే చేసుకొని అక్కడ తేనెటీగలకు లభ్యమయ్యే పంటలను అంచనా వేసుకోవాలి.

3. పట్టలను మరియొక చోటికి మార్చుటకు ముందు, సాయంకాలం కూలి ఈగలన్నీ పట్టుకు చేరుకున్న తర్వాత తేనెపట్టు ద్వారములను మూసి వేయాలి.

4. తేనె పెట్టె లోపలి భాగాన్ని వెలుపలి భాగాన్ని సరియైన విధంగా ప్యాకింగ్ చేసుకొని పట్టును కుదుపుల నుండి రక్షించుకొనవలెను.

జి. వివిధ ఋతువులలో తేనె పట్టలలో చేపట్టవలసిన యాజమాన్యము

ఎండాకాలంలో తేనెపట్టల యాజమాన్యము

- తేనెపట్టలను దట్టమైన నీడలో వుంచుకొనవలెను.
- తడిగోనె పట్టాను తేనె పెట్టె పై మూత పై యుంచాలి. మధ్యాహ్నం ఎండ వేళలలో నీటిని తేనె పెట్టె చుట్టూ చల్లి పట్టుల చుట్టూ చల్లని వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- తేనె పట్టు ద్వారాన్ని వెడల్పు చేసుకొని పట్టుకు గాలి అందునట్లుగా చూసుకోవాలి. పది ఫ్రేములు గల పట్టులలో పదింటికి బదులు తొమ్మిదింటిని వుంచి, చిన్న, చిన్న చెక్కముక్కలను గదుల మధ్య నుంచి పట్టులోనికి తాజా గాలి ప్రసరించేటట్లు చూసుకోవాలి.
- తేనె పట్టులున్న ప్రదేశంలో తాజా మంచినీరు తేనెటీగలను అందుబాటులో వుండునట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

వర్షాకాలంలో తేనెపట్టల యాజమాన్యము

- అడుగుబల్లపై నిండిన చెత్తను శుభ్రం చేసి, తొలగించి భూమిలో లోతుగా పాతిపెట్టాలి.
- స్వేచ్ఛగా వీచేగాలిని అడ్డుకునే అనవసరమైన చెట్ల కొమ్మలను నరికివేసి పట్టులున్న ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

- కృత్రిమ ఆహారాన్ని (పంచదారపాకం / పుప్పొడికి బదులుగా వాడే పదార్థం) పట్టు అవసరాన్ని బట్టి తయారుచేసి పట్టుకు ఇవ్వాలి.
- తేనె పట్టులలో వలసను, దోచుకొనబడటం నుండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని నివారించుకోవాలి.
- గుడ్లు పెట్టే కూలి ఈగలు గల పట్టులను/బలహీనమైన పట్టులను పేపరు పద్ధతి నుపయోగించి కలుపుకొనవలెను.
- కందిరీగలను, చీమలను, కప్పలను, బల్లులను తేనెపట్టులలో నివారించుకొనవలెను.

వర్షాకాలానంతం పట్టుల యాజమాన్యము

- పట్టులలో తగినంత ఖాళీని ఏర్పరచాలి.
- మగ ఈగల ఉత్పత్తిని పెరిగేలా పట్టులను బలపరచుకోవాలి.
- పట్టులను ఆశించి, నష్టపరచే నల్లులను, మైనపు పురుగును మరియు కందిరీగలను నివారించుకొనవలెను.

చలికాలంలో పట్టుల యాజమాన్యము

- పట్టులలో పుప్పొడి, మకరంద నిల్వలు పెరుగుట ద్వారా రాణి ఈగ ఎక్కువ గుడ్లను పెడుతుంది. కావున పట్టులోని ఈగల సంఖ్య పెరిగి, వలస పోవుటకు సిద్ధమవుతాయి.
- కొత్తగా కట్టే రాణి ఈగ గదులను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకొంటూ, వలసను నివారించుకోవాలి.
- ఎండ పడే ప్రదేశంలో పట్టులను మార్చుకోవాలి.
- ఆకుపచ్చ పక్షుల నుండి, నల్ల పక్షుల బెడద నుండి పట్టులను కాపాడుకోవాలి.
- బలహీనమైన పట్టులను బలమైన పట్టులతో కలుపుకోవాలి.
- కృత్రిమ మైనపు అట్టలను పట్టుకు ఇచ్చి కొత్త అట్టలను అల్లించుకోవాలి.
- పాత రాణి ఈగల స్థానంలో కొత్తరాణి ఈగలను ప్రవేశ పెట్టుకోవాలి.
- పురుగు మందుల బారి నుండి పట్టులను కాపాడుకోవాలి.
- తేనె అరలలో పూర్తిగా నిండిన సీలు వేసిన ఫ్రేముల నుండి మాత్రమే తేనెను తేనె యంత్రములో తీసికోవాలి.

తేనెటీగలకు వచ్చే వ్యాధులు – నివారణ : తేనెటీగలు అనేక రకాలైన వ్యాధులకు గురై శత్రువుల బారిన పడతాయి. పెంపుడు జాతి తేనెటీగలైన ఐరోపా, పుట్టతేనెటీగలు వివిధ తెగుళ్ళు, శత్రువుల బారిన పడతాయి. తేనెటీగల పిల్లలకు (లద్దెపురుగులు) సంక్రమించే బాక్టీరియా తెగుళ్ళు, ఐరోపా తేనెటీగలకు వెరోవా నల్లి పశ్చిమ దేశాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ఈ రోగాలు (బాక్టీరియా), శత్రువైన వెరోవా నల్లిని భారతదేశంలో గుర్తించారు. ప్రమాదకరమైన రూపంలో వైరస్ వ్యాధి పుట్టతేనెటీగలకు సోకినందున తేనె పరిశ్రమ చాలా నష్టపోయింది. కానీ

ఐరోపా తేనెటీగలకు మనదేశంలో వైరస్‌ల ద్వారా హాని జరగలేదు. ఇరిడో వైరస్ 70వ దశకంలో తేనెటీగలకు తీవ్రంగా సోకింది. 1978–1985 సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో ఉత్తర భారతదేశంలోని పుట్టతేనెటీగల్లో థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ వైరస్ తెగులు తీవ్రంగా వచ్చినందువల్ల 90–95 శాతం తేనెటీగల పట్లు చనిపోతాయి. ఇదే వ్యాధి దక్షిణ భారతదేశంలో 90 – 95 శాతం తేనెటీగల పట్టులను ఆశించి 1991–1992లో తేనె పట్టులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.

తేనెటీగల పెంపకందార్లు తమ తేనె పట్టులకు వచ్చే వ్యాధులను తొలిదశలోనే గుర్తించడానికి కొన్ని మెళకువలు తెలుసుకొన్నట్లయితే వ్యాధులను అరికట్టే చర్యలను చేపట్టి నష్టాన్ని నివారించుకోవచ్చు.

భారతదేశంలో తేనెటీగలకు వచ్చు వ్యాధులు : ఇతర జీవుల మాదిరిగానే తేనెటీగలకు కూడా వ్యాధులు, శత్రువులున్నాయి. వ్యాధులు లేదా కొన్ని శత్రువుల వ్యాప్తి తేనెటీగల్లో చాలా త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. ఎందుకనగా ఒక పట్టులోని తేనెటీగలన్నీ సంఘజీవులుగా ఒకేచోట జీవించి కూలి ఈగలు, ఆహారాన్ని లద్దె పురుగులకు, పోతు టీగలకు రాణి ఈగకు అందించడం వల్ల, వలసపోవుట, పట్టుల నుంచి తేనెటీగలు తప్పించుకొని పారిపోవుట, దోచుకొనుట, పుష్పాలను సందర్శించి పుప్పొడి, మకరందాన్ని సేకరించుట అను లక్షణాలతో వ్యాధులు, కొన్ని శత్రువుల వ్యాప్తికి దోహదపడతాయి. తేనెటీగల లద్దెపురుగులకొచ్చే కొన్ని రకాల వ్యాధులు చాలా తీవ్రమైనవి. భారతదేశం మరికొన్ని దేశాలతో భూ సరిహద్దులను కలిగి ఉండుట ద్వారా తేనెటీగలు పుప్పొడిని, మకరంద సేకరణ మొక్కల పుష్పాల నుంచి సేకరించుట ద్వారా (వేరే దేశానికి భూసరిహద్దులున్న) చెందిన తేనెటీగలు మనదేశంలోని పుష్పాలను సందర్శించుట, మనదేశ తేనెటీగలు అవే పుష్పాలను దర్శించుట ద్వారా భారతదేశంలోకి వివిధ వ్యాధులు సులువుగా ప్రవేశించగలిగాయి. అన్ని రకాల తేనెటీగల లద్దె పురుగులు కింది రకాల వ్యాధుల బారిన పడతాయి.

1. శాక్‌బ్రూడ్ రోగం 2. థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ రోగం 3. యూరోపియన్ పౌల్ బ్రూడ్ రోగం

1. శాక్‌బ్రూడ్ రోగం : ఈ వ్యాధి ఐరోపా తేనెటీగల్లో ఇతర ఖండాల్లో గుర్తించారు. మనదేశంలో కూడా ఐరోపా తేనెటీగల్లో ఈ వ్యాధిని గుర్తించారు.

2. థాయ్ శాక్ బ్రూడ్ వైరస్ తెగులు : ఈ వైరస్ తెగులు మొట్టమొదటిసారిగా 1976లో థాయ్‌లాండ్‌లో గుర్తించారు. అక్కడ నుంచి బర్మా, నేపాల్, ఇండియా, పాకిస్థాన్‌కు వ్యాపించింది. మనదేశంలో 1978 సం॥లో మేఘాలయలో గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఈ వైరస్ తెగులు మనదేశంలోని ఉత్తర ప్రాంతమంతా వ్యాపించింది. థాయ్ శాక్ బ్రూడ్ తెగులు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైరస్ తెగులు. ఈ తెగులు ద్వారా దక్షిణ భారతదేశంలోకి 1991లో ప్రవేశించి, పుట్టతేనెటీగల పట్టులు 95 శాతం నాశనానికి కారణమైంది.

ఈ తెగులు 30 నానో మీటర్ల వ్యాసార్ధం గల వైరస్ రేణువుల వల్ల కలుగుతుంది. ఈ వైరస్‌లో ఒకే పోగు గల ఆర్.ఎన్.ఎ. ఉంటుంది. మామూలు సూక్ష్మదర్శినితో వైరస్‌లను చూడటం సాధ్యపడదు. కావున ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపుతో మాత్రమే వైరస్‌ను చూడగలం. సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 10 రోజుల వరకు ఈ వైరస్ సజీవంగా

ఉండగలదు. 58 డిగ్రీల సెం.గ్రే. వద్ద 10 ని॥ల ఉంచినట్లయితే చురుకుదనం కోల్పోతుంది. వయస్సు వచ్చిన కూలి ఈగలు వైరస్‌ను పెరుగుతున్న పిల్లలకు (లద్దె పురుగులకు) అందించే ఆహారం ద్వారా వైరస్ ఒక లద్దెపురుగు నుంచి ఇంకొక లద్దె పురుగుకు వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధి సోకిన లద్దెపురుగుల నుంచి, చనిపోయిన లద్దె పురుగులను మైనపుగది నుంచి బయటకు తీసివేసే కూలి ఈగల ద్వారా కూడా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది. కూలి ఈగల హైపోఫెరంజియల్ గ్రంధుల్లో వైరస్ క్రిములు సమకూరుట ద్వారా వైరస్ ధారావాహికంగా ఇతర పట్టులలోని లద్దెపురుగులకు వ్యాపిస్తుంది. ఒక పట్టులోని కూలి ఈగలు ఇంకొక పట్టులోనికి వెళ్ళడం, పట్టులు దోచుకోబడటం ద్వారా ఈ వైరస్ వ్యాధి ఒక పట్టు నుంచి ఇంకొక పట్టుకు వ్యాపిస్తుంది.

తేనెపట్టులలో శాక్ బ్రూడ్ వైరస్ తెగులు – నిర్ధారణ :

- వయస్సులో పెద్ద లద్దెపురుగులు ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోతాయి. కొన్నిసార్లు వ్యూపాదశ ప్రారంభంలో కూడా లద్దెపురుగులు చనిపోతాయి. చనిపోయిన లద్దెపురుగుల నుంచి ఏ ప్రత్యేక వాసన రాదు.
- తెగులు సోకి చనిపోయిన లద్దెపురుగులు గదిలో నిటారుగా ఉండి, తల నాలుక వలె సాగి, మైనపు గదుల నుంచి కన్పిస్తుంది.
- తెగులుసోకి చనిపోయిన లద్దెపురుగులు స్పష్టమైన గోధుమ రంగు కలిగి తల, నోటి భాగాలు నల్లబడి ఉంటాయి. లద్దెపురుగు రంగు తెలుపునుంచి, పసుపుపచ్చ, గోధుమ రంగులోకి మారి చివరకు నలుపు రంగులోకి మారుతుంది. కాని నలుపు రంగులోనికి మారడం అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. చివరగా లద్దెపురుగు మైనపుగదిలో ఎండిపోయి చూడడానికి పడవ ఆకారంలో ఉంటుంది.
- సంచి ఏర్పాటు లేత వయస్సులోని లద్దె పురుగుల్లో చాలా స్పష్టంగా, శాక్ బ్రూడ్, థాయ్ శ్రాక్ బ్రూడ్ తెగుళ్ళు సోకిన తేనె పట్టులలో (ఉత్తర భారతదేశంలో) ఉంటుంది. అదే దక్షిణ భారతదేశంలో సంచి ఏర్పాటు శాక్ బ్రూడ్ లేదా థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ తెగుళ్ళలో అంత స్పష్టంగా ఉండదు.
- చనిపోయిన లద్దె పురుగుల్లో సాగే గుణం, కుళ్ళిన వాసన ఉండదు.
- తెగులుసోకిన పట్టులో లద్దె పురుగుల అభివృద్ధి తగ్గిపోతుంది. కూలి ఈగల్లో పట్టులో చనిపోయిన లద్దెపురుగులను తోడివేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అలాగే పోషణ కూలి ఈగలు పెరిగే లద్దెపురుగులకు ఆహారం ఇచ్చి పోషించలేవు.
- పట్టులోని కూలీ ఈగలన్నీ పట్టును వదిలి పారిపోవడమనేది సాధారణంగా వ్యాధి సోకిన పట్టులో కనిపించే లక్షణం.

గమనిక : ఐరోపా తేనెటీగల్లో వచ్చే శాక్‌బ్రూడ్ తెగులు, పుట్టతేనెటీగల్లో వచ్చే థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ తెగులు లక్షణాలు ఒకేలా ఉంటాయి. కాని థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ తెగులు కల్గించే వైరస్ భౌతికంగా, రసాయనికంగా, సీరలాజికల్‌గా శాక్‌బ్రూడ్ తెగులు కలిగించే వైరస్ కంటే వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

శాక్‌బ్రూడ్, థాయ్‌శాక్ బ్రూడ్ తెగుళ్ళ నివారణ :

- శాక్, థాయ్ శాక్ బ్రూడ్ తెగుళ్ళు వైరస్‌ల ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ఒక నిర్దిష్టమైన నివారణ అంటూ లేదు. కారణం వైరస్ లద్దె పురుగుల్లోని, కణాల్లో ఒక భాగంగా ఉండిపోవడమే. అయినప్పటికి కింద సూచించిన చర్యలు వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా కొంత వరకు అరికట్టబడతాయి.
- తేనెపట్టులను బలంగా ఉంచుకోవాలి. దోచుకోబడటం, తేనెటీగలు పట్టును వదలిపెట్టి వెళ్ళడాన్ని నిరోధించాలి.
- ప్రకృతిలో లభించే పట్టులను పట్టుకొని పెట్టెల్లో పెంచరాదు.
- తేనె పరిశ్రమలో వాడే పరికరాలైన చాకు, తేనె పెట్టె (ఖాళీవి), ఇతర పరికరాలన్నీ సబ్బు ఫార్మాలిక్ ద్రావణంలో 24 గంటలు నానబెట్టుట ద్వారా తెగులుకు కారణమైన వైరస్ క్రిములు చనిపోతాయి.
- వెటరినరీ గ్రేడ్‌కు చెందిన టెట్రామైసిన్ మందును 200 మి.గ్రా.లను 500 మి.గ్రా.ల పంచదార పాకంలో కలిపి ఐరోపా తేనె పట్టులకు ఇవ్వాలి. టెట్రాసైక్లిన్ వెటరినరీ గ్రేడ్ మందును (200 మి.గ్రా.) 300 మి.లీ. పంచదార పాకంలో కలిపి పట్టుతేనెటీగల పట్టులకివ్వాలి (వెటరినరీ గ్రేడ్ లభించనట్లయితే మానవులకు వాడే టెట్రామైసిన్ గొట్టాలను అంతే డోసుగలవి వాడవచ్చు) మందును వారానికి 4 లేదా 5 సార్లు ఒక పట్టుకు, 5-6 వారాలు వాడాలి. ఈవిధంగా చేసి తేనె పట్టులకు వచ్చే ఇతర వ్యాధులను నిరోధించుకోవచ్చు.
- వ్యాధిని పూర్తిగా లేదా కొంత వరకు తట్టుకునే తేనె పట్టులను గుర్తించి వాటిని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి.

3. **యూరోపియన్ పౌల్ బ్రూడ్ వ్యాధి :** ఈ వ్యాధి ఐరోపా తేనెటీగలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో అన్నిచోట్లా ఉంది. పుట్ట తేనెటీగలు కూడా ఈ వ్యాధి బారిన పడతాయి. కాని వ్యాధిని కలుగజేసే బాక్టీరియా రకం వేరుగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ వ్యాధి 1971 సం॥లో పుట్టతేనెటీగల్లో మహారాష్ట్రలో వచ్చింది. ఈ వ్యాధి మెలిసోకోకస్ ప్లూటాన్ అనే బాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది. ఈ బాక్టీరియా పెరిగే లద్దెపురుగుల మధ్య పొట్టలో ఒంటరిగా గాని, గొలుసులుగా గాని లేదా గుంపులుగా గాని ఉంటుంది. బాక్టీరియా కణాలు ఆహారంతోపాటు పోయి, లద్దెపురుగు మధ్య పొట్టలో అభివృద్ధి చెందుతాయి.

యూరోపియన్ పౌల్ బ్రూడ్ వ్యాధి – నిర్ధారణ :

- వ్యాధి సోకిన లద్దెపురుగులు మైనపు గదుల్లో ఒక పక్కకు కొంచెం జరుగుతాయి.
- లద్దెపురుగుల 4-5 రోజుల వయస్సులో (వ్యాధి సోకిన తర్వాత) చనిపోతాయి. ఈ వయస్సులో ఇవి ముడుచుకున్న దశలో ఉంటాయి. అప్పటికి లద్దెపురుగుల మైనపు గది మైనంతో మూతవేయబడదు.
- లద్దెపురుగుల రంగు మెరిసే తెలుపు నుంచి పేలవమైన పసుపు రంగులోకి, ఆ తర్వాత గోధుమ రంగులోకి మారుతుంది. చనిపోయిన లద్దెపురుగులు చివరకు పొలుసులాగ ఎండిపోయి, మైనపు గదులకు అంటుకోకుండా, రబ్బరు లాగ కన్పిస్తాయి.

- వ్యాధి సోకి కుళ్ళిపోయిన లద్దెపురుగుల నుంచి పులిసిపోయిన వాసన వస్తుంది.
- వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే సీలు వేసిన, సీలు వేయని లద్దెపురుగుల గదులు మైనపు అట్టపై చెదిరిపోయిన లక్షణం ఈ వ్యాధి ముఖ్యమైన గుర్తుగా తెలుసుకోవచ్చు.

వ్యాధి నివారణ :

- తేనె పట్టులకు పంచదార పాకం ఇచ్చుట, సీలువేసిన పిల్లల (లద్దెపురుగు) అట్టలను ఇచ్చుట, బలహీనమైన పట్టులను బలమైన పట్టులకు కలుపుట, బేసి తేనెపట్టులను బలంగా ఉంచుకోవాలి. వయస్సు మళ్ళిన రాణి ఈగల స్థానంలో కొత్తగా సంపర్కం చెందిన రాణి ఈగలను ఇచ్చినట్లయితే 2 లాభాలు ఉంటాయి. మొదట ఒక పట్టు బలం పెరుగుతుంది. రెండోసారి కూలి ఈగలు వ్యాధి సోకిన లద్దె పురుగులను మైనపు గదుల నుంచి తీసివేసి, మైనపు గదులను శుభ్రం చేయడానికి వ్యవధి దొరుకుతుంది.
- టెర్రామైసిన్ (వెటరినరి గ్రేడ్) అను యాంటిబయోటిక్ మందును 200 మి.గ్రా. తీసుకొని 500 మి.లీ. (అరకిలో) పంచదార పాకంలో కలిపి పట్టులకు వారానికి 4–5 సార్లుగా 5–6 వారాలు వ్యాధి తగ్గే వరకు పట్టుకు అందించాలి. ఇది ఐరోపా తేనెటీగల పట్టులకివ్వాల్సిన మోతాదు.
- పట్టు తేనెటీగల పట్టులకు టెట్రాసైక్లిన్ 200 మి.గ్రా. (వెటరినరీ గ్రేడ్) మందును 300 మి.లీ. పంచదార పాకానికి కలిపి వారానికి 4 నుంచి 5 సార్లుగా, 5 నుంచి 6 వారాలు పట్టులకు అందించి నివారణ చేసుకోవచ్చు. ఖాళీ మైనపు అట్టలను 80 శాతం ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని 150 మి.లీ. ఒక పట్టుకు (8–10 ఖాళీ ఫ్రేములకు) ఇవ్వాలి. (150 మి.లీ. ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని ఒక సీసాలో పోసి దానికి వత్తిని ఏర్పాటుచేసి, పట్టులోని అడుగు బల్లమీద ఉంచి వాసన సోకేలా ఏర్పాటు చేయాలి). ఎసిటిక్ ఆమ్లపు ఆవిరిని 3–4 రోజులు ఖాళీ మైనపు అట్టలకు సోకేలా చేయాలి. ఖాళీ మైనపు గదుల్లోని బాక్టీరియా ఆమ్లపు ఆవిరికి చనిపోతుంది. తర్వాత ఖాళీ మైనపు అట్టలను ఒకరోజు నీడలో ఉంచి తిరిగి పట్టులకు సరఫరా చేసుకోవచ్చు.

హెచ్చరిక : యాంటిబయోటిక్ మందు వాడకాన్ని తేనె లభించే కాలానికి నాలుగు వారాల ముందు ఆపివేయాలి. మన రాష్ట్రంలో శాస్త్రీయమైన పద్ధతులలో తేనెటీగల పెంపకములో శిక్షణ తీసుకొనగోరువారు – ఇతర వివరములకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా.

ఇతర వివరములకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (ఎంటమాలజీ), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

విజయరాయి – 534 475 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.

ఫోన్ నెం. 08812-225689, సెల్ నెం. 94933 04643

చెదలు నివారణ పద్ధతులు

పంటలు పండించే అన్ని ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా ఎర్రని, తేలిక నేలల్లో ఈ చెదపురుగులు విస్తృతంగా వ్యాపించి పంటలను ఆశించి నష్టపరుస్తున్నాయి. వరి మాగాణుల్లో మరియు నల్లని నేలల్లో పండించినప్పుడు వీటి సమస్య తక్కువగా ఉండేది, కాని ప్రస్తుతం నల్లరేగడి భూముల్లో సాగు చేయు శనగ పైరులో ఆశించి నష్ట పరుస్తున్నాయి. ఈ పురుగులు సామూహికంగా పుట్టల్లో నివశిస్తాయి. ఇవి ముఖ్యంగా 4 తెగులు. (1) రాణి, (2) రాజు, (3) పనిచేసే చెదపురుగులు (సేవకులు), (4) సైనిక చెదపురుగులు (సిపాయిలు). రాణి మరియు రాజు పురుగులు మొదట రెక్కలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ రెక్కల పురుగులు తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే పుట్ట నుండి బయటకు వచ్చి నేలమీద కానీ, గాలిలోగాని సంపర్కం జరుపుకుంటాయి. సంపర్కం జరిగిన తరువాత పురుగుల రెక్కలు రాలిపోతాయి. రెక్కలు రాలిన రాణి పురుగు భూమిలోకి పోయి తర్వాత ఒకరోజులో సుమారుగా 30,000–80,000 గుడ్లు పెడుతుంది. ఈ విధంగా అవసరాన్ని బట్టి 7–10 సంవత్సరాల వరకు గుడ్లు పెడుతుంది. గుడ్ల నుండి పిల్ల పురుగులు 40 నుండి 50 రోజులలోపు బయటకొస్తాయి. పిల్ల పురుగులు పెద్ద పురుగులుగా మారటానికి సంవత్సర కాలం పడుతుంది. పనిచేసే చెదపురుగులు తెల్లగా లేక గోధుమ వర్ణం కలిగి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి.

సైనిక చెదపురుగులు, పనిచేసే పురుగులకంటే పెద్దవిగా ఉండి రెక్కలు లేకుండా ఉంటాయి. కొద్ది నెలల్లో పనిచేసే చెదపురుగులు కొత్తగా ఏర్పరచుకొన్న నివాసాల నుండి ఆహారం వెదుకులాటలో బయటకు వెళ్ళడం ప్రారంభిస్తాయి. గట్టి దంతాలు గల సైనిక చెదపురుగులు నివాసాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాయి. చెదపురుగుల నివాసాలు భూమిలోపల అనేక మీటర్లు వ్యాపించి ఉంటాయి. అతికష్టం మీద వీటిని త్రవ్వి వేయవచ్చు కాని 50 మి.మీ. పొడవున్న రాణి పురుగును నాశనం చేసేవరకు చెదపురుగులు నాశనమయినట్లు భావించరాదు. చెదపురుగుల గూళ్ళను బాగా పెరిగిన మట్టి దిబ్బలు మరియు గాలిపోవు గొట్టాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు.

నష్టపరిచే విధానం

తేలికపాటి నేలల్లో, సేంద్రీయ పదార్ధం తక్కువగా ఉండే నేలల్లో, పంట మార్పిడి చేయని పొలాల్లో, నీటి ఎద్దడి మరియు వర్షాభావ పరిస్థితులలో చెదపురుగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పనిచేసే చెదపురుగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పంట పొలాలను ఆశించి మొక్కల కాండంలోనికి పోయి లోపలి పదార్థాన్ని తింటాయి. అలా తినటం వలన ఏర్పడిన ఖాళీ ప్రదేశాలను మట్టితో నింపుతాయి. దీనివలన మొక్కలు మొదట వడలిపోయి తరువాత ఎండిపోయి చనిపోతాయి. ఇటువంటి మొక్కలను చాలా సులభంగా పీకివేయవచ్చు. ఈ పురుగులు కాయలలోనికి కూడా కన్నాలు చేసి గింజలను పాడుచేస్తాయి. చెదలు మొక్కలలోని కణాలను తినడం వలన వేడి వాతావరణ పరిస్థితులలో మొక్కలు త్వరగా కుళ్ళిపోయి త్వరగా అదృశ్యమౌతాయి. అంతేకాకుండా చెదపురుగులు వేరుశనగ వంటి పంటలలో కాయల ఈనెల మధ్యగల పెంకు పదార్థాన్ని తినివేస్తాయి, దీనినే "స్కారిఫికేషన్" అంటారు. దీనివలన విత్తనాలకు నేరుగా హాని జరగదు. కానీ, కాయలను ఒకరకం ఆస్పర్జిల్లస్ బూజు తెగులుకు

గురిచేస్తాయి. ఈ బూజు తెగులు "అఫ్లాటాక్సిన్" అనే విష పదార్థాన్ని తయారుచేసి విత్తనాలను పనికిరాకుండా చేస్తుంది, అఫ్లాటాక్సిన్ ఒక బలమైన క్యాన్సర్ కారకం.

చెరకులో విత్తనపు ముచ్చెలకిరువైపుల నుండి ప్రవేశించి లోపలి పదార్థం, మొగ్గలు తినడం వల్ల మొలకశాతం తగ్గుతుంది. ఎదిగిన తోటల్లో కూడా లోపలి మెత్తని పదార్థం తినివేసి కేవలం డొల్లలు మిగులును.

పండ్లు మరియు అడవి జాతుల మొక్కల బెరడును తింటూ మట్టితో కప్పేస్తాయి. ఇవి ఆశించిన చెట్లు గిడసబారిపోతాయి. ఈ పురుగులు ఆశించిన నారుమళ్ళు కూడా వడలి చనిపోతాయి. వీటి ఉధృతి మెట్ట పంటల్లో మరియు నీటి ఎద్దడి ఉన్న పండ్ల తోటల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇసుక నేలల్లో తేమ లేనప్పుడు చెట్లను ఆశించి, కాండం పైపొరను తొలిచి చెట్లకు హాని కల్గిస్తాయి. నారుమడిలో కూడా మొక్కలను ఆశించి నష్టాన్ని కలుగజేస్తాయి.

నివారణ

పంటపొలాల గట్లపైన లేక పొలం చుట్టూ ఉన్న చెద పురుగుల పుట్టలను పూర్తిగా త్రవ్వి రాణి పురుగును వెలికి తీసి చంపాలి. క్లోరిపైరిఫాస్ 50 ఇ.సి. 5 మి.లీ. మందును లీటరు నీటికి కలిపి సుమారు 15-30 లీటర్ల మందు ద్రావణాన్ని చెద పుట్టల్లో బాగా తడిచేటట్లు పోయాలి. నేల తయారీ సమయంలో లోతు దుక్కి చేసుకోవాలి. చెదలు ఎక్కువగా ఆశించే పొలాల్లో పంట మార్పిడి చేసుకోవాలి. బాగా కుళ్ళిన పశువుల ఎరువు మాత్రమే పంట పొలాల్లో వేసి కలియదున్నాలి. సగం చివికిన పశువుల ఎరువు వేస్తే చెద పురుగుల సమస్య ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది.

వేరుశనగ, చెఱకు మరియు మొక్కజొన్న వంటి పంటలు నాటే సమయంలో పురుగు మందులతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి. పంట పెరిగే దశలో చెదలు ఆశించినట్లయితే క్లోరిపైరిఫాస్ 50 ఇ.సి. 5 మి.లీ. లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 ఎస్.ఎల్. 0.25 మి.లీ. మందును లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళ్ళ చుట్టూ, బోదెలపై పోయాలి.

పండ్ల చెట్లను చెదపురుగులు ఆశించినప్పుడు కాండాన్ని గోనె సంచితో రుద్ది క్లోరిపైరిఫాస్ 50 ఇ.సి. 5 మి.లీ. మందును లీటరు నీటిలో కలిపి కాండం మీద, మొదళ్ళ మీద, చెట్టు చుట్టూ పిచికారి చేయాలి. పాదుల్లో తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. వాణిజ్య పంటలలో చెద పురుగులు ఆశించినప్పుడు, చెదపురుగుల ఉధృతిని అనుసరించి ఫిప్రోనిల్ గుళిక మందులను తగిన మోతాదులో భూమిలో వేసి కలియబెట్టి నీరు కట్టాలి.

ఇతర వివరములకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

ఊటుకూరు - 516 003, వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా.

ఫోన్ నెం : 08562 - 231150, సెల్ : 94409 72870

రైతులకు మేలు చేసే వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సలహాలు మరియు పంటల్లో చీడపీడలపై వాతావరణ ప్రభావం

భారతదేశం వ్యవసాయ ప్రధానమైన దేశం. మన దేశంలో దాదాపు 70 శాతం మంది వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. వివిధ పంటల దిగుబడులు ప్రధానంగా వాతావరణంపై ఆధారపడి వుంటాయి. అదే విధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాలైన వాతావరణ పరిస్థితులుండటం వల్ల ఆ ప్రాంతాల్లో పండించే పంటలపై వాతావరణ ప్రభావం ఎక్కువ. నేల దున్నిన దగ్గర నుండి ఆ పంట మార్కెట్లో అమ్మే వరకు ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు రైతులకు ఒక పరీక్షగా నిలుస్తున్నాయి.

ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు, విపత్తులకు కారణమవుతున్న వాతావరణ మార్పు, ప్రాణకోటి నేడు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఉపద్రవం. వాతావరణ మార్పు వలన ఋతుపవనాల రాక ఆలస్యం కావడం, వర్షపాతంలో హెచ్చుతగ్గులు, తక్కువ సమయంలో అధిక ఉధృతితో కూడిన వర్షం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, పంట కాలంలో వర్షపాత విస్తరణ సమంగా లేకపోవడం, అధిక వర్షాలు, అకాల వర్షాలు, వరదలు, తుఫానులు, అకస్మాత్తుగా వడగళ్లు పడడం, ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చు తగ్గులు, అధిక నీటి అవసరం, విపరీతమైన వేడి గాలులు మొదలైన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు వివిధ పంటల దిగుబడులపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. దీని వలన రైతులకు కొన్ని సార్లు పాక్షికంగా, మరికొన్నిసార్లు పూర్తిగా పంట నష్టం జరుగుతున్నది.

ఈ నేపధ్యంలో మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా యాజమాన్య పద్ధతులను మార్చుకొని, అధిక దిగుబడులను సాధించవలసిన అవసరం ఉంది. వివిధ పంటలలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను అధిగమించి, అధిక దిగుబడులు సాధించడంలో రైతులకు సలహాలు, సూచనలను అందించడం కోసం, భారత వాతావరణ సంస్థ, భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థ మరియు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు సంయుక్తంగా మధ్యతరహా ముందస్తు వాతావరణ సూచనల ఆధారంగా "వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సూచనలు" అనే పథకాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయి వాతావరణ విభాగాలను (AMFU) 1996-98 సంవత్సరముల నుండి అన్ని వాతావరణ మండలాలలో ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ప్రస్తుతం గ్రామీణ రైతు వాతావరణ సేవా పథకం (GKMS) అనే పేరుతో అమలుచేయబడుతోంది.

ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని రైతులందరికీ, రాబోయే 5 రోజులకు జిల్లాల వారీగా ముందస్తు వాతావరణ అంచనాలు, వివిధ పంటలలో చేపట్టవలసిన వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సూచనలను బులెటిన్లు మరియు ఎస్.ఎమ్.ఎస్‌ల రూపంలో అందజేస్తున్నారు. అనకాపల్లి కేంద్రం నుండి ఉత్తర కోస్తా మండలానికి, లాం కేంద్రం నుండి కృష్ణా, గోదావరి మండలాలకు, తిరుపతి కేంద్రం నుండి దక్షిణ మండలానికి, అనంతపురం కేంద్రం నుండి అత్యల్ప వర్షపాత మండలానికి, చింతపల్లి కేంద్రం నుండి ఎత్తైన పర్వత మండలానికి నూతనంగా ఏర్పడిన జిల్లాల వారిగా వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు అందిస్తున్నారు.

భారత వాతావరణ సంస్థ సహకారంతో ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని రైతులందరికీ ముందస్తు వాతావరణ అంచనాలు, వివిధ పంటలలో చేపట్టవలసిన వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సూచనలను అందజేయబడుతున్నవి.

2024 సం॥ నుండి జిల్లా వ్యవసాయ వాతావరణ కేంద్రాల సేవలను నిలిపివేయడంతో, రాష్ట్రంలోని 5 క్షేత్ర స్థాయి వాతావరణ విభాగాల (AMFU) ద్వారా మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని జిల్లాలకు ఈ సేవలు కొనసాగించబడుతున్నాయి. ఈ విభాగాలు వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సూచనలను బులెటిన్లు మరియు సంక్షిప్త సందేశములు (ఎస్.ఎమ్.ఎస్.) ద్వారా అందిస్తాయి. ప్రతి మంగళ మరియు శుక్ర వారాల్లో సైక్లోన్ వార్నింగ్ సెంటర్ (CWC), విశాఖపట్టణం, వాతావరణ కేంద్రం వారు రాబోయే ఐదు రోజులకు వర్తించే వాతావరణ సూచనలను, 5 కేంద్రాలలోని పర్యవేక్షణ అధికారికి అందజేస్తారు. ఇందులో సంగ్రహించిన భవిష్యత్ వాతావరణ సూచనలు రోజు వారీగాను మరియు వారమంతటికీ వర్షపాతం, పగటి మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు, గాలి వేగం మరియు దిశ, ఆకాశంలోని మబ్బుల పరిస్థితి మరియు తుఫాను దిశ, బలం మొదలగు సలహాలను పొందుపరుస్తారు.

స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించి రాబోయే ఐదు రోజులలో వాతావరణంలో కలిగే మార్పుల సమాచారాన్ని ఆధారం చేసుకొని నిపుణుల కమిటీ ఆ ప్రాంతంలోని పంటల దశను బట్టి చేపట్టవలసిన యాజమాన్యం మరియు చీడపీడల ఉధృతి మరియు నివారణ చర్యలకు సంబంధించిన ముందస్తు సలహాలను తయారుచేస్తుంది. ఈ విధంగా తయారుచేసిన వాతావరణాధార వ్యవసాయ సలహాలను మరియు సంక్షిప్త సందేశాలను ఆయా ప్రాంతాల రైతులకు రేడియో, దూరదర్శన్, ఐ.ఎమ్.డి. సేవను ఉపయోగించుకొను ఇఫ్కో, నోకియా, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ మొదలగు ప్రయివేటు సంస్థల ద్వారా, వార్తా పత్రికలు, ఈ–మెయిల్, వాట్స్ అప్ గ్రూపులు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యవసాయ అధికారులు మరియు జిల్లాల వారీగా ఎంపిక చేయబడ్డ రైతులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ సలహాలను అనుసరించి రైతులు సరైన సమయంలో తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టి పంట నష్టం మరియు ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించుకొని అధిక లాభాలను పొందవచ్చు.

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు జిల్లాలవారీగా పొందుపరచిన ఈ సమాచారాన్ని బులెటిన్ల రూపంలో www.imdagrimet.gov.in అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా ప్రతి మంగళ, శుక్ర వారములలో రైతులు తెలుసుకొని పాటించవచ్చును. ఈ సమాచారమంతా “మేఘ్‌దూత్” మరియు “వ్యవసాయ వాతావరణం” అను ఆప్‌లను గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకొనుట ద్వారా కూడా ప్రతి రైతు పొందవచ్చును. అఖిల భారత సమన్వయ వ్యవసాయ వాతావరణ పథకం, అనంతపురము ద్వారా కూడా ప్రతి వారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణము, పంటల పరిస్థితి, వివిధ పంటలలో వర్షాభావ పరిస్థితులలో చేపట్టవలసిన చర్యలు, వాతావరణ ఆధారిత సూచనలను www.cropweatheroutlook.in/ERF అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా రైతులకు అందించబడుతున్నది. భారత వాతావరణ సంస్థ మరియు అఖిల భారత సమన్వయ వ్యవసాయ వాతావరణ పథకము, కేంద్రీయ మెట్ట వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థ (సి.ఆర్.ఐ.డి.ఏ.) హైదరాబాద్, ఆయా రాష్ట్రాల సమన్వయ కేంద్రాలు సంయుక్తంగా, నైఋతి ఋతుపవనాల కాలంలో (జూన్ – సెప్టెంబర్) ప్రతి శుక్రవారము “జాతీయ వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సూచనలు” అందజేయడం జరుగుతున్నది. ఈ బులెటిన్లలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితి, రాబోయే రెండు వారాలలో వర్షపాత అంచనా, వివిధ ప్రాంతాలలో ప్రధాన పంటల సాగులో చేపట్టవలసిన వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సూచనలను పొందుపరచడం జరుగుతున్నది. ఈ బులెటిన్లు www.imdagrimet.gov.in/erfsview15 అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైతులు ఈ సమాచారం ఆధారంగా రాబోయే రెండు వారాల వ్యవధిలో వ్యవసాయ పనులలో మార్పులు, చేర్పులు చేపట్టవచ్చును.

వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సూచనలు

- రాష్ట్రంలో ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత, 60–75 మి.మీ. వర్షం పడినట్లైయితేనే వర్షధార పంటలను విత్తుకోవాలి.
- ఎరువులు వేసే ముందు నేలలో తగినంత పదును ఉండాలి లేదా 20–25 మి.మీ. వర్షపాతం కురిసిన తర్వాత మాత్రమే ఎరువులను వేసుకోవాలి.
- విత్తిన 48 గంటల లోపల పొలంలో తగిన తేమ చూసుకొని మొలకెత్తక ముందు సిఫారసు చేసిన కలుపు మందుల పిచికారీ చేయాలి.
- కలుపు మందులు మరియు క్రిమి సంహారక మందులు పిచికారీ చేసిన తర్వాత కనీసం 4–6 గంటలు వర్షం లేకుండా ఉండాలి. గాలి వేగం 15 కి.మీ. కంటే ఎక్కువ ఉంటే క్రిమి సంహారక మందులు మరియు కలుపు మందులు పిచికారి చేయరాదు.
- మేఘావృతమైన వాతావరణం వుండి వర్షసూచన ఉంటే క్రిమి సంహారక మందుల పిచికారీ చేపట్టరాదు.
- వాతావరణంలో అధిక తేమ, అధిక వర్షాల వంటి మార్పులున్నప్పుడు శిలీంధ్ర నాశినులు వాడి తెగుళ్ళను నివారించుకోవాలి.
- బెట్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు పంట ఎదుగుదల, దశను బట్టి 2 శాతం యూరియా ద్రావణం, డి.ఎ.పి, పొటాషియం నైట్రేట్ లేదా మల్టీ-కె వంటి పోషకాలను రెండు మూడు దఫాలుగా పిచికారి చేయాలి.
- వర్ష సూచన ఉన్నచో నీటి తడులు ఇవ్వడం ఆపాలి.
- వరి నాటిన 4–5 రోజుల వరకు మరియు పిలకలు తొడిగే దశలో 2 సెం.మీ. నీరు పెట్టాలి.
- వరిలో అంకురం దశ నుండి గింజ గట్టిపడే వరకు 5 సెం.మీ. లోతు నీరు పెట్టాలి.
- మొక్కజొన్నలో జల్లు మరియు పీచు దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాలి.
- ప్రత్తిలో విత్తిన 15 రోజులకు, అటు తర్వాత పూత దశకు వచ్చే ముందు వర్షాలు లేనట్లయితే ఒకసారి నీరు కట్టాలి. పూత దశ నుంచి కాయ పెరిగే వరకు నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి.
- వాతావరణం, వర్షపాత విశ్లేషణ ప్రకారం వర్షాధార వేరుశనగ విత్తుకొనుటకు చిత్తూరు జిల్లాలోని పడమట మండలాలకు జూలై మాసం, తూర్పు మండలాలకు జూన్ రెండో పక్షం నుండి జూలై రెండో పక్షం వరకు; కడప మరియు అనంతపురం జిల్లాలకు జూలై మాసము అనువైన సమయం. ఆగష్టు మాసంలో పంట విత్తుకొనిన ఎడల పంట నీటి ఎద్దడికి లోనై దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశముంది.
- వేరుశనగలో పూత దశ, ఊడలు దిగే సమయం, కాయ ఊరే సమయం, మరియు గింజ కట్టే దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాలి.
- ప్రొద్దుతిరుగుడులో మొగ్గ తొడుగు, పూత మరియు గింజ కట్టే దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూడాలి.
- అపరాలలో పూత ముందు మరియు గింజకట్టు దశలలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసుకోవాలి.
- వివిధ పంటల్లో అధిక దిగుబడులు సాధించడానికి పంట కీలక దశల్లో ఎర్ర చల్కా నేలల్లో సుమారు 50 మి.మీ. మరియు నల్ల రేగడి నేలల్లో 60 మి.మీ. చొప్పున నీరు ఇవ్వాలి.

ఋతుపవనాల రాక ఆలస్యమైనప్పుడు వివిధ పంటల్లో రైతులు చేపట్టవలసిన చర్యలు

వరి : • మధ్యకాలిక రకాలు (130–135 రోజులు) లేదా స్వల్పకాలిక రకాలను (110–120 రోజులు) ఎంచుకోవాలి. దీర్ఘకాలిక రకాలు (145–150 రోజులు) వేయకూడదు. • ముదురు నారును మామూలు కంటే దగ్గరగా నాటాలి. కుదురుకు 4 నుండి 6 మొక్కలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. • నత్రజని మూడు దఫాలుగా కాక, రెండు దఫాలుగా 2/3 వంతు దమ్ములోను, మిగతా భాగం అంటే 1/3 వంతు చిరుపొట్ట దశలోను వేసుకోవాలి.

ప్రత్తి : • త్వరగా వచ్చే రకాలను ఎంచుకోవాలి. • ఎరువుల యాజమాన్యంలో మెళకువలు పాటించాలి.

మధ్యలో వర్షాలు కురవక బెట్ట పరిస్థితులు నెలకొంటే : • నేలలో పదును లేకపోతే ఎరువులు వేయటం ఆపాలి. • రెండు శాతం యూరియా ద్రావణాన్ని 10–15 రోజుల వ్యవధిలో 2 నుండి 3 సార్లు పిచికారి చేయాలి. • తరచుగా గుంటక లేదా గొర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి.

పంటలలో అధిక ఉత్పత్తి సాధించటములో అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు చాలా అవసరం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మనం పండించే పంటపై వివిధ రకాల చీడపీడలు, తెగుళ్ళు ఆశించడం ద్వారా దిగుబడులు తగ్గి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. దాదాపు 30 శాతం దిగుబడులు ఈ చీడపీడల వల్లే నష్టపోతూ ఉన్నాం. కొన్ని పురుగులు బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తే మరికొన్ని ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు ఉధృతంగా ఆశిస్తాయి. అలాగే కొన్ని తెగుళ్ళు వర్షపాతం, గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువయితే మరికొన్ని చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువవుతాయి. ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఏ ఏ చీడపీడలు ఎక్కువగా ఆశిస్తాయి అనే అవగాహన మన రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఎంతైనా అవసరం.

వివిధ పంటల్లో చీడపీడల ఉధృతికి అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు

1) వరి : కాండం తొలిచే పురుగు : పొడి వాతావరణం, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలలో తగ్గుదల మరియు గాలిలో తేమ తక్కువగా ఉండి, సూర్యరశ్మి రోజుకి 7 గంటలకంటే ఎక్కువసేపు ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా కరువు నెలకొన్న సంవత్సరాలలో ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంది.

ఆకు ముడత : అధిక వర్షాలు పడిన తర్వాత బెట్ట పరిస్థితులు నెలకొని, 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ పగటి ఉష్ణోగ్రత, 17 డిగ్రీల సెల్సియస్ రాత్రి ఉష్ణోగ్రత, వారం రోజులపాటు మబ్బులు, గాలిలో ఆధిక తేమతో (90% కంటే అధికం) కూడిన వాతావరణం అనుకూలం.

ఉల్లికోడు : ఋతుపవనాలు ఆలస్యమై, ఆలస్యంగా నాట్లు వేసిన ప్రాంతాలు ఉల్లికోడు సోకటానికి అనుకూలం.

సుడిదోమ : ఆగష్టు – సెప్టెంబరు నెలల్లో అధిక వర్షపాతం (వారానికి 30 మి.మీ. కంటే ఎక్కువ కనీసం 2 వారాలు), అధిక తేమతో కూడిన వేడి వాతావరణం, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21–23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటే ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

కంపు నల్లి : మే నెలలో వర్షాలు పడినట్లయితే సెప్టెంబరు–నవంబరు నెలల్లో కంపునల్లి ఉధృతంగా ఆశిస్తుంది.

కంకి నల్లి : నవంబరు నెలలో తక్కువ వర్షపాతం ఉండి, సూర్యరశ్మి రోజుకు 7 గంటలు మించి ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అగ్గి తెగులు లేదా మెడవిరుపు తెగులు : అక్టోబరు నుండి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో, ఒక వారం పాటు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18-22 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా ఉండి పగటి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడా 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ, గాలిలో తేమ 90% కన్నా ఎక్కువ, ఆకులపై తేమ 10 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం ఉండి, చిరుజల్లులు, మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం, మంచు కురుస్తున్న వాతావరణం అగ్గితెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

పొడ తెగులు : ప్రధానంగా ఆగష్టు - అక్టోబర్ మాసాల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు 28-32 డిగ్రీల సెల్సియస్, గాలిలో తేమ 90 శాతం, మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం మరియు సన్నని వర్షపు జల్లులతో కూడిన వాతావరణం తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

ఆకు ఎండు తెగులు : ఉష్ణోగ్రతలు 25-30 డిగ్రీల సెల్సియస్, గాలిలో అధిక తేమ, గాలితో కూడిన వర్షం లేదా మంచు కురవడం.

పొట్టకుళ్ళు తెగులు : రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువ, గాలిలో తేమ 90 శాతం కంటే ఎక్కువ. మంచు పడటం లేదా వాతావరణం చల్లగా ఉండటం, తెగులు అభివృద్ధికి అనుకూలం.

గోధుమ ఆకుమచ్చ : గాలిలో తేమ 90 శాతం కంటే ఎక్కువ, నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆలస్యమైన సంవత్సరాల్లో ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

మాని పండు తెగులు : పూత దశలో మంచు లేదా మబ్బులతో కూడిన జల్లులు, గాలిలో తేమ 90 శాతం కంటే అధికం లేదా తుఫానులతో కూడిన వర్షం ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

ఎలుకలు : ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వరదలు సంభవించినప్పుడు ఎలుకలలో అసాధారణ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగి ఉధృతి ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది.

2) మొక్కజొన్న :

కత్తెర పురుగు : జూన్, జూలై మాసంలో సాధారణం కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, పురుగు ఆశించుటకు రెండు మూడు వారాల ముందు అధిక వర్షాలు, గాలిలో ఆర్ద్రత తగ్గి ఉదయ, మధ్యాహ్న కాలపు సాపేక్ష ఆర్ద్రతలో అధిక వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువ ఉంటుంది.

కమ్మ రోగం లేదా టర్సికం ఆకుమాడు తెగులు : పూత దశలో అధిక తేమతో కూడిన వాతావరణం,ఉష్ణోగ్రతలు 18-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండి, మంచుతో కూడిన వర్షపు జల్లులు ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

మేడిస్ వడలు తెగులు (లేట్ విల్ట్) : గింజ పాలు పోసుకునే దశలో నీటి ఎద్దడి, వేడి వాతావరణం (ఉష్ణోగ్రతలు 20-32 డిగ్రీల సెల్సియస్) మరియు అధిక తేమ ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

3) జొన్న :

గింజ బూజు తెగులు : పూత మరియు గింజ గట్టిపడే సమయంలో వర్షాలు పడితే ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది.

బంక కారు తెగులు : పూత మరియు గింజ గట్టిపడే సమయంలో ఆకాశం మేఘావృతమై, చల్లని తేమతో కూడిన వాతావరణం వుంటే ఎక్కువగా వ్యాపిస్తుంది.

మొవ్వు తొలుచు ఈగ : విత్తనము మొలకెత్తినప్పటి నుండి 5 వారాల వరకు ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది. 25-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు, గాలిలో తేమ 60 శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కాండం తొలుచు పురుగు : పైరు విత్తిన 30 రోజుల వయసు నుండి పంట కోసే వరకు ఆశిస్తుంది. 27–32 డిగ్రీల సెల్సియస్ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు, గాలిలో తేమ 60 శాతం కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

4) సజ్జ :

పచ్చకంకి / వెర్రికంకి తెగులు : గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు మరియు చల్లని వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడు ఈ తెగులు తీవ్రత అధికం.

తేనెబంక తెగులు : మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం, పూత మరియు గింజ పాలుపోసుకోను దశలలో వర్షాలు పడుట మరియు చల్లటి ఉష్ణోగ్రతలు నెలకొనుట తెగులు తీవ్రతకు అనువైన వాతావరణ పరిస్థితులు.

5) రాగి :

అగ్గి తెగులు : వర్షపు జల్లులు పడుతూ గాలిలో అధిక తేమ ఉండి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకున్నప్పుడు అగ్గి తెగులు ఉధృతి ఎక్కువ అవుతుంది.

6) పెసర / మినుము :

పల్లాకు తెగులు మరియు ఆకుముడత వైరస్ తెగులు : పొడి వాతావరణం, బెట్ట పరిస్థితులు ఎక్కువ కాలం (దాదాపు 7 నుండి 10 రోజులు) కొనసాగితే రసం పీల్చు పురుగుల (తామర పురుగులు మరియు తెల్లదోమ) ఉధృతి ఎక్కువై తద్వారా తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

బూడిద తెగులు : విత్తిన 30–35 రోజుల తర్వాత గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నపుడు బూడిద తెగులు వ్యాపిస్తుంది.

తుప్పుతెగులు : చల్లని పొడి వాతావరణం తుప్పు తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు : అక్టోబరు, డిసెంబరు మాసాలలో వర్షపు జల్లులు మరియు ముసురుతో కూడిన వాతావరణం ఈ తెగులుకు అనుకూలం.

7) కంది :

శనగపచ్చ పురుగు (హెలికోవెర్పా) : ఖరీఫ్‌లో ముందుగా తక్కువ వర్షాలు, నవంబరు నెలలో అధిక వర్షాలు, ఒక్కసారిగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో తగ్గుదల ఈ పురుగు ఉధృతికి అనుకూలం. గుడ్డు దశ లేదా చిన్న లార్వాల దశలో ఎక్కువ వర్షం కురిస్తే ఉధృతి తగ్గుతుంది.

మరూక మచ్చల పురుగు (గూడు పురుగు) : అక్టోబరు నుండి డిసెంబరు వరకు వర్షపు జల్లులతో కూడిన వాతావరణం లేదా మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం మరియు గాలిలో అధిక తేమ శాతం ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది.

కాయ ఈగ : పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30^0 సెంటిగ్రేడ్ కంటే తక్కువగా ఉండి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 10^0–17^0 సెంటిగ్రేడ్ గాను, గాలిలో తేమ 70 శాతం చొప్పున ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు ఉధృతి అధికమవుతుంది.

ఫైటోప్తోరా ఎండు తెగులు : అధిక వర్షాలు, నేలలో అధిక తేమ వుండి రాత్రి, పగటి ఉష్ణోగ్రతల మధ్య తేడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది.

8) కుసుమ :

పేనుబంక : డిసెంబరు, జనవరి మాసాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 12^0–15^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత మధ్య ఉండి మబ్బులతో కూడిన ఆకాశం ఉన్నట్లైతే ఉధృతి ఎక్కువ. వర్షాలు ఉధృతంగా కురిస్తే పేనుబంక దానంతట అదే తగ్గుతుంది.

ఆకుమచ్చ తెగులు : విత్తిన 60 రోజుల నుండి ముఖ్యంగా డిసెంబరు–జనవరి మాసాల్లో వర్షాలు కురవడం లేదా ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణంలో తేమ 70 శాతం మించినపుడు ఉధృతి ఎక్కువ అవుతుంది.

స్టెరిలిటీ మొజాయిక్ వైరస్ తెగులు : ఏప్రిల్–మే నెలల్లో వర్షాలు కురిసినట్లైతే ఆగష్టు నుండి అక్టోబర్ నెలలలో ఈ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువ.

ఫైటోప్తోరా ఎండు తెగులు : అధిక వర్షాలలో నేలలో అధిక తేమ ఉండి, రాత్రి, పగటి ఉష్ణోగ్రతల మధ్య తేడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది.

9) ప్రొద్దుతిరుగుడు :

ఆల్టర్నేరియా ఆకు మాడు తెగులు : విత్తిన 50–60 రోజుల తరువాత, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే తక్కువగా ఉండి, మంచుతో కూడిన వాతావరణం, గాలిలో తేమ 80–90 శాతం వరకు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. పూత, గింజ గట్టిపడే దశలలో ఇలాంటి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుంది.

తుప్పు తెగులు : 25–36^0 సెంటీగ్రేడ్ పగటి ఉష్ణోగ్రత, 80–85 శాతం గాలిలో తేమ ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

10) ఆముదం :

ఎర్ర గొంగళి పురుగు / బొంత పురుగు : తొలకరి వర్షాల వల్ల నేల 10–20 సెం.మీ. మేర తడిచినట్లయితే ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

బూజు తెగులు : ఆముదం మొక్క గెలవేసే సమయంలో తుఫాను వల్ల ఎడతెరిపి లేకుండా 3–4 రోజులు చిరుజల్లులు, గాలిలో తేమ 90 శాతం కంటే అధికంగా ఉండి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ ఉన్నచో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

వేరుకుళ్ళు/మసికుళ్ళు తెగులు : బెట్ట పరిస్థితులు మరియు అధిక నేల ఉష్ణోగ్రతలు ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం.

అల్టర్నేరియా–ఆకుమచ్చ తెగులు : రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16^0–20^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతల మధ్య ఉండి మబ్బులు మరియు అధిక తేమతో కూడిన వాతావరణం ఈ తెగులుకు అనుకూలం.

11) చెఱకు :

పీక పురుగు : అధిక ఉష్ణోగ్రత మరియు పంటలో నీటి ఎద్దడి పరిస్థితులు ఈ పురుగు ఉధృతికి అనుకూలం. ఈ పురుగు ఉధృతి వర్షాధార చెఱకు మరియు ఏప్రిల్ మాసములో నాటిన చెఱకుపై అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఎర్రనల్లి (మైట్స్) లక్క తెగులు : వరుసగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, పొడి వాతావరణం ఉండి వేసవి కాలంలో వాన జల్లులు పడిన సమయాలలో ఈ నల్లి ఉధృతి కనిపిస్తుంది.

తెల్లపేను : వాతావరణం మబ్బులతో కమ్మి ఉష్ణోగ్రతలు 29^0–35^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతల మధ్య మరియు గాలిలో తేమ శాతం 80–90 గా ఉన్నప్పుడు తెల్లపేను ఉధృతి అధికం.

పసుపు నల్లి : ఉష్ణోగ్రతలు 26^0–29^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతల మధ్య ఉండి, గాలిలో తేమ 60–70 శాతం ఉన్న పరిస్థితులు ఈ పురుగు ఉధృతికి అనుకూలం. ఏప్రిల్ నుండి అక్టోబరు వరకు ఈ నల్లి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మొవ్వకుళ్ళు తెగులు : వర్షాలు తొందరగా మే–జూన్ నెలల్లో ప్రారంభమై జూలై నెలలో అధిక వర్షాలు పడినప్పుడు ఉధృతంగా ఆశించి, గాలి, వర్షపు జల్లుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

ఎర్రకుళ్ళు తెగులు : అధిక వర్షాలు కురిసి, గాలిలో తేమ అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఎర్రకుళ్ళు తెగులు ఆశిస్తుంది.

కాటుక తెగులు : కార్తి తోటలలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశించి మొవ్వు నల్లని కొరడాగా మారుతుంది.

పసుపు ఆకు తెగులు : అధిక వర్షపాతం, వెనువెంటనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో కూడిన వాతావరణం ఈ తెగులు ఆశించేందుకు అనుకూలం.

తుప్పు తెగులు : వర్షాకాలంలో నీరు నిల్వ ఉండి, గాలిలో 70–90 శాతం తేమ, 30^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలతో మబ్బులు కమ్మిన వాతావరణం, ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలం. ఈ తెగులు సెప్టెంబరులో మొదట కనిపించి డిసెంబరు–జనవరిలో ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది.

12) ప్రత్తి :

శనగపచ్చ పురుగు (హెలికోవెర్పా) : ఖరీఫ్‌లో ముందుగా తక్కువ వర్షాలు, నవంబరు నెలలో అధిక వర్షాలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో ఒక్కసారిగా తగ్గుదల ఉధృతికి అనుకూలం. గుడ్డు దశ లేదా చిన్న లార్వాల దశలో ఎక్కువ వర్షం కురిస్తే ఉధృతి తగ్గుతుంది.

తెల్లదోమ : 10 రోజులకు మించి బెట్ట పరిస్థితులు మరియు పొడి వాతావరణం ఈ పురుగు ఉధృతికి అనుకూలం.

గులాబి రంగు పురుగు : మధ్యస్థంగా ఉష్ణోగ్రతలు మరియు మబ్బులతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు వర్షపాతము అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పురుగు ఉధృతి మరియు వ్యాప్తి అధికంగా ఉంటుంది.

రసం పీల్చు పురుగు : తెల్లదోమ, పచ్చదోమ, తామర పురుగులు వంటి రసం పీల్చు పురుగులు దీర్ఘకాలిక బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అధికంగా ఆశిస్తుంటాయి. మొక్కల వరుసల మధ్య దూరం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, అధిక వేగంతో గాలులు వీచినప్పుడు పిండినల్లి వంటి పురుగుల వ్యాప్తి అధికంగా ఉంటుంది.

వేరుకుళ్ళు తెగులు : బెట్ట పరిస్థితులు ఏర్పడి ఆ తర్వాత అధిక వర్షాలు పడి నేలలో తేమ ఎక్కువైతే ఆశిస్తుంది.

కాయకుళ్ళు మరియు కాయ రాలుట : ప్రత్తి కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువ పడితే కాయకుళ్ళు ఆశించి కాయ రాలిపోతుంది. ఆగిన తరువాత పచ్చదీపపు పురుగులు అధికంగా ఆశించి నష్టపరుస్తాయి.

తుప్పు తెగులు : నవంబరు నుంచి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో తుప్పు తెగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అధిక తేమ ఉండి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ తెగులు : గాలిలో అధిక శాతం తేమ, మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రతలు 25-28^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు మరియు పంటకాలము మధ్యలో వర్షాలు సంభవించినప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా కనబడుతుంది.

వర్టిసీలియం వడలు తెగులు : తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అనగా 15-20^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు వర్టిసీలియం వడలు తెగులు ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది.

బాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులు : ఎక్కువ గాలి వేగం, అధిక తేమ, రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 21^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతల కన్నా తక్కువ ఉండటం, వర్షంతో కూడిన వాతావరణం అనుకూలం.

13) వేరుశనగ :

ఆకుముడత : విత్తిన 30-35 రోజుల తర్వాత బెట్ట పరిస్థితులు (విత్తిన 30 రోజుల వరకు వర్షాలు లేకపోతే) ఉన్నట్లయితే లేదా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా 3^0 నుండి 5^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు, మధ్యాహ్నం పూట గాలిలో తేమ 40% కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, జూలై మాసం చివరి వారం మరియు ఆగష్టు మొదటి వారంలో పంట విత్తినప్పుడు ఈ పురుగు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

రసం పీల్చు పురుగులు : పొడి వాతావరణం, ఎక్కువ రోజులు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే పేనుబంక, పచ్చ దీపపు పురుగులు మరియు తామర పురుగులు ఆశిస్తాయి.

ఎర్రగొంగళి పురుగు / బొంత పురుగు : జూన్ చివరి వారంలో మరియు జూలై మాసంలో తొలకరి వర్షాల వల్ల నేల 10-20 సెం.మీ. మేర తడిచినట్లయితే రెక్క పురుగులు బయటికి వస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో పూర్తి వర్షాధారంగా పంటసాగు చేస్తున్న పరిస్థితులలో ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వుంటుంది.

పొగాకు లద్దె పురుగు : సెప్టెంబరు, అక్టోబరు, నవంబరు మాసాలలో 10-20 మి.మీ. వర్షపాతం, రెండు మూడు రోజులు వరుసగా కురిసినట్లయితే భూమిలోని కోశస్థ దశ నుండి, రెక్క పురుగులు బయటకు వచ్చి ఆ తరువాత పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30^0-32^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21^0-23^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలుగా ఉండి, గాలిలో తేమ శాతం 80 కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పురుగు అధికంగా ఆశిస్తుంది.

పేనుబంక : డిసెంబరు, జనవరి మాసాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 12-15 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండి పగటి ఉష్ణోగ్రతలలో క్రమేపి పెరుగుదల ఉండి, మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం ఉన్నట్లయితే ఉధృతి ఎక్కువ. వర్షాలు ఉధృతంగా కురిస్తే పేనుబంక దానంతట అదే తగ్గుతుంది.

ఆకుమచ్చ తెగులు : పంట 40-50 రోజుల మధ్యలో ఉండి అధిక తేమ, వర్షపాతం ఉన్నట్లయితే ముందస్తుగా వచ్చు ఆకుమచ్చ తెగులు, పంట 50-60 రోజుల మధ్య ఉండి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16^0-22^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు గాలిలో తేమ 90 శాతం కంటే ఎక్కువ, వర్షం లేదా మంచు వల్ల ఆకులపై తేమ ఎక్కువగా 3-4 రోజుల వరకు (ఆకులపై తేమ 20 గంటలు) ఉన్నట్లయితే ఆలస్యంగా వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు ఆశిస్తుంది.

తుప్పు తెగులు : రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-22^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు గాలిలో తేమ 80 శాతం కంటే ఎక్కువ, ప్రతి రోజు చిరు జల్లులతో వర్షం రెండు, మూడు రోజులపాటు కురుస్తూ, రోజులో 5 గంటల కంటే తక్కువ సమయం సూర్యరశ్మి ఉన్నట్లయితే ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

మొవ్వుకుళ్ళు వైరస్ / కాండం కుళ్ళు వైరస్ తెగులు : పైరు 20 నుండి 40 రోజుల మధ్య ఉన్నప్పుడు బెట్ట పరిస్థితులు నెలకొని తామర పురుగులు ఎక్కువగా ఉండి, పొలం చుట్టూ ఎక్కువ పార్థీనీయం మొక్కలు ఉండి పొలంలో మొక్కల సంఖ్య తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువ.

వేరుకుళ్ళు తెగులు : పంట 25-35 రోజుల తర్వాత వరుసగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నప్పుడు వేరుకుళ్ళు ఆశిస్తుంది.

కాండం కుళ్ళు శిలీంధ్రపు తెగులు : పంట 60-70 రోజుల దశలో వర్షాలు అధికంగా కురిసినపుడు ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది.

14) శనగ :

రబ్బరు పురుగు : విత్తిన 15 నుండి 45 రోజుల సమయంలో గాలిలో ఎక్కువ తేమ (ఉదయం పూట 75-95%, మధ్యాహ్నం పూట 60-75%) మరియు పగటి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు (పగలు 26-32^0 సెంటీగ్రేడ్, రాత్రి 17-24^0 సెంటీగ్రేడ్) తగ్గినప్పుడు ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతి పెరుగుతుంది.

శనగపచ్చ పురుగు : శాఖీయ దశ చివరిలో పంట బెట్ట పరిస్థితులకు గురైన తరువాత వర్షం కురిసినప్పుడు, విత్తిన 30-45 రోజుల నుండి కోత దశ మధ్యలో ఉష్ణోగ్రత 32^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నా, గాలిలో తేమ 50% కంటే తక్కువ ఉన్నా శనగపచ్చ పురుగు ఎక్కువగా పంటను ఆశిస్తుంది.

మొదలు కుళ్ళు : మొలక దశ నుండి 45 రోజుల మధ్యలో నేలలో అధిక తేమ శాతం ఉండి, నేలలో సరిగా కుళ్ళని పంట వ్యర్థాలు ఉండి, నేల ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఉష్ణోగ్రత 27-35^0 సెంటీగ్రేడ్ మధ్యలో ఉండి, గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మొదలు కుళ్ళు తెగులు వ్యాప్తి చెందుతుంది.

వేరు కుళ్ళు : పంట పూత దశ నుండి కాయ ఏర్పడే దశ వరకు బెట్ట పరిస్థితులు ఉండి, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఈ తెగులు వ్యాప్తికి అనుకూలము.

ఎండు తెగులు : ఇది విత్తనం, మట్టి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే తెగులు. రైతులు పంట మార్పిడి చేయకుండా ఉండడం, పొడి, వేడి వాతావరణం ఉండి, 25^0 సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది.

ఆకుమచ్చ : రైతులు సెప్టెంబర్ నెలలోనే ముందుగా పంట విత్తినపుడు, విత్తిన పంట సెప్టెంబర్ నెల చివరిలో, అక్టోబరు మొదటి పక్షంలో వర్షాలలో చిక్కుకొన్నప్పుడు, పంట విత్తిన 15 రోజుల నుండి కోత దశ మధ్యలో అకాల అధిక వర్షాలు కురిసినప్పుడు, 25-30^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు ఆకుమచ్చ తెగులు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది.

మొగిలి : పూత దశ నుండి పిందె/కాయ ఏర్పడే సమయంలో, వేకువజామున మంచు/పొగ మంచుతో కూడిన వాతావరణం, ఒక్కసారిగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 4-5^0 సెంటీగ్రేడ్ మేర తగ్గినపుడు, గాలిలో తేమ 10-12% వరకు పెరిగినప్పుడు శనగ పంటలో పూత వాడిపోవడం, అప్పుడప్పుడే ఏర్పడుతున్న పిందెలు/కాయలు పాలిపోయి, వడబడి, రాలిపోవడం జరుగుతుంది.

ఇవేకాక పంటలపై క్రిమి సంహారక మందులు పిచికారీ చేసేటప్పుడు రైతులు వర్షం లేని రోజున లేదా కనీసం 6-8 గంటల పాటు వర్షం లేని సమయంలో పిచికారీ చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. అందువలన రైతులు క్రిమి సంహారక మందులు పిచికారీ చేసే ముందు తప్పనిసరిగా రాబోయే నాలుగు రోజుల వాతావరణ పరిస్థితులను తెలుసుకొని వర్షం పడే సూచనలు లేనట్లయితే పిచికారీ చేయాలి లేదా వర్షం పడే సూచనలుంటే పిచికారీ ఆపివేయాలి. ఈ విధంగా రైతులు వాతావరణ పరిస్థితులకనుగుణంగా ఒక రోజు పిచికారీ ఆపివేస్తే దేశానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆదా అవటమే కాక రైతులు అనవసర ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు. దీనితో పాటు వాతావరణ మరియు నీటి కాలుష్యం కూడా నివారించవచ్చు. నేలలో సరియైన మోతాదులో తేమ ఉన్నప్పుడు పైపాటుగా వేసిన ఎరువులు మొక్కకి అందుబాటులోకి వచ్చి దిగుబడి పెరుగుతుంది. అందువలన ముందస్తు వ్యవసాయ వాతావరణ సలహాల ద్వారా వర్షం పడే సూచనలు తెలుసుకొని ఎరువులు సేకరించి, వర్షం పడగానే వేసుకుంటే ఎరువు నష్టం తగ్గడంతో బాటు, దిగుబడులు పెరుగుతాయి.

వర్షం పడే అవకాశం ఉంటే పంటకు నీటి తడి ఆపి వేయాలి. లేనిచో నీటి మోతాదు ఎక్కువై నేలలో వేసిన ఎరువులు వృధాకావడమే కాక నీటి మరియు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయి. వర్షాలు ఎక్కువగా కురిసి పైరులో ఎక్కువ కాలం నీరు నిల్వ ఉన్నప్పుడు జింక్ మరియు ఇనుప ధాతు లోపం, పొటాష్ మరియు నత్రజని పోషకాల లోపాలు వచ్చే అవకాశం పలు పంటల్లో ఉంటుంది. అలాగే చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు భాస్వరం లోపం తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఈవిధమైన వాతావరణాధారమైన వ్యవసాయ సలహాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని రైతులు పాటిస్తే, సరియైన సమయంలో తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టి పంటలను రక్షించుకోవడమేగాక పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు.

పై సమాచారాన్ని మరింత మంది రైతులకు, వ్యవసాయాధికారులకు అందజేసి రాష్ట్ర రైతాంగానికి మేలు చేయాలనే సదుద్దేశంతో వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్ర విభాగం ద్వారా ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు వాతావరణ సలహాలను ప్రతి మంగళ మరియు శుక్రవారాల్లో మరియు ఉన్నట్టుండి సంభవించే అకాల వాతావరణ మార్పుల సమాచారాన్ని అందజేస్తున్నారు.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలకు మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,
తిరుపతి - 517 502. ఫోన్ నెం. 0877-2248827, సెల్ : 73822 93055

మరియు

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.
సెల్ : 77026 06857

వివిధ పంటలలో వాడదగిన కలుపు మందులు

పంటల సాగులో కలుపు యాజమాన్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. కలుపు వలన వివిధ పంటలలో పంటను బట్టి జరిగే నష్టం 30 శాతం నుండి 90 శాతం వరకు ఉండవచ్చు. పంటల సాగులో కలుపు యాజమాన్యానికి రెండు పద్ధతులు పాటించాలి. 1. కలుపు రాకుండా నివారించడం. 2. పైరులో ఆశించిన కలుపును నివారించడం. అవకాశం ఉన్నంతవరకు పొలంలో కలుపు రాకుండా నివారించుకోవటం మంచిది.

కలుపు రాకుండా నివారించుకోవటానికి చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతులు :

* నేల సమతలంగా లేని ప్రాంతాలలో కలుపు సమస్య ఎక్కువ. కాబట్టి పైరు విత్తేముందే నేలను చదును చేయాలి.
* వేసవిలో లోతు దుక్కులు దున్నటం వలన పొలంలో ఉన్న తుంగ, గరిక వంటి మొండిజాతి కలుపు నివారించవచ్చు.
* తొలకరి వర్షాలు మొదలైన వెంటనే నేలను వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు గొర్రు, గుంటక వంటి పరికరాలతో దున్నటం వలన నేల పైపొరలలోని కలుపు విత్తనాలు చాలా వరకు మొలక దశలోనే అంతరించి, పంటతో పాటుగా వచ్చే కలుపు మొక్కలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి.
* రైతులు సాగుచేసే భూములను ఎంతో జాగ్రత్తగా కలుపు లేకుండా చూసుకుంటారు. అంతే శ్రద్ధతో పొలంగట్లు, పొలాలకు వెళ్ళే డొంకలు, రోడ్ల ప్రక్క ప్రదేశాలలో కలుపు లేకుండా చూసుకుంటే కలుపు విత్తనం తయారి చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.
* గ్రామాలలో చెరువు గట్లు, కాలువ గట్లు, ఆట స్థలాలు, ఖాళీ ప్రదేశాలలో కలుపు మొక్కలు పెరగనీయకుండా చేసినపుడు పంట పొలాలలో కలుపు సమస్య తగ్గుతుంది.
* పశువుల ఎరువు పొలానికి వేసినపుడు పశువుల ఎరువులో ఉండే కలుపు విత్తనాల ద్వారా వచ్చే కలుపును నివారించుకోవటానికి, తొలకరి వర్షాలకు అవసరం మేరకు పొలాన్ని దున్ని ఎరువుతో పాటుగా వచ్చే కలుపు విత్తనాలు పైరు వేయకముందే మొలచి నశించేలా చేయాలి.
* కలుపు విత్తనాలు కలవకుండా ఉన్న పంట విత్తనాలు మాత్రమే విత్తేందుకు వాడాలి.
* పంట మొక్కల సాంద్రత పొలంలో సరిపడా ఉన్నపుడు కలుపు ఉధృతిని పైరు అడ్డుకుంటుంది.
* పంట విత్తనాలు వెదచల్లటం కంటే, యంత్ర పరికరాలు ఉపయోగించి సిఫారసు చేసిన ఎడంతో, సిఫారసు మేరకు విత్తన మోతాదు పాటించి, సరైన పద్ధతిలో విత్తినపుడు కలుపు సమస్య తక్కువగా ఉంటుంది.
* వేసవిలో పాలీథీన్ షీట్‌ను నేలపై అమర్చినపుడు నేల బాగా వేడెక్కి నేలలో వున్న కలుపు విత్తనాలు నశించిపోతాయి.
* పైరు వేయటానికి కొంత సమయం ఉన్నపుడు పొలంలో పచ్చి రొట్ట పైర్లు సాగుచేసి కలుపు ఉధృతి తగ్గించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది.
* డ్రిప్ పద్ధతిలో పంటలకు నీరు కట్టినప్పుడు పొలంలో కలుపు తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అవకాశాన్ని బట్టి నీరు కట్టడానికి డ్రిప్ పద్ధతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
* సాధారణ పద్ధతిలో నీటిని కట్టినపుడు పొలంలో నీరు నిలబడినపుడు కలుపు ఎక్కువగా ఆశించటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డ్రిప్ అవకాశం లేని దగ్గర, పైపులు ఉపయోగించి, పొలంలో నీరు నిలబడకుండా పంటలకు నీరు అవసరం మేరకే పారించినప్పుడు కలుపు సమస్య తక్కువగా ఉంటుంది.

* పైర్లకు అందించే ఎరువులు పొలంలో చల్లకుండా డ్రిప్ నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉన్నపుడు డ్రిప్ ద్వారా, లేనపుడు మొక్కలకు దగ్గరలో మట్టి క్రింది పడేలా వేసినపుడు కూడా కలుపు ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు.
* పరాన్న బుక్కులైన కలుపు మొక్కలు (బంగారు తీగ, పొగమల్లె మొ॥) ఆశించే నేలలో వాటి మొలకకు, పెరుగుదలకు దోహదపడే పంటలు కొన్ని సంవత్సరాలు సాగుచేయకుండా ఉన్నపుడు పరాన్న బుక్కులైన కలుపు మొక్కలు పొలంలో నశించిపోయేలా చేయవచ్చు.
* పంటకోసిన తరువాత పొలంలో మిగిలిపోయే కలుపు మొక్కలను వెంటనే నాశనం చేయాలి. అలా చేయనపుడు, వాటి ద్వారా విత్తనం ఉత్పత్తి జరిగి తరువాత సాగు చేసే పైర్లలో కలుపు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది.
* పైరు విత్తేముందు లేక నాటేముందు నేలను పూర్తిగా పాలీథీన్ షీట్‌తో కప్పి, అవసరమైన దగ్గర పాలీథీన్ షీట్‌కు బెజ్జాలు వేసి పైరు విత్తి లేక నాటి, పైరులో కలుపు మొలవకుండా చేయవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో ఖర్చు అధికం కాబట్టి, అధిక ఆదాయం ఇచ్చే పంటల సాగులో పాటించవచ్చు.

పంటలను ఆశించిన కలుపును నివారించేందుకు చేపట్టవలసిన పద్ధతులు :

సాధారణంగా పంట కాలపరిమితిలో మొదటి మూడవ వంతు కాలంలో కలుపు సమస్యను పైర్లు తట్టుకోలేవు. కాబట్టి పైర్ల మొదటి మూడవ వంతు కాలాన్ని కలుపుకు సున్నిత దశగా చెప్పవచ్చు. ఈదశలో పైరుతో పాటుగా మొలచి పెరిగే కలుపును నివారించటానికి ఈ క్రింద తెలిపిన పద్ధతులు పాటించాలి.

యంత్ర పరికరాలతో కలుపు నివారణ : పైరు విత్తిన తరువాత 15-20 రోజుల వ్యవధిలో అవసరం మేరకు పశువులు లేక యంత్రాలతో నడిచే పరికరాలతో అంతర సేద్యం చేసి సాళ్ళ మధ్యలో పెరిగే కలుపును నివారించవచ్చు. సాళ్ళలో మొక్కల మధ్యన మిగిలిపోయే కలుపును మనుషులతో తీయించాలి.

మనుషులతో కలుపు తీయించుట : అంతరసేద్యం చేయటానికి పశువులు, యంత్రాలు అందుబాటులో లేనపుడు, అవసరాన్ని బట్టి 15-20 రోజుల ఎడంతో మనుషులతో కలుపు తీయించి పైర్లలో కలుపు సమస్యను అధిగమించవచ్చు.

సేంద్రియ పద్ధతులతో కలుపు నివారణ : పైరుకు అనుకూలము మరియు కలుపుకు ప్రతికూలము అయిన పరిస్థితులను యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా కల్పించి పైరుకు కలుపును ఎదుర్కొనడంలో పైచేయి ఉండేలా చేయటం ఈ పద్ధతి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. కలుపును తట్టుకునే పైర్లు ఎంచుకోవాలి. ఎంచుకున్న పైర్లలో కూడా త్వరగా పెరుగుతూ కలుపుకు లొంగనటువంటి రకాలు ఎంచుకోవచ్చు. సరైన విత్తన మోతాదులో, సరైన పదును, సరైన లోతులో, సరైన ఎడంతో పైరు విత్తి పొలంలో సరిపడా పంట మొక్కలు ఉండేలా పంటల యాజమాన్యం చేయాలి. పైరును సకాలంలో విత్తినపుడు పైరు బాగా పెరిగి కలుపు అదుపులో ఉంటుంది కంది వంటి పైర్లలో వరుసల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తొలిదశలో మినుము, పెసర, వేరుశనగ, జొన్న, సజ్జ, కొర్ర వంటి అంతర పంటలు సాగుచేసి కలుపు సమస్య తగ్గించవచ్చు.

జీవరాశులతో కలుపు నివారణ : పురుగులు, శిలీంధ్రాలు ఉపయోగించి కూడా కలుపును నివారించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రత్యేకమైన కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించటానికి మాత్రమే జీవరాశులు కొన్ని ఉపయోగంగా ఉన్నాయి. పార్థీనియం (వయ్యారి భామ) నివారణకు జైగోగ్రామ బైకలరేటా (పెంకుపురుగు), నాగజముడు నివారణకు పొలుసు పురుగు, రైలుకంప నివారణకు కోసిడొసిమి, టిలోనిమియా పురుగులు, తుంగ నివారించటానికి బ్రాక్టా పురుగులు, పొగమల్లె నివారణకు ఫైటో మైజా, గుర్రపుడెక్క నివారణకు నియోకెటినా, సాల్వీనియా నిర్మూలనకు సైటోబేగా, నీటి కలుపైన హైడ్రిల్లా, చారా మొదలైన వాటి నిర్మూలనకు గ్రాస్‌కార్ప్ రకం చేప ఉపయోగపడతాయి.

కాని జీవకలుపునాశినుల తయారి, నిల్వ, అందుబాటు, వాడకంలో ఉన్న అనేక రకాలైన ఇబ్బందుల కారణంగా, వీటి వినియోగం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఏర్పడినపుడు తప్పితే పెద్దగా లేదనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా నాగజముడు, పార్థీనియం, గుర్రపుడెక్క, రైలుకంప వంటి కలుపు మొక్కల ఉధృతి అధికంగా ఉండి సమస్యాత్మకంగా మారిన పరిస్థితులలోనే వాటికి సంబంధించిన జీవరాశులను ఉపయోగించి, ఒక నిర్ధిష్ట ప్రణాళికతో వాటి నివారణకు ఈ పద్ధతులను ఉపయోగించుకుంటున్నాం.

జీవకలుపునాశినులు : కలుపు మొక్కలను చంపగలిగే కొన్ని రకాల సూక్ష్మజీవులను కలుపుమందుల వలే పంటలలో కలుపు నిర్మూలనకు ఉపయోగించే పద్ధతి. జీవకలుపునాశినులు పంటలలో వచ్చే అన్ని రకాల కలుపు మొక్కలను నివారించలేవు. ప్రతి జీవకలుపునాశిని కూడ ఒక ప్రత్యేకమైన కలుపుమొక్క మీద మాత్రమే పనిచేసే శక్తి మాత్రమే కలిగి ఉండటం వలన, వీటి వినియోగం భారతదేశంలో అంత ప్రాచుర్యం పొందలేదు.

జీవసాంకేతిక పరిజ్ఞానం : కలుపు మందును తట్టుకొనగలిగే జన్యువును పంట మొక్కలలో ప్రవేశపెట్టిన రకాలను సాగుచేస్తూ, కలుపును నివారించటానికి కలుపు మందులు వినియోగించి, పంట మొక్కలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, కలుపు మాత్రమే నివారింపబడేలా రూపొందిన పరిజ్ఞానం ఇది. ప్రత్తి, మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు వంటి పంటల జన్యువుల్లో గ్లైఫోసేట్‌ను తట్టుకునే జన్యువును కలుపుట ద్వారా, ఆ పంటల సాగులో పంటలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కలుపు నివారణకు గ్లైఫోసేట్‌ను కొన్ని దేశాలలో వాడుతున్నారు. ఈ పద్ధతి కొన్ని ఇతర ముఖ్య పంటలలో ముందు ముందు వినియోగంలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పంటల సాగులో వీలైనంత వరకు కలుపుమొక్కలు రాకుండా యాజమాన్యం చేపట్టాలి. ఒకవేళ పంటలలో కలుపు ఆశించినపుడు పైన తెలిపిన పద్ధతులలో అనుకూలమైన వాటిని ఎంచుకుని కలుపు యాజమాన్యం చేపట్టాలి. జీవ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా కలుపు మొక్కల యాజమాన్యం భారతదేశంలో అందుబాటులో లేదు.

కాని ప్రస్తుత పరిస్థితులలో రైతులు కలుపు ఆశించకుండా చూసుకోవటం, ఆశించిన కలుపు నివారించటానికి ఇతర యాజమాన్యం మీద దృష్టి పెట్టకుండా పూర్తిగా 'కలుపు మందుల ద్వారా మాత్రమే కలుపు నివారణ' అనే ధోరణిలో సాగుతున్నారు. దీని వలన దీర్ఘకాలంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవలసిన పరిస్థితులు ఉత్పన్నమవుతాయి. కాబట్టి కలుపు యాజమాన్యానికి కలుపుమందులకంటే ముందుగా, ప్రత్యామ్నాయ యాజమాన్య పద్ధతులు ఏమేమి ఉన్నయో ఆలోచించుకుని వాటిని తమ పంటల కలుపు యాజమాన్యంలోకి తెచ్చుకుని, ఆ పైన అవసరం మేరకు మాత్రమే కలుపు మందులు వినియోగం చేపట్టినపుడు ఖర్చు తగ్గటం, పర్యావరణ అనుకూలత, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు మరియు అధిక లాభం పొందటానికి అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.

పంటలలో రసాయనాల ద్వారా కలుపు నివారణ :

వరి :

నేరుగా విత్తిన వరి :

1. సరియైన పదును ఉన్నప్పుడు దుక్కిలో నేరుగా విత్తుట : ఈవిధానంలో రైతులు తొలకరి వర్షాలు పడిన వెంటనే లేదా కాలువల్లో నీరు వచ్చిన వెంటనే పొలం దుక్కి దున్ని విత్తనాలను నేలలో తగినంత పదును చేరినప్పుడు విత్తి, వర్షాధారంగా లేక ఆరుతడి పంటగా సాగుచేస్తూ కాలువల ద్వారా నీరు అందుబాటులోకి వచ్చిన అనంతరం మాగాణి వరిగా సాగుచేస్తారు. ఈ పద్ధతిలో రసాయనాలతో కలుపు నిర్మూలన మూడు దశలలో చేయాలి.

• **విత్తుటకు ముందు :** పొలంలో తుంగ, గరిక, దర్భగడ్డి, బొంత ఊద వంటి మొండి జాతి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, తొలకరి వర్షాలు పడి, కలుపు ఏపుగా పెరుగుచున్నప్పుడు 1.0 లీ. నీటికి 5 మీ.లీ. పారాక్వాట్ 24% రసాయనాన్ని లేదా గ్లూపోసినేట్ అమ్మోనియం 13.5% ద్రావకం 4 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి, ఎక్కడ కలుపు ఉంటే అక్కడ పిచికారి చేయాలి. ఈ మందు స్ప్రే చేసిన 10–15 రోజుల తర్వాత పొలం దున్ని వరి విత్తుకోవచ్చు.

• **విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజుల లోపు :** వరి విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజుల లోపు తేమ ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 1.0 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% ద్రావకం లేదా 400 మి.లీ. ప్రెటిలాక్లోర్ 50% (రీఫిట్, ఎరేజ్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

• **విత్తిన 15–20 రోజుల మధ్య :** ఏ కారణం చేతనైన విత్తిన వెంటనే కలుపు మందులు పిచికారి చేయకపోతే పొలంలో ఊద వంటి గడ్డి జాతి మొక్కలు ఉంటే ఎకరాకు 400 మి.లీ. సైహాలోఫాప్ బ్యూటైల్ 10% (క్లించర్, రాప్‌అప్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. గడ్డి జాతి మరియు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు ఉంటే ఎకరాకు 100 మి.లీ. బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% (నామినీ గోల్డ్, తారక్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–25 రోజుల మధ్య పిచికారి చేయాలి.

• **విత్తిన నెల రోజుల తర్వాత :** పొలంలో వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2, 4–డి సోడియం సాల్టు 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సిన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.ఈ మందు పిచికారి చేసినప్పుడు పైరు కొంచెం ఎర్రబడును. కనుక పై పాటుగా నత్రజని ఎరువును వేసుకోవాలి లేదా ఎకరానికి 50 గ్రా. ఇథాక్సిసల్ఫ్యూరాన్ 15%(సన్ రైస్) లేదా 8.0 గ్రా. మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యురాన్ ఇథైల్ 20% (ఆల్ మిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి కలుపుపై పడేటట్లు పిచికారి చేయాలి.

2. దమ్ము చేసిన పొలంలో నేరుగా విత్తుకొనుట :

• **వరి విత్తిన 3–5 రోజుల లోపు :** పొలంలో నీరు పలుచగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 80 గ్రా. పైరజోసల్ఫూరాన్ ఇథైల్ 10% (సాథి) ముందుగా అరలీటరు నీటిలో కలుపుకొని, ఆ ద్రావణాన్ని 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో కలిపి పొలంలో సమానంగా చల్లాలి. ఈ మందు చల్లిన 2–3 రోజుల వరకు పొలంలోని నీరు బయటకు పోనిచ్చుట కాని లేదా బయట నీరు పొలంలోకి పెట్టుటకాని చేయరాదు.

• **వరి విత్తిన 15–20 రోజుల మధ్య :** ఏదైనా కారణం చేత విత్తిన వెంటనే కలుపు మందులు స్ప్రే చేయకపోతే, పొలంలో ఊద మొదలగు గడ్డి జాతి మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటే ఎకరాకు 400 మి.లీ. సైహాలోఫాప్ బ్యూటైల్ 10% (క్లించర్, రాప్‌అప్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి లేదా గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటే ఎకరాకు 100 మి.లీ. బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% (నామిని గోల్డ్, తారక్, అడోరా) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–20 రోజుల మధ్య పిచికారి చేయాలి.

• **విత్తిన నెల రోజుల తరువాత :** విత్తిన నెల రోజుల తర్వాత పొలంలో వెడల్పాకు మొక్కల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2, 4–డి సోడియం సాల్టు 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సిన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఈ మందు పిచికారి చేసినప్పుడు పైరు కొంచెం ఎర్రబడును. కనుక పై పాటుగా నత్రజని ఎరువును వేసుకోవాలి లేదా ఎకరాకు 50 గ్రా. ఇథాక్సిసల్ఫ్యూరాన్ 15% (సన్ రైస్) పొడి

మందును లేదా 8.0 గ్రా. మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 20% (ఆల్ మిక్స్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి కలుపుపై పడేటట్లు పిచికారి చేస్తే పైరుకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పైరుపై వచ్చే వెడల్పాకు మొక్కలను నిర్మూలించవచ్చును.

మాగాణి వరి :

నారుమడి : నారుమడిలో ఊద నిర్మూలనకు ఒక ఎకరం నారుమడికి ప్రెటిలాక్లోర్ 50% ద్రావకం 400 మి.లీ. (రీఫిట్, ఎరేజ్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నారుమడి విత్తిన 2 లేక 3 రోజులలో పిచికారి చేయాలి లేదా విత్తిన 14-15 రోజులప్పుడు ఊద నిర్మూలనకు ఎకరం నారుమడికి 400 మి.లీ. సైహాలోఫాప్ బ్యూటైల్ 10% ద్రావకం (క్లించర్, రాప్‌అప్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయవలెను. ఊద మరియు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు నారుమడిలో ఉన్నప్పుడు నారుమడి విత్తిన 15 రోజులకు ఎకరాకు 100 మి.లీ. బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% ద్రావకం (నామిని గోల్డ్, తారక్, అడోరా) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నాటిన వరి పొలంలో :

- ఊద మొదలగు ఏక వార్షిక గడ్డిజాతి మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 1.0 నుండి 1.5 లీ. బ్యూటాక్లోర్ 50% (మాచెటి, హిల్టాక్లోర్) లేదా 80 గ్రా. పైరజోసల్ఫ్యూరాన్ ఇథైల్ 10% పొడి మందు (సాధి) లేదా 400 మి.లీ. ప్రెటిలాక్లోర్ 50% (రీఫిట్, ఎరేజ్) లో ఏదో ఒకదానిని ఎకరాకు 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో కలిపి, నాటిన 3 నుండి 5 రోజులలో పలుచగా నీరు ఉన్నప్పుడు చల్లాలి.
- గడ్డి, తుంగ, వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 4.0 కిలోలు బెన్ సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ (0.6%) + ప్రెటిలాక్లోర్ (6.0%) (లోండాక్స్ పవర్) గుళికలు లేదా 4.0 కిలోలు బ్యూటాక్లోర్ 5% గుళికలు మరియు 4.0 కిలోలు 2,4-డి. ఇథైల్ ఎస్టర్ 4% గుళికలు 20 కిలోల పొడి ఇసుకలో కలిపి, నాటిన 3 నుండి 5 రోజులలో పొలంలో నీరు పలుచగా ఉన్నప్పుడు సమానంగా వెదజల్లాలి.
- నాటిన 15-25 రోజుల సమయంలో గడ్డి మరియు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కలు ఉంటే ఎకరాకు 100 మి.లీ. బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% (నామిని గోల్డ్, తారక్, అడోరా) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పొలంలో నీరు తీసి పిచికారీ చేయాలి.
- నాటిన 25-30 రోజులప్పుడు పొలంలో వెడల్పాటి కలుపు మొక్కల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2,4-డి సోడియం సాల్ట్ 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) లేదా 400 మి.లీ. 2,4-డి ఎమైన్ సాల్ట్ 58% ద్రావకం (వీడ్‌మార్ సూపర్, వీడార్ 58) లేదా 50 గ్రా. ఇథాక్సిసల్ఫ్యూరాన్ 15% (సన్‌రైస్) లేదా 8.0 గ్రా. మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్+ క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 20% (ఆల్‌మిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి ఏదో ఒక కలుపు మందును కలుపుపై పడేటట్లు పిచికారి చేయడం ద్వారా వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చును.

మొక్కజొన్న :

విత్తిన వెంటనే : ఎకరాకు 1-1.2 కి. అట్రాజిన్ 50% (అట్రటాప్, సోలారో, మిల్‌జిన్, సూర్య) లేదా 1.0 నుండి 1.25 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% ద్రావకం (స్టాంప్ ఎక్సట్రా) లేదా 200 మి.లీ. ఆక్సీఫ్లోరోఫెన్ 23.5% (గోల్, ఆక్సిగోల్డ్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 24 నుండి 48 గంటల లోపు నేలపై తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు పిచికారి చేసుకోవాలి. మొక్కజొన్నలో

అపరాలు/ నూనె గింజలు అంతర పంటగా వేసినపుడు ఎకరాకు 1.0–1.25 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% (స్టాంప్ ఎక్స్ట్రా) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 24 నుండి 48 గంటల లోపు పిచికారి చేసుకోవాలి.

విత్తిన 20–25 రోజులకు : వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల నివారణకు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2,4–డి సోడియం సాల్ట్ 80%(ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్), వెడల్పాకు మరియు గడ్డిజాతి కలుపు నివారణకు ఎకరానికి 30 మి.లీ. టోప్రోమిజోన్ 33.6% (టింజర్ /ఎలైట్) లేదా 115 మి.లీ. టెంబోట్రియోన్ 34.4% (లాడిస్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. తుంగ జాతి గడ్డి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరానికి 36 గ్రా. హాలోసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ 75% డబ్ల్యు.జి. (సెంప్రా) ను 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

మాగాణి వరిలో దున్నకుండా విత్తిన మొక్క జొన్న : ఎకరాకు 1.0 కి. అట్రాజిన్ 50% (అట్రాటాప్, సోలారో, మిల్జిన్, సూర్య) + 1.0 లీ. పారాక్వాట్ 24% (గ్రామాక్సోన్) విత్తిన 24–48 గంటల లోపు 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20–25 రోజులకు సాధారణ మొక్కజొన్నలో తెలియచేసిన విధంగానే కలుపు మందులను వాడవచ్చును.

జొన్న : ఎకరాకు 600–800 గ్రా. అట్రాజిన్ 50% (అట్రాటాప్, సోలారో, మిల్జిన్, సూర్య) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 24–48 గంటల లోపు పిచికారి చేయాలి. నాటిన 25–30 రోజుల మధ్య వెడల్పాకు కలుపు ఉన్నట్లయితే ఎకరాకు 400 గ్రా. 2,4–డి సోడియం సాల్ట్ 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) లేదా 400 మి.లీ. 2,4–డి అమైన్ సాల్ట్ 58% (వీడ్‌మార్ సూపర్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

రాగి : విత్తిన వెంటనే లేదా నారు నాటటానికి ముందు ఎకరాకు 1.0 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. నాటిన 20–25 రోజులప్పుడు వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల నిర్మూలనకు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2, 4–డి. సోడియం సాల్ట్ 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

సజ్జ : ఎకరానికి 400–600 గ్రా.అట్రాజిన్ 50% (అట్రాటాప్, సోలారో, మిల్జిన్, సూర్య) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 24–48 గంటలలోపు పిచికారి చేయాలి. నాటిన 20–25 రోజుల మధ్య వెడల్పాకు కలుపు సమస్య ఉన్నపుడు ఎకరాకు 400 గ్రా. 2,4–డి సోడియం సాల్ట్ 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. వెడల్పాకు కలుపు ఉన్నపుడు 6.0 గ్రా. మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 20% (ఆల్‌మిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

కొర్ర : ఎకరానికి 500 గ్రా. అట్రాజిన్ 50% (అట్రాటాప్, సోలారో, మిల్జిన్, సూర్య) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 48 గంటలలోపు పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20–25 రోజులకు వెడల్పాకు కలుపు మాత్రమే ఉన్నపుడు ఎకరానికి 400 గ్రా. 2, 4–డి సోడియం సాల్ట్ 80% (ఫెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్ 80, సాలిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. వెడల్పాకు కలుపు సమస్యగా ఉన్నపుడు ఎకరానికి 6.0 గ్రా. మెట్‌సల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్ 20% (ఆల్‌మిక్స్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ప్రత్తి : విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజులలో ఎకరాకు 1000 మి.లీ. మెటలాక్లోర్ 50% లేదా 1.0–1.3 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% (స్టాంప్ ఎక్సాట్రా) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఖరీఫ్‌లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండి అంతరకృషి కుదరనప్పుడు ఎకరాకు 250 మి.లీ. పైరిథయోబాక్ సోడియం 10% (హిట్‌వీడ్, థీమ్) మరియు 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్-పి-ఇథైల్ 5% (టర్గా సూపర్) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

చెఱకు : చెఱకు ముచ్చెలు నాటిన వెంటనే లేదా 3వ రోజున అట్రాజిన్ 50% పొడి మందును ఎకరానికి 2.0 కిలోలు లేదా మెట్రిబుజిన్ 600 గ్రా. 200 లీ. నీటిలో కలిపి పొలమంతా పిచికారీ చేసి ఒక నెల వరకు కలుపు నివారించుకోవచ్చు. తోట నాటిన నెల తరువాత 20, 25 రోజుల వ్యవధిలో అవసరాన్నిబట్టి 2, 3 సార్లు గొర్రుతో లేదా దంతితో అంతరకృషి చేయాలి లేదా కూలీలతో కలుపు తీయించాలి. వెడల్పాటి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 2,4-డి సోడియం సాల్ట్ 800 గ్రా. మరియు ఒక లీటరు గ్రామోక్సోన్ 200 లీ. నీటిలో కలిపి వరుసల మధ్య పైరుపై పడకుండా నాటిన 20, 60 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయాలి. ఈ మిశ్రమం పిచికారి చేస్తున్నప్పుడు మందు పైరుపై పడితే పంటకు నష్టం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ముచ్చె నాటిన 20వ రోజున, 90 వ రోజున మెట్రిబ్యుజిన్ 400 గ్రా. + 2,4-డి సోడియం సాల్ట్ 800 గ్రా. ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయటం వలన కలుపును సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. తీగ జాతి కలుపు మొక్కల నివారణకు ఋతుపవనాల తరువాత ఎకరానికి 1.0 లీ. పారాక్వాట్ + 1.0 కిలో 2,4 సోడియం సాల్ట్ కలిపి లేదా ముచ్చె నాటిన 75 రోజులకు మెటాసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యురాన్ ఇథైల్ 20% డబ్ల్యూ.పి. (ఆల్‌మిక్స్) ఎకరానికి 8 గ్రా. లేదా 2,4 డి సోడియం సాల్ట్ 80% పొడి మందు 400 గ్రా. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి చాళ్ళలో పిచికారి చేయాలి.

అపరాలు :

కంది : కందిలో సాళ్ళ మధ్యన దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కలుపు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాళ్ళ మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉండడంతో అంతర సేద్యం చేయడానికి పశువుల అరకలతోను, ట్రాక్టరుతో నడిచే గొర్రు, గుంటకలు వంటి పరికరాలతో గాని అంతరకృషి చేయాలి. పైరు విత్తిన 20 రోజులకు మొదలుపెట్టి అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి 15-20 రోజులకు ఒకసారి చొప్పున రెండు నుండి 3 సార్లు అంతరసేద్యం చేసి సాళ్ళ మధ్య పెరిగే కలుపును నివారించవచ్చును. అంతరసేద్యం అనంతరం పొలంలో మిగిలిన కలుపును కూలీలతో తీయించి కందిలో కలుపు సమస్యను అధిగమించవచ్చును.

కలుపు మందులతో కలుపు యాజమాన్యం : కంది విత్తిన వెంటనే లేక విత్తిన 1 నుండి 2 రోజులలో పై పొరలలో తేమ ఉన్నప్పుడు ఎకరానికి పెండిమిథాలిన్ 30 శాతం (స్టాంప్, పెండిస్టార్) 1.0-1.3 లీటర్లు లేదా అలాక్లోర్ 50 శాతం (లాసో, అలాటిప్) ఒక లీటరు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసి తొలి దశలో వచ్చే కలుపు మొక్కలు నివారించవచ్చు. విత్తిన 20-25 రోజుల మధ్య గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలైన ఊద, చిప్పెర మరియు గరిక నివారణకు క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5 శాతం (టర్గాసూపర్) మందును 400 మి.లీ. లేదా ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9 శాతం (విప్ సూపర్) 250 మి.లీ. లేదా ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10 శాతం (ఎజిల్) 250 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేయాలి. గడ్డి జాతి మరియు వెడల్పాకు మొక్కలు ఉన్న ఎడల ఎకరానికి 250 మి.లీ. ఇమజితాపిర్ 10 శాతం (పరష్యూట్) లేదా ఇమాజితాపిర్ 3.75 శాతం + ప్రొపిక్విజాఫాప్ 2.5 శాతం (షకెడ్) ద్రావణాన్ని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన 20-25 రోజులకు పిచికారి చేయాలి. పెసర మరియు మినుము పైర్లలో విత్తిన 25 రోజులకు వాడే సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ అసిఫ్లోరోఫెన్ 16.5 శాతం +

క్లోడినాపాప్ ప్రొపర్జిల్ 8 శాతం (ఐరిస్, పటేల) కలుపు మందును కందిలో వాడరాదు. కందిలో ఫోమాసాఫెన్ 11.1 శాతం + ఫ్యూజిఫాప్ – పి.–బ్యుటైల్ 11.1 శాతం (ఫ్యూజిఫ్లెక్స్) అనే కలుపు మందును కూడా కందిలో వాడరాదు.

మెట్ట మినుము మరియు పెసర : విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజులలో ఎకరాకు 1.0–1.3 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% (స్టాంప్ ఎక్స్ట్రా) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరాకు 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9% (విప్ సూపర్) లేదా ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% (సొసైటి, ఎజిల్) 250 మి.లీ. లేదా 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% (టర్గా సూపర్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–20 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయవలెను. పొలంలో గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకు కలుపు ఉన్నపుడు ఎకరానికి 200 మి.లీ. ఇమజితాపిర్ 10% (పరష్యూట్, లగామ్) లేదా 400 మి.లీ. పొమెసాపెన్ 11.1% + ఫ్లూజియోపాప్ పి–బ్యుటైల్ 11.1% (ఫ్యూజిఫ్లెక్స్) లేదా 800 మి.లీ. ప్రొపిక్విజాఫాప్ 2.5% + ఇమాజితాపిర్ 3.75% (షకెడ్) విత్తిన 15–20 రోజులలోపు 200 లీటర్ల నీటిలో పిచికారి చేయాలి. పైరు 25 నుండి 30 రోజులప్పుడు ఎకరాకు 300 మి.లీ. సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ అసిఫ్లోరోఫెన్ 16.5% + క్లోడినాపాప్ ప్రొపర్జిల్ 8% (ఐరిస్, పటేల) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు.

మాగాణి మినుము మరియు పెసర :

- వరి పనలు తీసిన వెంటనే లేదా మరుసటి రోజు, ఎకరాకు 1.5–2.0 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) 20 కి. ఇసుకలో కలిపి సాయంత్రంవేళ పొలంలో సమానంగా చల్లాలి. చల్లిన వెంటనే ఎకరాకు 200 లీటర్ల నీరు పిచికారి చేస్తే పైరుకు నష్టం లేకుండా కలుపు నివారింపబడుతుంది. ఈ పద్ధతి వల్ల మాగాణి అపరాలలో వచ్చు బంగారు తీగ కూడా కొంతవరకు నివారింపబడుతుంది.
- మాగాణి మినుములో గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరాకు 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9% (విప్ సూపర్) లేదా 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% (టర్గా సూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% (ఎజిల్) ను 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–20 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయవలెను.
- పొలంలో గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకు మొక్కలున్నపుడు ఎకరాకు 200 మి.లీ. ఇమజితాపిర్ 10% (పరష్యూట్, లగామ్) విత్తిన 15–20 రోజులలోపు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. దీని వల్ల బంగారు తీగ కూడా కొంతవరకు నివారింపబడుతుంది. ఈ మందు పిచికారి చేసినప్పుడు మినుము పెరుగుదల ఒక వారం ఆగినప్పటికి తరువాత మామూలు స్థితికి వచ్చును లేదా సోడియం ఎసిఫ్లూరోఫెన్ 16.5% + క్లాడినాఫాప్ ప్రొపార్గిల్ 8% (ఐరిస్, పటేలా) ఎకరానికి 300 మి.లీ. లేదా ఫోమెసాఫెన్ 11.1% +ఫ్లుజియఫాప్–పి–బ్యుటైల్ 11.1% (ఫ్యూజిఫ్లెక్స్) ఎకరానికి 400 మి.లీ. 20 రోజులకు పిచికారి చేయడం ద్వారా వెడల్పాకు మరియు గడ్డి జాతి కలుపును నివారించవచ్చును.
- పైరు నెల రోజుల తర్వాత బంగారు తీగ ఎక్కువగా ఉన్న చోట పారాక్వాట్ 24% (గ్రామాక్సోన్) 1.0 లీటర్ల నీటికి 5.0 మి.లీ. పిచికారి చేస్తే పైరుతో పాటు బంగారు తీగ కూడా చనిపోతుంది.

అపరాలలో బంగారు తీగ నివారణకు సమగ్ర కలుపు యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి :

- తొలకరిలో పైరు వేయక ముందు పొలంలో ఉన్న కలుపుపై బంగారు తీగ ఉనికిని గమనించినప్పుడు పూతకు రాకముందే దున్నటం ద్వారా కాని, పారాక్యాట్ వంటి మందులతో గాని నివారించాలి
- వేసవిలో లోతు దుక్కులు చేయాలి.

- తొలకరి అపరాలపై బంగారు తీగను గమనించినపుడు వీలైనంత వరకు ఆ పైరును పచ్చిరొట్టగా కలియదున్నాలి.
- బంగారు తీగ ఆశించే అవకాశమున్న పొలాల్లో, అపరాలు విత్తిన వెంటనే పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) ఎకరాకు 1.0 లీ. ను 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి
- మాగాణి అపరాలలో 20 రోజుల దశలోనే ఇమిజితాపిర్ 10% ఎకరాకు 200 మి.లీ. పిచికారి చేయాలి. ఈ దశలోనే బంగారు తీగ మినుము పైరుపై స్థిరపడుతూ ఉంటుంది కనుక, నివారణ తేలిక.
- పొలం గట్లపై ఉన్న ఇతర కలుపు మొక్కల మీద వృద్ధి చెందే బంగారు తీగను కూడా విత్తనం ఏర్పడకముందే నాశనం చేయాలి.
- ఈ చర్యలు చేపట్టలేనప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పంట మార్పిడి చేయాలి. బంగారు తీగ ఆశించని మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జ వంటి పంటలను సాగు చేయాలి.

శనగ : ఎకరాకు 1.0–1.25 లీ.పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% ద్రావణాన్ని విత్తిన 24–48 గంటల లోపు 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 25–30 రోజులకు గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరానికి 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5%(టర్గాసూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాఫాప్ ఇథైల్ 9% ద్రావకం (విప్ సూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% (ఎజిల్, సొసైటీ) 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నూనెగింజలు

వేరుశనగ :

విత్తిన వెంటనే లేదా 1–2 రోజులలో ఎకరాకు 1.0 నుండి 1.6 లీ.పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% లేదా 1000 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ + ఇమాజితాపిర్ 32% ద్రావణాన్ని 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరాకు 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్ 9% (విప్ సూపర్) లేదా ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% (సొసైటి, ఎజిల్) 250 మి.లీ. లేదా 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% (టర్గా సూపర్) 200 లీ. నీటిలో కలిపి విత్తిన 15–20 రోజులప్పుడు పిచికారి చేయవలెను. పొలంలో గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాకు కలుపు ఉన్నప్పుడు ఎకరాకు 250 మి.లీ. ఇమజితాపిర్ 10% (పరష్యూట్, లగామ్) విత్తిన 15–20 రోజులలోపు 200 లీటర్ల నీటిలో పిచికారి చేయాలి.

ప్రొద్దుతిరుగుడు, ఆముదం : విత్తిన వెంటనే లేదా 1,2 రోజులలో ఎకరాకు 1.0 నుండి 1.25 లీ.పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) లేదా 700 మి.లీ. పెండిమిథాలిన్ 38.7% (స్టాంప్ ఎక్స్ట్రా) పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20 రోజులకు గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరాకు 400 మి.లీ. క్విజలోఫాప్ ఇథైల్ 5% (టర్గాసూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాఫాప్ ఇథైల్ 9% ద్రావకం (విప్ సూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% (ఎజిల్, సొసైటీ) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 15–20 రోజులకు వెడల్పాకు కలుపు నివారణకు ఎటువంటి కలుపు మందులు లేవు.

నువ్వులు : విత్తిన వెంటనే లేదా 1,2 రోజులలో ఎకరాకు 1.0 లీ. పెండిమిథాలిన్ 30% (స్టాంప్, పెండిస్టార్) పిచికారి చేయాలి లేదా ప్రిటిలాక్లోర్ 50 శాతం ద్రావకాన్ని (ఎరేజ్, రిఫిట్) 400 మి.లీ. 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి విత్తిన మూడవ రోజు లోపు పిచికారి చేసుకోవాలి. విత్తిన 20–25 రోజులకు గడ్డిజాతి కలుపు నిర్మూలనకు ఎకరానికి 400 మి.లీ. క్విజలాఫాప్ ఇథైల్ 5%(టర్గాసూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ఫెనాక్సాఫాప్ ఇథైల్ 9% ద్రావకం (విప్ సూపర్) లేదా 250 మి.లీ. ప్రొపిక్విజాఫాప్ 10% ద్రావకం (ఎజిల్, సొసైటీ) 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. విత్తిన 20 రోజులకు వెడల్పాకు కలుపు నివారణకు ఎటువంటి కలుపు మందులు లేవు.

తుంగ, గరిక వంటి మొండిజాతి కలుపు నివారణ : భూమిని దున్నక ముందుగాని లేదా మొదటి పంట తర్వాత రెండవ పంట వేయక ముందు తుంగ మరియు ఇతర కలుపును 15–20 రోజుల వరకు పెరగనీయాలి. అవసరమైతే నీటిని పెట్టి త్వరగా పెరిగేటట్లు చేయాలి. కలుపు 15 రోజులు పెరిగిన సమయంలో పారాక్వాట్ 5 మి.లీ. లేదా గ్లూపోసినేట్ అమ్మోనియం 4 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి కలుపు బాగా తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి. 10–15 రోజులు ఆగి, కలుపు బాగా ఎండిపోయిన తర్వాత దున్నినచో మొండి జాతి కలుపును కొంత వరకు నివారించవచ్చును. ఈ విధంగా 2–3 సార్లు చేసిన, తుంగ మొదలగు మొండి కలుపు తగ్గుముఖం పడుతుంది.

కలుపు మందులు వినియోగంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

* సిఫారసు చేయని, పూర్తి వివరాలు తెలియని కలుపు మందులు వాడరాదు.
* సిఫారసు చేసిన మందును, సిఫారసు చేసిన పైరుకు, సిఫారసు చేసిన మోతాదులో, సిఫారసు చేసిన సమయంలో సరియైన పద్ధతిలో పిచికారి చేయాలి.
* కలుపు మందుల అవశేషాల వలన తరువాత వేసే పైరు మీద దుష్ప్రభావం ఉంటుందో లేదో తెలుసుకుని వాడాలి.
* సిఫారసు చేసిన కలుపు మందు మోతాదును తేలికపాటి నేలలలో తక్కువ మోతాదులోను, సేంద్రియ పదార్థం ఎక్కువ ఉండే నల్ల నేలలలో ఎక్కువ మోతాదులోను, ఎర్రనేలలో మధ్యస్త మోతాదులోనూ వాడాలి.
* మిశ్రమ పంటలు సాగుచేసేటప్పుడు, సాగులో ఉన్న పంటలు అన్నింటికి సురక్షితమైన కలుపు మందులు మాత్రమే వాడాలి.
* కలుపు మందులు వాడేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక స్ప్రేయర్ ఉంచుకోవటం మంచిది.
* పిచికారి చేసేందుకు శుభ్రమైన మంచి నీరు వాడాలి. ఉప్పునీరు, మురికినీరు వాడరాదు.
* పిచికారి చేసే వ్యక్తి చేతులకు, కళ్ళకు, ఇతర శరీర భాగాలకు తగిన రక్షణతో మాత్రమే కలుపు మందు పిచికారి చేయాలి.
* కలుపుమందులు స్ప్రేకు పైరు దశను బట్టి ఎకరాకు 200–250 లీటర్లు నీటిని వాడాలి.
* సాధ్యమైనంత వరకు కలుపు మందులు చేతి పంపుతో వాడాలి.
* పిచికారి చేసే సమయంలో కలుపు మందు పడినచోట మరల పడకుండ స్ప్రే చేయాలి.
* నిర్దిష్టమైన సూచనలు లేకుండా కలుపు మందులను పురుగు మందులు, తెగుళ్ళు మందులతో లేదా ఇతర కలుపు మందులతో కలిపి వాడరాదు.
* కాల పరిమితి దాటిన మందులు వాడరాదు.
* ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నపుడు, గాలి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు (గంటకు 10 కి.మీ) కలుపు మందులు పిచికారిచేయరాదు.
* కలుపు మందు పిచికారి చేసిన తరువాత 6–8 గంటలలోపు వర్షం కురిసిన కలుపు మందు ప్రభావం తగ్గవచ్చు.
* కలుపు మందులు పురుగుమందుల వలే విషపూరితాలు. పిల్లలకు, ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
* ఆహార పంటలలో, పశువుల మేతకు వాడే పైర్లలో కలుపు మందులు వాడినపుడు సూచించిన కాలపరిమితి తరువాత మాత్రమే పైర్లు కోయాలి.
* సాధ్యమైనంత వరకు యాంత్రిక పద్ధతులు, సేద్య పద్ధతులు పాటిస్తూ పరిమితంగానే కలుపు మందులు వాడుతూ సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యం పాటించాలి.
* ఫ్లాట్ పాన్ లేదా ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్ ఉపయోగించి కలుపు మందులు పిచికారి చేయాలి.

ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న కలుపు మందుల వివరాలు

క్ర.సం.	సాంకేతిక నామము	వ్యాపార నామము (లు)	మూలపదార్థం %
1	2,4-డి సోడియం సాల్టు	పెర్నాక్సోన్, గ్రీనోక్సోన్, క్లీన్80, సాలిక్స్, 2, 4-డి	80% నీటిలో
2	2,4-డి అమైనోసాల్టు	వీడ్‌మార్ సూపర్, వీడార్	58% ద్రావకం
3	అట్రాజిన్	అట్రాటాప్, సొలారో, సూర్య, మిలిజిన్, ధనుజిన్, క్రోజిన్ స్ట్రైక్	50% నీటిలో కరిగే పొడి
4	అనిలోఫాస్	అనిలోగార్డ్, ఎరోజిన్, అనిల్‌ధిన్, అనిలోస్టార్, వీడోనిల్	30% ద్రావకం
5	బ్యుటాక్లోర్	మ్యాచిట్, టీడ్, ట్రాప్, మిల్‌క్లోర్, ధనుక్లోర్, బెల్‌క్లోర్, అనుక్లోర్	50% ద్రావకం 5% గుళికలు
6	బ్యుటాక్లోర్ +2, 4-డి	అనుక్లోర్+2, 4-డి	5% + 4% గుళికలు
7	2,4-డి ఇథైల్ ఎస్టర్	నాక్‌వీడ్, 2,4-డి గుళికలు	4% గుళికలు
8	పెండిమిథాలిన్	స్టాంప్, పెండిస్టార్, గధర్, దనుటాప్, పెండమిల్,పనిడా	30% ద్రావకం
9	పెండిమిథాలిన్	స్టాంప్ ఎక్స్‌ట్రా	38.7% ద్రావకం
10	సైహాలో పాప్‌బ్యుటైల్	క్లించర్, రాప్‌అప్, డెనిటిల్	10% ద్రావకం
11	ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్	విప్ సూపర్, వ్యూమాసూపర్, పెనాక్సాసిల్	9% ద్రావకం
12	ఫెనాక్సాప్రాప్ ఇథైల్+సేఫనర్	రైస్‌స్టార్	6.3 % ద్రావకం
13	క్విజలోఫాప్ ఇథైల్	టర్గాసూపర్	5% ద్రావకం
14	ఇమజితాపిర్	పరష్యూట్, దీనామజ్, లగామ్, వీడ్‌బ్లాక్	10% ద్రావకం
15	ప్రిటిలాక్లోర్	ఎరేజ్, రిఫిట్, ప్రెటిగాన్	50% ద్రావకం
16	ఆక్సిఫ్లోర్‌ఫిన్	గోల్, ఆక్సిగోల్డ్, గాలిగాన్	23.5% ద్రావకం
17	పైరజోసల్ఫ్యూరాన్ ఇథైల్	సాథి, ఒజికా	10% నీటిలో కరిగే పొడి
18	మెట్రిబుజిన్	శంకర్, టాటామెట్రి, ట్రిబ్యుట్, బారియర్	70% నీటిలో కరిగే పొడి
19	మెటాసల్ఫ్యూరాన్ మిథైల్ + క్లోరిమ్యూరాన్ ఇథైల్	ఆల్‌మిక్స్, రైమిక్స్, ఆల్‌గ్రిప్	20% నీటిలో కరిగే పొడి
20	పారాక్వాట్	గ్రామోక్సోన్, యునిక్యాట్, మిల్‌క్యాట్	24% ద్రావకం
21	పైరిథయోబాక్ సోడియం	హిట్‌వీడ్, థీమ్, రైప్	10% ద్రావకం
22	బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం	నామిని గోల్డ్, తారక్, ఎడోరా	10% ద్రావకం
23	ప్రిటిలాక్లోర్ + సేఫనర్	సోఫెట్	50% ద్రావకం
24	ప్రొపిక్విజాఫాప్	ఎజిల్, సొసైటీ, ఓపెల్	10% ద్రావకం
25	సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ అసిఫ్లోరోఫెన్+క్లాడినాఫాప్ ప్రొపర్జిల్	ఐరిస్, పటేల	24.5% ద్రావకం
26	టొప్రామిజోన్	టింజర్, ఎలైట్	33.6% ద్రావకం
27	టెంబోట్రియోన్	లాడిస్	34.4% ద్రావకం
28	ప్రిటిలాక్లోర్+బెన్‌సల్ఫ్యూరాన్	లొండాక్స్ పవర్, ఎరేజి స్ట్రాంగ్	6.6% గుళికలు

29	ఫోమిసాఫెన్ + ప్లుజియఫాప్ బ్యుటైల్	ప్యూజిఫ్లెక్స్, పారాఫ్లెక్స్	22.2% ద్రావకం
30	ప్రొపిక్విజాఫాప్ + ఇమజితాపిర్	షెకడ్	6.25% ద్రావకం
31	హాలోసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్	సెంప్రా	75% నీటిలో కరిగే పొడి
32.	గ్లూపోసినేట్ అమ్మోనియం	బస్టా, స్వీప్ పవర్	13.5% ద్రావకం
33.	ఇథాక్సీసల్ఫ్యూరాన్	సన్ రైస్	15.0% నీటిలో కరిగే గుళికలు
34.	ట్రయాపమోన్ + ఇథాక్సీ సల్ఫ్యురాన్	కౌన్సిల్ ఆక్టివ్	30% నీటిలో కరిగే గుళికలు
35.	పైరిథయోబాక్ సోడియం + క్విజలోపాప్ పి ఇథైల్	హిట్ వీట్ మాక్స్, దోసమాక్స్	10% ద్రావకం
36.	హ్యలాక్సీపాప్ ఆర్ మిథైల్	గ్యాలంట్ / ట్యాలెంట్	10.5% ద్రావకం
37.	క్లిథోడిం	సెంట్యూరియన్	25% ద్రావకం

మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (సేద్య శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

లాం, గుంటూరు – 522 034.

సెల్ : 98852 80283

పట్టిక 1 : క్రిమి సంహారక, శిలీంధ్రనాశక మందులు మరియు జీవ నియంత్రణ కారకాల కలయిక వివరాలు

		శిలీంధ్రనాశక మందులు																	జీవ నియంత్రణ కారకాలు						
క్రిమి సంహారక మందులు	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	29	30	31	32	33	34	35
	1	C		C	N		C			C					N						C				
	2	N		C			C								N			C							
	3	N		C	C		C	C		C	C	N			N										
	4	N	N	N	N		C			C	C		C		N			C							
	5		N							N								C							
	6	N	N	C		C	C	C		C	C	C									N				
	7	N	N	C	C		C	C			C	C	C					N							
	8	C	N												N										
	9	C	N	C	C		C			C	C		C			C		C				C			
	10	C	N	C			C			C	C	C													
	11	N	N				C																		
	12	N	N	C			C																		
	13	N	N	C	C		C	N					N												
	14	N	N	C	C		C	C			C		C												
	15	N	N	C	C		C				C														
	16	N					C																		
	17	N	N	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C			C		C			C				
	18	N	N	C								C	C					C							
	19	C	N					C																	
	29																		C	C	C				
	30																	C							
	31																	C							
	32																	C							
	33																								
	34			N		C	N					N	N				C								
	35				N																				

శిలీంధ్రనాశక మందులు

క్రిమి సంహారక మందులు	No	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	3	6
	20	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	21	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	22	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	23	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	24	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	25	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	26	C	N	C	C	C	N	N	N	C	C	N	N	C	C	C	N	C
	27	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	28	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C
	1	C	C	C	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N	C

పట్టిక (1) మందుల వివరాలు

నిలువు : క్రిమి సంహారక మందులు

1. ఎసిఫేట్
2. క్లోరిపైరిఫాస్
3. రైనాక్సిపైర్
4. డైమిథోయేట్
5. ఫెనిట్రోథియాన్
6. మలాథియాన్
7. మిథైల్ డెమెటాన్
8. ఫెన్థోయేట్
9. థయోడికార్బ్
10. ఫాసలోన్
11. ప్రొఫెనోఫాస్
12. క్వినాల్ఫాస్
13. సైపర్ మెత్రిన్
14. డెల్టామెత్రిన్
15. ఫెన్వల్రేట్
16. ఫెన్ప్రొపెథ్రిన్
17. ఇమిడాక్లోప్రిడ్
18. కార్బోఫ్యూరాన్
19. కార్బోసల్ఫాన్
20. బూప్రోఫెజిన్
21. ఫిప్రోనిల్
22. డైనోటెఫ్యూరాన్
23. ఎథిప్రోల్ + ఇమిడాక్లోప్రిడ్
24. పైమెట్రోజైన్
25. ఇథోఫెన్ప్రాక్స్
26. కార్టప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఎస్.పి.
27. క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ ఎస్.సి.
28. ఫ్లూబెండియమైడ్

జీవనియంత్రణ కారకాలు

29. బాసిల్లస్ తురింజియెన్సిస్
30. హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా యన్.పి.వి.
31. స్పోడోప్టెరా లిటూరా యన్.పి.వి.
32. బెవేరియా బెస్సియానా
33. వర్టిసిల్లియమ్ లకాని
34. ట్రైకోడెర్మా స్పీసీస్
35. సూడోమోనాస్ ఫ్లోరిసెన్స్

అడ్డం : శిలీంద్రనాశక మందులు

1. కార్బండెజిమ్ 50 డబ్ల్యు.పి.
2. బోర్డోమిశ్రమం
3. అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 25 యస్.సి.
4. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 50 డబ్ల్యు.పి.
5. కార్బోక్సిన్
6. మాంకోజెబ్ 75 డబ్ల్యు.పి.
7. సల్ఫర్ (వెట్టబుల్) 80 డబ్ల్యు.డి.జి.
8. థయోఫానేట్ మిథైల్ 70 డబ్ల్యు.పి.
9. జైరామ్ 27% యస్.సి.
10. జినెబ్ 75 డబ్ల్యు.పి.
11. థైరమ్ 75% డబ్ల్యు.పి.
12. కాప్టాన్ 50% డబ్ల్యు.పి.
13. ప్రోపినెబ్ 70 డబ్ల్యు.పి.
14. కాపర్ సల్ఫేట్
15. ఆక్సికార్బోక్సిన్
16. మెటలాక్సిల్ 35% డబ్ల్యు.ఎస్.
17. హెక్సాకొనజోల్ 5 ఇ.సి.
18. వాలిడామైసిన్ 3 యల్
19. ప్రోపికొనజోల్ 25 ఇ.సి.
20. టెబ్యుకొనజోల్ 25.9 ఇ.సి.
21. ట్రైసైక్లోజోల్ 75 డబ్ల్యు.పి.
22. ఐసోప్రొథయోలేన్ 40 ఇ.సి.
23. కాసుగామైసిన్ 3 యల్
24. ట్రైఫ్లాక్సీస్ట్రోబిన్+టెబ్యుకొనజోల్ 75 డబ్ల్యు.పి.
25. కార్బండెజిమ్12%+మాంకోజెబ్63%
26. కాప్టాన్ 70% + హెక్సాకోనజోల్ 5% డబ్ల్యు.పి.
27. క్లైసాక్సిమ్ మిథైల్ 44 ఇ.సి.
28. ట్రైసైక్లోజోల్ 18% + మాంకోజెబ్ 62%
29. ప్రోపికొనజోల్+డైఫెన్కొనజోల్
30. కార్బండెజిమ్ 25%డబ్ల్యు.పి. + మాంకోజెబ్ 50%డబ్ల్యు.పి.
31. అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 11% + టెబ్యుకొనజోల్ 18.3% ఎస్.సి.

జీవనియంత్రణ కారకాలు

29. బాసిల్లస్ తురింజియెన్సిస్
30. హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా యన్.పి.వి.
31. స్పోడోప్టెరా లిటురా యన్.పి.వి.
32. బెవేరియా బెస్సియానా
33. వర్టిసిల్లియమ్ లకాని
34. ట్రైకోడెర్మా స్పీసీస్
35. సూడోమోనాస్ ఫ్లోరిసెన్స్

పట్టిక 2 : క్రిమి సంహారక మందుల కలయిక వివరాలు (సిఫారసు చేసిన మోతాదు మేరకు)

క్ర.సం.	కీటక నాశక మందులు	కీటక నాశక మందులు					
		స్పైనిటోరమ్	ఫ్లోనికామిడ్	సయాంట్రినిలిప్రోల్	స్పైరోమెసిఫెన్	ప్రోపర్‌గైట్	లుఫెన్యురాన్
1	స్పైనిటోరమ్	C	C	C	C	C	C
2	ఫ్లోనికామిడ్	C	C	C	C	C	C
3	సయాంట్రినిలిప్రోల్	C	C	C	C	C	C
4	స్పైరోమెసిఫెన్	C	C	C	C	C	C
5	ప్రోపర్‌గైట్	C	C	C	C	C	C
6	లుఫెన్యురాన్	C	C	C	C	C	C

C - కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు.

పట్టిక 2 : క్రిమి సంహారక మందుల కలయిక వివరాలు (సిఫారసు చేసిన మోతాదు మేరకు)

క్ర.సం.	కీటక నాశక మందులు	కీటక నాశక మందులు			
		క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 70% డబ్ల్యూ.పి. 2 గ్రా. /లీ. + మైక్రోన్యూట్రియెన్ట్ 5 గ్రా./లీ.	క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 70% డబ్ల్యూ.పి. 2 గ్రా. /లీ. + 13-0-45 పిచికారి నమూనా 5 గ్రా./లీ.	టెబ్యుకొనజోల్ 50% డబ్ల్యూ.జి. + ట్రైఫ్లాక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూ.జి. 1.25 గ్రా./లీ. + మైక్రోన్యూట్రియెన్ట్ 5 గ్రా. /లీ.	టెబ్యుకొనజోల్ 50% డబ్ల్యూ.జి. + ట్రైఫ్లాక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూ.జి. 1.25 గ్రా./లీ. +13-0-45 5 గ్రా./లీ.
1	థయోక్లోప్రిడ్ 21.7 ఎస్.సి. 1.25 మి.లీ./లీ.	C	C	C	C
2	థయోమిథాక్సామ్ 75 డబ్ల్యూ.జి 0.5 గ్రా./లీ.	C	C	C	C

C - కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు.

థయోక్లోప్రిడ్ 1.25 మి.లీ. లకు టెబ్యుకొనజోల్ + ట్రైఫ్లాక్సీస్ట్రోబిన్ 1.25 గ్రా. మరియు సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమము 5 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేసినప్పుడు తామర పురుగులు మరియు తిక్కా ఆకు మచ్చ తెగులును సమర్ధవంతంగా నియంత్రించినది.

పట్టిక 3 : క్రిమి సంహారక, శిలీంధ్ర నాశక మందుల కలయిక వివరాలు (సిఫారసు చేసిన మోతాదు మేరకు)

సం.	శిలీంధ్ర నాశక మందులు	క్రిమి సంహారక మందులు										
		ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి.	బూప్రోఫెజిన్ 25% ఎస్.సి.	ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్.సి.	డైనోటెఫ్యూరాన్ 20 ఎస్.జి. (5)	ఎథిప్రోల్ 40%+ ఇమిదాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యూ.జి.	పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యూ.జి.	ఇథోఫెన్‌ప్రాక్స్ 10% ఇ.సి.	కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్.పి.	క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.పి.	ఫ్లూబెండియమైడ్ 20 డబ్ల్యూ.జి.	ట్రైఫ్లూమిజోపైరిమ్ 10 ఎస్.సి. (12)
1.	మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2.	కార్బండెజిమ్ 50% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3.	కాప్టాన్ 70%+ హెక్సాకొనజోల్ 5% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4.	కార్బండెజిమ్ 12% + మాంకోజెబ్ 63% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5.	కార్బండెజిమ్ 25%+ మాంకోజెబ్ 50% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6.	కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 50% డబ్ల్యూ.పి.	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
7.	హెక్సాకొనజోల్ 5% ఇ.సి. మరియు 5% ఎస్.సి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8.	వాలిడామైసిన్ 3% ఎల్.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC	C
9.	ప్రోపికొనజోల్ 25% ఇ.సి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10.	టెబ్యుకొనజోల్ 25.9% ఇ.సి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11.	ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C

C - కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు

NC - కలిపి పిచికారి చేయరాదు

పట్టిక 3 : క్రిమి సంహారక, శిలీంధ్ర నాశక మందుల కలయిక వివరాలు (సిఫారసు చేసిన మోతాదు మేరకు)

సం.	శిలీంధ్ర నాశక మందులు	క్రిమి సంహారక మందులు										
		ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి.	బూప్రోఫెజిన్ 25% ఎస్.సి.	ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్.సి.	డైనోటెఫ్యూరాన్ 20 ఎస్.జి. (5)	ఎథిప్రోల్ 40%+ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యూ.జి.	పైమెట్రోజిన్ 50% డబ్ల్యూ.జి.	ఇథోఫెన్‌ప్రాక్స్ 10% ఇ.సి.	కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్.పి.	క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్.పి.	ఫ్లూబెండియమైడ్ 20 డబ్ల్యూ.జి.	ట్రైఫ్లూమిజోపైరిమ్ 10 ఎస్.సి. (12)
12.	ఐసోప్రోథయోలెన్ 40% ఇ.సి.	C	NC	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
13.	కాసుగామైసిన్ 3% ఎల్.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
14.	ట్రైఫ్లాక్సీస్ట్రోబిన్ + టెబ్యుకొనజోల్ 75% డబ్ల్యూ.జి.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
15.	క్రెసోక్సిమ్ - మిథైల్ 44.3% ఎస్.సి.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
16.	ట్రైసైక్లోజోల్ 18% + మాంకోజెబ్ 62% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	C	C
17.	ప్రోపికొనజోల్ 13.9% + డైఫెన్‌కొనజోల్ 13.9%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18.	అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 25 ఎస్.సి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19.	అజాక్సీస్ట్రోబిన్ 11% + టెబ్యుకొనజోల్ 18.5 ఎస్.సి.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C - కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు

NC - కలిపి పిచికారి చేయరాదు

పట్టిక 3 : క్రిమి సంహారక, శిలీంధ్రనాశక మందుల కలయిక వివరాలు

సం.	శిలీంధ్రనాశిని / క్రిమి సంహారకాలు	కార్బండెజిమ్	డైథెన్ యం-45 ♦మాంకోజెబ్	కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్	సల్ఫర్ 80% డబ్ల్యూ.డి.జి.
1.	♦♦ క్లోరిపైరిఫాస్ 20% ఇ.సి.	C	C	NC	C
2.	క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇ.సి.	C	C	NC	C
3.	♦♦♦ డైమిథోయేట్ 30% ఇ.సి.	C	C	NC	C
4.	ప్రొఫెనోఫాస్ 50% ఇ.సి.	C	C	NC	C
5.	ఇండాక్సీకార్బ్ 15.8% ఇ.సి.	C	C	NC	C
6.	నీమ్ ఫార్ములేషన్ 1000 పి.పి.యం.	C	C	NC	C
7.	థయోమిథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యూ.జి.	C	C	NC	C
8.	స్పైనోసాడ్ 45% ఎస్.సి.	C	C	NC	C
9.	ఫిప్రోనిల్ 20% ఎస్.సి.	C	C	NC	C
10.	థయోక్లోప్రిడ్ 21.7% ఎస్.సి.	C	C	NC	C
11.	ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్.పి.	C	C	NC	C
12.	నొవాల్యురాన్ 10% ఇ.సి.	C	C	NC	C
13.	ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.జి.	C	C	NC	C
14.	థయోడికార్బ్ 70% డబ్ల్యూ.పి.	C	C	NC	C
15.	మెటాఫ్లుమిజోన్ 22% ఎస్.సి.	C	C	NC	C
16.	ఫ్లుబెండియమైడ్ (ఫేమ్) 480 ఎస్.సి.	C	C	NC	C
17.	ఇమిడాక్లోప్రిడ్	C	C	NC	C
18.	ఎసిఫేట్	C	C	NC	C
19.	క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్	C	C	NC	C
20.	డైఫెన్‌థియురాన్	C	C	NC	C
21.	ఇథియోన్ + సైపర్‌మెత్రిన్	C	C	NC	C
22.	లాంమ్డా సైహలోత్రిన్ 2.5% ఇ.సి.	C	C	NC	C

C – కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు **NC –** కలిపి పిచికారి చేయరాదు

♦ మాంకోజెబ్ శిలీంధ్రనాశక మందు వాడకాన్ని జామ, జొన్న మరియు కర్రపెండలం పంటలపై నిషేధించడమైనది

♦♦క్లోరిపైరిఫాస్ క్రిమి సంహారక మందు వాడకాన్ని రేగు, నిమ్మ మరియు పొగాకు పంటలపై నిషేధించడమైనది.

♦♦♦ డైమిథోయేట్ క్రిమి సంహారక మందు వాడకాన్ని పచ్చిగా తినే పండ్లు మరియు కూరగాయ పంటలపై నిషేధించడమైనది.

పట్టిక 4 : క్రిమి సంహారక మందుల, రసాయనిక ఎరువుల కలయిక వివరాలు

	క్రిమి సంహారక మందులు																						
సం.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.															C								
2.															C								
3.					C		C							C						C		C	
4.	C		C	I				C															
5.	C	C	C	I	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C
6.																					C		
7.																				C		C	
8.																					I	I	

C - కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు

I - కలిపి పిచికారి చేయరాదు

- క్షార స్వభావం గల మందును ఏ ఇతర మందులతో కలుపరాదు
- ట్రైకోడెర్మా శిలీంద్రమును క్రిమి సంహారక మందులతో కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయరాదు
- సూడోమోనాస్ ఫ్లోరిసెన్స్ బాక్టీరియాను యాంటీ బయాటిక్ మందులతో కలుపరాదు

రసాయనిక ఎరువులు (నిలువు)

1. బోరాక్స్	2. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్	3. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్
4. సూపర్ ఫాస్ఫేట్	5. యూరియా	6. జింక్ సల్ఫేట్
7. ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్	8. డై అమ్మోనియమ్ ఫాస్ఫేట్	

క్రిమి సంహారక మందులు (అడ్డం)

1. ఎసిఫేట్	2. కార్బోప్యురాన్ (3%)	3. కార్బొసల్ఫాన్
4. క్లోర్‌ఫెన్‌విన్‌ఫాస్	5. క్లోరిపైరిఫాస్	6. డయాజినాన్
7. ♦ డైమిథోయేట్	8. డైసల్ఫోటాన్	9. ఫెనిట్రోథియాన్
10. ఫెన్‌సల్ఫోథియాన్	11. ఫెన్‌థియాన్	12. హెక్సాక్లోర్‌హెక్సేన్
13. ఐసోఫెన్‌ఫాస్	14. ♦♦ మలాథియాన్	15. మెథోస్ఫోలాన్
16. మోథామిడోఫాస్	17. మిథైల్ డెమెటాన్	18. పాస్ఫామిడాన్
19. ఫెనామిఫాస్	20. ప్రొఫెనోఫాస్	21. క్వినాల్‌ఫాస్
22. టెబ్యూఫాస్	23. టెలోడ్రిన్	

Source : A guide on crop pests - A. Regupathy, S. Palanisamy, N. Chandra Mohan, K. Gunathilagaraj (1997)

♦ డైమిథోయేట్‌ను కూరగాయలు మరియు పండ్లు మీద పిచికారిని నిషేదించారు.

♦♦ మలాథియాన్‌ను జొన్న, బఠాణి, సోయాచిక్కుడు, ఆముదము, ప్రొద్దుతిరుగుడు, బెండ, వంకాయ, క్యాలిఫ్లవర్, ముల్లంగి, టమాట, ఆపిల్, మామిడి మరియు ద్రాక్ష పంటలపై పిచికారి చేయడము నిషేదించారు.

పట్టిక 5 : క్రిమి సంహారక మందుల, రసాయనిక ఎరువుల కలయిక వివరాలు


సం.	రసాయనిక ఎరువులు / క్రిమి సంహారకాలు	యూరియా	మల్టీ-కె	ఫెర్రస్ సల్ఫేట్	అగ్రిఫెర్
1.	క్లోరిపైరిఫాస్ 20% ఇ.సి.	C	C	C	C
2.	♦ క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇ.సి.	C	C	C	C
3.	♦♦ డైమిథోయేట్ 30% ఇ.సి.	C	C	C	C
4.	ప్రొఫెనోఫాస్ 50% ఇ.సి.	C	C	C	C
5.	ఇండాక్సీకార్బ్ 15.8% ఇ.సి.	C	C	C	C
6.	నీమ్ ఫార్ములేషన్ 1000 పి.పి.యం.	C	C	C	C
7.	థయోమిథాక్సామ్ 25% డబ్ల్యు.జి.	C	C	C	C
8.	స్పైనోసాడ్ 45% ఎస్.సి.	C	C	C	C
9.	ఫిప్రోనిల్ 20% ఎస్.సి.	C	C	C	C
10.	థయోక్లోప్రిడ్ 21.7% ఎస్.సి.	C	C	C	C
11.	ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్.పి.	C	C	C	C
12.	నొవాల్యురాన్ 10% ఇ.సి.	C	C	C	C
13.	ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.జి.	C	C	C	C
14.	థయోడికార్బ్ 70% డబ్ల్యు.పి.	C	C	C	C
15.	మెటాఫ్లుమిజోన్ 22% ఎస్.సి.	C	C	C	C
16.	ఫ్లుబెండియమైడ్ (ఫేమ్) 480 ఎస్.సి.	C	C	C	C
17.	ఇమిడాక్లోప్రిడ్	C	C	C	C
18.	ఎసిఫేట్	C	C	C	C
19.	క్లోరాంట్రనిలిప్రోల్	C	C	C	C
20.	డైఫెన్‌థియురాన్	C	C	C	C
21.	ఇథియోన్ + సైపర్‌మెత్రిన్	C	C	C	C
22.	లాంమ్డా సైహలోత్రిన్ 2.5% ఇ.సి.	C	C	C	C

C కలిపి పిచికారి చేయవచ్చు.

♦ క్వినాల్‌ఫాస్ మందును జనపనార, యాలకులు మరియు జొన్న పంటల మీద పిచికారిని నిషేధించారు.

♦♦ డైమిథోయేట్ మందును కూరగాయలు మరియు పండ్లు మీద పిచికారిని నిషేధించారు.

వివిధ రసాయనిక ఎరువుల కలయిక వివరాలు



1 మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్
2 సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్
3 అమ్మోనియం సల్ఫేట్
4 కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్
5 సోడియం నైట్రేట్
6 కాల్షియం సైనమైడ్
7 యూరియా
8 సూపర్ ఫాస్ఫేట్ సింగిల్ లేక ట్రిపుల్
9 అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్
10 బేసిక్ స్లాగ్
11 కాల్షియం కార్బోనేట్

వివిధ రకాల ఎరువులను కలుపునప్పుడు ముఖ్యంగా రసాయన అనుకూలత, కీలక తేమ శాతం (క్లిష్టమైన సాపేక్ష ఆర్ద్రత) మరియు భౌతిక అనుకూలత అను మూడు అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

వివిధ పొడి (ఘన) ఎరువులను కలిపినప్పుడు అవి ఏ విధమైన రసాయన చర్యకు లోనవుచున్నవి, కరిగే గుణం మరియు సురక్షితం అవునా, కాదా అనేది గమనించాలి. సాధారణంగా ఎరువుగా వాడే పదార్థములు లవణాలు కనుక వాతావరణంలోని తేమను గ్రహిస్తాయి. అతికొద్ది పదార్థములు లవణములు కానప్పటికీ ఎరువుగా వాడతాము. ఉదా : సల్ఫర్ మూలకము. వాతావరణంలోని తేమను గ్రహించే లక్షణమును హైగ్రోస్కోపిక్ స్థితి అంటారు.ఎక్కువ హైగ్రో స్కోపిక్ స్వభావం ఉన్న పదార్థాలు ఎక్కువ తేమను గ్రహిస్తాయి. కనుక వాటికి తక్కువ కీలక తేమ శాతం (క్లిష్టమైన సాపేక్ష ఆర్ద్రత) ఉంటుంది. ప్రతి ఎరువు పదార్థమునకు లేదా ఎరువుల మిశ్రమమునకు నిర్దిష్టమైన కీలక తేమ శాతం ఉంటుంది.

ఎరువుల మిశ్రమము తయారీలో ఉపయోగించిన ఎరువులకన్నా ఎరువుల మిశ్రమమునకు తక్కువ కీలక తేమ శాతం ఉంటుంది. ఈ కీలక తేమ స్థాయి ఎరువు లేదా ఎరువుల మిశ్రమము గాలి నుంచి తేమను గ్రహించుట సూచిస్తుంది (పట్టిక–1). ఇది గాలి ఉష్ణోగ్రత ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది మరియు గాలి ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ కీలక తేమ శాతం తగ్గుతుంది. కావున ఎక్కువ కీలక తేమ శాతం కలిగిన ఎరువులను తక్కువ కీలక తేమ శాతం ఎరువులతో కలుపరాదు. ఉదా : యూరియా (73 శాతం) ను మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (92 శాతం) తో కలపడం వలన 65 కీలక తేమ శాతం కలిగిన మిశ్రమము ఏర్పడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో కేక్ లేదా స్లర్రీ కూడా ఏర్పడుతుంది. యూరియాను ఎం.ఎ.పి. లేదా డి.ఏ.పి. తో కలిపినప్పుడు వెనువెంటనే నేలకు అందించాలి. లేనిచో సూపర్ ఫాస్ఫేట్ విడుదల చేసే నీటి పరమాణువులతో యూరియా ప్రతిస్పందిస్తుంది. యూరియా లేదా డి.ఏ.పి.ను తక్కువ కీలక తేమ శాతం ఉన్న ఉత్పత్తులతో కలుపరాదు. ఎందుకనగా ఉత్పత్తులు ప్రతిస్పందిస్తాయి మరియు అస్పష్టంగా మారతాయి.

రసాయన అనుకూలత హైగ్రోస్కోపిక్ స్వభావంతో పాటు మిశ్రమ ఎరువుల తయారీకి ఎరువు యొక్క భౌతిక లక్షణములైన పరిమాణం, ఆకారం మరియు సాంద్రత అనుకూలతను నిర్ధారిస్తాయి. ఒకే రకమైన పరిమాణం, ఆకారం, సాంద్రత కలిగిన ఎరువులను కలుపుట అనుకూలమైనది. పరిమాణంలో 10 శాతం కంటే ఎక్కువ భిన్నమైన పదార్థములు ఉన్నచో రవాణాలో వేరుచేయబడతాయి. సాంద్రతలో వ్యత్యాసం ఉన్నా, నిల్వ సమయంలో పదార్థము వేరుచేయబడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది సూక్ష్మపోషక ఎరువుల తయారీలో ఈ సమస్య ఉంటుంది.

పట్టిక 1 : వివిధ ఎరువుల యొక్క కీలక తేమ స్థాయి

సం.	ఎరువు	కీలక తేమ స్థాయి (క్లిష్ట సాపేక్ష ఆర్ద్రత) (%) 30^0
1.	యూరియా	70–75
2.	డి.ఏ.పి.	83
3.	పొటాషియం క్లోరైడ్	76
4.	సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్	96
5.	అమ్మోనియం నైట్రేట్	58
6.	ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్	95
7.	అమ్మోనియం సల్ఫేట్	79
8.	మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్	92

ఎరువుల కలయిక మరియు నిల్వ ఉంచుటలో పరిగణనలోనికి తీసుకోవలసిన ముఖ్యమైన అంశములు (పటము –1).

1. యూరియాను చాలా ఎరువులతో కలపవచ్చు కానీ కలిపిన వెంటనే నేలకు అందించవలెను.
2. ఎరువుల మిశ్రమంలో యూరియా ఉన్నచో నిల్వ చేయరాదు.
3. అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ మరియు సూపర్ ఫాస్ఫేట్‌ను లైమ్, బేసిక్ స్లాగ్, రాక్ ఫాస్ఫేట్, కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్‌తో కలుపరాదు.
4. పొటాషియం క్లోరైడ్, సల్ఫేట్ అఫ్ పొటాష్‌ను యూరియాతో కానీ, కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్‌తో కలిపి నిల్వ ఉంచకూడదు.
5. కాల్షియమ్ అమ్మోనియం నైట్రేట్‌ను బేసిక్ స్లాగ్‌తో కలుపరాదు. యూరియాతో గానీ అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ తో గానీ కలిపిన యెడల వెనువెంటనే నేలకు అందించాలి.
6. ఒకే ట్యాంకులో కాల్షియం, మెగ్నీషియం కలిగిన ఎరువులను భాస్వరం లేదా గంధకం కలిగిన ఎరువులతో కలుపరాదు.

I) భారతదేశంలో నిషేధించబడిన క్రిమి సంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందుల వివరాలు

ఎ) తయారీ, దిగుమతి, మరియు వాడడానికి వీలులేని క్రిమి సంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందులు

1. అలాక్లోర్
2. ఆల్డీకార్బ్
3. ఆల్డ్రిన్
4. బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్
5. బెనోమిల్
6. కాల్షియం సైనైడ్
7. కార్బరిల్
8. క్లోరోబెంజిలేట్
9. క్లోర్డెన్
10. క్లోరోఫెన్‌విన్‌ఫాస్
11. కాపర్ ఎసిటోర్సినైట్
12. డయాజినోన్
13. డైబ్రోమోక్లోరోప్రాఫేన్
14. డైక్లోర్‌వాస్
15. డైకోఫాల్
16. డైఎల్‌డ్రిన్
17. డైనోకాప్
18. ఎండోసల్ఫాన్
19. ఎండ్రిన్
20. ఇథైల్ మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్
21. ఇథైల్ పెరాథియాన్
22. ఇథిలిన్ డైబ్రోమైడ్
23. ఫెనారిమోల్
24. ఫెన్‌థియాన్
25. హెప్టాక్లోర్
26. లిండేన్ (గామా హె.సి.హెచ్)
27. లిన్యూరాన్
28. మాలిక్ హైడ్రాజైడ్
29. మెనజోన్
30. మెథోమిల్
31. మెథోక్సీ ఇథైల్ మెర్క్యురి క్లోరైడ్
32. మిథైల్ పెరాథియాన్
33. మెటాక్సురాన్
34. నైట్రోఫెన్
35. పెరాక్వాట్ డైమిథైల్ సల్ఫేట్
36. పెంటాక్లోరో నైట్రోబెంజీన్
37. పెంటాక్లోరోఫినాల్
38. ఫినైల్ మెర్క్యూరీ ఎసిటేట్
39. ఫోరేట్
40. ఫాస్ఫామిడాన్
41. సోడియం సైనేడ్
42. సోడియం మిథేన్ ఆర్సోనేట్
43. టెట్రాడిఫోన్
44. థయోమిటోన్
45. టోక్సాఫిన్
46. ట్రైజోఫాస్
47. ట్రైడిమార్ఫ్
48. టిసీఎ (ట్రైక్లోరో ఎసిటిక్ యాసిడ్)
49. ట్రైక్లోరోఫాన్

బి) వాడడానికి నిషేధించబడి, ఎగుమతి చేయడానికి మాత్రమే తయారు చేయబడినటు వంటి క్రిమి సంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందులు మరియు వాటి ఫార్ములేషన్స్

1. నికోటిన్ సల్ఫేట్ 2. కాప్టాఫోల్ 80% పౌడర్ 3. డైక్లోర్‌వాస్ 4. ఫోరేట్ 5. ట్రైజోఫాస్

సి) ఉపసంహరించబడిన క్రిమిసంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందులు

1. డేలఫాన్
2. ఫెర్బామ్
3. ఫార్మోథియాన్
4. నికేల్ క్లోరైడ్
5. పారాడైక్లోరోబెంజీన్ (పిడిసిబి)
6. సిమజిన్
7. వార్‌ఫారిన్
8. సిర్మేట్

II) రిజిస్ట్రేషన్‌కు నిరాకరించబడిన క్రిమిసంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందులు

1. కాల్షియం ఆర్సినేట్
2. ఇ.పి.యన్
3. అజిన్‌ఫాస్ మిథైల్
4. లెడ్ ఆర్సినేట్
5. మెవిన్‌ఫాస్ (ఫాస్‌డ్రిన్)
6. 2, 4, 5-టి
7. కార్బోఫినోథియాన్
8. వామిడోథియాన్
9. మెఫాస్‌ఫోలన్
10. అజిన్‌ఫాస్ ఇథైల్
11. బినాపాక్రిల్
12. డైక్రోటోఫాస్
13. థైయోడిమిటాన్ / డైసల్ఫోటాన్
14. ఫెన్టిన్ అసిటేట్
15. ఫెన్టిన్ హైడ్రాక్సైడ్
16. కినోమిథియోనేట్ (మోరిస్టన్)
17. అమ్మోనియం సల్ఫామేట్
18. లెఫ్టోఫాస్ (ఫాస్వెల్)

III) భారతదేశంలో పరిమిత వాడుకకు అనుమతించబడిన క్రిమి సంహారక మరియు శిలీంధ్ర నాశక మందులు

1. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ 6%
2. కార్బోఫ్యూరాన్
3. క్లోరోపైరిఫాస్
4. డిడిటి
5. డైమిథోయేట్
6. మిలాథియాన్
7. మాంకోజెబ్
8. మిథైల్ బ్రోమైడ్
9. మోనోక్రోటోఫాస్
10. ఆక్సీఫ్లూరోఫెన్
11. ఫెనిట్రోథియాన్
12. క్వినాల్‌ఫాస్
13. డజోమెట్
14. కాప్టాఫాల్ 80%
15. సైపర్‌మెత్రిన్ 3% పొగ
16. ట్రిఫ్లూరాలిన్

పురుగు మందులు మరియు శిలీంధ్ర నాశనాలు కలయిక పై ఇతర విషయాలకోసం సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం) & విశ్వవిద్యాలయ విభాగ అధిపతి,
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, తిరుపతి. సెల్ : 70130 53203;
ప్రొఫెసర్ & హెడ్, యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తెగుళ్ళ డిపార్ట్‌మెంట్, తిరుపతి - 517 502
సెల్ : 96422 76238; అసోసియేట్ డీన్, వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల - 522 101
సెల్ : 99896 25203 మరియు స్పెషల్ ఆఫీసర్, ఎ.పి.జి.సి., లాం, గుంటూరు - 522 034,
సెల్ నెం : 98662 78398

వివిధ రసాయనిక ఎరువుల్లో లభించే పోషక విలువలు

ఆధునిక వ్యవసాయ రంగంలో రసాయన ఎరువులు కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలను తీర్చి ఆహారోత్పత్తిని పెంచడానికి వ్యవసాయంలో ఎరువులు విస్తృతంగా ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. రసాయనిక ఎరువులను కూడా సమగ్ర పోషక యాజమాన్యంలో భాగం చేయటం వలన ఆశించిన దిగుబడులు సాధించవచ్చును. రసాయనిక ఎరువుల సంతులిత వాడకం మరియు సమర్థవంతమైన వినియోగం గురించి సరైన అవగాహన ఉన్నప్పుడే ఎరువుల నుండి పూర్తి ఫలితం పొందగలం. ఎరువులు చేనుకి, మొక్కలకి పోషకాలు అందించుటకు, నేల ఆరోగ్యం పెంపొందించుటకు ఉపయోగపడతాయి.

రసాయన ఎరువులను 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చును.

1) సూటి ఎరువులు : నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం లలో ఏదైనా ఒకే ప్రధాన పోషకాన్ని కలిగిన ఎరువులను 'సూటి ఎరువులు' అంటారు. ఉదా: అమ్మోనియం నైట్రేట్, సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫెటు, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్

2) సంకీర్ణ ఎరువులు : రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రధాన పోషక పదార్థాలున్న ఎరువులను 'సంకీర్ణ ఎరువులు' అంటారు. ఉదా : మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (డి.ఎ.పి.).

3) మిశ్రమ ఎరువులు : ఒకటి కంటే ఎక్కువ సూటి ఎరువులు గాని, సంకీర్ణ ఎరువులు గాని కలిగి ఉన్న ఎరువులను 'మిశ్రమ ఎరువులు' అంటారు. ఉదా: 20:20:20, 17:17:17.

ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం అనేది అనేక అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక కిలో రసాయనిక పోషకాన్ని పంటకు అందించినప్పుడు వచ్చే దిగుబడిని, ఎలాంటి రసాయన ఎరువు వాడకుండా వచ్చిన దిగుబడిని బేరీజు వేసుకొని తదనుగుణంగా రసాయన ఎరువులను వాడటాన్ని సమర్థ ఎరువుల వినియోగం అంటారు.

ఎరువులను ఎలా వాడాలి ?

నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ పోషకాలను ఆహార పంటలకు 4:2:1 నిష్పత్తిలో వాడమని సిఫారసు చేస్తుండగా రైతులు నత్రజని ఎరువులను అవసరమైన దాని కన్నా రెండు నుండి రెండున్నర రెట్లు అధికంగా వేస్తున్నారు. తద్వారా అవసరం లేని పోషకాన్ని వేసి వృధా చేయడం వలన ఖర్చు పెరగడం, పోషకాల సమతుల్యత లోపించడం, దిగుబడి తగ్గడం, నేల ఆరోగ్యం, ఫలదత క్షీణించడం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అవసరమైన మేరకే ఎరువులను వేయడం, వేసిన ఎరువులు సమర్థవంతంగా మొక్క తీసుకునేటట్లు చేయడం ద్వారా ఎరువు ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు మరియు రసాయన ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

ఎరువులు ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి, ఏ నేలకు ఏ ఎరువు పనికి వస్తుంది ?

- యూరియా, అమ్మోనియం సల్ఫేట్, కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఎరువులలో ఉన్న ముఖ్య పోషకం "నత్రజని" అయినప్పటికీ అది రసాయనికంగా వివిధ రూపాల్లో ఉంటుంది. ఎరువుల లక్షణాలు కూడా వేర్వేరుగా ఉంటాయి.

- ఇసుక పాలు తక్కువ ఉన్న మాగాణి భూముల్లో తప్ప మిగతా అన్ని నేలలకు పంటలకు పైరు అడుగులోను, పైపాటుగా యూరియా వేసుకోవచ్చు.
- అమ్మోనియం సల్ఫేటును క్షార గుణం నేలలకు, సున్నపు పాలు ఎక్కువగా ఉన్న నేలలకు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. కానీ ఆమ్ల భూములకు, సల్ఫైడ్ ఇంజురీ వచ్చే భూములకు వేయరాదు.
- కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్ అన్ని భూములకు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. కానీ వరిలో చిరుపొట్ట దశలో మాత్రమే వేసుకోవాలి. ఆఖరి దమ్ములో పైరు అడుగులోను, మొదటి సారి పైపాటు సమయాల్లో వేస్తే అందులోని నైట్రేట్ నత్రజని వృథా అవుతుంది,
- సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ను సాధారణంగా అన్ని పైర్లకు సామాన్య స్థితి గల నేలలకు మరియు క్షార నేలలకు వేయవచ్చు. కానీ ఆమ్ల గుణం గల నేలలకు సల్ఫైడ్ ఇంజురీ వచ్చే నేలలకు వేయరాదు.
- అమ్ల గుణం గల నేలలకు డై కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, రాక్ ఫాస్ఫేట్ వంటివి పనికి వస్తాయి. అయితే ఇవి క్షారగుణం గల నేలలకు, సాధారణ పైర్లకు ఉపయోగపడవు. ఫల వృక్షాలు, తోట వృక్షాలు వంటి బహువార్షికాలకు వాడవచ్చు.
- భాస్వరం పంటలలో వేరు వ్యవస్థ అభివృద్ధికి చాలా అవసరం. కావున భాస్వరం అందించే ఎరువులను వ్యవసాయ (వార్షిక) పంటలకు ఆఖరి దుక్కిలో పైరు అడుగులో వేయాలి.
- మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాషియంను పాలచౌడు తప్ప మిగిలిన అన్ని నేలలకు వాడవచ్చు. పొగాకు పైరుకు వేయరాదు. నాణ్యత తగ్గిపోతుంది.
- సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ అన్ని నేలలకు, అన్ని పైర్లకు వాడవచ్చు.
- కాంప్లెక్స్ ఎరువుల్లో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అన్ని నేలలకు, అన్ని పైర్లకు వేయవచ్చు.
- నైట్రోఫాస్ఫేట్ మెట్ట, ఆరుతడి పైర్లకు, ఎర్ర నేలలకు, సామాన్య రసాయన స్థితిగల నేలలకు, కొద్దిపాటి ఆమ్ల గుణం గల నేలలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వాటిని వరి పైరుకు వేస్తే అందులోని నైట్రేటు నత్రజని వృథా అవుతుంది.
- ఈ మెళకువలు పాటించి ఎరువులను ఎంపిక చేసుకోవడం వల్ల పైరుకు పోషకాలు సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడతాయి.
- వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు/అధికారులు వివిధ వ్యవసాయ పంటలకు అవసరమయ్యే పోషకాలను మోతాదు మేరకు సూచించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యాన పంటలకు మాత్రం మొక్కకు వాడాల్సిన పోషకాల మోతాదును బట్టే ఎరువుల పరిమాణాన్ని సూచిస్తారు. వ్యవసాయ పంటలు పత్తి, మిర్చి, వరి లాంటి పంటలకు మాత్రం పోషకాల మోతాదును మాత్రమే సూచిస్తారు. రసాయన ఎరువుల్లోని ఈ మోతాదును లెక్కగట్టి వాడితే ఖర్చు తగ్గడమేగాక పైరుకు పోషకాలు సమతుల్యంగా అందినట్లవుతుంది. ఎరువుల ధరలు తరుచూ పెరుగుతున్నందున వాటి వాడకం మరింత భారం కాకుండా పోషకాల మోతాదు గణనలో తప్పనిసరిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలని రైతులు గమనించాలి.

ఎరువుల్లో పోషకాల శాతం

ఎరువుల బస్తాపై ఆ ఎరువులో ఉండే పోషకాల శాతం ముద్రించి ఉంటుంది. యూరియా బస్తాపై 46 శాతం ఉంటుంది. అంటే వంద కిలోల యూరియాలో 46 కిలోల నత్రజని ఉంటుంది. సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్‌లో 16 శాతం భాస్వరం ఉంటుంది. మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్‌లో 60 శాతం పొటాష్ ఉంటుంది. ఈ ఎరువుల్లో ఒకే పోషక పదార్థం ఉన్నందున వీటిని సూటి ఎరువులు అంటారు. రెండు లేదా మూడు పోషకాలు కలిపి ఉండే ఎరువులను కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అంటారు. డీఏపీలో 18 శాతం నత్రజని, 46 శాతం భాస్వరం ఉంటాయి.

పోషకాల గణన ఇలా...

ప్రతి రసాయనిక ఎరువుకు సంబంధించి ఖచ్చితమైన ఎరువుల శాతాన్ని సూచిస్తూ ఎరువుల గ్రేడ్ ను ప్రకటిస్తారు. ఉదాహరణకు ప్రతి 100 కి. గ్రా. ల 10–20–10 లో 10 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం మరియు 10 కిలోల పొటాషియం ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి రసాయనిక ఎరువులలో పోషకాల నిష్పత్తి ఒకటే అయినా కూడా పోషకాల శాతంలో తేడాలు ఉండవచ్చు. సంతులిత మరియు ఖచ్చితమైన పోషకాల వాడకం అనేది సుస్థిర వ్యవసాయానికి మరియు ఆహార భద్రత సాధించటానికి అవసరమైన సాధనం.

$$\text{పంటకు వేయవలసిన ఎరువు మోతాదు (కి.గ్రా.)} = \frac{\text{సిఫార్సు చేసిన పోషక మోతాదు (కి.గ్రా.)} \times 100}{\text{ఎరువులో పోషక శాతం (\%)}}$$

ఉదాహరణకు పత్తి (బి.టి.) పంటకు ఎకరాకు 60 కిలోల నత్రజని, 24 కిలోల భాస్వరం, 24 కిలోల పొటాష్ సిఫారసు చేయబడింది. ఎంచుకునే ఎరువులో పోషకాల మోతాదును బట్టి అవసరమయ్యే ఎరువులను లెక్కించవచ్చు. కిలో నత్రజని కోసం 2.17 కిలోల యూరియా (100/46) ను వాడాలి. కిలో భాస్వరం అందించేందుకు 6.25 కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ (100/16) వేసుకోవాలి. కిలో పొటాష్ కోసం 1.67 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (100/60) వాడాలి. నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ పోషకాలను వాడినప్పుడు వాటి మోతాదుననుసరించి అవసరమైన ఎరువులు లెక్కగట్టి సరైన అవసరమైనంత మోతాదులో వాడి వృథా ఖర్చు తగ్గించుకుని, పోషకాల సమతుల్యతను పొందవచ్చు. ఎరువుల వాడకంలో కాంప్లెక్స్ ఎరువులు దుక్కిలో విత్తనాలు వేసేటప్పుడు వాడాలి. పైపాటుగా కాంప్లెక్స్ ఎరువుల వాడకం వల్ల పోషకాలు సమర్థవంతంగా పనిచేయవు. యూరియాను పలు దఫాలుగా వేయాలి. ఎక్కువగా యూరియా వాడకం వల్ల చీడపీడలు, తెగుళ్ళు సోకుతాయి.

వివిధ రసాయనిక ఎరువులలో పోషకాల శాతం :

సం.	రసాయనిక ఎరువులు	పోషక పదార్థాల శాతం			
		నత్రజని	భాస్వరం	పొటాషియం	గంధకం
I	**సూటి నత్రజని ఎరువులు**				
1	అమ్మోనియం సల్ఫేట్	20.6	–	–	23.0
2	యూరియా	46.0	–	–	
3	యూరియా (కోటెడ్)	45.0	–	–	
4	అమ్మోనియం క్లోరైడ్	25.0	–	–	
5	కాల్షియం అమ్మోనియం నైట్రేట్	25.0	–	–	
6	అమ్మోనియం సల్ఫేట్ నైట్రేట్	26.0	–	–	12.0
7.	యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ (ద్రవరూపం)	32	–	–	
8.	గంధకం పూత కలిగిన యూరియా	37	–	–	17.0
II	**సూటి భాస్వరం ఎరువులు**				
1.	సింగల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్	–	16	–	12.0
2.	సూపర్ ఫాస్ఫేట్ (ట్రిపుల్)	–	48	–	
3.	రాక్ ఫాస్ఫేట్	–	18	–	
III	**సూటి పొటాషియం ఎరువులు**				
1.	మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్	–	–	51 – 60	
2.	సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్	–	–	48 – 50	17.0
IV	**నత్రజని మరియు భాస్వరం కలిగిన ఎరువులు**				
1	మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (ఫస్ట్ గ్రేడ్)	11	52	–	
2	డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్	18	46	–	
3	అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్ (16-20-0)	16	20	–	14.0
4	అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్ (20-20-0)	20	20	–	
5	నైట్రో ఫాస్ఫేట్ (20-20-0)	20	20	–	
6	నైట్రో ఫాస్ఫేట్ (23-23-0)	23	23	–	

7.	నైట్రో ఫాస్ఫేట్ (24-24-0)	24	24	-	
8.	యూరియా అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (28-28-0)	28	28	-	
9.	యూరియా అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ (24-24-0)	24	24	-	
10.	అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఫాస్ఫేట్ (23-23-0)	23	23	-	
11.	అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ సల్ఫేట్ నైట్రేట్ (20-20-0-13)	20	20	-	13
V	**నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాషియం కలిగిన ఎరువులు**				
1 .	నైట్రో ఫాస్ఫేట్ (పొటాషియంతో)	15	15	15	
2.	14-14-21	14	14	21	
3.	21-06-13	21	06	13	
4.	10-26-26	10	26	26	
5.	12-32-16	12	32	16	
6.	14-35-14	14	35	14	
7.	14-28-14	14	28	14	
8.	17-17-17	17	17	17	
9.	19-19-19	19	19	19	
VI	**ద్వితీయ పోషక ఎరువులు**				
	రసాయనిక ఎరువులు	**కాల్షియం**	**మెగ్నీషియం**	**గంధకం**	
1 .	జిప్సం	23.0	-	18.0	
2.	మెగ్నీషియం సల్ఫేటు	-	9.60	12.0	
3.	బెంటోనైట్ సల్ఫర్	-	-	90.0	
4.	గంధకం	-	-	90.0	

VII సూక్ష్మ పోషక ఎరువులు

సం.	రసాయనిక ఎరువులు	సూక్ష్మ పోషకం	శాతం	గంధకం శాతం(%)
1.	జింకు సల్ఫేట్ ($ZnSO_4.7H_2O$)	జింకు	21.0	10
2.	జింకు సల్ఫేట్ ($ZnSO_4.H_2O$)	జింకు	33.0	15
3.	జింకు ఆక్సైడ్	జింకు	39.5	–
4.	మాంగనీసు సల్ఫేట్ ($MnSO_4$)	మాంగనీసు	30.5	17
5.	బోరాక్స్ ($Na_2B_4O_7.10H_2O$)	బోరాన్	10.5	–
6.	సాల్యుబోర్ ($Na_2B_4O_7.10H_2O$ + $Na_2B_{11}O_6.10H_2O$)	బోరాన్	19	–
7.	కాపర్ సల్ఫేట్ ($CuSO_4.5H_2O$)	కాపర్	24	12
8.	ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ($FeSO_4.7H_2O$)	ఇనుము	19.0	10.5
9.	చీలేటెడ్ జింకు (Zn-EDTA)	జింకు	12.0	–
10.	చీలేటెడ్ ఇనుము (Fe-EDTA)	ఇనుము	12.0	–

VIII బలవర్ధకమైన ఎరువులు (Fortified Fertilizers)

సం.	రసాయనిక ఎరువులు	పోషకాల శాతం
1.	బోరోనేటెడ్ సింగల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్	భాస్వరం –16; బోరాన్ – 0.18
2.	జింకేటెడ్ యూరియా	నత్రజని –43; జింకు – 2.0
3.	బోరోనేటెడ్ ఎన్.పి.కె. కాంప్లెక్స్	10–26–26 బోరాన్ 0.2–0.3%
4.	బోరోనేటెడ్ డి.ఎ.పి.	18–46–6 బోరాన్ 0.2–0.3%
5.	జింకేటెడ్ బెంటోనైట్ గంధకం	65% సల్ఫర్, 18% జింకు

IX నీటిలో (100%) కరిగే కాంప్లెక్స్ ఎరువులు

సం.	రసాయనిక ఎరువులు	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాషియం	గంధకం	మెగ్నీషియం
1.	పొటాషియం నైట్రేట్	13	0	45	–	–
2.	మోనో పొటాషియం ఫాస్ఫేట్	0	52	34	–	–
3.	పొటాషియం మెగ్నీషియం సల్ఫేట్	–	–	22	20	18
4.	మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్	12	61	0	–	–
5.	యూరియా ఫాస్ఫేట్	17	44	0	–	–
6.	పొటాషియం నైట్రేట్ (Prilled) నేలకు వేయటానికి	13	0	45	–	–
7.	24-24-0	24	24	0	–	–

Source : The Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) control order 1985 as amended upto July 2021, 19th Edition, FAI, New Delhi.

భూసార పరీక్ష ఆధారిత ఎరువుల సిఫార్సు :

మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి వివిధ పంటలకు వ్యవసాయ మండలాల వారీగా పోషకాల మోతాదు సిఫార్సు చేయటం జరిగింది.

- ఈ ఎరువుల సాధారణ సిఫార్సు నేలలో నిర్దిష్టమైన పోషక లభ్యత మధ్యస్థంగా ఉంటే వర్తిస్తుంది.
- భూసార పరీక్ష విలువ ఎక్కువగా వస్తే అంటే పోషక లభ్యత ఎక్కువగా ఉంటే, సిఫార్సు చేయబడిన పోషకాల మోతాదు 25% తగ్గించి పంటకు వేసుకోవాలి.
- అదే పోషక లభ్యత తక్కువగా ఉంటే సిఫార్సు చేయబడిన పోషకాల మోతాదు 25% పెంచి పంటకు వేసుకోవాలి.

ఉదాహరణకు : కృష్ణా డెల్టాకు ఖరీఫ్ నందు వరి పంటకు సిఫారసు చేసిన పోషకాల మోతాదు ఎకరాకు 36-24-24 కిలోల నత్రజని – భాస్వరం – పొటాష్. నేలలో పోషక లభ్యతననుసరించి పోషకాల మోతాదు ఈ క్రింది విధంగా లెక్కకట్టవలెను.

నేలలో పోషక లభ్యత	పంటకు అందించవలసిన పోషక మోతాదు (కిలోలు / ఎకరాకు)		
	నత్రజని	భాస్వరం	పొటాష్
తక్కువ	45	30	30
మధ్యస్థం	36	24	24
అధికం	27	18	18

రసాయన ఎరువులతో పాటు జీవన ఎరువులు, సేంద్రీయ ఎరువులను సమగ్రంగా నేలకు అందించినట్లయితే రసాయన ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం పెంచటమే కాకుండా నేల ఆరోగ్యం మరియు ఉత్పాదకతను సుస్థిరపరుచుకోవచ్చును.

రసాయనిక ఎరువుల గురించి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తిక శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, లాం, గుంటూరు.

ఫోన్ నెం : 80083 33985

కొలమానాలు

మైలు.....	1760 గజాలు లేదా 1609.34 మీటర్లు లేదా 5280 అడుగులు లేదా 1.609 కి.మీ.
మీటరు.....	1.0936 గజాలు లేదా 39.37 అంగుళాలు;
1 చదరపు మీటరు.....	10.764 చదరపు అడుగులు లేదా 9 చదరపు అడుగులు
గజం.....	0.9144 మీటర్లు లేదా 91.44 సెంటీ మీటర్లు లేదా 3.0 అడుగులు
అడుగు.....	0.3048 మీటర్లు లేదా 30.48 మిల్లీ మీటర్లు
అంగుళం.....	2.54 సెంటీ మీటర్లు లేదా 30.48 మిల్లీ మీటర్లు
గుంట.....	120.99 చదరపు గజాలు లేదా 101.17 చదరపు మీటర్లు లేదా 1089 చదరపు అడుగులు
సెంటు.....	48.4 చదరపు గజాలు లేదా 435.6 చదరపు అడుగులు లేదా 0.01 ఎకరాలు
అంకణం	72 చదరపు అడుగులు
ఎకరం.....	4840 చదరపు గజాలు లేదా 43560 చదరపు అడుగులు లేదా 100 సెంట్లు
ఎకరం.....	0.4047 హెక్టారులు లేదా 605 అంకణాలు లేదా 40 గుంటలు
హెక్టారు.....	2.471 ఎకరాలు
కుంచం	10 సెంట్లు లేదా 484 చదరపు గజాలు
కిలో మీటరు.....	1000 మీటర్లు లేదా 3280.8 అడుగులు లేదా 0.6214 మైలు లేదా 39370.1 అంగుళాలు
మెట్రిక్ టన్ను.....	1000 కిలోలు లేదా 2204.6 పౌన్లు
పౌన్.....	0.4536 కిలోలు లేదా 453.3 గ్రాములు
కిలో గ్రాము.....	2.2046 పౌన్లు
క్వింటాలు.....	100 కిలోలు
గ్యాలను.....	4.5361 లీటర్లు
లీటరు.....	0.2200 గ్యాలన్ లేదా 1000 మిల్లీ లీటర్లు
ఔన్సు.....	28.412 మిల్లీ లీటర్లు
టీ స్పూన్.....	5 మిల్లీ లీటర్లు
కేండీ.....	500 పౌన్లు లేదా 226.8 కిలోలు

బండి పశువుల ఎరువు.....	0.5 టన్ను
ఎకరానికి ఒక పౌను.....	హెక్టారుకు 1.12 కిలోలు
ప్రత్తి బేలు.....	170 కిలోలు
పొగాకు బేలు.....	217.7 కిలోలు
గోగు బేలు	180 కిలోలు
పుట్టి (వరి).....	560-600 కిలోలు (8 బస్తాలు)
బస్తా (వరి)	70-75 కిలోలు;
బస్తా (వేరుశనగ)	40 కిలోలు
క్యూబిక్ అడుగుల నీరు.....	28.31 లీటర్లు;
టీఎంసీ అడుగుల నీరు.....	28316846592 లీటర్లు
1 హార్స్ పవర్ (అశ్వ శక్తి).....	746 వాట్స్
1 డిగ్రీ సెల్సియస్.....	32 డిగ్రీ ఫారన్ హీట్

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

సీనియర్ శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం), పరిపాలనా భవనం, ఎ.ఎన్.జి.ఆర్.ఎ.యు.,

లాం, గుంటూరు. సెల్ నెం : 80089 03578

వివిధ పంటలలో ఎలుకల సమగ్ర యాజమాన్యం

ఎలుకలు మానవుల వలె క్షీరదాల తరగతికి చెందిన జీవులు. వీటిలో ప్రత్యేకంగా 2 జతల కొరికే దంతాలు రోజూ 0.4 మి.మీ. చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటాయి. దంతాల పరిమాణంను స్థిరంగా ఉంచడానికి అవి నిత్యం వాటిని అరగరీస్తూ వివిధ వస్తువులకు, సామాగ్రికి మరియు పంటలకు నష్టం కలుగజేస్తాయి. ఎలుకల వలన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి 3.3 కోట్ల టన్నుల ఆహారధాన్యానికి నష్టం కలుగుతుంది. మన దేశంలో ఎలుకల తాకిడికి సుమారు 50 లక్షల టన్నుల ఆహారధాన్యం నష్టపోతున్నాము. మన రాష్ట్రంలో వరి పండించే ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాల్లో వరద తాకిడి సంభవించినపుడు ఎలుకల ఉధృతి పెరగడం పరిపాటి. ఇటీవల వాతావరణం మరియు సేద్య పద్ధతుల్లో వస్తున్న మార్పుల కారణంగా అన్ని జిల్లాల్లోను ఎలుకల ఉధృతి/బెడద గమనిస్తున్నాము. గతంలో 1978,1988, 1996, 2010, 2021 సంవత్సరాలలో ఎలుకల ఉధృతి వలన కలిగే నష్టాన్ని మన రాష్ట్ర రైతాంగం చవిచూసింది. పుష్కలంగా నీరు లభించే ప్రాంతాలలోను, వరి తరువాత వరి లేదా అపరాలు వేసే ప్రాంతాలలోను ఎలుకల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఎలుక జాతులను గుర్తించినప్పటికీ, ప్రధానంగా *బాండికోటా బెంగలెన్సిస్* (చిన్న పందికొక్కు/పొలం ఎలుక), *మస్ బూడుగ* (చిట్టెలుక) జాతులు వరి పొలానికి, *రేటస్ రేటస్* (కొబ్బరి ఎలుక), ఉడుత జాతులు కొబ్బరి, కోకో వంటి ఉద్యాన పంటలకు నష్టం కలుగజేస్తాయి.

ఎలుకల వలన వరి పంటకు కలిగే నష్టం

- వరిలో విత్తనం వేసినప్పటి నుండి కోత దశ వరకు ఎలుకలు నష్టం కలుగజేస్తాయి. అంతేకాక పంట కోత అనంతరం కళ్ళాలలోను, గోదాముల్లోను ధాన్యాన్ని నష్టపరుస్తూ కలుషితం చేస్తాయి.
- నారు మడిలో చల్లిన విత్తనాలను తినివేస్తాయి. కాని ఈ దశలో నష్టం చేసినా, రైతులు తిరిగి విత్తనాలను చల్లుకోవడం ద్వారా లేదా కాస్త ఎక్కువ విత్తనం వాడడం ద్వారా ఎలుక వలన కలిగే నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకొనే అవకాశముంది.
- పిలకలు పెట్టే దశలో, పిలకలను నీటి మట్టానికి 5-10 సెం.మీ. ఎత్తులో 45^0 కోణంలో కొరికి వేస్తాయి. ఎలుకలు వరి పిలకలను తినడం కంటే, కొరకడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తాయి.
  పిలకలు వేసే దశలో (ఎలుకలు నష్టపరిచే సమయానికి) ఎలుకల ఉధృతి ఎక్కువైతే పంటనష్టం ఎక్కువై, ఒక్కొక్క పర్యాయం మరలా నాట్లు వేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
- చిరుపొట్ట దశలో ఎలుక చేసే నష్టం చాలా కీలకమైనది. ఈ దశలో వరి దుబ్బులను గట్ల వెంబడే కాక, పొలం మధ్యలో కొరికి వేసి, నష్టపరుస్తుంది. దీనివలన పొలంలో అక్కడక్కడా ఖాళీలు కనిపిస్తాయి. కొరికిన దుబ్బుల నుండి వెలువడే తియ్యటి స్రావం ఎలుకల్లో ప్రత్యుత్పత్తి ఆరంభానికి దోహదపడుతుంది.
- ఎలుక బొరియల్లో ధాన్యపు గింజలను నిల్వ చేయడం మరో ప్రధాన నష్టం. ఒక్కొక్క రంధ్రంలో సుమారు 0.5 నుండి 4.0 కిలోల వరకూ ధాన్యపు గింజలను నిల్వ చేస్తుంది.
- ధాన్యపు గోదాములలో 5-10% ఆహార ధాన్యాలను నష్టపరచడమే కాక, ఆహార పదార్థాలను వాటి మూత్రం, వెంట్రుకలతో కలుషితం చేసి నాణ్యతను దెబ్బతీస్తాయి.

అపరాలు : ఎలుకల వలన అపరాల పంటలకు 10–15 శాతం నష్టం వాటిల్లుతుంది. పెసర, మినుము వంటి పంటలు పైరు పక్వ దశకు చేరుకొన్నపుడు, కాయలను అపక్వ, పక్వదశల్లో సేకరించి, ఎలుక బొరియలలో నిల్వ ఉంచుతుంది. మినుము, పెసర కాయల్లో గల ప్రోటీను, ఎలుకలు ధృడంగా బలియడానికి దోహదపడుతుంది. తద్వారా వాటి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది.

చెఱకు : ఎలుకలు చెఱకు పంటను కణుపు కట్టేదశలోను, ఏపుగా ఎదిగే దశలోను, పక్వదశలోను నష్టము కలుగజేస్తాయి. చెఱకు గడలను కొరికి వేయడం వలన, చచ్చు గడలు కనిపిస్తాయి. పొలం గట్లపైనా, లోపల ఎలుక బొరియలు, మట్టి పోగులు కనిపిస్తాయి.

రాష్ట్రంలో సమస్యాత్మక ఎలుక జాతులు :

పొలం ఎలుక : ఈ ఎలుక ప్రౌడ దశలో 200–350 గ్రా. బరువు కలిగి, సంవత్సర కాలం బ్రతికి, బొరియలు చేసే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. మూడు నెలల వ్యవధిలో పక్వం చెంది, సంవత్సరానికి 5–6 సార్లు పిల్లలను కంటుంది. ఒక్కొక్క ఈతలో సుమారు 6–8 పిల్లల చొప్పున కంటుంది. గర్భాధారణ సమయం 21 రోజులు. ఒక్కొక్క ఆడ ఎలుక సంవత్సరానికి గరిష్ఠంగా 65 పిల్లలను పెడుతుంది. వర్షఋతువులో కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలలో ఎలుకల తాకిడి ఎక్కువ. ఎలుకల్లో గర్భధారణ పంటల శైలి, వ్యవధిలను బట్టి కూడా మార్పు చెందుతుంది. ఎలుక బొరియల ప్రక్కనే మట్టిని ఉండలుగా చేసి పోగు పెడుతుంది.

అసాధారణ ప్రత్యుత్పత్తి : ప్రకృతి వైపరీత్యాలైన వరదలు, తుఫానులు, ముంపుపరిస్థితుల్లో చాలా ఎలుకలు నిర్మూలించబడతాయి. జాతి పునరుద్ధరణకై ఎలుకలు అసాధారణ ప్రత్యుత్పత్తిలో భాగంగా ఒక్కొక్క ఈతకు 15–22 పిల్లలను పెడుతుంది. కాన్పు అయిన వెంటనే 3–4 రోజుల్లో తిరిగి గర్భధారణ జరుగుతుంది. పిల్లల్లో మగ, ఆడ ఎలుకల నిష్పత్తి 1:2 ఉంటుంది. ఫలితంగా ఎలుకల ఉత్పత్తి తక్కువ కాల వ్యవధిలోనే గణనీయంగా పెరిగి, పంటల నష్టం తీవ్రతరమవుతుంది.

చిట్టెలుక : ఈ ఎలుక 10–12 గ్రా. బరువు కలిగి, వీపు భాగం గోధుమ వర్ణంలో, ఉదర భాగం తెలుపు వర్ణంలో ఉంటుంది. నీటి పారుదల వసతి ఉన్న పొలాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో వరి, అపరాలు, మొక్కజొన్న పంటలకు నష్టం కలుగజేస్తుంది. చిట్టెలుక చేసిన రంధ్రం చిన్నగా, గుండ్రంగా ఉండి, బయట మట్టి పోగులు లేకుండా ఉంటుంది. సంవత్సరం పొడువునా ప్రత్యుత్పత్తి చేస్తూ, కాన్పుకు 2–8 పిల్లలను కంటుంది.

కొబ్బరి ఎలుక : ఈ ఎలుక కొబ్బరి, కోకో, ఆయిల్‌పామ్ వంటి పంటలకు మరియు ధాన్యం గోదాముల్లో, ఇండ్లలో సంచరిస్తూ ఆహార ధాన్యాలకు, ఇంటిలో వివిధ వస్తువులకు నష్టం కలుగజేస్తుంది. దీని బరువు 80–120 గ్రా. ఉండి, లేత నుండి ముదురు గోధుమరంగులో ఉంటుంది. దీని తోక శరీరం, తల భాగాలకన్నా పొడవుగా ఉంటుంది. మూతి భాగం పొడవుగా సాగి ఉంటుంది. సంవత్సరం పొడవునా పిల్లలను పెడుతుంది. ప్రతి కాన్పుకు పిల్లల సంఖ్య 6–10 వరకు వుంటుంది. గర్భాధారణ కాలము 22 రోజులు.

ఎలుకల ఉధృతికి అనుకూల పరిస్థితులు :

- డెల్టా లోతట్టు ప్రాంతాలలో కాలువల క్రింద పండించబడే వరి పంటలో ఎలుకల ఉధృతి ఎక్కువ.
- నిరంతరం ఆహారం, నీరు, ఆశ్రయం లభ్యత కారణంగా ఈ ప్రాంతాలు ఎలుకల సంతానోత్పత్తికి అనుకూలం
- సాగు నీటి కాలువలు, ఉద్యానవన పంటలైన కొబ్బరి, కోకో, ఆయిల్ పామ్‌వంటి తోటల ప్రక్కనే వరి సాగు ఎలుకల ఉధృతికి మిక్కిలి అనుకూలం.

- వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉన్న సంవత్సరాల్లో ఎలుకల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- సహజశత్రువులైన పాము, గుడ్లగూబ, పిల్లి, ముంగిస వంటివి అధిక రసాయనాల వాడకం వల్ల నశించిపోవడం వల్ల ఎలుకల ఉధృతి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
- ఎలుకల యాజమాన్యంలో సమిష్టిగా రైతులందరూ పాల్గొనకపోవడం మరియు అశాస్త్రీయ పద్ధతులను అవలంభించడం వల్ల ఎలుకల ఉధృతి పెరుగుతుంది.
- రైతులు పురుగుమందు గుళికలను విషపు ఎరలుగా ఎలుకల నివారణకు వాడినప్పుడు, ఎలుకలు అసాధారణ ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా వాటి సంఖ్యను పెంచుకుంటాయి.

ఎలుకల ఉనికిని గుర్తించడం :

- పొలం గట్లపై సజీవ ఎలుక బొరియలుండడం.
- బురద మట్టిలో ఎలుకల పాదముద్రలు మరియు సంచరించిన బాటలుండటం.
- కొరికి వేయబడిన వరి పిలకలు, దుబ్బులు ఉండడం.
- ఎలుకల విసర్జన పదార్థాలు, నూనె వంటి స్రావాలు కనిపించడం మొదలగువాటిని బట్టి ఎలుకల ఉనికిని గుర్తించవచ్చు.

ఎలుకల నివారణకు సమగ్ర యాజమాన్యం :

1. సేద్య పద్ధతులు : వేసవిలో లోతుగా దుక్కి దున్నాలి. పొలంగట్లపైన, పొలంలోని కలుపు మొక్కలను తీసి శుభ్రపరచుకోవాలి. తద్వారా గట్లు శుభ్రపడి, ఎలుకలకు ప్రత్యామ్నాయ ఆహారమైన నాము మరియు కలుపు మొక్కల గడ్డలు / దుంపలు లభించకుండా ఉంటాయి. సాధ్యమైనంత వరకు గట్ల సంఖ్యను, పరిమాణాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియవల్ల ఎలుకలు ఆశ్రయం పొందే ప్రాంతం తగ్గి, ఎలుకల సాంద్రత తగ్గుతుంది. సాధ్యమైనంత వరకు నాట్లు ఒకేసారి, సకాలంలో జరిగేటట్లు చూడాలి. ఫలితంగా వరి ప్రత్యుత్పత్తి కాలం పరిమితమై, ఎలుకల సాంద్రత తగ్గుతుంది. వేర్వేరు సమయాల్లో నాట్లు చేపడితే, ఎలుకలకు వరి చిరుపొట్టదశ ఎక్కువ కాలం లభ్యమయి, ప్రత్యుత్పత్తి కాలం పెరిగి వాటి ఉధృతి పెరుగుతుంది. నారుమడిలో తగినంత నీరు ఉండేటట్లు చేయాలి. దీని వల్ల మొలకెత్తే విత్తనాలు ఎలుకల వల్ల నష్టపోకుండా ఉంటాయి.

2. భౌతిక / యాంత్రిక పద్ధతులు : సామూహికంగా రైతులందరూ ఎలుక బుట్టలను, బోనులను పొలంలో దమ్ము చేసే సమయం మరియు పైరు తొలిదశలో ఎకరానికి 20 చొప్పున అమర్చుకోవడం ద్వారా, వలసవచ్చే ఎలుకలను నివారించవచ్చు. పొగబారించు యంత్రం (బ్రోస్మోకర్)ను ఉపయోగించి, ఎలుక బొరియల్లో పొగబారించు కొన్నట్లయితే, ఎలుకలు ఊపిరాడక, చనిపోతాయి. ఈ విధానం అత్యుత్తమమైనది. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలుగదు. రసాయన పద్ధతులకన్నా శ్రేష్ఠమైనది. కృష్ణాగోదావరి డెల్టా రైతాంగం ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి, సత్ఫలితాలు పొందుతున్నారు. పైరులో గుడ్లగూబ స్థావరాలను ఏర్పరుచుకొని ఎలుకల ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు.

ఎర-తెర పద్ధతి ద్వారా వరిలో ఎలుకల నివారణ : ఎర-తెర పద్ధతి ఎలుకల యొక్క ప్రవర్తనావళిని చేదిస్తూ ఎలుకలను తనవైపుకు ఆకర్షిస్తూ, ఎలుకలను అమర్చిన బుట్టల్లో పడేట్టు చేసి వాటిని సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది. దీనికి గాను 2 1/4 అడుగుల ఎత్తున్న ప్లాస్టిక్ షీటును తీసుకుని, 2 అడుగులు నేలపై, 1/4 అడుగు పొలంలోని మట్టి క్రింద ఉంచి, ఇనుప తీగ మరియు వెదురు బద్దల సహాయంతో పైరు చుట్టూ గోడ మాదిరిగా తెరను

ఏర్పరుచుకోవాలి. ప్రతి 20–25 మీ. పొడవుకు తెరలో నీటి మట్టం పైభాగాన చిన్నపాటి రంధ్రం (10 సెం.మీ. వ్యాసం) చేసి తెరలోపలి వైపున తీగ బోనులను అమర్చుకోవాలి. ఎలుకలు సులువుగా లోపలికి చేరుకోవడానికి తెర ముందు, కన్నానికి నేరుగా చిన్నపాటి గట్టును ఏర్పరచుకోవాలి.

ఎర–తెర లోపల గల పైరును 15–20 రోజులు ముందుగా నాటుకొన్నట్లయితే మంచి ఫలితాలను ఆశించవచ్చును. ఇది సాధ్యం కాని పక్షంలో ఎర–తెరను ఎలుకలు ఎక్కువగా సంచరించే పెద్ద గట్లున్న మడిలో ఏర్పరచుకోవాలి. ఒక ఎకరంలో అమర్చిన ఎర–తెర, చుట్టూ ఉన్న 10–15 ఎకరాల నుండి ఎలుకలను ఆకర్షించి బుట్టల్లో పడేట్లు చెయ్యడం వలన చుట్టు ప్రక్కల పొలాల్లో కూడా ఎలుకల బెడద గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

లోపల గల పైరు నుండి వెలువడే రసాయన సంకేతాలకు ఎలుకలు ఆకర్షించబడి వాటి ప్రవర్తన ప్రకారం తెరను ఆనుకుని ఈదుకుంటూ రంధ్రానికి ముందు ఏర్పరచిన గట్టును చేరుకొని దాని ద్వారా తెరకు ఆవతల వైపు పైరులో ఉంచిన తీగ బుట్టల్లో పడతాయి. ప్రతి రోజు ఉదయం ఎర–తెరను పరిశీలించి ఎలుకలు పడ్డ తీగబుట్టలను బయటకు తీసి పంట కాల్వలో 2 నిముషాలు పూర్తిగా ముంచినట్లయితే ఎలుకలు ఊపిరాడక చనిపోతాయి. చనిపోయిన ఎలుకలను వేరు చేసి తీగ బుట్టలను యదా స్థానంలో ఉంచాలి.

ఒక ఎకరంలో ఎర తెర ఏర్పడచడానికి సుమారు 250 మీ. పొడవైన ప్లాస్టిక్ షీట్ అవసరం పడుతుంది. దీని ఖరీదు సుమారుగా రూ.1,000 వరకు అవుతుంది. ఒక సీజనులో వాడిన ప్లాస్టిక్ షీట్ వెంటనే తీసి బద్రపరిచిన ఎడల తర్వాత 1–2 సీజన్లు వరకు వాడుకోవచ్చు. తీగ బుట్టలను చాలా కాలం వరకు (4–5 సం.) వాడుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క తీగబుట్ట ఖరీదు సుమారు 200 వరకూ ఉంటుంది. ఒక ఎకరా పొలంలో ఎర–తెర ఏర్పాటుకు సుమారు రూ. 4,000/– ఖర్చు అవుతుంది.

ఖర్చు తగ్గించుకొనేందుకు గాను, రైతులందరూ సామూహికంగా ఈ పద్ధతిని అవలంభించినట్లయితే 10–15 ఎకరాల విస్తీర్ణంకు గాను ఒక ఎకరా పొలంలో 15–20 రోజులు ముందుగా నాట్లు వేసుకుని దీని చుట్టూ ఎర తెరను ఏర్పరిస్తే, ఈ పొలంతో పాటు చుట్టుప్రక్కల గల పొలాల నుండి కూడా ఎలుకలు ముదురు పైరుకు ఆకర్షింపబడి చుట్టూ ఉన్న మిగతా పొలాల్లో వాటి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గి, చుట్టు ప్రక్కల పొలాలు కూడా ఎలుకల బారి నుండి రక్షింపబడతాయి. రైతులు ఎలుకల బెడద ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కడైతే ముందుగా నారుమళ్ళను వెయ్యడానికి భయపడతారో, అటువంటి నారుమళ్ళ చుట్టూ ఈ ఎర తెరను అమర్చుకోవడం ద్వారా నారుమళ్ళను ఎలుకల బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చు. ఎర తెర పరిమాణాన్ని అమర్చవలసిన ప్రాంతాన్ని, అవసరం మరియు సందర్భం బట్టి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పు చేసుకుంటూ పంటను ఎలుకల బారి నుండి సమర్థవంతంగా రక్షించుకోవచ్చు.

3. రసాయన పద్ధతులు : రసాయన మందుల ద్వారా ఎలుకల నివారణ అనే ప్రక్రియ సర్వసాధారణము. వీటిని ఎరమందుగా తయారు చేసుకొని, సామూహికంగా గ్రామం లేదా మండలం ఒక యూనిట్‌గా తీసుకొని, చేపట్టినట్లయితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం మనకు రెండురకాల ఎలుక నివారణ మందులు లభ్యమవుతున్నాయి. అవి బ్రోమాడయోలోన్ (తెల్ల మందు), జింక్ ఫాస్ఫైడ్ (నల్ల మందు).

ఎ) బ్రోమాడయోలోన్ : ఈ మందు బూడిద వర్ణంలో ఉంటుంది. ఎలుకలు నెమ్మదిగా 4–5 రోజుల్లో రక్తస్రావంతో చనిపోవడం వలన ఎలుకలు ఈ మందును భుజించడానికి సందేహించవు.

1వ రోజు : సజీవ ఎలుక బొరియలను గుర్తించి, బ్రోమోడయోలోన్ 10–15 గ్రా. విషపు ఎరను కాగితంతో ప్యాకెట్లుగా కట్టి (నూకలు 96 పాళ్ళు + నూనె 2 పాళ్ళు + బ్రోమాడయోలోన్ మందు 2 పాళ్ళు) ఒక్కొక్క బొరియలో వేయాలి. పైరు పొట్ట తగిలిన తర్వాత విషపు ఎరలను ఎలుకలు అంతగా స్వీకరించవు, కాబట్టి ఈ సామూహిక ఎలుకల నివారణ వరి పైరు చిరుపొట్ట దశ కంటే ముందే అవలంభించాలి.

11వ రోజు : తిరిగి 11వ రోజున సజీవ ఎలుక బొరియలుంటే మరలా పైన సూచించిన మోతాదుల్లో విషపు ఎరను అందించాలి.

బి) జింక్ ఫాస్ఫైడ్ : ఈ మందు నలుపు రంగులో ఉంటుంది. అత్యంత విషపూరితం. పంట కాలంలో ఒకే ఒక పర్యాయం వాడుకోవాలి. ఎలుకలను తక్కువ సమయంలో చంపగలిగిన శక్తిగల మందు. ఐతే ఈ మందు వాడకానికి ముందు విషంలేని ఎరను వాడాల్సివుంటుంది. ఎందుచేతనంటే ఈ మందును ఎలుక సందేహిస్తుంది. కావున రైతులు రెండు పర్యాయాలు అంటే ఒకసారి మందు కలుపకుండా, మరొకసారి మందు కలిపిన ఎరను ఎలుక బొరియల వద్ద ఈ క్రింద సూచించిన విధంగా అమర్చుకోవాలి.

1వ రోజు : సజీవ ఎలుక బొరియలను గుర్తించి, 20 గ్రా. విషం కలపని ఎరను (98 పాళ్ళు నూకలు +2 పాళ్ళు నూనె) అమర్చాలి.

3వ రోజు : తెరవబడిన ఎలుక బొరియల్లో ఒక్కొక్క బొరియకు జింక్ ఫాస్ఫైడ్ కలిగి ఉన్న 10 గ్రా. విషపు ఎరను (96 పాళ్ళు నూకలు+ 2 పాళ్ళు నూనె + 2 పాళ్ళు జింక్ ఫాస్ఫైడ్ మందు) కాగితంలో ప్యాకెట్లుగా కట్టి ఇవ్వాలి.

4వ రోజు : చనిపోయిన ఎలుకలను ఏరివేసి, పూడ్చివేయాలి.

అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ బిళ్ళలు : ఎలుకల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీటిని వాడుకోవాలి. మార్కెట్‌లో లభ్యమయ్యే 12 గ్రా. అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ (6%) బిళ్ళలను బొరియకు ఒకటి చొప్పున వేసి తడి మట్టితో బొరియలను మూసివేయాలి. మందు బిళ్ళల నుండి వేలువడే ఫాస్ఫీన్ విషవాయువు వల్ల ఎలుకలు చనిపోతాయి. పై యాజమాన్య పద్ధతులను వరి, అపరాలు, చెఱకు, నూనె గింజల పంటల (క్షేత్రపంటలు)లో ఆచరించినట్లయితే సమర్ధవంతంగా ఎలుకలను నివారించుకోవచ్చు. పైవిధంగా సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను సామూహికంగా చేపట్టినట్లయితే పలు పంటలలో ఎలుకల నివారణ జరిగి, రైతాంగం స్థిరమైన దిగుబడులును పొందవచ్చు.

కొబ్బరి, కోకో :

మార్కెట్‌లో లభ్యమయ్యే బ్రోమోడయోలోన్ లేదా బ్రోడిఫాకమ్ (ప్రస్తుతం మార్కెట్టులో క్రొత్తగా లభిస్తున్న క్లెరాట్ ఎలుకల మందు) విషపు ఎర కేకు ముక్కలను (16.6 గ్రా.) చెట్టుకు రెండు చొప్పున కొబ్బరి గెలల్లో తీగ/తాడు సహాయంతో వర్షాకాలం కు ముందు ఉంచి ఎలుకలను నిరోధించుకోవాలి.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించ వలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం) ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, మారుటేరు – 534 122.

సెల్ : 89787 78724

పంటలలో సకశేరుకాల (కోతులు, అడవి పందులు & పక్షులు) సమస్య - యాజమాన్యం

మన దేశంలో పంటలలో నష్టం ముఖ్యంగా కీటకాలు, తెగుళ్ళు మరియు కలుపు మొక్కల వలన జరుగుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో క్షీరదాలైన ఎలుకలు, జింకలు, మనుబోతులు, కోతులు, అడవి పందుల బెడద ఎక్కువగా పెరిగి పలు ప్రాంతాల్లో పంటలకు చెప్పుకోదగ్గ నష్టం వాటిల్లుతోంది. వీటిలో కోతులు, అడవి పందుల సమస్య కొండ ప్రాంతాల్లో గణనీయంగా పెరిగింది. విత్తనం నాటినప్పటి నుండి మొలకెత్తి పక్వానికి వచ్చే వరకు వివిధ దశలలో వీటి వలన నష్టం వాటిల్లుతున్నది. దీనికి గల కారణాలను గమనించినట్లయితే కోతులు, అడవి పందుల ఆవాస ప్రాంతాలైన అడవుల విస్తీర్ణం తగ్గడం, తద్వారా వాటికి కావలసిన ఆహార కొరత ఏర్పడుట మరియు కోతులు, అడవి పందులను వేటాడే జంతువులు అంతరించి పోవడం వంటి కారణాలు ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు. అడవి పందుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి ఆహారం కొరకు సమీపంలోని పంట పొలాలపై ఆధారపడుతున్నాయి. ఆహారపంటలైన వరి, మొక్కజొన్న, జొన్న, నూనె గింజల పంటలైన ప్రొద్దుతిరుగుడు, వేరుశనగ మరియు పండ్ల జాతికి చెందిన జామ, దానిమ్మ, ద్రాక్ష మరియు కూరగాయ పంటలపై కోతులు, అడవి పందులు దాడిచేసి తినడం ద్వారా, పంట నష్టం సంభవిస్తుంది. కోతులు, అడవి పందులు తినడం ద్వారా చేసే పంట నష్టం కన్నా అవి విస్తృతంగా సంచరించటం ద్వారా పంట మొక్కలు ధ్వంసం చేయబడి నష్ట శాతం పెరుగుచున్నది.

అడవులకు సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయక సాగు ప్రాంతాలలో కోతులు మరియు అడవి పందుల సంచారం అధికంగా ఉండటం వల్ల నష్ట శాతం ఈ ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా వుంటుంది. కోతులు పగటి పూట సంచరిస్తూ, పంటపై దాడి చేస్తాయి. అడవి పందులు ముఖ్యంగా ప్రాత:కాల సమయంలో మరియు సాయంత్రం సమయంలో గుంపులుగా సంచరించి పంట పొలాలపై దాడిచేస్తాయి. కోతులు అత్యంత తెలివైన వానర జాతి జీవులు. అడవి పందులకు వాసనను పసిగట్టే శక్తి అమోఘం. అందువలన అవి దూరం నుంచే పంట పొలాల ఆచూకీని తెలుసుకొని దాడి చేస్తాయి.

ఆహారపు అలవాట్లు : కోతులు ప్రధానంగా పండ్లను, గింజలను, దుంపలను, ఆకులను, చెట్ల బెరడను, చిన్న కీటకాలను భుజిస్తాయి. కోతులు 20-200 సంఖ్యలో గుంపులుగా సంచరిస్తూ పంటలపై దాడి చేస్తాయి. వీటి కున్న తోక కారణంగా చెట్లను, తీగలను అవలీలగా ఎక్కి, ఉరుకుతూ, ఎగురుతూ పంటలను పాడు చేస్తాయి.

అడవి పందులు మిశ్రమ భక్షణ రకానికి చెందిన జంతువులు. వీటి శాఖాహారంలో ప్రధానంగా పంట మొక్కల వేర్లు, దుంపలు, వివిధ రకాల గడ్డలను తింటాయి. మాంసాహారంలో భాగంగా కీటకాలు, పాములు, పాడైపోయిన జంతు కళేబరాలను భుజిస్తాయి. పంటలపై దాడిచేయుటకు అడవి పందులకు వివిధ అనుకూల సాధనాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఆహార సేకరణ కొరకు ఎక్కువగా ప్రాత:కాల సమయంలో గుంపులుగా సంచరిస్తుంటాయి. ఒక్కొక్క గుంపులో సుమారు 15-35 వరకు అడవి పందులుంటాయి. అందువలన అవి పంటపొలాలపై

సమర్థవంతంగా దాడిచేసి ఆహారాన్ని పొందుతాయి. వీటికి వినికిడి శక్తి మరియు చూపు మాత్రం చాలా తక్కువ. వీటి ఆహార సేకరణ పద్ధతి వలన పంటపొలాలకు కొంతమేర ఉపయోగం కలుగుతుంది. అడవిపందుల నోటిపై భాగం (ముట్టె) చాలా గట్టిగా ఉండి భూమిని త్రవ్వుటకు అనుకూలంగా ఉండును. అందువల్ల ఇవి వేర్ల కొరకు భూమిలో గుంతలు త్రవ్వుతాయి.అప్పుడు భూమి గుల్లపరచబడి గాలి ప్రసారం బాగా జరుగుతుంది మరియు వర్షపునీరు సులభంగా భూమిలోకి ఇంకుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో రాలిపోయిన ఆకులు, చెత్త మొదలగు వ్యర్థపదార్థాలు భూమి లోపలికి చేరి కుళ్ళిపోయి ఎరువులుగా మారి భూసారాన్ని పెంచుతాయి. భూమిలోపలికి త్రవ్వడం మూలంగా వేరుపురుగులను తింటాయి. దానివల్ల వేరు పురుగుల సమస్య కొంతవరకు నివారించబడుతుంది.

పంట మొక్కలపై కోతులు, అడవి పందుల దాడి తత్ఫలితంగా వాటిల్లుతున్న నష్టాలను నివారించడానికి సమగ్ర విశ్లేషణ ద్వారా అఖిల భారత సకశేరుక చీడల యాజమాన్య విభాగం రైతులకు కొన్ని మార్గదర్శకాలను/ సస్యరక్షణ పద్ధతులను సూచించింది. అదే విధంగా ఈ పద్ధతులు సమర్థవంతంగా అమలు జరిగే విధంగా రైతులను జాగృతం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తోంది.

కోతుల నివారణ పద్ధతులు :

1. నైలాన్ వల కంచెను ఏర్పాటు చేయుట : సుమారు 6–8 అడుగుల ఎత్తు గల 3 అంగుళాల కళ్ళున్న నైలాన్ వలను కర్రలు లేదా వెదురు బొంగుల సహాయంతో పొలం చుట్టూ కంచె మాదిరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వల ఇవతలి వైపు దగ్గరలో చెట్లు లేకుండా చూసుకోవాలి. కోతులు వల కళ్ళల్లో చిక్కుకొంటాయన్న భయంతో అవి పంటపై దాడి చేయడానికి సంశయిస్తాయి, తద్వారా 70% వరకు పంట రక్షింపబడుతుంది. ఒక ఎకరంలో వల ఏర్పాటుకు (సుమారు 250 మీ. పొడవు) 20 కిలోల వల అవసరం పడుతుంది. ఇది పంటలను 3–4 సంవత్సరాల పాటు రక్షిస్తుంది. 1 కిలో నైలాన్ వల ఖరీదు సుమారు రూ. 300–350. ఎకరాకు రూ. 6000–8000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది.

2. సోలార్ కంచెను ఏర్పాటు చేయుట : ఇది అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. సోలార్ ఫలకం నుండి సంగ్రహింపబడిన శక్తి, విద్యుత్ శక్తిగా బ్యాటరీలో నిక్షిప్తం కాబడి పొలం చుట్టూ 4–5 వరసల్లో నేల నుండి అడుగు వ్యత్యాసంలో అమర్చుకొన్న ఇనుప తీగలకు జతపరచబడి ఉంటుంది. నేల నుండి మొదటి వరుస ఇనుప తీగను 1/2 అడుగు ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి. కంచె వెలుపలి వైపు దగ్గరలో చెట్లు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి. పొలం చుట్టూ ప్రతి 12 అడుగుల దూరంలో 8 అడుగులు పొడవున్న వెదురు బొంగులను బిగుతుగా పాతుకొని, ఇనుప తీగను రబ్బరు ట్యూబు ముక్కలపై వెదురు బొంగుల చుట్టూ బిగుతుగా లాగి కంచెను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తీగల్లో తక్కువ వోల్టేజిలో (12 వోల్ట్) ప్రసరించే విద్యుత్ వలన వాటిని తాకితే "షాక్"ను కలుగజేస్తాయి. కావున కోతులు, పశువులు, అడవి పందులు వంటి జంతువులు పొలంలో చొరబడటానికి సాహసించవు. 5 ఎకరాలకు సోలార్ యంత్రపు కంచె ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారు రూ. 20,000/-.

3. కోతులను బెదిరించడం : పంటలపై దాడి చేసే కోతులను రైతులు వివిధ శబ్దాల ద్వారా లేదా వివిధ ఆకారాల ద్వారా బెదిరిస్తుంటారు. టపాసులు, బాంబులను లేదా తారాజువ్వలను పేల్చి వాటి నుండి వెలువడే శబ్దాల ద్వారా

కోతులను బెదిరిస్తారు. ఇటీవల అఖిల భారత సకశేరుక చీడల యాజమాన్య విభాగం వారు పరిశోధనల ద్వారా "అగ్రి కెనాన్" అనే శబ్ద పరికరాన్ని రూపొందించారు. దీనిలో 2-3 గ్రా. కార్బైడు ముక్కలను ఉంచి 4-5 చుక్కల నీటిని వేసినపుడు వెలువడే వాయువులను అర నిమిషం తర్వాత లైటరు సాయంతో వెలిగించినపుడు విపరీతమైన శబ్దం వెలువడి కోతులు ఆయా ప్రాంతాల నుండి బయపడి పారిపోతాయి. దీని ఖరీదు సుమారు రూ. 3,000/-.

అదేవిధంగా కోతులకు సహజ శత్రువులైన ఎలుగుబంటి, పులి వంటి వేషధారణలతో వాటిని మభ్యపరిచి పొలాల నుండి కోతులను దూరంగా పారద్రోలతారు. ఎలుగుబంటి దుస్తులను రైతు ధరించి ఎలుగుబంటి వలె ప్రవర్తించినట్లయితే కోతులు బాగా బెదిరి ఆ ప్రాంత పొలాల్లోకి రావడానికి భయపడతాయి. దీని ఖరీదు సుమారు రూ. 5,000/-. దీనిని అవలంభించేటప్పుడు వాటికి అనుమానం రాకుండా ప్రవర్తించాలి. కోతులు గమనిస్తుండగా దుస్తులను ధరించడం గాని, విప్పడం గాని చేయరాదు.

కోతులను సంహరించడం చట్ట రీత్యా నేరం కావున పైన తెల్పిన పద్ధతులను మిళితం చేస్తూ వాటి నుండి పంటలను కాపాడుకోవాలి.

అడవి పందుల నివారణ చర్యలు :

1. భౌతికంగా ఏర్పాటు చేయు ప్రహరీలు :

1.1 ఇనుప ముళ్ళ తీగె కంచె (బార్బ్‌డ్ వైర్ ఫెన్స్) : పంట పొలం గట్టు వెంబడి ఒక అడుగు దూరంలో ముళ్ళను కలిగి ఉన్న ఇనుప తీగెను పంటపొలం చుట్టూ కర్రల సహయంతో ఒక అడుగు ఎత్తులో 3 వరుసలలో బిగించి కట్టినట్లైతే అడవిపందుల రాకను ఈ ముళ్ళ కంచె నిరోధిస్తుంది. ఇనుప ముళ్ళ తీగె కంచెను ఒక ఎకరా పొలం చట్టూ నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు వివరాలు (సుమారుగా) ఇనుప ముళ్ళ తీగె చుట్ట వెల రూ. 9,000/- నుండి రూ. 10,000/-, ఒక కిలో ముళ్ళ తీగ పొడవు 27 అడుగులు; వెల-రూ. 100/-; ఒక ఎకరా పొలంలో ఒక వరుసకు 836 అడుగులు; వెల - రూ. 3,100/-; అదే మూడు వరుసలకు కలిపి రూ. 9300/-, మూడు వరుసలలో తీగెను బిగించుటకు కర్రలు మరియు కూలీలకు అయ్యే ఖర్చు రూ. 3,000/-, మొత్తం ఒక ఎకరానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 13,000/-.

1.2 వలయాకార ముళ్ళ కంచె పద్ధతి (రేజర్ ఫెన్స్) : ఈ పద్ధతిలో వలయాకారంలో ఉన్న ఇనుప కంచెను పొలం గట్ల వెంబడి పంటకు ఒక అడుగు దూరము నుండి అమర్చినట్లైతే అడవిపందులు ఈ కంచెను దాటుటకు ప్రయత్నించినప్పుడు, ఈ కంచెకు ఉండే చిన్న పదునైన బ్లేడ్లు అడవి పందుల దేహానికి తీవ్రమైన గాయాలను కలుగజేస్తాయి. గాయాలతో అవి అరస్తూ పారిపోవునపుడు మిగతా పందులు ఏదో ఆపద వున్నదని వెనుకకు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ పద్ధతి చాలా సమర్థవంతంగా అడవి పందుల ప్రవేశాన్ని నిరోధిస్తుంది.

వలయాకార రక్షణ కంచెను పంట పొలం చుట్టూ బిగించి కట్టినట్లైతే అడవి పందుల రాకను ఈ ముళ్ళకంచె సమర్థవంతంగా నిరోధిస్తుంది. ఈ కంచెను ఒక ఎకరా పొలం చుట్టూ నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు వివరాలు (సుమారుగా) : ఒక ఎకరానికి చుట్టూ ఏర్పాటు చేయవలసిన వలయాకార రక్షణ కంచె చుట్ట వెల

రూ. 30,000/–, ఒక వరుసలో వలయాకార రక్షణ కంచె బిగించుటకు కర్రలు మరియు కూలీలకు అయ్యే ఖర్చు రూ. 5,000/–, మొత్తం ఒక ఎకరానికి అయ్యే ఖర్చు రూ. 35,000/– నుండి రూ. 40,000/–.

1.3 ఇనుప వల కంచె (చైన్‌లింక్ ఫెన్స్) : పంట పొలం నుండి ఒక అడుగు దూరములో, ఇనుప వల కంచెను 3 అడుగుల ఎత్తువరకు ఏర్పాటుచేయడం ద్వారా సమర్థవంతంగా అడవిపందుల ప్రవేశాన్ని నిరోధించవచ్చు. ఇనుప వల కంచెను ఒక ఎకరా పొలం చుట్టూ నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు వివరాలు (సుమారుగా) ఇనుప వల కంచె చుట్ట వెల రూ. 20,000/– నుండి రూ. 25,000/–, భూమి నుండి 3 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఇనుప వలను బిగించుటకు కర్రలు మరియు కూలీలకు అయ్యే ఖర్చు రూ. 3,000/–, మొత్తం ఒక ఎకరానికి ఇనుప వలను బిగించడానికి అయ్యే ఖర్చు రూ. 23,000/– నుండి సుమారుగా రూ. 28,000/–

1.4 సౌరశక్తి కంచె (సోలార్ ఫెన్స్) : ఇందులో సోలార్ ప్లేట్ల ద్వారా 12 వోల్టులు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయబడి కంచె లాగ ఏర్పాటు చేసిన వైర్ల ద్వారా ప్రసారం జరిగి అడవిపందులకు షాక్ తగిలి అరుస్తూ పారిపోవునపుడు మిగతా పందులు ఏదో ఆపద వున్నదని భయపడి వెనుకకు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ పద్ధతి చాలా సమర్థవంతంగా అడవి పందుల బెడదను తగ్గిస్తుంది. పొలం చుట్టూ సౌరశక్తి కంచెను 3 అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటుచేయడం ద్వారా అది సమర్థవంతంగా అడవి పందుల ప్రవేశాన్ని నిరోధిస్తుంది. సౌరశక్తి కంచెను 5 ఎకరాల పొలం చుట్టూ నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 20,000/– వరకు ఉంటుంది.

1.5 జి.ఐ. తీగె కంచె : పంట పొలం చుట్టూ ఒక అడుగు దూరంలో జి.ఐ తీగను భూమికి ఒక అడుగు ఎత్తులో 3 వరుసలలో బిగించి కట్టినట్లైతే కంచెలాగ ఉండి అడవిపందులు పంటపొలంలోనికి వెళ్ళకుండా నిరోధిస్తాయి. ఈ జి.ఐ తీగ ప్రహరీకి అక్కడక్కడ గుంద్రటి ఉచ్చులను ఏర్పాటుచేసినట్లైతే అడవిపందులు వాటిలో చిక్కుకుని పంటపొలాలలోనికి వెళ్ళలేవు. జి.ఐ.తీగ కంచెను ఒక ఎకరా పొలం చుట్టూ నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు వివరాలు (సుమారుగా) జి.ఐ. తీగె వెల రూ. 9,000/–, భూమి నుండి 3 అడుగుల ఎత్తు వరకు మూడు వరుసలలో జి.ఐ.తీగెను బిగించుటకు కర్రలు మరియు కూలీలకు అయ్యే ఖర్చు రూ. 3,000/– మొత్తం ఒక ఎకరానికి జి.ఐ. తీగెను బిగించడానికి అయ్యే ఖర్చు రూ. 12,000/–

1.6 కందకము త్రవ్వు పద్ధతి : పంటపొలం చుట్టూ ఒక అడుగు దూరంలో గట్లవెంబడి రెండడుగుల వెడల్పు ఒకటిన్నర అడుగుల లోతైన కందకాలను (ట్రైంచెస్) ఏర్పాటు చేసినట్లైతే అడవి పందులు పొలంలోపలికి ప్రవేశించలేవు. ఈ పద్ధతి ఒక్క అడవిపందుల నివారణ మాత్రమే కాకుండా వర్షాభావ ప్రాంతాలలో నేలలోని తేమను వృద్ధిచేయడానికి, ఒక పొలం నుండి ఇంకో పొలంనకు వలసపోయే పురుగుల తాకిడిని తగ్గించడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.

పొలం చుట్టూ 3 అడుగుల వెడల్పు 2 అడుగుల లోతు కందకాన్ని త్రవ్వడానికి అయ్యే ఖర్చు వివరాలు: కందకాన్ని తీయడానికి (జె.సి.బి ద్వారా) గంటకు వెల రూ. 1,000/– చొప్పున ఒక ఎకరా పొలానికి 15 గంటలు పడుతుంది, దానికి గాను అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా రూ. 15,000/–.

1.7 వల పద్ధతిని అమలుపరిచే విధానం : 100 మి.మీ.ల గళ్ళు కలిగిన హెచ్‌డిపిఇ (హెచ్.డి.పి.ఇ.) నైలాన్ వైరుతో నిర్మితమైన వల 6 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది మరియు తేలికగా ఉండి దృఢంగా ఉంటుంది. పంట పొలం చుట్టూ 3 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున దృఢమైన వెదురు బొంగులు/సర్వి దుంగలు భూమి నుండి 3 అడుగుల ఎత్తు ఉండేటట్టూ బిగుతుగా పాతుకోవాలి. నైలాన్ వలపై అంచు గళ్ళ నుండి జి.ఐ వైర్‌ను చొప్పించి కర్ర దుంగలపై అంచుకు బిగుతుగా కట్టుకుంటూ చివర వరకు లాగి కట్టవలెను. అదేవిధంగా భూమిపై దిగువన కర్ర మొదటి భాగాలతో కూడా మరొక జి.ఐ.వైరను బిగుతుగా లాగి కట్టవలెను. మరింత పటిష్టతకు మధ్యభాగంలో కూడా ఒక వరుస జి.ఐ. వైరును కట్టుకోవచ్చు. మిగిలిన 3 అడుగుల నైలాన్ వలను భూమిపై సమాంతరంగా పరిచి బిగుతుగా లాగి ఏటవాలుగా కర్ర పెగ్గులను పాతుకోవాలి. ఈ విధంగా అమర్చిన నైలాన్ వల పంట పొలం చుట్టూ ఒక గోడ వలె కన్పిస్తుంది. రాత్రి సమయంలో పంట పొలాలపైకి దాడి చేసే అడవి పందులు, కుందేళ్ళు మరియు ఇతర జంతువులు పొలం సమీపానికి వచ్చి వలపై అడుగువేయగానే వాటి కాలి గిట్టలు వలలో చిక్కుకొని అవి భయపడి వెనుతిరుగుతాయి. వాటి అరుపు / ఆర్తనాదాలతో మిగతా గుంపు కూడా పారిపోతుంది. ఈ విధంగా నైలాన్ వల పద్ధతి సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుంది. సుమారు 70–80% పంటలకు రక్షణ కలుగజేస్తుంది.

నైలాన్ వల పద్ధతి ఒక సంవత్సరం పాటు మన్నిక ఉంటుంది. ఎక్కడైనా వల పాడైనట్లైతే అక్కడ కొత్త వలను అమర్చుకోవచ్చు మరియు జి.ఐ. వైరు మరలా కొనవలసిన అవసరం ఉండదు. ఈ పద్ధతి పంట పొలం చుట్టూ గోడవలె ఉంటూ పంటను రక్షిస్తుంది. ఒక ఎకరాకు ఈ వల పద్ధతి పాటించినందు వల్ల అయ్యే ఖర్చు సుమారు రూ. 9,000/-.

2. జీవకంచెలు

2.1 పొలం చుట్టూ కుసుమ/ఆముదము పంటను 4 వరుసలలో నాటడం : వేరుశనగ పంట పొలాల చుట్టూ 4 నుండి 5 వరుసలు కుసుమ పంటను దగ్గరగా (30×15 సెం.మీ) వేసినచో వాటికి సన్నని ముళ్ళు ఉండటం మూలాన అడవి పందులు వచ్చి ముట్టెతో భూమిని త్రవ్వడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ ముళ్ళు ముట్టెపై చర్మానికి గుచ్చుకొని తీవ్రమైన నొప్పిని కలిగిస్తాయి, మరియు కుసుమ పంట వాసన వేరు శనగ పంట వాసన కన్నా ఘాటుగా ఉండి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. అందువల్ల దూరంలో ఉన్న పందులు వేరుశనగ వాసనను పసిగట్టలేక, లోపలికి చొచ్చుకొని పోవడానికి విముఖత చూపుతాయి. కుసుమ పంట వలన రైతులకు అదనపు ఆదాయం కూడా సమకూరుతుంది.

2.2 పొలం చుట్టూ ఆముదపు పంటను 4 వరుసలలో నాటడం : మొక్కజొన్న పంటపొలాల చుట్టూ 4 నుండి 5 వరుసలు ఆముదపు పంటను దగ్గరగా (45×30 సెం.మీ.) వేసినచో మొక్కజొన్న పంట వాసన కన్నా ఆముదపు పంట వాసన ఘాటుగా ఉండి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. అందువల్ల దూరంలో ఉన్న పందులు మొక్కజొన్న వాసనను పసిగట్టలేక, లోపలికి చొచ్చుకొని పోవడానికి విముఖత చూపుతాయి. ఆముదపు పంటను అడవి పందులు తినడానికి ఇష్టపడవు. ఫలితంగా మొక్కజొన్న పంట రక్షించబడుతుంది. అదే విధంగా రైతులకు ఆముదము ద్వారా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది.

2.3 పొలం చుట్టూ అల్లం మరియు పసుపు పంటను సాగుచేయడం : అల్లం (35×20 సెం.మీ.), పసుపు (45×20 సెం.మీ. ఎడం) పంటలను పొలం చుట్టూ దగ్గర దగ్గరగా నాటడం వలన ప్రధాన పంట వాసన అడవి పందులు గుర్తించలేవు మరియు అల్లం/ పసుపు పంటలు అడవి పందులకు రుచించవు. దీని ద్వారా రైతులకు ప్రధాన పంట కాపాడబడటంతో పాటు అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

2.4 పదునైన ముళ్ళతో కూడిన మొక్కలు/ఎడారి మొక్కలు పొలం చుట్టూ నాటడం : వివిధ ముళ్ళపొదలు (రేగిజాతులు), అగేవ్ జాతి మొక్కలు, జిజిఫస్ జాతులు, కాక్టస్ జాతులు, ఒపన్షియా మొదలగు ఎడారి జాతి మొక్కలు మరియు గచ్చపొదలను, గట్ల వెంబడి పెంచినట్లైతే వాటి యొక్క ముళ్ళు అడవి పందులకు గాయాలను కలుగజేసి, పందులు పంట పొలాల్లోకి చొరబడకుండా నిరోధిస్తాయి.

2.5 వాక్కాయ చెట్లను పొలం చుట్టూ నాటడం : వాక్కాయ చెట్లను గట్ల వెంబడి పెంచడము మూలాన వాటి పదునైన ముళ్ళ వలన అడవిపందుల దేహం గాయపడి అడవిపందులు అరుస్తూ పారిపోతాయి. వాక్కాయ గింజలను చింతపండుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగిస్తారు. జాములు, పచ్చళ్ళు మరియు పళ్ళరసాల తయారీలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. వాక్కాయ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్‌లో అధిక ప్రాముఖ్యత ఉండడం వలన ఈ ఉత్పత్తుల ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.

3. రసాయనిక పద్ధతులు :

3.1 క్రుళ్ళిన కోడి గుడ్ల ద్రావణం పంట పొలం చుట్టూ పిచికారి చేయు పద్ధతి : క్రుళ్ళిన లేదా మామూలు కోడి గుడ్లను సేకరించి ద్రావణాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. ఈ ద్రావణం 25 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పంట పొలం చుట్టూ ఒక అడుగు వెడల్పులో చదును చేసిన తడి భూమిపై పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఘాటైన వాసన వెలువడుతుంది.

ఈ వాసన పంట వాసన కంటే ఘాటుగా ఉండి సులభంగా వ్యాపించి పందులను పంట వాసన పసిగట్టకుండా చేయడం వలన పందులు దూరం నుండే వెనుకకు వెళ్ళిపోతాయి. అందువల్ల అవి పంట పొలాలవైపుకు రావడానికి సుముఖత చూపవు. వాసన ఎక్కువ రోజులు వ్యాపించి ఉండాలంటే 10 రోజులకు ఒక మారు 50–70 లీ.ల నీటికి 40–50 కోడి గుడ్లు కలిపి తరుచుగా పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఈ కోడి గుడ్లు ద్రావణమును పర్యావరణానికి హాని చేయదు మరియు పంట పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఈ పద్ధతికి అయ్యే ఖర్చు 1 ఎకరానికి సుమారుగా రూ. 1000/–.

3.2 కిరోసిన్ ద్రావణంలో ముంచిన కాటన్ నవారును పంట చుట్టూ 3 వరుసలలో కట్టడం : ఈ పద్ధతిలో మంచాలకు ఉపయోగించు బట్ట నవారును కిరోసిన్ ద్రావణంలో నానబెట్టి 2 గంటల తర్వాత తీసి ఆరబెట్టాలి. ఇలా ఆరబెట్టిన నవారును పంటపొలం చుట్టూ కర్రదుంగలు పాతి 3 వరుసలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలా చుట్టిన

నవారు నుండి ఘాటైన కిరోసిన్ వాసన వెలువడుతుంది, ఫలితంగా అడవి పందులు ఆ ప్రాంతానికి రావడానికి విముఖత చూపుతాయి. తద్వారా పంట రక్షింపబడుతుంది. ఈ పద్ధతికయ్యే ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ.

3.3 గంధకం + పందిక్రొవ్వు నూనె మిశ్రమాన్ని 3 వరుసల కొబ్బరి తాడుకు పూయడం : పందిక్రొవ్వు నూనె సేకరించి దానికి తగినంత గంధకపు పొడిని కలిపి, మిశ్రమంగా తయారుచేసి ఉంచుకోవాలి. పంట పొలం గట్టు చుట్టూ 3 మీ.ల ఎడంతో కర్ర దుంగలు పాతుకోవాలి. ఈ కర్ర దుంగలకు కొబ్బరితాడును భూమికి ఒక అడుగు ఎత్తులో మొదలు పెట్టి మధ్య ఒక అడుగు స్థలం ఉండేటట్లు చూసుకొని 3 వరుసలు బిగుతుగా లాగి కట్టుకోవాలి. ఇలా కట్టిన త్రాడుకు ముందుగా తయారు చేసుకున్న పంది క్రొవ్వు మరియు గంధకపు మిశ్రమాన్ని దట్టంగా పూయాలి.

ఈ మిశ్రమం నుండి వెలువడు ఘాటైన వాసనలు చాలా రోజుల వరకు ఉండి రాత్రి వేళల్లో సంచరించు అడవి పందులకు ఇబ్బందులు కలుగజేస్తాయి. ఆవాస పరిధి గల జంతు జాతులు ఒక జంతువు ఉన్న పరిధిలోనికి వేరొక జంతువు రాదు. అందువల్ల ఇక్కడే వేరొక పందుల సమూహం ఉన్నదని వాసన ద్వారా పసిగట్టి పందులు దూరం నుండే వెను దిరిగి వెళ్ళిపోతాయి. వాసన ఎక్కువ రోజులు వ్యాపించి ఉండాలంటే 10 రోజులకు ఒక మారు మిశ్రమ ద్రావణాన్ని తాడుకు పూయాలి. తత్ఫలితంగా పందులు పంటపొలాల సమీపం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయి పంటలు రక్షించబడుతాయి.

ఘాటైన వాసనను వెదజల్లె వెల్లుల్లి, అల్లం వంటి వాటిని మెత్తగా రుబ్బి కొన్ని రోజుల (5–7 రో.) పాటు నిల్వ ఉంచి వాటి నుంచి తీసిన కషాయాలను పొలం గట్లపై చల్లితే వాటి వాసనకు అడవి పందులు ఆ పంట ప్రాంతాల్లోకి చొరబడవు.

4. జీవ ఆర్తనాద పద్ధతి : ఈ పద్ధతిలో అడవి పందుల ఆర్తనాదాలు మరియు అడవి పందులను వేటాడే జంతువులైన సింహాలు, పులులు, చిరుతలు, అడవి కుక్కలు, నక్కలు మరియు తోడేళ్లు మొదలగునవి అడవి పందులను వేటాడేటప్పుడు చేసే భయంకర గాండ్రింపు శబ్దాలను ప్రత్యక్షంగా రికార్డ్ చేసి సునిశితమైన స్పీకర్ల ద్వారా పంట దగ్గర ప్రాంతం నుండి ప్రసారం చేసినట్లయితే అడవి పందులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురై పంట పొలాల నుండి దూరంగా పారిపోతాయి. ఇటువంటి ఆర్తనాద యంత్రాలు విద్యుత్ / సొలార్ ఫలకల ద్వారా పని చేస్తాయి. ఈ యంత్రాల ద్వారా వెలువడు గాండ్రింపు శబ్దాలు 10–12 ఎకరాల వరకు వ్యాపిస్తాయి. ఈ యంత్రం ఖరీదు ఎ.సి. వెర్షన్ రూ. 19,000 + జి.ఎస్.టి. సోలార్ వెర్షన్ రూ. 22,000 + జి.ఎస్.టి.

5. సాంప్రదాయ పద్ధతులు

ఊరపందుల పెంట మిశ్రమ పిచికారి విధానం : దీనికిగాను ఊరపందుల పెంటను సేకరించి తగినంత నీటితో ద్రావణంగా తయారుచేసి వడగట్టుకోవాలి. ముందే పంటపొలం చుట్టూ 1 అడుగు వెడల్పు ప్రాంతాన్ని చదును చేసి, నీటితో తడపాలి. ఈ వడగట్టిన ద్రావణాన్ని తడిచేసిన ప్రాంతంలో పిచికారి చేసినట్లైతే ఒక విధమైన వాసన

వస్తుంది. ఈ వాసన గ్రహించిన అడవి పందులు ఆ ప్రాంతంలో ఊర పందులు సంచరిస్తున్నాయని భ్రమపడి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ వాసన ఎక్కువ రోజులు వ్యాపించి ఉండాలంటే 7 రోజులకు ఒక మారు మిశ్రమ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయాలి, తత్ఫలితంగా పందులు పంట పొలాల సమీపంలోకి రాకుండా దూరంగా పారిపోయి పంటలు రక్షించబడుతాయి.

వెంట్రుకలు వెదజల్లు పద్ధతి : క్షౌరశాలలో దొరికే వ్యర్థమైన వెంట్రుకలను సేకరించి గట్ల చుట్టూ ఒక అడుగు వెడల్పు ప్రాంతాన్ని చదును చేసి వెంట్రుకలను పల్చగా చల్లాలి. అడవిపందుల నేలను త్రవ్వే అలవాటు, వాసన చూసే అలవాటు ప్రకారం అవి నేలమీద తమ ముట్టె భాగాన్ని ఉంచి గాలిపీల్చడం వలన ఈ వెంట్రుకలు వాటి ముక్కులోనికి ప్రవేశించి శ్వాసపరంగా తీవ్ర ఇబ్బందికి గురై తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళిపోతాయి. తద్వారా పంటలు రక్షించబడుతాయి.

చీరల పద్ధతి : పంట పొలాల చుట్టూ కర్రలను పాతి పాత చీరలను గోడ వలె కట్టినట్లైతే, అడవి పందులు రాత్రి సమయాలలో దాడిచేసినప్పుడు ఆ చీరల స్పర్శతో మనుషులు ఉన్నట్లుగా భ్రమపడి అరుస్తూ దూరంగా పారిపోతాయి. ఈ శబ్దాలను విన్న మిగతా పందులు భయపడి దూరం నుండే వెనుదిరుగుతాయి. ఫలితంగా పంటలు రక్షింపడతాయి.

6. పక్షుల నియంత్రణ పద్ధతులు :

రిబ్బన్ పద్ధతి : పంట ఎత్తు కంటే ఒక అడుగు ఎత్తు గల రెండు కర్రలను ఉత్తర, దక్షిణదిశలలో పాతుకోవాలి. ఒక ప్రక్క ఎరుపు రంగు మరొక ప్రక్క తెలుపు రంగు కల్గి అరఅంగుళం వెడల్పు 30 అడుగుల పొడవు గల రిబ్బన్ 3 లేదా 4 మెలికలను త్రిప్పి కర్రలను 10 మీ. దూరములో నాటి కట్టవలెను. పక్షుల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న ఎడల కర్రల మధ్య దూరము 5 మీ. తగ్గించి కట్టవలెను. సూర్యరశ్మి రిబ్బన్ పైబడి ధగధగ మెరుస్తూ గాలి వీచినపుడు ఒకరకమైన శబ్దము చేస్తూ పంట దశ పక్షుల కంటపడకుండా చేస్తుంది. రిబ్బన్ పద్ధతిలో అన్ని రకములైన ఆహార ధాన్యాల, పప్పు ధాన్యాల, నూనెగింజల పంటలు మరియు పండ్లతోటలను పక్షుల బారి నుండి కాపాడవచ్చును.

ఆకుచుట్టు పద్ధతి : మొక్కజొన్న ఆకులను, గింజలు పాలుపోసుకొను దశలో కంకి చుట్టూ చుట్టి పక్షుల దృష్టిని మరల్చవచ్చును. గట్ల నుండి 3 లేదా 4 వరుసల వరకు ఆకులను చుట్టి పక్షుల దృష్టిని మరల్చి పంటలను రక్షించవచ్చును. తక్కువ విస్తీర్ణము కల్గిన పంటలకు ఇది అనువైన పద్ధతి.

వేపగింజల కషాయం పిచికారి పద్ధతి : వేపగింజల కషాయం తయారీ తగిన మొత్తంలో వేపగింజలను సేకరించి ఎండబెట్టుకోవలెను. గింజలు బాగా ఎండిన తరువాత గింజపై పొట్టును వేరు చేసి గింజలను తిరిగి ఒకరోజు ఎండబెట్టవలెను. తరువాత ఈ గింజలను బాగా పొడిగా చేసి తడిలేని డబ్బాలలో పోసి నిల్వ ఉంచుకోవాలి. వేప కషాయం పిచికారి చేయడానికి, దానికి ముందు రోజు ఈ గింజల పొడిని ఒక పలుచటి గుడ్డలో కట్టి, ఒక పాత్రలో తగినంత నీటిని తీసుకొని గింజల పొడి ఉన్న మూట ఆ నీటిలో మునుగునట్లు ఉంచినట్లైతే రాత్రి

సమయం మొత్తం ఆ పొడి నీటిలో నాని చక్కటి కషాయం తయారవుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ మూటను పాత్రలో నీటిలో గట్టిగా పిండి పిప్పిని వడపోసి ఆ కషాయాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. ఈ రకంగా తయారు చేసిన వేప గింజల కషాయాన్ని 20 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పంటపై పిచికారి చేసినచో పక్షులు గింజలను తినడానికి విముఖత చూపుతాయి. ఫలితంగా పక్షుల బారి నుండి పంటను సమర్ధవంతంగా కాపాడుకోవచ్చును. ఈ పద్ధతి ద్వారా 7 నుండి 10 రోజుల వరకు పక్షులు పంటను నష్టపరచకుండా కాపాడవచ్చు.

కోడి గుడ్డు ద్రావణం పిచికారి : కుళ్ళిన కోడిగుడ్లు సేకరించి వాటిని పగులగొట్టి ద్రావణాన్ని వేరుపరచాలి. ఈ ద్రావణాన్ని 25 మి.లీ. ఒక లీటరు నీటికి కలిపి గింజ పాలుపోసుకొనే దశలో పంటపై పిచికారి చేసినట్లైతే ఆ వాసనలు పక్షులకు తీవ్రమైన చిరాకును కలుగచేయును మరియు గింజలు రుచింపవు. అందువలన అవి పంట పొలాల వైపునకు రాకుండా దూరంగా పారిపోతాయి. దీని ద్వారా వచ్చే వాసన సుమారు 10–15 రోజుల వరకు పనిచేసి పక్షులను రాకుండా చేస్తుంది. అవసరమైనచో రెండవ విడత కూడా పిచికారి చేసుకోవచ్చు.

వ్యవసాయ పంటలలో నెమళ్ళ యాజమాన్యం : ఆహార ధాన్యాపు పంటలైన వరి, గోధుమ, జొన్న, మొక్కజొన్న, నూనెగింజలైన ప్రొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, కుసుమ, వలిశెలు మొదలగునవే కాక ఫలజాతికి చెందిన జామ, దానిమ్మ, సపోట, ద్రాక్ష మరియు కూరగాయలైన టమాట, బెండకాయలు, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజి, వంకాయ, బీరకాయ, దోస మొదలగు పంటలలో విత్తనం విత్తిన దశ నుంచి పంట కాపుకు వచ్చే సమయ వరకు నెమళ్ళ వలన తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతున్నది. ఈ నష్ట తీవ్రతను తగ్గించడానికి కొబ్బరిత్రాడు / పురికోసత్రాడును విత్తనం విత్తే దశలో పొలానికి 4 వైపులా కర్రలను పాతి భూమికి ఒక అడుగు ఎత్తులో పంటకు పైన అడ్డు, నిలువు వరుసలలో ఒక మీటరు మధ్య ఎడంగా ఖాళీ ఉంచుకొని కట్టినట్లైతే, పంటల మీదికి ఎగురుతూ వచ్చే నెమళ్ళు పంట పొలంపై దిగినప్పుడు వాటి కాళ్ళకు ఈ త్రాడు చుట్టుకొని నెమళ్ళు భయాందోళనకు గురై ఆర్తనాదాలు చేయుచూ దూరంగా ఎగిరిపోతాయి. గింజ పాలుపోసుకునే దశలో, ఫలాలు పక్వదశలో, పంట గట్టు వెంబడి భూమి నుంచి ఒక అడుగు ఎత్తులో 3 వరుసలు పంట చుట్టూ కట్టినట్లైతే నెమళ్ళ బెడదను సమర్ధవంతంగా అరికట్టవచ్చు.

పెద్ద కమతాలలో ఒకే పంటను వేయు విధానము : ఈ పద్ధతిలో ఒకే రకమైన పంటను అనగా జొన్న, మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు పంటలను ఏదైనా ఒక దానిని మాత్రమే పెద్ద కమతాలలో (20 ఎకరాలలో) పండించినట్లైతే పక్షుల వలన వాటిల్లే నష్టాన్ని చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు. వివిధ గింజలను తినే పక్షులు పంటల అంచుల వెంబడి మాత్రమే నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్న పంట పొలాలపైకి పక్షుల దాడి చేయునప్పుడు అంచుల వెంబడి వివిధ సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లైతే దాదాపుగా పంట మొత్తాన్ని రక్షించుకోవచ్చు. పక్షుల బెడదను అరికట్టడానికి ఈ పద్ధతి అత్యంత సమర్ధవంతమైనది మరియు స్వల్ప మోతాదు సస్యరక్షణ చర్యలు మాత్రమే చేపట్టవలసి ఉంటుంది. కావున రైతులకు ఈపద్ధతి ఆమోదయోగ్యమైనది.

ఆర్తనాద పద్ధతి : పంటలను నష్టపరచు వివిధ పక్షుల ఆర్తనాదాలను మరియు పంటకు నష్టం చేయు పక్షుల మీద దాడి చేయు పక్షుల యొక్క అరుపులను సేకరించి క్రమపద్ధతిలో రికార్డ్ చేసి నిర్ణీత శబ్దోత్పత్తి యంత్రాలను ఉపయోగించి పంట పొలాలకు సమీప ప్రాంతం నుంచి ఆర్తనాదాలను ఉత్పత్తి చేయవలెను. అప్పుడు పంటను నష్టం చేయు పక్షులు బెదరి ఆపద ఉన్నదని భ్రాంతికి గురై పంట పొలాల నుండి దూరంగా పారిపోతాయి. ఈ పద్ధతిలో ఉపయోగించే యంత్రం ఖరీదు సుమారు రూ. 20,000/- (సోలార్ ప్లేట్లతో), విద్యుత్ సరఫరాతో పనిచేయు యంత్రం ఖరీదు రూ. 15,000/-. ఈ యంత్రం సుమారుగా 4-5 ఎకరాల విస్తీర్ణం గల పంట పొలాలకు సమర్ధవంతంగా పనిచేయుచున్నదని ప్రయోగ పూర్వకంగా రుజువు పరచడమైనది.

ప్రత్యామ్నాయ ఆహార సరఫరా పద్ధతి : వివిధ వ్యవసాయ పంట పొలాల సమీపంలో ఆవాస ప్రాంతాలలో వృధాగా ఉన్న భూములలో మరియు పొలం గట్ల వెంబడి వివిధ అటవీ జాతి పండ్ల చెట్లను పెంచినట్లైతే అవి వివిధ పక్షులను ఆకర్షించును. ఫలితంగా పంటలపై పక్షుల దాడి తగ్గి అధిక పరిమాణంలో పంట నష్టం తగ్గుతుంది మరియు అటవీ జాతి ఫలసాయం వలన రైతులకు అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. ముఖ్యంగా అటవీజాతి పండ్ల చెట్లు సీమచింత, మోదుగ, రావి, మర్రి, వర్కి, కల్మకాయలు, మొర్రి, తునికి, జీడిపండ్లు, రేగి, చింత, వెలగ, ఊదుగ మొదలగునవి.

7. సమగ్ర సస్యరక్షణ :

పంటలకు హానిచేయు వివిధ పక్షులను అరికట్టుటకు గల పద్ధతులను సమగ్రంగా అమలు పరిచినట్లయితే ఒక్కొక్క పద్ధతిలో వచ్చే ఫలితాలు సంయుక్తంగా వచ్చి పంట నష్టం సమర్ధవంతంగా అరికట్టబడును.

వివిధ సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులు :

మెరుపు రిబ్బన్+ఆకుచుట్టు పద్ధతి : మొక్కజొన్న పంటలో గింజ పాలుపోసుకునే దశలో రామచిలుకలు, గోరింకలు, కాకులు, పావురాలు, గువ్వలు మరియు ఇతర పక్షులు తీవ్రంగా దాడిచేస్తాయి. ఈ దశలో మొక్కజొన్న కండెపై అంచు నుండి నూగు రావడంతో పక్షులు ఆకర్షించబడి గింజలను తింటాయి. ఈ దశలో నూగు బయటకు కనిపించకుండా కండెకు చుట్టూ ఉన్న ఆకులను కండె చుట్టూ కప్పినట్లైతే అది పక్షులు గమనించలేవు. ఫలితంగా పంట నష్టం తగ్గుతుంది. ఈ పద్ధతితో పాటు రిబ్బన్‌లను పంటకు ఒక అడుగు ఎత్తులో ఉత్తర, దక్షిణ దిశలో మెలిత్రిప్పి కట్టినట్లైతే సూర్యరశ్మిలో మెరుపు రిబ్బన్‌లు తళుక్కున మెరవడం వలన మరియు గాలి వీచునప్పుడు శబ్దం ఉత్పత్తి కావడం వలన పక్షులు బెదరి దూరంగా పారిపోతాయి.

మెరుపు రిబ్బన్ + కుళ్ళిన కోడిగుడ్డు మిశ్రమం పిచికారి : జొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు మరియు సజ్జ పంటలలో పంటకు ఒక అడుగు ఎత్తులో ఉత్తర, దక్షిణ దిశలో రిబ్బన్ కట్టిన తర్వాత కుళ్ళిన కోడిగ్రుడ్డు ద్రావణాన్ని ఒక లీటరు నీటికి 20 మి.లీ. ల మోతాదులో కలుపుకొని కంకులపైన పిచికారి చేయవలెను. ఈ పద్ధతిలో పంటలను వివిధ హానిచేయు పక్షుల బెడద నుంచి సమర్ధవంతంగా రక్షించవచ్చు.

మెరుపు రిబ్బన్ + ఆర్తనాద పద్ధతి : మొక్కజొన్న, జొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు, చిరుధాన్య పంటలు, నూనెగింజలు మొదలగు పంటలలో మెరుపు రిబ్బన్‌లను పంటకు ఒక అడుగు ఎత్తులో ఉత్తర, దక్షిణ దిశలో మెలి త్రిప్పి కట్టినట్లైతే సూర్యరశ్మి రిబ్బన్‌లపై పడి తళతళమని మెరుస్తాయి. ఈ మెరుపుల వల్ల పక్షుల కంటికి తీవ్ర అసౌకర్యము కలిగి పంట పొలాల నుండి దూరంగా పారిపోతాయి. ఆ రిబ్బన్‌లతో పాటు ఆర్తనాద శబ్దాలనుత్పత్తి చేయు యంత్రాన్ని పంట పొలం మధ్యలో అమర్చినట్లైతే దాని నుండి ఆర్తనాద శబ్దోత్పత్తి జరిగి మెరుపు రిబ్బన్‌ల మెరుపులు, ఆర్తనాద శబ్దాలు ఒకే సమయంలో ఉత్పత్తి కావడం వలన పక్షులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై పంట పొలాల నుండి దూరంగా పారిపోతాయి.

పైన సూచించిన పద్ధతులు సంయుక్తంగా అమలుచేసినప్పుడు మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఫలితంగా పంట నష్టం గణనీయంగా తగ్గించబడుతుంది.

పంటలకు మేలు చేయు పక్షులు :

వివిధ దశలలో పంటలను నష్టపరుచు పురుగులను పక్షులు తిని రైతులకు మేలు చేస్తాయి. తెల్ల కొంగలు, మంగలిపిట్ట, గోరింక, పాలపిట్ట, చిన్న పసిరిక, మాల కాకి, కిరీటం పిట్ట మరియు పసరిక పిట్ట పొలం దున్ను సమయంలో భూమి నుండి బయటకు వచ్చిన పురుగులను ఏరుకొని తినుట వలన పురుగుల ఉధృతి సుమారు 63 శాతం తగ్గుతుంది. ప్రత్తి, కంది పంటలను నాశనము చేయు శనగపచ్చ పురుగు మరియు పొగాకులద్దె పురుగులను 40 నుంచి 60 శాతం వరకు తిని పంటలను కాపాడుతాయి. ఒక కొంగ 20 నిమిషాలలో 50 పురుగులను తింటుంది. ఈవిధంగా వివిధ పూల, పండ్ల వృక్షాలను కూడా పొలం గట్ల చుట్టూ పెంచినట్లైతే మేలు చేయు పక్షులకు ఆవాస ప్రాంతాలుగా మారి పంటలను ఆశించు కీటకాలను అదుపులో ఉంచుతాయి.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

మారుటేరు - 534 122. ఫోన్ నెం. 08819-246283.

సెల్ నెం. : 89787 78724

పుట్టగొడుగుల పెంపకము

పుట్టగొడుగులు ప్రత్యేకమైన శిలీంధ్రము (ఫంగస్ / బూజు) జాతికి చెందిన జీవులు. పుట్టగొడుగులను శాఖాహారుల మాంసాహారము అని అంటారు. పుట్టగొడుగులు బెసిడియో మైకోట విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేకమైన ఫలనాంగాలు కలిగిన ఉన్నత జాతి శిలీంధ్రాలు. ఈ పుట్టగొడుగులలో కొన్ని తినదగినవి మరియు కొన్ని విషపూరితమైనవి ఉంటాయి. తినడానికి ఉపయోగపడే పుట్టగొడుగులలో అతి ముఖ్యమైనవి మరియు సులభంగా పెంచగలిగినవి క్రింద పేర్కొనడం జరిగినది.

1. ముత్యపుచిప్ప పుట్టగొడుగులు; 2. బటన్ పుట్టగొడుగులు; 3. పాల పుట్టగొడుగులు; 4. వరిగడ్డి పుట్టగొడుగులు.

పుట్టగొడుగులు అధిక పోషక మరియు ఔషధ విలువలు కలిగి ఉండి ఆరోగ్యానికి మంచి చేయుట వలన వీటికి జాతీయంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉంది. కావున పుట్టగొడుగుల పెంపకం ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకొన్నది. పుట్టగొడుగుల పెంపకం రైతులకు, నిరుద్యోగ యువతకు, మహిళలకు జీవనోపాధి పొందుటకు ఉపయుక్తంగా ఉండే ఒక మంచి కుటీర పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చును. ప్రపంచం వ్యాప్తంగా దాదాపు రెండు వందల రకాల తినదగిన మరియు ఔషధ గుణాలున్న పుట్టగొడుగులను శాస్త్రీయంగా పెంచటం జరుగుతున్నది. కాని మన భారత దేశంలో ముఖ్యంగా పైన తెలిపిన నాలుగు రకాల పుట్టగొడుగులు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నవి. కొత్తగా పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టాలి అనుకునే వారు ఖచ్చితంగా పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై సరైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి మరియు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వ సంస్థలలో పుట్టగొడుగుల పెంపకం శిక్షణ పొంది ఉండటం మంచిది. చాలా మందికి పుట్టగొడుగుల పైన అనేక అపోహలు ఉంటాయి వాటిని క్రింద పొందుపరచటం జరిగినది.

పుట్టగొడుగుల గురించి అపోహలు :

- చాలా మంది వీటిని మాంసాహారము అనుకుంటారు. ఇది ఎంత మాత్రము నిజము కాదు.
- దిబ్బ ఎరువుల మీద పెరిగేవన్ని హానికరమైనవిగా భావిస్తారు. ఇది తప్పు.
- తెలుపు రంగులో ఉండే అన్ని రకాల పుట్టగొడుగులు తినదగినవి అనుకుంటారు. ఇది కూడా తప్పు.
- అన్ని రకాల పుట్టగొడుగులు తినదగినవి కావు.

పుట్టగొడుగుల గురించి ముఖ్యమైన విషయాలు :

- ఆయిస్టర్, పాల, బటన్ మరియు వరిగడ్డి పుట్టగొడుగులు విషపూరితమైనవి కావు.
- కొండలలో, గుట్టలలో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొలాలలో పెరిగే అన్ని రకాల పుట్టగొడుగులు తినకూడదు.
- పుట్టగొడుగులు తినేటప్పుడు మత్తు పానీయాలు తీసుకోకూడదు.
- గుమ్మడికాయ లేక చిక్కుడు కాయలను పుట్టగొడుగులతో కలిపి తినకూడదు, వండకూడదు. అలా కలిపి తింటే ఆహారం విషపూరితమవుతుంది.

సాధారణంగా మరియు ముఖ్యంగా పెంచు పుట్టగొడుగులు :

1. బటన్/యూరోపియన్/ శీతోష్ణ మండల పుట్టగొడుగు. 2. తెల్లబటన్ / ఎడ్యులిస్, ఉష్ణమండల పుట్టగొడుగు

3. వరిగడ్డి / చైనీస్ పుట్టగొడుగు. 4. ముత్యపు చిప్ప పుట్టగొడుగు. 5. షిటాకీ పుట్టగొడుగు. 6. బ్లాక్ ఇయర్/ నల్ల చెవి పుట్టగొడుగు. 7. తెల్లపాల పుట్టగొడుగు. 8. గోధుమ టోపి/ అతి పెద్ద పుట్టగొడుగు

విషపూరిత పుట్టగొడుగులు : 1. డెత్ క్యాప్ పుట్టగొడుగు. 2. ఎగిరే అగారికస్. 3. నాశన దేవదూత

పుట్టగొడుగుల ఔషధ విలువలు :

- పుట్టగొడుగులు యాంటీబయోటిక్స్‌ను కలిగి ఉంటాయి మరియు కాన్సర్, హైపోలిపిడెమిక్, హైపోకొలెస్టెరమిక్, మరియు హైపర్ టెన్షన్ లాంటి జబ్బులకు ఔషధాలుగా ఉపయోగబడుతాయి.
- పుట్టగొడుగులలో అగారికస్ బైస్పోరస్, లెంటిన్యులా ఎడోడ్స్ రకాలు అతి తక్కువ కొవ్వును కలిగి ఉంటాయి.
- రేషి పుట్టగొడుగు, గానోడెర్మా ల్యూసిడమ్ పుట్టగొడుగులను ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, లుకేమియా వంటి కాన్సర్ల నివారణకి మాత్రలు తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు.
- మైటేకు (గ్రిఫోలియా ఫ్రెండోజా) పుట్టగొడుగు యాంటీ ట్యూమర్ మరియు యాంటీ కాన్సర్ ఔషధాలు/ మందులు లాగా ఉపయోగపడుతాయి.
- పుట్టగొడుగులు సెలీనియం వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి, కణాలు మరియు కణజాలాలకి కలిగే నష్టాలను అరికడతాయి.
- యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
- జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగు పరుస్తుంది.

పోషక విలువలు :

1. వీటిలో ప్రోటీన్స్ (19–35 శాతం) వరి, గోధుమ మరియు కూరగాయల కంటే అధికంగా ఉండును.
2. పొటాషియం, సోడియం నిష్పత్తి, పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉండడం వల్ల అధిక రక్తపోటు (బి.పి.), అధిక ఆమ్లత (అసిడిటి) వల్ల బాధ పడేవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతాయి.
3. పుట్టగొడుగులలో కొవ్వు పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటాయి.
4. విటమిన్–బి కాంప్లెక్స్, విటమిన్–సి, ఫోలిక్ ఆమ్లము, పాంటోథెనిక్ ఆమ్లము మరియు నియాసిన్లు అధికంగా ఉంటాయి.
5. వీటిలో పిండి పదార్థాలు అనగా కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల చక్కెర వ్యాధి, గుండెజబ్బు గల వారికి ఇది మంచి ఆహారం.
6. పొటాషియం, ఫాస్పరస్, కాపర్ మరియు ఐరన్ వంటి మినరల్స్ విరివిగా ఉంటాయి.
7. పుట్టగొడుగులలో ముఖ్యమైన లైసిన్ మరియు ట్రిప్టోఫాన్ వంటి అమైనో ఆమ్లాలు అధికంగా లభ్యమవుతాయి.
8. తాజా పుట్టగొడుగులలో విటమిన్–డి సంశ్లేషణకు అవసరమైన రసాయనాలు అధికంగా ఉంటాయి.

పుట్టగొడుగుల పెంపకము వలన లాభాలు :

- పుట్టగొడుగులను పెంచుటకు ఎక్కువ పెట్టుబడి అవసరం లేదు.
- పుట్టగొడుగులను తక్కువ కాల వ్యవధిలో అనగా 35–40 రోజులలో పెంచవచ్చు.
- ఇంటి ఆవరణంలో కూడా వీటిని సులభంగా పెంచవచ్చును.
- అధిక దిగుబడులు మరియు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చును.

- పంట అయిపోయిన తరువాత బెడ్లను ఎరువుగా లేదా బయోగ్యాస్ తయారీకి వాడుకోవచ్చు.
- గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువత, మహిళలు మరియు సన్నకారు రైతులు పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని చేపట్టినట్లైతే అధిక దిగుబడులను పొందడమే కాకుండా, ఉపాధిని కూడా పొందవచ్చును.

ముత్యపు చిప్ప పుట్టగొడుగుల పెంపకము-విధానం :

శాస్త్రీయ నామము - ప్లరోటస్ సాజర్ కాజు : సాధారణంగా ముత్యపు చిప్ప పుట్టగొడుగులను ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగులు అని అంటారు. దీనిని ధింగ్రీ పుట్టగొడుగు అని పిలుస్తుంటారు. వీటి పెరుగుదలకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత మరియు ఎక్కువ శాతం తేమ ఉండాలి, అనగా 20-25 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత మరియు 75-80 శాతం తేమ ఉండాలి. దీని పెరుగుదలకు భారత దేశంలో జూన్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ పుట్టగొడుగులలో రంగు ఆధారంగా వివిధ రకాలు కలవు (తెలుపు, పసుపు, బూడిద, లేత రోజా వంటివి).

ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి కంపోస్టింగ్ అవసరం ఉండదు. ఇది వివిధ వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి అధికంగా ప్రొటీన్ ఉండే ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలో 3వ అతి ఎక్కువగా పండించే పుట్టగొడుగు. గోధుమ గడ్డి, వరి గడ్డి, రాగి గడ్డి, మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జ, ప్రత్తి మొక్క కాండాలు మరియు ఆకులు, చెఅకు పిప్పి, జనపనార మరియు ప్రత్తి వ్యర్థాలు, మొక్కజొన్న పొత్తులు, వేరుశనగ కాయల పొట్టు, ఎండిన గడ్డి, ప్రొద్దుతిరుగుడు కాండాలు, ఉపయోగించిన టీ ఆకు వ్యర్థాలు, విస్మరించిన వ్యర్థ కాగితం మరియు కంపోస్టు వంటి అనేక వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగు సాగులో సాగు పదార్థాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చును.

ఈ పుట్టగొడుగులు పెంచే విధానం : ఇందులో ముఖ్యంగా 6 దశలు ఉంటాయి

1. తల్లి కల్చర్ తయారు చేయడం 2. పుట్టగొడుగుల విత్తనం (స్పాన్) తయారు చేయడం 3. సబ్ స్ట్రేట్ తయారు చేయడం 4. బెడ్స్ తయారు చేయడం 5. స్పాన్‌ని పెంచడం 6. పుట్టగొడుగులు పెరిగే దశ.

1. తల్లి కల్చర్ తయారు చేయడం :

కావలసిన పరికరాలు : ఫలనాంగ దశకు చేరిన పుట్టగొడుగు, బ్లేడ్లు, లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో, 70 శాతం ఆల్కహాల్, పెట్రిప్లేట్స్, పొటాటో డెక్స్‌ట్రోజ్ అగార్ మీడియం.

మొదటిగా లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో చాంబర్‌ని ఆల్కహాల్ ఉపయోగించి నీటిని పీల్చే దూది సహాయంతో శుభ్రపరచాలి. తరువాత పుట్టగొడుగు యొక్క పీల్ (Pileus) మరియు కాండం (Stalk) కలిసే చోటు (కాలర్) నుండి బ్లేడు సహాయంతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి, వాటిని పెట్రిప్లేట్లలో పోసిన పొటాటో డెక్స్‌ట్రోజ్ అగార్ మీడియంపై ఉంచాలి. తరువాత 2-3 రోజులలో మైసీలియం పెరుగుదలను గమనించవచ్చును.

2. పుట్టగొడుగుల విత్తనం (స్పాన్) తయారు చేయడం :

పగిలిన గింజలు కాని, రాళ్ళు మట్టి బెడ్డలు లేని ఏ విధమైన తెగుళ్ళు ఆశించని ఆరోగ్యవంతమైన జొన్నలు లేదా గోధుమలు లేదా మొక్కజొన్నలు ఎంచుకొని వీటిని మంచి నీటిలో కడగాలి. కడిగిన పదార్థాలను 30 నిమిషాలు ఉడకబెట్టిన తరువాత ఎక్కువగా ఉన్న నీటిని తీసివేయాలి. ఒక కిలో ఉడకబెట్టిన పదార్థానికి

20 గ్రా. కాల్షియం కార్బోనేట్ పొడిని కలపాలి. 5 గ్రా. కాల్షియం సల్ఫేట్ మరియు 3 గ్రా. సుక్రోజ్ పొడిని కూడా కలపాలి. పై మిశ్రమాన్ని స్పాన్ సీసాలో లేదా ప్లాస్టిక్ సంచులలో మూడో వంతు వరకు నింపి శుభ్రమైన దూదితో మెత్తగా గట్టిగా మూతపెట్టాలి. నలుచదరంగా ఉన్న మందపు కాగితపు ముక్కలను దూదిపై ఉంచి సీసాను లేదా ప్లాస్టిక్ సంచిని దారంతో గట్టిగా కట్టాలి. ఇలా కట్టిన సీసాలను ఆటోక్లేవ్ లో 15 పౌండ్ల పీడనం చేరిన తర్వాత 20 నిమిషాల పాటు వుంచి, తరువాత ఆటోక్లేవ్ నుండి తీసి 24 గంటల పాటు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచాలి.

శుభ్రపరచిన స్పాన్ సీసాలను ఇనాక్యులేషన్ చేయడానికి అతినీలలోహిత బల్బు అవసరం. ఇది లేకపోతే, సారా దీపం వద్ద ఇనాక్యులేషన్ చేయవచ్చు. పరీక్ష నాళికలోని తల్లిస్పాన్‌ను ఇనాక్యులేషన్ నీడిల్ సహాయంతో సీసాలోకి కొద్దిగా వేసిన తరువాత వెంటనే, శుభ్రమైన దూదితో మూసి వేయాలి. ఈ విధంగా ఇనాక్యులేషన్ చేసిన తరువాత కాగితంతో కప్పి దారంతో బిగించాలి. ఇనాక్యులేట్ చేసిన సీసాలను గది ఉష్ణోగ్రతలో అంటే 24–28 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మధ్య 10–15 రోజుల పాటు ఉండనివ్వాలి. వారం రోజుల తరువాత, సీసాలను బాగా గుండ్రంగా, వేగంగా తిప్పితే శిలీంధ్రం దారాలు ముక్కలు ముక్కలుగా అయ్యి, సీసాలోని గింజలన్నింటిని అంటుకుంటుంది. సీసాలను ఉంచిన గది చల్లగా ఉండాలి. మూడు వారాల్లో శిలీంధ్రం పెరిగి, వాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.

3. సబ్ స్ట్రేట్ తయారు చేయడం : పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి కావలసిన ముడి పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడాన్ని సబ్ స్ట్రేట్ తయారుచేయడం అంటారు.

కావలసిన ముడి పదార్థాలు : వరిగడ్డి

తయారు చేయు విధానం:

1. రసాయన పద్ధతి : మొదటగా వరి గడ్డిని 3–5 సెం.మీ. పొడవు ముక్కలుగా ప్యాడీస్ట్రా కట్టర్ లేదా కత్తితో కాని కత్తిరించాలి. సుమారు 100 లీటర్ల నీటిలో 10–15 కిలోల గడ్డికి 200 మి.లీ. ఫార్మలిన్ మరియు 7.5 గ్రా. కార్బెండజిమ్ (బావిస్టిన్) ను బాగా కలిపి 8–12 గంటలపాటు రాత్రంతా నానబెట్టాలి. తరువాత వరి గడ్డిని బయటకు తీసి నీడలో 60–65 శాతం తేమ వచ్చేంత వరకు ఆరబెట్టాలి. గడ్డిముక్కలు మరీ ఎక్కువగా ఆరిపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

2. వేడిచేయు పద్ధతి : వేడిచేయు పద్ధతిని కూడా అవలంబించవచ్చు. ఈ పద్ధతి పాల పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో వివరంగా చెప్పబడినది.

3. బెడ్స్ (దిండ్లు) తయారు చేయు విధానం : బెడ్‌ని తయారు చేయడానికి అవసరమైన పాలిథిన్ సంచికి అన్ని వైపుల 15–20 చిన్న చిన్న రంధ్రాలను చేయాలి. ముందుగా బెడ్స్ తయారు చేయుటకు చేతులను స్పిరిట్ (ఆల్కహాల్) తో కడుక్కోవాలి. పాలిథిన్ సంచులలో గడ్డి ముక్కలను 5 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండేలాగా వేయాలి. మొదటి పొరను నింపిన తరువాత 20 రోజుల వయసు గల సీసాలోని స్పాన్‌ను ఒక గుప్పెడు తీసుకొని గడ్డిపైన అంచులలో చల్లాలి. తరువాత మళ్ళీ 5 సెం.మీ. ఎత్తు వుండే 2వ పొరను వరిగడ్డితో నింపి బాగా అదుముకోవాలి. మరల స్పాన్‌ని వెదజల్లాలి. అలా ఒక సంచికి 4–6 పొరలను నింపి మూతిని రబ్బరు బ్యాండుతో లేదా దారముతో బిగించవలెను.

4. స్పాన్‌ని పెంచడం : అలా తయారు చేసిన బెడ్లను బోదగడ్డితో నిర్మించిన పాకలందు ఒక వరుసకు 4 నుంచి 5 వరకు వ్రేలాడదీయాలి. 15–21 రోజులలో పుట్టగొడుగుల శిలీంధ్ర జాలం బెడ్ మొత్తం పెరుగుతుంది. తరువాత బెడ్ల నుంచి పాలిథిన్ కవర్‌ని తొలగించి 65–85 శాతం కన్నా తక్కువ తేమ లేకుండా రోజుకు ఒకసారి నీటితో తడపాలి.

5. పుట్టగొడుగులు పెరిగే దశ : పాలిథిన్ కవర్‌ను తొలగించిన తరువాత 10–12 రోజులకు బటన్ వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడుతాయి. ఇవి వారం రోజులకు ఫలనాంగ దశకు చేరుకుంటాయి.

6. పుట్టగొడుగులను కోయటం : బాగా ఏర్పడిన ఫలనాంగాలను స్పిరిట్‌తో శుభ్రపరచిన స్టెరిలైజెడ్ బ్లేడు సహాయంతో కోయాలి. తరువాత 10 నుంచి 15 రోజుల వ్యవధిలో ఒక్కొక్క బెడ్ నుండి 2 నెలల వ్యవధిలో సుమారుగా 2–3 కిలోల పుట్టగొడుగులు తీసుకోవచ్చు.

పుట్టగొడుగుల అమ్మకము : వీటి యొక్క నిల్వకాలం తక్కువగా ఉండటం వలన తాజా పుట్టగొడుగులను 24 గంటలలో అమ్మాలి.

నిల్వ వుంచడం : పుట్టగొడుగులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి, ఎండలో ఎండబెట్టిన తరువాత వాటిని సుమారు 6 నెలల వరకు వాడుకోవచ్చు. ఫ్రిజ్ లో 3 నెలల వరకు నిల్వవుంచవచ్చు. ఉప్పు నీటిలో కొంచెం సేపు నానబెట్టి ఆరబెట్టినట్లైతే పుట్టగొడుగులు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.

పెంపకములో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- బెడ్లు ఉన్న గదులలో పురుగులు, కీటకాలు మరియు ఎలుకలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
- గదిలో తేమ శాతం పెంచుట కొరకు గోనె పట్టలను కట్టి వాటిని ఎల్లప్పుడు నీటితో తడపవలెను లేదా హుమిడిఫైయర్‌ను వాడుకోవచ్చును.
- కలుషితమైన బెడ్లను గుర్తించి వెంటనే తొలగించాలి.
- 6–12 నెలల వయసు ఉన్న గడ్డిని తీసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- రంగు మారిన మరియు మచ్చలు కలిగిన గడ్డిని తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం కాదు.
- వ్యాధులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా గదుల గోడల మీద మరియు నేల మీద ప్రతి 10 రోజుల కొకసారి 2 శాతం ఫార్మాల్డిహైడ్ లేదా డైక్లోరోవాస్ (10 లీటర్ల నీటికి 6 మి.లీ.) లేదా అజాక్సీస్ట్రోబిన్ (1 లీటరు నీటికి 1 మి.లీ.) లను లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ (10 లీటర్ల నీటికి 8 మి.లీ.) లేదా కార్బండెజిమ్ పొడిని (1.0 గ్రా. పొడిని 1 లీటరు నీటికి) లను ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చి మార్చి పిచికారి చేయాలి. గోడల మీద చెదలు ఉన్నట్లైతే క్లోరిపైరిఫాస్‌ను పిచికారి చేయవలెను.

పాల పుట్టగొడుగుల పెంపకము (శాస్త్రీయ నామము : కాలోసైబే ఇండికా)

వీటిని మిల్కీ పుట్టగొడుగులు అని కూడా అంటారు. సాధారణంగా పాల పుట్టగొడుగులను పశ్చిమబెంగాల్‌లో దూధి చాట్టూ అని పిలుస్తారు. వీటిని ఎక్కువగా తమిళనాడు, కర్ణాటక మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో పెంచుతున్నారు. ఇవి ఉష్ణమండల ప్రాంతములైన రాయలసీమలో మార్చి నుండి అక్టోబర్ వరకు పెంచవచ్చును. ఇంతకు మునుపు వరకు వీటిని అడవుల నుండి సేకరించి తినేవారు. ఇవి తెలుపు రంగులో ఆకర్షణీయంగా గొడుగు వలె ఉండును. ఈ పుట్టగొడుగుల ఫలనాంగాలు పొడవైన కాడను కలిగి చివర వెడల్పుగా వుండి

చూడడానికి గుండి పుట్టగొడుగుల (బటన్ పుట్టగొడుగుల) ను పోలి ఉంటాయి. దీని నిల్వకాలం ఆయిస్టర్ పుట్టగొడుగుల కన్నా ఎక్కువ. అంతేకాక దీనిని నిల్వ ఉంచినప్పుడు గోధుమ వర్ణానికి మారడం జరగదు. మార్చి నుండి అక్టోబర్ వరకు పెంచుటకు అనుకూలంగా ఉండును.

ఉపయోగాలు :

- వీటి పెరుగుదల మరియు ఫలనాంగాలు రావటానికి 30–35 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు ఉష్ణోగ్రత అవసరం కనుక ఇది ఉష్ణమండల ప్రాంతానికి అనువైనది.
- నిల్వకాలం ఎక్కువ (రెఫ్రిజిరేటర్‌లో 20 రోజులు) గది ఉష్ణోగ్రత 25–28 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు వద్ద 4 మి.మీ. వ్యాసంలో 8–16 రంధ్రాలున్న పాలిథీన్ సంచులలో (100 గేజ్), 3–4 రోజుల వరకు నిల్వఉంటాయి.
- వీటిని సులభంగా పెంచవచ్చు.
- పాల వలె ఆకర్షణీయమైన తెలుపు రంగును కలిగి ఉంటాయి. ఇవి చాలా రకాలైన వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలపై పెరుగుతాయి.

పెంచే విధానం : వీటిని లిగ్నో లైటిక్ మరియు సెల్యులోలైటిక్ వ్యర్థాల పైన పెంచుకోవచ్చును. ముల్లంగి వ్యర్థం (విత్తనాలను తీసివేసిన తరువాత) పై 120 శాతం జైనిక శక్తిని గమనించారు. అయితే ముల్లంగి వ్యర్థం ఎక్కువ మొత్తంలో లభించకపోవడంతో దీనిని వాణిజ్య సరళిలో ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు చేయరాదు.

సబ్ స్ట్రేట్ తయారు చేయు విధానము : పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి కావలసిన ముడి పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడాన్ని సబ్ స్ట్రేట్ తయారు చేయడం అంటారు.

ముడి పదార్థాలు – వరిగడ్డి : వరిగడ్డిని 3–5 సెం.మీ. పొడవు ఉండేటట్లు ప్యాడీస్ట్రా కట్టర్ లేదా కత్తితో కానీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించాలి. అలా కత్తిరించిన ముక్కలను రెండు పద్ధతుల ద్వారా నానబెట్టవచ్చును. దీనివలన గడ్డి మెత్తబడుతుంది.

మొదటి పద్ధతి (రసాయన పదార్థాలను కలపడం) : సుమారు 100 లీటర్ల నీటిలో 10–15 కిలోల గడ్డికి 200 మి.లీ. ఫార్మలిన్ మరియు 7.5 గ్రా. కార్బండెజిమ్ (బావిస్టిన్) ను బాగా కలిపి 8–12 గంటల పాటు రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నానబెట్టిన వరి గడ్డిని బయటకు తీసి నీడలో ఆరబెట్టాలి. గడ్డి ముక్కలు మరీ ఆరిపోకుండా కొంచెం తేమగా ఉంచాలి.

రెండవ పద్ధతి (వేడి చేయు విధానము) : మొదట కత్తిరించిన గడ్డి ముక్కలను గోనె సంచులలో నింపవలెను. తరువాత ఒక డ్రమ్ములో లేదా పెద్ద ట్యాంక్ లో నీటిని నింపి, గోనె సంచులను పూర్తిగా మునిగేటట్లు చూడాలి. నీటిని 80–100 డిగ్రీల సెంటీ గ్రేడు వద్ద సుమారు ఒక గంట పాటు బాగా మరిగించవలెను. తరువాత గోనె సంచులను బయటకు తీసి, రంధ్రాలు కలిగిన జల్లెడ వంటి చెక్కల మీద లేదా జల్లెడ లాగా ఉండే వైర్ మెష్ మీద పూర్తిగా నీరు కారిపోయే వరకు ఉంచాలి.

బెడ్స్ (దిండ్లు) తయారు చేయడం : 24×14 సెం.మీ. సైజుగల పాలిథిన్ సంచులలో గడ్డి ముక్కలను 5 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండేలాగా మొదటి పొరను నింపాలి. తరువాత ఒక పిడికెడు స్పాన్ తీసుకొని అంచుల చుట్టూ మరియు మధ్యలో చల్లాలి. ఈ విధముగా 4–5 పొరలు వరకు గడ్డిని నింపిన తరువాత మూతిని రబ్బరు బ్యాండుతో లేదా దారంతో బిగించవలెను. ఈ విధంగా తయారు చేసిన బెడ్డును చీకటి గదిలోకి మార్చవలెను.

స్పానింగ్ : స్పాన్‌ను సబ్ స్ట్రేట్ పై చల్లడాన్ని స్పానింగ్ అని అంటారు. తడి సబ్ స్ట్రేట్ పై 5 శాతం స్పాన్‌ని ఉపయోగిస్తారు.

స్పానింగ్ మూడు విధములు :

ఉపరిభాగ స్పానింగ్ : పాశ్చరైజ్డ్ సబ్ స్ట్రేట్‌ను సంచులలో నింపి పై భాగాన స్పాన్‌ను చల్లుకోవాలి. ఈ విధానంలో సంచులలో యున్న సబ్ స్ట్రేట్‌ను ఆటోక్లేవ్ / స్టీమ్ స్టెరిలైజర్‌లలో స్టెరిలైజ్ చేసిన తరువాత ఉపయోగించాలి.

లేయర్ స్పానింగ్ : ఈ విధానాన్ని వేడి నీరు లేక స్టీమ్ పాశ్చరైజేషన్ చేసినపుడు పాటిస్తారు. ఈ విధానంలో సబ్ స్ట్రేట్‌ను మరియు స్పాన్‌ను పొరలు పొరలుగా (8–10 సెం.మీ.) వేయాలి. ఈ విధంగా సంచులు నిండేవరకు చేయాలి (3–4 పొరలు) 34×45 సెం.మీ. సైజు కలిగిన పాలిథిన్ సంచులలో 3 కిలోల సబ్ స్ట్రేట్ పడుతుంది.

సంపూర్ణమైన స్పానింగ్ : ఈ విధానంలో స్పాన్ మరియు సబ్ స్ట్రేట్‌లను సంపూర్ణంగా కలిసేటట్లు చేసి సంచులను నింపుతారు.

స్పాన్ రన్నింగ్ : ఇది సబ్ స్ట్రేట్ పైన శిలీంధ్రం పెరిగే దశ. ఈ దశలో గాలి అవసరం చాలా తక్కువ. శిలీంధ్రం పెరుగుదలకు అధికంగా కార్బన్–డై–ఆక్సైడ్ అవసరం కనుక గదిని చీకటిగా ఉంచాలి. 28–35 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండేటట్లు చూడాలి. ప్రతి రోజూ పరిశీలిస్తూ కలుషితమైన వాటిని తీసివేయాలి. స్పాన్ రన్నింగ్ (శిలీంధ్రం అల్లుకోవడం) 20–25 రోజులలో పూర్తవుతుంది. సంచులన్నీ పూర్తిగా తెల్లగా కనబడుతాయి.

కేసింగ్ : స్పాన్ రన్నింగ్ పూరైన తరువాత సంచులను కేసింగ్ చేస్తారు. సబ్ స్ట్రేట్ పైన ప్రక్షిఫికేషన్‌తో పాటు ప్రూటింగ్ బాడీలను స్థూలమైన ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి పాశ్చరైజ్డ్ మట్టిని పొరగా కప్పడాన్ని కేసింగ్ అని అంటారు. బెంగుళూరు ప్రాంతంలో 25 శాతం ఇసుక, 20 శాతం తేమయున్న మట్టిని, సుద్దపొడి (6.8 శాతం) తో కలిపి ఉదజని సూచిక 7.5–8.0 వరకు ఉండేటట్లు చేసి పాశ్చరైజేషన్ చేసి వాడుతారు. సుద్దపొడిని కలపాల్సిన పరిమాణము మట్టిలో ఉన్న ఉదజని సూచికపై ఆధారపడియుంటుంది. కేసింగ్ మిశ్రమాన్ని, కేసింగ్ చేయడానికి రెండు వారాలు ముందుగానే ఫార్మాల్డిహైడ్ (5 శాతం) తో తడిపి పాశ్చరైజేషన్ చేయాలి. ఆవిరితో పాశ్చరైజేషన్ (65 డిగ్రీల సెం.గ్రే.) వద్ద 2 గంటలు చేయడం సమర్థవంతమైనది. తడి కేసింగ్ మిశ్రమాన్ని 2–3 అంగుళాల ఎత్తు వరకు ట్రేలలో నింపి పాశ్చరైజేషన్ గదిలో నేల నుండి 50 సెం.మీ. ఎత్తులో ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచాలి. ఆవిరి ప్రసరించే విధంగా ట్రే మరియు గోడకు (సుమారు 50 సెం.మీ.) మధ్య దూరం ఉంచాలి. ఆవిరిని నేల ఉపరితల భాగంలో పంపించాలి, సీలింగ్ నుండి మరియు నేలపై భాగాన 20–30 సెం.మీ. ఎత్తులో బ్లోయర్ ద్వారా గాలిని ప్రసరింప చేసిన యెడల ఉష్ణోగ్రతను సమంగా ఉండేటట్లు చూడవచ్చును. కేసింగ్ మిశ్రమాన్ని 2 గంటలు, 6.5 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వుంచాలి. కేసింగ్ పై భాగాన, మధ్య, క్రింది భాగాన సెన్సార్‌లను అమర్చడం ద్వారా డిజిటల్ ధర్మామీటరు ఉష్ణోగ్రతను సమన్వయ పరచవచ్చును. ఆటోక్లేవ్‌లో 15 పి.ఎస్.ఐ. వద్ద 30 నిమిషాల వరకు పాశ్చరైజేషన్ చేయవచ్చును. చిన్న మొత్తంలో పెంచినప్పుడు మట్టిని ప్రెషర్ కుక్కర్లో పాశ్చరైజ్ చేసుకోవచ్చును. కాని పెద్ద మొత్తానికి వేరే పాశ్చరైజేషన్ గది అవసరం. బాగా శిలీంధ్రం అల్లుకున్న సంచులను క్రాపింగ్ గదిలోకి మార్చి తెరవాలి. ప్లాస్టిక్ పొరను క్రిందకు మడిచి సబ్ స్ట్రేట్‌ను సమతలం చేయాలి. చల్లార్చిన పాశ్చరైజ్డ్ మట్టిని (2–3 సెం.మీ. లోతు) సబ్ స్ట్రేట్ పైన సమానంగా పరుచుకోవాలి. మట్టి పరిచిన వెంటనే సంచులపై బావిస్టిన్ (0.1 శాతం, 1 లీటరు నీటిలో 1 గ్రా. చొప్పున) తో పిచికారి చేయాలి. మరుసటి రోజు నుండి నీటిని పెట్టాలి.

పుట్టగొడుగుల దశ (ఫలనాంగా దశ) :

- ప్రధానంగా ఈ దశ యందు ఎక్కువ వెలుతురు (30 నుంచి 35 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు) మరియు తేమ శాతం (80–90 శాతం) ఉండేటట్లు చూడాలి. పాలిహౌస్ గదిలో ఎక్కువ సూర్యరశ్మి (30–35 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు) తో కూడిన వెలుతురు వచ్చును మరియు గది యొక్క నేలపైన సుమారు 3 నుంచి 5 అంగుళాల మందాన ఇసుక వేసి, రోజూ నీటితో తడపడం వలన గది యందు తేమ శాతం ఉండేటట్లు చూడవలెను.
- బెడ్ల యొక్క కేసింగ్ మన్ను పైన ప్రతిరోజూ ఉదయం మరియు సాయంత్రం నీరు చల్లి తేమ ఉండేటట్లు చూడవలెను.
- కేసింగ్ బెడ్ల నుంచి సుమారు 10–20 రోజులలో గుండు సూది పరిమాణంలో పుట్టగొడుగులు మొలకెత్తుతాయి. ఈ దశ నుంచి సుమారు 5–8 సెం.మీ. వ్యాసం కలిగిన ఫలనాంగాలు రావడానికి వారం రోజులు పడుతుంది.

పుట్టగొడుగులను కోయడం : కేసింగ్ మట్టికి దగ్గరగా కాడ మొదలు వద్ద కత్తిరించాలి. అలా కత్తిరించిన తరువాత కాడల చివర మట్టి లేకుండా చూడాలి. ప్రతి బెడ్డు నుంచి సుమారు మూడు పంటలు వస్తాయి.

పుట్టగొడుగుల అమ్మకం: తాజాగా కోసిన పుట్టగొడుగులను వెంటనే అమ్మవచ్చును లేదా పచ్చళ్ళు, చట్నీలు చేసి అమ్మవచ్చును.

నిల్వ ఉంచడం : కోసిన తరువాత రంధ్రాలు కలిగిన పాలిథిన్ సంచులలో వేసి రిఫ్రిజిరేటర్లలలో సుమారు 2 నుంచి మూడు వారాల పాటు నిల్వ ఉంచవచ్చును.

పెంపకములో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- 6 నుంచి 12 నెలల వయస్సు ఉన్న గడ్డిని తీసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
- రంగుమారిన మరియు మచ్చలు కలిగిన గడ్డిని తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం కాదు.
- బెడ్లు ఉన్న గదులలోకి పురుగులు, కీటకాలు, ఎలుకలు రాకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి.
- పాలీహౌస్ గదులలోకి క్రిమికీటకాలు రాకుండా సన్నని దోమ తెర వంటి మెష్‌లను అమర్చాలి.
- వ్యాధులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా గదుల గోడల వెంట మరియు నేల మీద ప్రతి పది రోజుల కొకసారి 2 శాతం ఫార్మాల్డిహైడ్ లేదా డైక్లోరోవాస్ (10 లీటర్ల నీటికి 6 మి.లీ.) లను ఒక దాని తరువాత ఒకటి మార్చి పిచికారి చేయవలెను.
- కలుషితమైన బెడ్లను గుర్తించి వెంటనే గదుల నుంచి తొలగించాలి.

పుట్టగొడుగులను ఆశించు వ్యాధులు : 1. డ్రైబబుల్ 2. వెట్ బబుల్ 3. కాబ్ వెబ్ 4. గ్రీన్ మౌల్ట్ 5. పాల్స్ ట్రఫెల్స్ 6. ఆలివ్ గ్రీన్ మౌల్డ్ 7. గోధుమ రంగు ప్లాస్టర్ బూజు 8. మ్యాట్ వ్యాధి 9. సెపిడోనియం పసుపు మౌల్డ్ 10. ఇంక్ క్యాప్స్ 11. సిన్నమోన్ బూజు 12. లిప్టిక్ బూజు 13. లిల్లీపుటియం బూజు 14. ఆకుపచ్చ పెద్ద మచ్చ తెగులు 15. గోధుమ రంగు కుళ్ళు 16. సిబిరిన కుళ్ళు 17. బ్యాక్టీరియా వ్యాధులు 18. వైరస్ తెగుళ్ళు.

పుట్టగొడుగులను ఆశించు కీటకాలు మరియు ఇతరాలు :

1. సియారిడ్స్ 2. ఫోరిడ్స్ 3. సేసిడ్ ఫ్లై 4. స్ప్రింగ్ టైల్స్ 5. నల్లులు 6. నులి పురుగులు 7. ఎలుకలు

పుట్ట గొడుగులలో వచ్చే సాధారణ సమస్యలు మరియు నివారణ చర్యలు

వ.సం.	సమస్య	కారణం	నివారణ
1.	సంచులు తెరచిన తరువాత పుట్టగొడుగులు పెరగడానికి ఎక్కువ కాలం తీసుకోవడం.	గది ఉష్ణోగ్రతలు హెచ్చు తగ్గులు ఉండడం. తంతువు (మైసీలియమ్) తగినంత పెరుగుదల లేకపోవడం. గదిలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉండడం. గొడుగులు పెరుగుతున్నప్పుడు గదిలో తక్కువ వెలుతురు ఉండడం.	తగినంత గది ఉష్ణోగ్రతలు ఉండేటట్లు చూడాలి. తంతువును (మైసీలియమ్) తగినంత పెరుగుదల వచ్చే వరకు చూడాలి. తేమ శాతం 85% కు తగ్గకుండా చూడాలి. గదిలో గాలి వెలుతురు ప్రసరణ బాగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
2.	పెరిగిన పుట్ట గొడుగులు చిన్నవిగా ఉండడం మరియు ఆశించిన స్థాయిలో పెద్దవిగా లేకపోవడం.	స్పాన్ నాణ్యత తగ్గడం మరియు తంతువులు (మైసీలియమ్) నశించి పోవడం. సబ్‌స్ట్రేట్‌లో పోషకాలు తక్కువగా ఉండడం. ఒకేసారి ఎక్కువ ఫలనాంగాలు (ఫ్రూట్ బాడీస్) పుట్టడం లేదా ఉన్న పోషకాలు అయి పోవడం.	నాణ్యత గల స్పాన్‌ను ఉపయోగించాలి. సబ్‌స్ట్రేట్ లో పోషకాలు అందించాలి. ఒకేసారి ఫలనాంగాలు (ఫ్రూట్ బాడీస్) రాకుండా చూడాలి. బ్యాగులను కొద్దిగా తెరచి, ఫలనాంగాలు (ఫ్రూట్ బాడీస్) వచ్చేటట్లు చూడాలి.
3.	పుట్టగొడుగులు కుళ్ళిపోవడం	ఎక్కువ నీటిని పిచికారి చేయడం. శిలీంధ్రాలు మరియు సూక్ష్మక్రిములు ఆశించడం. తరువాత దశలో ఈగలు ఆశిస్తాయి.	పుట్ట గొడుగులు పెరుగుతున్నప్పుడు నేరుగా నీటిని చల్లకుండా చూడాలి. ఏదైనా మిస్ట్ ద్వారా లేదా స్ప్రెయర్ ద్వారా నీటిని పెరుగుతున్న గొడుగుల మీద పడకుండా చల్లాలి. శిలీంధ్రాలు మరియు సూక్ష్మ క్రిములు వ్యాప్తి చెందకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.
4.	ఉత్పత్తి తక్కువ	నాణ్యత లేని లేదా నశించి పోయిన స్పాన్‌ను ఉపయోగించడం. హెచ్చు తగ్గులు ఉష్ణోగ్రతలు ఉండడం.	నాణ్యత గల స్పాన్ ఉపయోగించాలి. గది ఉష్ణోగ్రతలు హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఫలనాంగాలు (ఫ్రూట్‌బాడీస్) రావడానికి కావల్సినంత ఉష్ణోగ్రతలు ఉండాలి.
5.	పుట్టగొడుగుల కాండము పొడవుగా మరియు పలుచగా పెరగడం	గదిలో వెలుతురు లేకపోవడం	తగినంత వెలుతురు గదిలో ఉండాలి.

వ్యాధుల నివారణ :

- సాధారణంగా పుట్టగొడుగులలో నలుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉండే శిలీంధ్రములు పెరిగి కలుషితం చేస్తాయి.
- పై విధమైన మచ్చలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే బెడ్లను దూరంగా పారవేయవలెను లేదా మచ్చలు చిన్న పరిమాణంలో ఉంటే అక్కడి వరకు కత్తిరించి 1 గ్రా. బావిస్టిన్ పొడిని 1 లీటరు నీటికి కలిపి ఆ ప్రదేశంలో చల్లాలి.

- బాక్టీరియా కలుషితం వల్ల పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడుతాయి. వీటి నివారణకు 2 గ్రా. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను పది లీటర్ల నీటికి కలిపి చల్లాలి లేదా డైక్లోరోవాస్ (10 లీటర్ల నీటికి 6 మి.లీ.) లేదా అజాక్సీ స్ట్రోబిన్ (1 లీటరు నీటికి 1 మి.లీ.) లను లేదా క్వినాల్‌ఫాస్ (10 లీటర్ల నీటికి 8 మి.లీ.) లేదా కార్బండెజిమ్ (1 గ్రా. కార్బండెజిమ్ పొడిని ఒక లీటరు నీటికి) లను ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చి పిచికారి చేయవలెను.
- కలుషితమైన బెడ్లను గుర్తించి వెంటనే గదుల నుంచి తొలగించాలి.
- నల్లుల నివారణకు ఓమిట్ 0.66 గ్రా./ చదరపు మీటరుకు లేదా డైకోఫాల్ 0.1 శాతం వాడాలి.
- నులి పురుగుల నివారణకు పినామిఫాస్ 20 మి.గ్రా. / కంపోస్టుకు వాడాలి.
- ఎలుకల ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్లైతే విషపు ఎరలను ఉంచాలి.

పుట్టగొడుగులతో వంటకాలు :

1. పుట్టగొడుగుల పచ్చడి : కావలసిన పదార్థాలు : పుట్టగొడుగులు–1 కిలో; వంట నూనె – 100 గ్రా.; ఉప్పు – 30 గ్రా.; మిరపపొడి 25 గ్రా.; ఆవాలు –3 గ్రా.; మెంతులు – 1.6 గ్రా.; జీలకర్ర – 1.5 గ్రా.; లవంగాలు –3 గ్రా.; యాలకలు 2 గ్రా.; మిరియాలు – 6 గ్రా.; గ్లేసియల్ అసిటిక్ ఆసిడ్ – 20 మి.లీ.

తయారు చేయు విధానము : ముందుగా పుట్టగొడుగులను నీటితో శుభ్రముగా కడగవలెను. పుట్టగొడుగులను ముక్కలుగా తరగాలి. పుట్టగొడుగులను ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. అది వేగేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేయాలి. దించిన తరువాత మిగిలిన ఉప్పు మరియు గ్లేసియల్ అసిటిక్ ఆసిడ్ కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక పాత్రలో నూనె వేసి తరువాత ఆవాలు, మిరపపొడి వేసి వేగించాలి. మిగిలిన పదార్థాలను మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వేయించిన పుట్టగొడుగులతో కలపాలి. శుభ్రమైన సీసాలో 24 గంటలు ఉంచి రుచిని చూడాలి.

2. పుట్టగొడుగుల కూర : కావలసిన పదార్థాలు : తాజా పుట్టగొడుగులు (తరిగినవి) 400 గ్రా.; తరిగిన ఉల్లిపాయలు –100 గ్రా.; నెయ్యి –50 గ్రా; వెన్న– 100 గ్రా.; టమోటా (పేస్ట్) –25 గ్రా; లవంగాల పొడి 4 గ్రా.; యాలకల పొడి 3 గ్రా.; తాజా కూరగాయలు 300 గ్రా.; ఉప్పు, మిరియాలు, కారం– రుచికి తగినట్టు.

తయారు చేసే విధానము : ఒక పాత్రలో నెయ్యి వేసి వేడిచేసిన తరువాత తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేయించాలి. టమోటా పేస్ట్‌ను, యాలకలపొడి మరియు లవంగాల పొడివేసి 4–5 నిమిషాల వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. పై మిశ్రమానికి నీళ్ళు మరియు పుట్టగొడుగులు వేసి లేత గోధుమ రంగు వచ్చేంత వరకు కలపాలి. తరువాత దీనికి వెన్నెను కలిపి 3–4 ని॥ కలపాలి. ఆఖరిగా 300 గ్రా. కూరగాయలు వేసి 15 ని॥ తక్కువ మంటలో పెట్టి ఉడికించాలి. రుచికోసం కొద్దిగా ఉప్పు, మిరియాలపొడి మరియు కారం కలిపి, కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి.

3. పుట్టగొడుగుల తాళింపు : కావలసిన పదార్థాలు : పుట్టగొడుగులు– 100 గ్రా.; మిరపపొడి – 1 చెంచా, ఉప్పు – 1/3 చెంచా: జీలకర్ర 2 గ్రా.; నూనె – తగినంత.

తయారు చేయు విధానం : పుట్టగొడుగులను కడిగి టిష్యూ కాగితంపై పెట్టాలి. ఒక పాత్రలో నూనెను వేడి చెయ్యాలి. నూనె కాగిన తరువాత పుట్టగొడుగులను వేసి 2 నిముషాలు వేయించాలి. మిగిలిన పదార్థాలను మరియు వేయించిన పుట్టగొడుగులను 3 నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి.

పుట్టగొడుగు బిర్యాని : కావలసిన పదార్థాలు : పుట్టగొడుగులు –200 గ్రా; ఉల్లిపాయలు 3; పచ్చిమిర్చి – 3; ఉడికించిన అన్నం–3 కప్పులు; తరిగిన కొత్తిమీర–1 చెంచా, పెరుగు– 100 మి.లీ., మసాల పొడి – 1 చెంచా మరియు ఉప్పు – తగినంత.

తయారు చేయు విధానము : పుట్టగొడుగులను ముక్కలుగా తరగాలి. ఈ ముక్కలను పెరుగు, మసాల, చిటికెడు ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమంలో అర్ధగంట నానబెట్టాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరగాలి. ఒక పాత్రలో నూనెను వేడి చేయాలి. పచ్చి మిర్చి, తరిగిన ఉల్లిపాయలు, మసాల మరియు ఉప్పు తగినంత వేసి వేయించాలి. ముదురు గోధుమ రంగులోకి మారిన తరువాత మంటను ఆర్పేయాలి. వీటిని వేరే పాత్రలోకి పెట్టుకోవాలి. అదే పాత్రలో నానబెట్టిన పుట్టగొడుగులను వేసి పెరుగు దగ్గర పడేంత వరకు వేయించాలి. పెద్ద పాత్రలో ఉడికించిన అన్నము, పుట్టగొడుగుల పులుసు, తరిగిన ఉల్లిపాయలు, ఉప్పు మరియు మసాల తగినంత వేసి బాగా కలపాలి. ఆఖరిగా కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి.

5. పుట్టగొడుగుల చాట్ : కావలసిన పదార్థాలు : పుట్టగొడుగులు– 1 కిలో; కొత్తిమీర – 1 కట్ట; వెన్న – 250 గ్రా; అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 చెంచా.

తయారు చేయు విధానము : తరిగిన కొత్తిమీరలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మరియు వెన్న వేసి కలపాలి. పుట్టగొడుగులను కాండం నుంచి వేరు చేయాలి. పుట్టగొడుగులలో ఈ మిశ్రమాన్ని నింపాలి. ఈ పుట్టగొడుగులను గ్రిల్ మీద 15 నిమిషాలు ఓవెన్‌లో పెట్టాలి.

6. పుట్టగొడుగుల సూప్ పౌడర్ : ఎండబెట్టిన పుట్టగొడుగుల ముక్కలను మెత్తటి పొడిగా చేసి దానిని 0.5 మి.మీ. జల్లెడ గుండా పంపుతారు. ఈ పొడిని పాల పొడి, మొక్కజొన్న పిండి మరియు ఇతర పదార్థాలు అయిన నూనె, ఉప్పు, చక్కెర, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడితో కలిపి సూప్ పొడి తయారు చేస్తారు. ఈ పొడిని సమాన పరిమాణం గల నీటిలో కలపడం ద్వారా చక్కటి రుచిని, వాసనను పొందవచ్చును.

7. పుట్టగొడుగుల కెచప్ : అప్పుడే కోసిన పుట్ట గొడుగులు కడిగి, ముక్కలు చేసి నీటిలో 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. అలా ఉడికిన దానిని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా గ్రైండర్ ఉపయోగించి తయారు చేసుకోవాలి. అసిటిక్ యాసిడ్, అగ్రోట్ మొదలగునవి కలిపి కెచప్‌లా తయారు చేసి 35 బ్రిక్స్ రీడిరగ్ వచ్చే దాకా ఉడికించాలి. తర్వాత స్టెరిలైజ్ చేసిన సీసాలు, జాడీలలో నిల్వ ఉంచుకోవాలి.

పుట్టగొడుగుల అమ్మకం పెంచడానికి పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :

కొత్తగా పుట్టగొడుగులు సాగు చేసే రైతుకు ముఖ్యమైన సమస్య మార్కెటింగ్ కావున మార్కెటింగ్ పెంచుకొనుటకు ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు / సలహాలు పాటించవలసి ఉంటుంది.

1. మార్కెట్ పరిధిని పెంచాలి.
2. పుట్టగొడుగుల వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలియచేయాలి.
3. వంటకాల యొక్క తయారీ విధానం అందరికి తెలియ చేయడం ద్వారా పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని వృద్ధి చేయవచ్చును.
4. అమ్మడానికి సహాయ సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
5. కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేయాలి.
6. రెఫ్రిజిరేటర్ రవాణా ఏర్పాటు చేయాలి.
7. ప్రాసెసింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి.
8. పెద్ద నగరాలకు పంపిణీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి.
9. మంచి ప్యాకేజిని కనులకు ఇంపుగా తయారు చేయాలి.

10. సూపర్ మార్కెట్లు, గొలుసు కూరగాయ మార్కెట్లు, టోకు వ్యాపారస్తులను సంప్రదించాలి.

11. ఖచ్చితమైన సప్లై సంవత్సరం అంతటా సరైన మద్దతు ధరకు అందించడం ద్వారా అధిక లాభాలు పొందవచ్చును.

భారతదేశంలో పుట్టగొడుగుల స్పాన్ లభించు ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు :

1. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పాథాలజి, యస్.వి. వ్యవసాయ కళాశాల, తిరుపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్.
2. డివిజన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పెథాలజి, పూస, ఢిల్లీ.
3. ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్, బెంగుళూర్,
4. ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ టెక్నాలజీ, చండీఘర్.
5. డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ, పి.ఎ.యు., లుధియానా.
6. డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పాథాలజి, రాజస్థాన్, వ్యవసాయ కళాశాల, ఉదయపూర్.
7. డివిజన్ ఆఫ్ మష్రూమ్ రీసెర్చ్, చంబాగట్, సోలాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్.

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, సార్వత్రిక మరియు దూర విద్యా కేంద్రము, లాం, గుంటూరు వారు పుట్ట గొడుగుల పెంపకం పై 2 నెలల శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని అందజేస్తున్నారు మరియు విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వివిధ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో కూడా ప్రతి ఏడాది నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందజేస్తుంటారు.

పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై మరిన్ని వివరములకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ఉపకులపతి & ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (తెగుళ్ళ శాస్త్రం), ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పరిపాలనా భవనం, లాం, గుంటూరు. ఫోన్ నెం : 63098 52929

సుస్థిర వ్యవసాయం - మెళకువలు - ప్రాముఖ్యత

దేశంలోని 70 శాతం ప్రజలకు వ్యవసాయమే జీవనాధారం. 20వ శతాబ్ధంలో వ్యవసాయంలో నూతన పద్ధతుల వలన జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో గణనీయమైన పెరుగుదల రావడం జరిగినది. ఈ పెరుగుదల అధిక దిగుబడినిచ్చే వంగడాల రూపకల్పన, సాగునీటి వినియోగం, రసాయనిక ఎరువులు వేయడం, సస్యరక్షణ మందుల వాడకం, యాంత్రీకరణ మరియు ప్రభుత్వ ప్రోత్సహకాల వలన సాధ్యమైంది.

పంటల దిగుబడి పెరిగినప్పటికి ప్రస్తుత పరిస్థితులలో వ్యవసాయ రంగం ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొనుచున్నది. వీటిలో ముఖ్యంగా

- సహజ వనరుల తరుగుదల వలన వ్యవసాయ ఉత్పాదకత తగ్గడం
- ప్రకృతి సమతుల్యత లోపించడం
- పశుసంపద తగ్గిపోవడం
- విచక్షణారహితంగ పంటలకు ఎరువులు వేయడం, సరైన మోతాదులో సేంద్రీయ ఎరువులు వేయలేకపోవడం వల్ల భూమి నిస్సారమవ్వడం
- వాతావరణ కాలుష్యం
- సారవంతమైన నేలకోతకు గురికావడం
- భూగర్భ జలాలు అడుగంటడం మరియు కలుషితమవడం
- పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి ఖర్చులు
- పురుగు మందుల అవశేషాలు పంట ఉత్పత్తులలో వుండిపోయి నాణ్యతాపరమైన సమస్యలు తలెత్తడం
- వ్యవసాయ కూలీల కొరత మరియు వలస పోవడం మొదలగునవి ప్రధానమైన సమస్యలుగా వున్నవి.

పై సమస్యలను అధిగమించడానికి ప్రకృతికి అనుకూలమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని అవలంభించవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది. రాబోయే తరాల అవసరాలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రస్తుత అవసరాలను తీర్చుకోవటమే సుస్థిరత యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతం. సహజ వనరులను మరియు మానవ వనరులను కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. గ్రామీణ ప్రజల జీవన పరిస్థితులను, వారి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరచుకోవడం ప్రధానం. స్థిరమైన ఉత్పాదకతను సాధించడానికి సహజ వనరుల సమర్ధ వినియోగం మరియు వాటి ఉత్పాదకతను పది కాలాల పాటు రేపటి తరాల కోసం కాపాడుకోవటం ఎంతైనా అవసరం. పర్యావరణ పరిరక్షణ, సామాజిక భద్రతతో పాటుగా ఉత్పత్తిదారులకు, వ్యవసాయ కూలీలకు, వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశాలను కల్పించడమే సుస్థిర వ్యవసాయం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

సుస్థిర వ్యవసాయంలో ఏం చేయాలి ?

- వ్యవసాయ వాతావరణ పరిస్థితులను అనుసరించి పంటలు / పంటల సరళిని ప్రోత్సహించటం.

- వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా చెట్లు, పూల పెంపకం, పాడి పశువుల పెంపకం, చేపల పెంపకం, అటవీ వ్యవసాయం మొదలగునవి పంటల సరళిలో చేపట్టటం.
- చెక్ డ్యాంలు, ట్యాంకులు, ఫాం పాండ్స్ (కొలనులు) బోరుబావుల ద్వారా రక్షిత నీటి సౌకర్యం కల్పించటం.
- సమర్థవంతమైన నీటి వినియోగం. నేలలో తేమ పరిరక్షణల కోసం వివిధ రకాల పద్ధతులపై సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించటం.

సుస్థిర వ్యవసాయంలో సాధించవలసినవి

• సహజ వనరులను కాపాడుకోవడం • పర్యావరణ పరిరక్షణ • ఆర్థిక ప్రగతి • సామాజిక మరియు ఆర్థిక సమానత • పర్యావరణ సమతుల్యం

వ్యవసాయంలో సుస్థిరతను ఒకే రోజులో సాధించలేము. ఇది ఒక దీర్ఘకాల ప్రయాణం. సుస్థిరతను సాధించడానికి వ్యవసాయదారులతో పాటుగా, కూలీలు, ప్రణాళికలు రచించేవారు, శాస్త్రవేత్తలు, వ్యాపారులు, వినియోగదారులు కూడా పాలుపంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించినప్పుడే వ్యవసాయంలో సుస్థిరత సాధ్యమవుతుంది. ఈ వ్యవసాయంలో సహజ వనరులైన నేల, నీరు, వృక్ష సంపద, గాలి, ఇంధనం యొక్క ఉత్పాదకతను కాపాడుకోవాలి.

వ్యవసాయంలో నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలి. ముఖ్యంగా కాల్వల క్రింద నీరు పూర్తిగా సద్వినియోగం కావడం లేదు. కాలువల మొదట్లో కావలసిన దానికన్నా ఎక్కువ నీటిని వాడుటవలన నేల చౌడుగా మారుచున్నది. కాల్వల క్రింద వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలను పండించాల్సిన అవసరం వుంది. బోర్లు, బావుల నుండి నీరు విచక్షణారహితంగా వాడకం పెరిగినందువలన భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి. దీని వలన భూమిలోని నీటి పొరలు దెబ్బతినడం, ఉప్పు నీరు బావులలోకి చేరడం జరుగుతుంది. అందువలన భూగర్భ జలాలు తగ్గకుండా పొదుపుగా వాడుకోవాలి. వర్షపు నీటిని నిల్వ చేయడం ద్వారా భూఉపరితలం కొట్టుకుపోవడాన్ని నివారించడంతో పాటు జలవనరులను రీచార్జ్ చేసుకొంటూ సాగునీటిని తక్కువ ఖర్చుతో పొందు సౌకర్యం కలుగుతుంది. నీటి వాడకంలో సమస్యలు తగ్గించుకోవడానికి తగిన చర్యలు చేపట్టాలి. కాల్వల క్రింద ఒక పంట కాలంలో వరికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలు పండించే విధానం రావాలి.

భూగర్భ జలాలను వాడుతున్నప్పుడు సూక్ష్మ సేద్య పద్ధతులను పాటించి నీటిని సమర్థవంతంగా పంటలకు అందించాలి. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే ఆరుతడి పంటలను ప్రోత్సహించాలి. ముురుగునీటి సమస్య వున్న ప్రాంతాల్లో దొరువు విధానాన్ని పాటించి ముురుగు నీటిని తీసివేసి ముురుగు నీటిలో లవణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నీటిని కొంత విస్తీర్ణంలో చేరేటట్లు చేయాలి. అటువంటి ప్రాంతాల్లో సాధారణ పంటలు కాకుండా పశుగ్రాస పంటలు లేదా అటవీ వ్యవసాయం చేయాలి లేదా వన్య ప్రాణుల నివాసంగా వృద్ధి చేయాలి.

విచక్షణారహితంగా రసాయనాలను ఉపయోగించటం వలన భూములు బండబారి, జీవం కోల్పోయి, నీటిని నిలుపుకొనే స్థితి కోల్పోయి నిర్జీవమైనవిగా మారుచున్నవి. వివిధ పంటలలో నత్రజని రసాయనిక ఎరువులు విరివిగా వాడినట్లైతే అవి నైట్రేట్ రూపంలో నీటిలోనికి చేరతాయి. దీని వలన నీటిలో నైట్రేట్ శాతం పెరుగుతుంది.

అలాగే భాస్వరం కూడా నీళ్ళలోకి చేరుతుంది. అవసరానికి మించి సస్యరక్షణ మందులు వాడితే అవి కూడ నీటిలోనికి చేరతాయి. ఇందువలన బావులు, కుంటలు, చెరువులలోని సాగునీరు కలుషితమై వ్యవసాయానికి ఉపయోగకరం కాకుండా పోతుంది. కాబట్టి వాటి వినియోగంలో మెళకువలు పాటించాలి. ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యము మరియు సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను పాటించాలి.

పంటలను సాగుచేయు క్రమంలో అడవులను నరికి వేసి ఆ ప్రాంతాల్లో పంటలను పండించడం వలన వృక్ష సంపదతో పాటు వన్య ప్రాణుల స్థావరాలు తగ్గిపోతున్నాయి. వాటి మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. భూమి మీద వృక్ష సంపద తగ్గడం వలన నేలకోత కూడా పెరిగి నీటితో పాటు మట్టి కొట్టుకొని పోయి ఒండ్రుగా చేరుట వలన వివిధ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం మరియు భూసారం కూడా తగ్గుతుంది. వన్య ప్రాణుల సంరక్షణ మరియు జీవవైవిధ్యం కాపాడుకోవటానికి వృక్ష సంపదను కాపాడుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

గతంలో చాలా వ్యవసాయ పనులకు పశువులను ఉపయోగించేవారు. దుక్కి దున్నడం, విత్తనం వేయడం, అంతరకృషి, నీరు తోడడం, రవాణా మొదలైన చాలా పనులకు పశువులు ఉపయోగపడేవి. కాని ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో సాగిన భారతీయ వ్యవసాయం గడిచిన నాలుగు దశాబ్దాలుగా యాంత్రీకరణ చెందుతూ వచ్చింది. వివిధ యంత్రాలకు సాధారణంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ఇంధనంగా వాడుచున్నాము. పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు ఖర్చుతో కూడుకొన్నవే కాకుండా వీటి వినియోగం వలన పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా జరుగుచున్నది. ఈ నేపధ్యంలో వాతావరణ కాలుష్యం కలుగజేయని బయోడీజిల్, ఇథనాల్ లాంటి జీవ సంబంధిత ఇంధనాన్ని వాడుతూ క్రమంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వాడకం తగ్గించాలి. గతంలో లాగా పశుసంపదను పెంచుకొని, వాటిని కూడా వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగించాలి.

ప్రస్తుతం వ్యవసాయం వలన గాలి కాలుష్యం కూడా ఎక్కువగా వుంది. ఏదైనా కాల్చివేసినప్పుడు పొగ రూపంలో గాలిలో చేరుతుంది. పురుగు మందులు పిచికారి చేయునపుడు, రసాయనిక ఎరువులు వేయునపుడు కొన్ని చర్యల ద్వారా అవి గాలిలో కలిసి వాతావరణ కాలుష్యం కలుగజేస్తాయి. ఇవే కాకుండా నేలను అధికంగా దున్నడం వలన వేగంగా గాలులు వీస్తున్నపుడు మరియు భూమిలో నీటి శాతం తక్కువగా వున్నపుడు దుమ్ము రూపంలో గాలిలో చేరి కాలుష్య సమస్య కలుగజేస్తుంది. అధికంగా భూమిని దున్నకుండా వుండటం, పంటల అవశేషాలను భూమిలోకి చేర్చటం లేదా అవశేషాలను నేలను కప్పివుంచేలా (మల్చింగ్) పరచడం లేదా భూమిలోకి చేర్చడం, నేలను కప్పి ఉంచేలా పంటలు వేయడం, గాలి నిరోధకాలుగా చెట్లను పెంచడం, రసాయనాల వాడకంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం లాంటి పద్ధతుల ద్వారా ఈ సమస్యను తగ్గించవచ్చు. ఎడారి ప్రాంతాల్లో జొన్న, సజ్జ లాంటి పంటలను పెంచి, వాటి కంకులను మాత్రమే కోసి, చొప్పను అలాగే వదిలివేయడం ద్వారా గాలి సమస్యలను తగ్గించవచ్చు. వరి తర్వాత దుక్కి చేయకుండానే మొక్కజొన్న, ప్రొద్దుతిరుగుడు లాంటి పంటలను లాభసాటిగా సాగు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా దుక్కి చేయడాన్ని తగ్గించే అవకాశాలను ఇంకా అన్వేషించి, ఆచరించాలి.

వివిధ పంటల మరియు రకాల ఎంపిక విషయంలో తగిన జాగ్రత్త వహించాలి. వివిధ వనరులను ఉపయోగించుకొని సహజ వనరుల మీద అధిక భారం పడకుండా మంచి దిగుబడినిచ్చే పంటలనే సాగుచేయడం మంచిది. రకాల ఎంపికలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. నీటి ఎద్దడిని మరియు చీడపీడలను తట్టుకొని అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలను ఎన్నుకోవాలి. వివిధ పంటలలో జన్యుమార్పిడి రకాల అభివృద్ధి జరుగుచున్నది. పర్యావరణానికి మరియు పంట వైవిద్యానికి హాని కలుగనంత వరకు ఈ రకాలను సాగుచేయవచ్చు. ఒకే పంటను ఒకే భూమిలో పలుసార్లు సాగుచేయడం ద్వారా భూసారం తగ్గడం, పురుగులు, తెగుళ్ళ ఉధృతి ఎక్కువ కావడం, పంట ఉత్పాదకత తగ్గడం మొదలగునవి జరుగుచున్నవి. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి పంట మార్పిడి మరియు బహుళ పంటల విధానాన్ని పాటించాలి. కాని పంటల వైవిధ్యాన్ని మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడూ ఒకే పంటను పండించడం కాకుండా పంట మార్పిడి పాటించాలి. అనువైన చోట అంతర పంటల విధానాన్ని అనుసరించాలి. వైవిధ్యం గల పంటలను సాగు చేయడం వలన భూమి యొక్క ఉత్పాదకతను రక్షించుకోవచ్చు. రైతుల అవసరాలు తీరడంతో పాటు, సహజ వనరుల మీద ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. రసాయనాల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కలుపు నివారణ, చీడపీడల నివారణ సులభతరమౌతుంది మరియు భూమిలో తేమను, పోషకాలను కాపాడుకోవచ్చు. అంతర పంటలను సాగు చేయడం వలన ప్రతికూల పరిస్థితులలో రైతులకు కొంత ఆర్థికంగా లాభం వుంటుంది. ఈ పద్ధతుల వలన కలుపు నివారణ, చీడ పీడల నివారణ సులభంగా వుంటుంది, పోషకాలను మరియు భూమిలో తేమను వృధా కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

రైతులు సమగ్ర వ్యవసాయంలో భాగంగా వ్యవసాయంతో పాటుగా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలైన పాడి, జీవాల సాగు, కోళ్ళ పెంపకం మొదలైనవి చేపట్టి ఆర్థికంగా కొంత మేర లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. ఒకేసారి పంటల సాగు మరియు పశువులను పెంచడం వలన రైతులకు చాలా లాభాలు వున్నాయి. ఈ పద్ధతి వలన భూసారం వృద్ధి చెందడమే కాకుండా నేల యొక్క ఉత్పాదకత శక్తి కూడ పెరుగుతుంది. కాలానుగుణంగా పశువుల పెంపకంలో కూడ చాలా మార్పులు వచ్చాయి. పాడి పశువులను ఒకేచోట కట్టివేసి, వాటి అవసరాలు తీరుస్తూ, మన అవసరాలు తీర్చుకొంటున్నాము. ఈ విధానంలో ముఖ్యంగా కొన్ని జాతుల పశువులను మాత్రమే పెంచడం జరుగుతుంది. దీని వలన దేశవాళీ జాతులు నశించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. పశువుల ఎంపిక, వాటి పోషణ, ఆరోగ్యం, పునరుత్పత్తి విషయంలో వచ్చిన మార్పులను గమనించి తగు జాగ్రత్తలు వహించాలి. వీటి వలన పర్యావరణ సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఒకేచోట అధిక సంఖ్యలో పశువులను పెంచుతున్నప్పుడు, వాటి విసర్జకాలను సేకరించి, దూరంగా తరలించడం జరుగుతుంది. దీనివలన కొంత ఖర్చు పెరుగుతున్నది. కాని పశువుల మూత్రం కొద్ది విస్తీర్ణంలోనే ఇంకిపోవడం వలన, ఆ ప్రాంతంలోని బావులలోని నీటిలో నైట్రేట్ శాతం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. పశువుల విసర్జకాలను సేకరించి, నాణ్యమైన సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చి వాడటం వలన రసాయన ఎరువుల వినియోగం కొంత తగ్గడంతో పాటు పంట నాణ్యతను కూడా పెంచుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతం అవలంభిస్తున్నటువంటి సాగు విధానాల వల్ల అన్నింటికన్నా భూమికే ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లుతుంది. భూమిని కేవలం పోషకాలు అందించే మాధ్యమంగానే చూస్తున్నాము. భూమి యొక్క రసాయనిక

ధర్మాలతో పాటుగా భూమి యొక్క భౌతిక ధర్మాలు, జీవగుణాల గురించి ఆలోచన చేయాలి. విచక్షణా రహితంగా రసాయనాల వాడకం వలన భూమిలోని జీవవైవిధ్యం దెబ్బతింటున్నది. సుస్థిర వ్యవసాయంలో భాగంగా సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని కొంత మంది వ్యవసాయదారులు అనుసరిస్తున్నారు. ఇందులో సేంద్రీయ ఎరువులు వాడటం, కలుపు మందులు కాకుండా యాంత్రీకరణ పద్ధతుల ద్వారా కలుపును నివారించడం, చీడపీడల నివారణకు సేంద్రీయ కషాయాలు మరియు జీవ నియంత్రణ పద్ధతులను అవలంభిస్తున్నారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణే కాకుండా భూమి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొంటూ రసాయన అవశేషాలు లేని పంట ఉత్పత్తులను పొందవచ్చు. సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగుచేసిన పైరులు నాణ్యతాపరంగా బాగున్నప్పటికి దిగుబడులు గణనీయంగా పెరగడంలేదు. ఈ వ్యవసాయానికి ప్రత్యామ్నాయంగా దిగుబడులు తగ్గకుండా ఉండాలంటే సమతుల్య పద్ధతులను అవలంభించవలసివుంది.

వ్యవసాయ, గ్రామీణ సమాజం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని, అందులో సంభవిస్తున్న మార్పులను గుర్తించి, తదనుగుణంగా చేపట్టవలసిన చర్యలు కూడా సుస్థిర వ్యవసాయంలో ముఖ్యమైనవి.

ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని క్లష్టరు గ్రామాల రైతులు వ్యవసాయ శాఖ మరియు ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విద్యాలయం వారి పర్యవేక్షణలో కొన్ని పంటలను ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించుచున్నారు. కాని విస్తృతమైన పరిశోధనా ఫలితాల తర్వాత మాత్రమే ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో రైతులు అవలంభించుటకు అవకాశముంది.

ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఆహార భద్రతకు సుస్థిర వ్యవసాయం ఎంతైనా అవసరం. సుస్థిర ఆహార విధానాన్ని రూపొందించాలి. మన ప్రభుత్వాలు సుస్థిర వ్యవసాయాన్ని అవలంభిస్తున్న రైతులను ప్రోత్సహించి సహజ వనరులైన నేల మరియు నీటి భద్రతను కాపాడుకోవడానికి దోహదపడాలి. అందుకోసం ప్రభుత్వాలు క్రొత్త ప్రణాళికలు రచించడం మరియు క్రొత్త విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం జరగాలి. రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలను అందించాలి. రైతులకు సంపూర్ణ లాభం చేకూరేలా చర్యలు చేపట్టాలి. ట్యాక్సులు, వ్యవసాయ ఋణాలు, వ్యవసాయ పరపతి విధానాలు, చిన్న, సన్నకారు రైతులకు సహాయకారిగా నిలబడాలి. కార్పోరేట్ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఉండకూడదు. మార్కెట్ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి. వ్యవసాయ భూములను ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించకుండా అడ్డుకోవాలి. వ్యవసాయ కూలీలు వలస పోకుండా, వారికి సంవత్సరం పొడవునా పని కల్పించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. వారికి సరియైన గృహ వసతి కల్పించాలి. సహజ వనరుల సంరక్షణతో పాటు మానవ వనరుల సంరక్షణ కూడా సుస్థిర వ్యవసాయంలో భాగమే. అలా జరిగినపుడే మనం కలుషితం కాని ఆహార ఉత్పత్తులను నేటి తరానికి అందిస్తూ సహజ వనరుల ఉత్పాదకతకు భంగం కలగకుండా ముందు తరాలకు అందించుటకు అవకాశం ఉంటుంది.

సుస్థిర వ్యవసాయంపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మెట్ట వ్యవసాయం), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనంతపురం- 515 001.

సెల్ నెం : 99896 25222

సేంద్రీయ వ్యవసాయం

సేంద్రీయ వ్యవసాయం అనేది స్థిరత్వం, జీవవైవిధ్యం మరియు పర్యావరణ సమతుల్యత నొక్కి చెప్పే సమగ్ర విధానం. ఈ విధానం పర్యావరణాన్ని రక్షించటమే కాకుండా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆహారం ఆరోగ్యకరమైనది మరియు వినియోగానికి సురక్షితమైనదని నిర్ధారిస్తుంది. సేంద్రీయ వ్యవసాయం భారతదేశానికి కొత్త కాదు; ఇది వేల సంవత్సరాలుగా ఆచరించబడుతోంది. వృక్షాయుర్వేదం వంటి ప్రాచీన భారతీయ వ్యవసాయ గ్రంధాలు, సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం మరియు తెగుళ్ళను నియంత్రించడానికి పద్ధతులను వివరిస్తాయి. 1960 మరియు 1970 లలో జరిగిన హరిత విప్లవం సమయంలో ఈ సాంప్రదాయ పద్ధతులకు అంతరాయం కలిగింది, ఈ సమయంలో ఆహార ఉత్పత్తిని పెంచడానికి అధిక దిగుబడినిచ్చే పంట రకాలు మరియు రసాయన ఇన్‌పుట్‌లను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కాలంలో రసాయనిక ఎరువుల వాడకం ప్రారంభమై, క్రమేపి వాటి వాడకం పెరిగి, కేవలం రసాయనిక ఎరువులను మాత్రమే వాడే పరిస్థితులు నేడు నెలకొన్నాయి. రసాయనిక ఎరువులే కాకుండా, చీడపీడల నివారణకు, కలుపు నివారణకు, పంటలు ఏపుగా పెరిగి పూలు, కాయలు, గింజలు అధికంగా నిలబడేందుకు కృత్రిమ హార్మోనుల వాడకం కూడా అధికమైంది. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సిఫార్సులలో రసాయనిక ఎరువులతో బాటు పశువుల ఎరువు, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు కూడా ఉన్నప్పటికీ, సమీకృత ఎరువుల వాడకాన్ని మరిచి, కేవలం రసాయన ఆధారిత సేద్యం వైపు మొగ్గుచూపటం వల్ల నేలల్లో, నీటిలో, ఆహార పదార్థాలలో పురుగు మందుల అవశేషాలు ఆరోగ్యానికి హానికరమైన పరిమితులలో ఉండటం చాల ఆందోళన చెందవలసిన అంశం. అయితే వ్యవసాయంలో ఈ విధమైన పరిణామాలు ఏర్పడడానికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రక్క పెరిగే జనాభా ఆహార భద్రత కొరకు అధికోత్పత్తి చేయవలసిన నేపథ్యంలో, పంట ఉత్పాదకతను పెంచడానికి అధిక దిగుబడి ఇచ్చే పంటల రకాలను, సంకరాలను తయారుచేసి, వాటికి అనుగుణంగా అధిక పోషకాలను అందించడానికి రసాయనిక ఎరువులను వాడవలసి రావడం అనేది అందరు ఒప్పుకొని తీరవలసిన నిజం. సేంద్రీయ ఎరువులు కూడా తగినంత మోతాదులో లభ్యం కాకపోవటం, రసాయనిక ఎరువులతో పోలిస్తే వాటిని ఎక్కువ పరిమాణంలో వాడవలసి ఉండటం, అందుకు కావలసిన రవాణా, కూలీల అవసరం, రసాయనిక ఎరువులలోని పోషకాలు సులువుగా పంటలు గ్రహించగలిగి వెంటనే వాటి ప్రభావం పైర్లపై కనబడటం, సొంతసేద్యం తగ్గి కౌలు సేద్యం పెరగటం, పశు సంపద ఆధారిత వ్యవసాయం క్రమేపి తగ్గిపోయి, యాంత్రీకరణ చోటు చేసుకోవటం వంటి అనేక ఇతర కారణాలు కూడా రసాయనిక సేద్యం వైపు వ్యవసాయాన్ని మళ్ళించాయి. ఈ పరిస్థితులను చక్కదిద్ది తిరిగి సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు రైతాంగాన్ని నడిపించ వలసిన అవసరం ఉంది. అయితే ఇది ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ప్రణాళికా బద్ధంగా, దశల వారీగా జరగవలసి ఉంది. ఒక ప్రక్క పెరుగుతున్న జనాభా ఆహార అవసరాలను సమన్వయ పరచుకొంటూ, సేంద్రీయ ఎరువులు, సేంద్రీయ క్రిమి నాశినుల లభ్యతను పెంపొందించుకుంటూ, యువ వ్యవసాయదారుల్లో వీటిపై అవగాహన కల్పిస్తూ శిక్షణా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయటం, సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు మద్దతుగా విధానపరమైన నిర్ణయాలను అమలు పరచటం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలి.

సేంద్రీయ వ్యవసాయం అంటే ఏమిటి ?

సేంద్రీయ వ్యవసాయం అనేది పర్యావరణ నష్టాన్ని తగ్గించి పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడే మార్గాల్లో ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యవసాయ వ్యవస్థ. 20 వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో సేంద్రీయ ధృవీకరణ ప్రమాణాల అభివృద్ధి ఈ ఉద్యమ పరిణామంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. 2000 సంవత్సరంలో నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ స్థాపన భారతదేశంలో సేంద్రీయ ధృవీకరణ కోసం ఒక చట్టాన్ని అందించింది, ఇది భారతీయ రైతులలో సేంద్రీయ పద్ధతులను స్వీకరించడాన్ని మరింత ప్రోత్సహించింది.

సహజ వనరులను, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను, పశువులు, గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్ళు వంటి పశుపక్షాదుల విసర్జనాలను, వాటి ఇతర ఉత్పత్తులను, పచ్చిరొట్టపైర్లను, సహజ సిద్ధ ఖనిజ సంబంధమైన మూలకాలను ఎరువులుగా, జంతు వృక్ష సంబంధ (వేప, పొగాకు, వెల్లుల్లి మొదలైనవి) క్రిమి సంహారాలను, జీవ నియంత్రణ సూక్ష్మజీవులను (బయోపెస్టిసైడ్), పురుగుల ఆకర్షక, వికర్షక (లింగాకర్షకాలు) ఎరలను (ఫిరమోన్ట్రాప్స్) వాడి పురుగులు, తెగుళ్ళను నియంత్రించటము వంటి పద్ధతులను అవలంబించి ఎటువంటి రసాయనాలను వాడకుండా పంటలను పండించటమే సేంద్రీయ వ్యవసాయం. దీని వల్ల పంటలకు స్థూల, సూక్ష్మ పోషకాలు అందటం, కాలుష్య కారకాలైన, ఆరోగ్యానికి హాని కల్గించే రసాయనాలు, వాటి అవశేషాలకు ఎటువంటి ఆస్కారము లేకపోవటం నాణ్యమైన, ఆరోగ్యకరమైన పంటలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. సేంద్రీయ ఎరువుల వాడకం పూర్తిగా తగ్గిపోయినపుడు నేలలోని సేంద్రీయ పదార్ధ నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి. దీని వలన భూసారం తరిగిపోవడమే కాక భూభౌతిక స్థితి కూడా దెబ్బ తింటుంది. భూమి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, నేల నాణ్యతను పరిరక్షించడానికి సేంద్రీయ పదార్ధం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

సూత్రాలు :

సుస్థిర వ్యవసాయ వ్యవస్థను సృష్టించడానికి కలిసి పనిచేసే నాలుగు ప్రాథమిక సూత్రాల ద్వారా సేంద్రీయ వ్యవసాయం మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది.

1. ఆరోగ్య సూత్రం :

సేంద్రీయ వ్యవసాయం నేల, మొక్కలు, జంతువులు, మానవులు మరియు గ్రహం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానిస్తూ మెరుగుపరచాలి అన్న ఆరోగ్య సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన నేలలు పోషక విలువలున్న పంటలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇవి జంతువులు మరియు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి.

2. జీవావరణ శాస్త్ర సూత్రం :

జీవావరణ వ్యవస్థలు మరియు చక్రాలలో జీవావరణ శాస్త్ర సూత్రం సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ఆధారం చేస్తుంది. వనరులను పరిరక్షించేటప్పుడు పర్యావరణ నాణ్యతను నిర్వహించడం మరియు మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పునర్వినియోగం, రీసైక్లింగ్ మరియు సమర్ధవంతమైన వనరుల నిర్వహణ ద్వారా తక్కువ ఇన్‌పుట్‌ల వినియోగం జరుగుతుంది.

3. న్యాయ సూత్రం :

ఇది సేంద్రీయ వ్యవసాయ గొలుసులో పాల్గొనే వారందరిలో – రైతులు, కార్మికులు, ప్రాసెసర్లు,

పంపిణీదారులు, వ్యాపారులు మరియు వినియోగదారులలో – న్యాయాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఈ సూత్రం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ మంచి జీవన నాణ్యతను సూచిస్తుంది. ఆహార సార్వభౌమత్వం మరియు పేదరిక తగ్గింపుకు దోహదం చేస్తుంది.

4. సంరక్షణ సూత్రం :

ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు తరాల ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును, అలాగే పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో భాద్యతాయుతమైన నిర్వహణను సూచిస్తుంది.

సేంద్రీయ వ్యవసాయం లాభాలు :

- పరిసరాల మిత్రత్వానికి, కాలుష్య నివారణకు దోహదపడుతుంది.
- జీవవైవిధ్యానికి నాంది పలుకుతుంది.
- మంచి జన్యు వైవిధ్యం ఏర్పడుతుంది.
- సహజ వనరులు ఎప్పటికప్పుడు ఉపయోగపడుటయే గాక, దీర్ఘకాల ప్రయోజనాల కొరకు రాబోయే తరాల వారికి కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
- నేల గుల్లబారుతుంది. మురుగు నీరు పోయే సౌకర్యం పెరుగుతుంది. నేలలో తేమ, గాలి, మొక్క సంబంధాలలో అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. నీరు పట్టి ఉంచుకొనే శక్తి పెరుగుతుంది. వేర్లు బాగా చొచ్చుకొనిపోయే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. భౌతిక లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి.
- మొక్కకు పోషకాలు బాగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. నేలకు వాటిని పట్టి ఉంచుకొనే గుణం అధికమవుతుంది. ఉదజని సూచిక వంటి రసాయన లక్షణాల అనుకూలత మెరుగవుతుంది.
- దీర్ఘకాలిక సుస్థిరత ఏర్పడుతుంది.
- నేల పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది.
- సురక్షితాహారం. ఆహారంలోకి విషపదార్థాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉండదు.
- ఖరీదైన పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
- నేల ఉత్పాదకత, భూసారం నిలకడగా ఉంటాయి.
- పంట నాణ్యత ఉంటుంది. ఉత్పత్తులు మంచి రంగు, రుచి, వాసన, నిల్వ ఉండే గుణం కలిగి ఉంటాయి.
- అంతర పంటలు వేసుకోవడంవల్ల, రైతు ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉండదు. చీడపీడల ఉధృతి తగ్గుతుంది.
- ప్రకృతి వనరుల్లో సమతుల్యత క్రమేణా వస్తుంది. పర్యావరణం సమతూకం ఏర్పడుతుంది. పంటలకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
- నేల, నీరు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కాలుష్యానికి గురి కావు.
- సేంద్రీయ, జీవన ఎరువులు వినియోగం పెరుగుదల వల్ల మొక్కలకు అవసరమైన ముఖ్య, ఉప, సూక్ష్మ పోషకాలు తగు మోతాదుల్లో లభ్యమవుతాయి.
- చీడ పీడల తాకిడి తక్కువగా ఉంటుంది. చీడపీడలు ప్రకృతి పరంగా కూడా సహజంగానే సమసిపోతాయి.
- సహజ సిద్ధంగా నేలలో ఉండే పోషకాలు మొక్కలకు బాగా లభ్యమవుతాయి.

- నేలలో తగినంత సేంద్రీయ పదార్థం ఉంటే పలు సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. నేటి పరిస్థితులలో దీనిని సర్వరోగ నివారిణిగా పేర్కొనవచ్చు.

ఎ) సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో చేపట్టవలసిన చర్యలు :

• భూమిని సారవంతం చేసే పోషకాలను అందించడానికి పశువుల ఎరువు, కోళ్ళ ఎరువు, కంపోస్టు, వర్మీ కంపోస్టు, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు, పచ్చి ఆకు ఎరువులు, పిండి చెక్కలు, చెఱకు మడ్డి వంటి సేంద్రియ ఎరువులు, జీవన ఎరువులు భూసారాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగించాలి. • సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో రసాయనాలు వాడకూడదు. • మొక్కల నుండి లభ్యమయ్యే నూనెలు, లైట్ మినరల్ ఆయిల్స్, లింగాకర్షణ రసాయనాలు, గంధకము, రాగి ధాతువుతో తయారయ్యే బోర్డోపేస్ట్, బోర్డోమిక్చర్, ప్రాసెస్ చేయ్యని రాక్ ఫాస్ఫేట్ (భాస్వరం ఎరువుగా) ఆమ్ల, క్షార భూములను పునరుద్ధరించడానికి సున్నం, జిప్సం రసాయనాలను పరిమితంగా వాడవచ్చు. • అవసరమైన మేరకే దున్నడం, నేల కోతకు గురి కాకుండా జాగ్రత్త పడడం, నేల, నీరు సంరక్షించడం • వ్యవసాయంతో పాటు పశుపోషణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. • సరైన విధంగా అంతర పంటలు వేయడం. • పంట మార్పిడి తప్పనిసరిగా పాటించడం. • పచ్చిరొట్ట ఎరువులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. • వ్యవసాయ వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం. • పూర్తిగా కుళ్ళిన (తయారైన) సేంద్రీయ ఎరువుల వాడకం. • పరిశుభ్రమైన సాగు, కలుపు నిర్మూలన యాజమాన్యం. • సేంద్రీయ ఎరువులు, జీవన ఎరువులు విరివిగా వాడడం. • సాగు నీటి సద్వినియోగం, యాజమాన్యంపై దృష్టి పెట్టడం. • రసాయన మందులు ఉపయోగించకుండా సహజ సస్యరక్షణ యాజమాన్యం. • జీవ నియంత్రణ పద్ధతులకు, వృక్ష సంబంధ మందులకు ప్రాధాన్యమివ్వడం • పంట కోసిన తర్వాత వినియోగదారునికి అందేవరకు ఉత్పత్తుల నాణ్యత చెడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో సవాళ్ళు :

అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, సేంద్రీయ వ్యవసాయం రైతులకు ఈ పద్ధతులను అవలంబించడం మరియు కొనసాగించడం కష్టతరం చేసే అనేక సవాళ్ళను కూడా అందిస్తుంది. ఈ సవాళ్ళు ఆర్థిక మరియు సాంకేతిక అడ్డంకుల నుండి మార్కెట్ డైనమిక్స్ మరియు నియంత్రణ సమస్యల వరకు ఉంటాయి.

1. దిగుబడి మరియు ఉత్పాదకత :

సాంప్రదాయ పొలాలతో పోలిస్తే సేంద్రీయ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు మొదట్లో తక్కువ దిగుబడిని ఇవ్వవచ్చు, ముఖ్యంగా పరివర్తన కాలంలో, నేల ఆరోగ్యం మరియు వ్యవసాయ నిర్వహణ పద్ధతులు మెరుగుపడటంతో కాలక్రమేణా దిగుబడి మెరుగుపడుతుంది.

2. ధృవీకరణ మరియు నియంత్రణ :

సేంద్రీయ ధృవీకరణ అనేది సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో కీలకమైన అంశం, ఎందుకంటే ఇవి "సేంద్రీయ" అనే లేబుల్ చేయబడిన ఉత్పత్తులు. ధృవీకరణ సంస్థలు నిర్దేశించిన కఠినమైన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ వినియోగదారులలో నమ్మకాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా రైతులకు కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలను కూడా తెరుస్తుంది.

అంతర్జాతీయ మరియు భారతీయ సర్టిఫికేషన్ సంస్థలు :

వివిధ సర్టిఫికేషన్ సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేంద్రీయ సర్టిఫికేషన్‌ను పర్యవేక్షిస్తాయి. భారతదేశంలో, నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ ప్రాథమిక ధృవీకరణ సంస్థ మరియు దీనిని ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్

ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ మూవ్‌మెంట్స్ మరియు యు.ఎస్.డి.ఎ. ఆర్గానిక్ ప్రోగ్రామ్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు గుర్తించాయి. ఇతర సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీలలో INDOCERT, ECOCERT మరియు OneCert ఉన్నాయి.

3. సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ :

సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియలో సాధారణంగా ప్రారంభ ధరఖాస్తు, ఆన్-సైట్ తనిఖీలు మరియు కొనసాగుతున్న పర్యవేక్షణ వంటి అనేక దశలు ఉంటాయి. సర్టిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి చాలా నెలలు పట్టవచ్చు మరియు కొన్ని సందర్భాల్లో, రైతులు పరివర్తన వ్యవధిని అనుభవించాల్సిరావచ్చు, ఈ సమయంలో వారి భూమి సాంప్రదాయ నుండి సేంద్రీయ పద్ధతులకు మార్చబడుతుంది.

4. ఆర్థిక సవాళ్ళు :

సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో సేంద్రీయ ఇన్‌పుట్‌ల అవసరం, శ్రమతో కూడిన పద్ధతులు మరియు సాంప్రదాయ భూమిని సేంద్రీయ ప్రమాణాలకు మార్చడానికి అవసరమైన పరివర్తన కాలం కారణంగా అధిక ఖర్చులను కలిగి ఉంటుంది. సేంద్రీయ ఉత్పత్తులు సాధారణంగా ప్రీమియం పొందినప్పటికీ, సేంద్రీయ ఉత్పత్తులు ఈ మార్కెట్‌లను చేరటం సవాలుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాలలో, రవాణా, మార్కెటింగ్ మరియు పంపిణీ ఖర్చులతో రైతులు ఇబ్బంది పడవచ్చు. అదనంగా, మార్కెట్ డిమాండ్‌లో హెచ్చుతగ్గులు సేంద్రీయ వ్యవసాయం యొక్క లాభదాయకతను ప్రభావితం చేస్తాయి.

5. సాంకేతిక సవాళ్ళు :

సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి పర్యావరణ ప్రక్రియలు, నేల ఆరోగ్యం, తెగులు నిర్వహణ మరియు పంట వైవిధ్యం గురించి లోతైన అవగాహన అవసరం.

భారతదేశంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి అతిపెద్ద సవాళ్ళలో ఒకటి చిన్న కమతాల ప్రాబల్యం. భారతదేశంలో సగటు పొలం పరిమాణం 1.15 హెక్టార్ల కంటే తక్కువ, ఇది రైతులు సేంద్రీయ పద్ధతులను సమర్థవంతంగా అమలు చేసే సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుంది.

సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో వాడదగిన, పరిమితంగా వాడదగిన మరియు వాడకూడని పోషక పదార్థాలు

I. వాడదగిన పదార్థాలు (సొంతంగా తయారు చేసుకొన్న సేంద్రీయ పదార్థాలు) :

• పశువుల ఎరువు, కోళ్ళ ఎరువు, పశువుల మల మూత్రాలు మొదలగునవి. • పంట వ్యర్థాలు మరియు పచ్చిరొట్ట ఎరువులు. • గడ్డి మరియు ఇతర ఆచ్ఛాదనలు. • జీవన ఎరువులును కూడా సేంద్రీయ సాగులో వినియోగించుకోవచ్చును.

II. పరిమితంగా వాడదగిన పదార్థాలు

ఇతర ప్రదేశాల నుండి సేకరించిన పదార్థాలు : • రక్తాహారాలు, మాంసాహారాలు, ఎముకల పొడి, కొమ్ముల పొడి మొదలగునవి. • చేపల మార్కెట్ నుండి మరియు చేపల శుద్ధి పరిశ్రమల నుండి వెలువడే వ్యర్థాలు మొదలగునవి.

ఆహార మరియు వస్త్ర పరిశ్రమల నుండి వచ్చే చివికే స్వభావం ఉన్న వ్యర్థాలు

• సముద్ర కలుపు మొక్కలు మరియు ఉప వ్యర్థాలు • పట్టణ కంపోస్టు మరియు సీవేజ్ నీళ్ళు

• పట్టణ వ్యర్థాల నుండి తయారయ్యే కంపోస్టు

ఆయిల్ పాం, కొబ్బరి మరియు కోకో నుండి వచ్చే ఉప ఉత్పత్తులు

వివిధ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల నుండి వచ్చే ఉప ఉత్పత్తులు

• ఆక్వాకల్చర్ నుండి వచ్చే సేంద్రీయ వ్యర్థాలు • పీట్ మట్టి • రంపపు పొట్టు మరియు కలప పరిశ్రమల నుండి వచ్చే సేంద్రీయ వ్యర్థాలు • వివిధ పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నుండి తయారయ్యే కంపోస్టు

III. ఉపయోగించదగిన మినరల్స్ : • కాల్షియం క్లోరైడ్ • సున్నపు రాయి • జిప్సం, సుద్ద మరియు ఫాస్ఫేట్ సుద్ద • మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ • సోడియం క్లోరైడ్ • బంకమన్ను బెంటోనైట్, పెర్లైట్, జియొలైట్ మొదలగునవి.

IV. పరిమితంగా వాడదగిన మినరల్స్ : • కాల్షియం మరియు మెగ్నీషియం రాక్స్ • తక్కువ క్లోరిన్ కలిగిన పొటాషియం మినరల్ • రాక్ ఫాస్ఫేట్ • సూక్ష్మ మూలకాలు (జింక్, ఐరన్, కాపర్; మాంగనీస్ మొదలగునవి) • కలప బూడిద మరియు శుద్ధి చేయని కలప • పొటాషియం సల్ఫేట్ • బేసిక్ స్లాగ్ మొదలగునవి.

V. వాడకూడని పదార్థాలు • మానవ మలమూత్రాలు మరియు అన్ని రకాల రసాయనిక ఎరువులు • కృత్రిమంగా తయారు చేసే హార్మోన్స్ మొదలగునవి.

సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో పురుగు మరియు తెగుళ్ళ నివారణకు వాడదగిన, పరిమితంగా వాడదగిన మరియు వాడకూడని పదార్థాలు

I. చీడపీడల నియంత్రణకు ఉపయోగించదగిన పదార్థాలు : • క్రోమాటిక్ ట్రాప్స్ • బంకమన్ను (బెంటోనైట్, పెర్లైట్, వర్మికులైట్ మరియు జియోలైట్) • జిలాటిన్ • మెకానిల్ ట్రాప్స్ • లైట్ ట్రాప్స్ • స్టిక్కీ ట్రాప్స్ • మొక్కల నుండి తయారు చేసే పదార్థాలు (వేప, వెల్లుల్లి, గానుగ మొదలగునవి) • ఫెరమోన్స్ • హోమియోపతిక్ మరియు ఆయుర్వేదిక్ పదార్థాలు • హెర్బల్ మరియు బయోడైనమిక్ పదార్థాలు • మొక్కల నుండి తయారు చేసే రెపెల్లంట్స్ • పొటాషియం సోప్ • కేసిన్ • సోడియం బైకార్బోనేట్ • పుట్టగొడుగు వ్యర్థాలు మొదలగునవి.

II. పరిమితంగా వాడదగిన పదార్థాలు : • లైం మరియు సోడాక్లోరైడ్స్ • కాపర్ లవణాలు • సముద్రంలోని ఏక కణ మొక్కల పొడి (శైవల శిధిలాల పౌడర్) • మినరల్ నూనెలు, సిలికేట్స్ మొదలగునవి • పొటాషియం పర్మాంగనేట్ • పైరెత్రం సినరిఫోలియం • క్వాసియా అమర • క్విక్ లైం (కాల్షియం ఆక్సైడ్) • పరాన్న భుక్కులు • లైం సల్ఫర్, సల్ఫర్ • పొగాకు కషాయం • బాక్టీరియా, శిలీంధ్ర మరియు వైరస్ సంబంధిత తయారీలు • సముద్రపు కలుపు మొక్కలు మరియు వాటి ఉత్పత్తులు • సముద్ర లవణం మరియు సముద్రపు నీళ్ళు • ఆస్పర్జిల్లస్ నుండి తయారైన పులిసిన పదార్థాలు • వినిగర్ వంటి సహజ ఆమ్లాలు

III. వాడదగిన జీవనియంత్రణ కారకాలు : • వైరస్ సంబంధిత తయారీలు • శిలీంధ్ర సంబంధిత తయారీలు • బాక్టీరియా సంబంధిత తయారీలు • పరాన్న జీవులు, పరాన్న భుక్కులు మరియు స్టెరైల్ కీటకాలు

IV. నిషేధిత పదార్థాలు : • మినరల్ పొడులు (స్టోన్ మీల్స్, సిలికేట్స్) • ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మొదలగునవి.

భారతదేశంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయం

ప్రపంచంలో సుమారుగా 187 దేశాలు సేంద్రీయ సాగును ప్రోత్సహిస్తూ 730 లక్షల హెక్టార్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేంద్రీయంగా సాగు చేస్తున్నారు. వీరిలో ఆస్ట్రేలియా దేశం ప్రధమ స్థానంలో ఉండగా తర్వాత స్థానాల్లో అర్జెంటినా, చైనా ఉన్నాయి. ఆసియా దేశాల్లో భారతదేశం ద్వితీయ స్థానంలో ఉంటూ సుమారు 50

లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సేంద్రీయ సాగు నమోదు అవుతున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.4 లక్షల విస్తీర్ణం సేంద్రీయ సాగు క్రింద నమోదు కాబడినది, దీనిలో 37000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణం జాతీయ సేంద్రీయ ప్రమాణాల క్రింద నమోదు కాగా మిగిలిన భూమి పార్టిసిపేటరీ గ్యారంటీ పద్ధతిలో నమోదుకాబడినది.

ప్రభుత్వ విధానాలు మరియు మద్దతు

భారత ప్రభుత్వం సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అనేక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది, వాటిలో పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన మరియు మిషన్ ఆర్గానిక్ వాల్యూ చైన్ డెవలప్‌మెంట్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలు సేంద్రీయ రైతులకు ఆర్థిక సహాయం, శిక్షణ మరియు మౌలిక సదుపాయాల మద్దతును అందిస్తాయి. అదనంగా, సేంద్రీయ ఇన్‌పుట్‌లు, సర్టిఫికేషన్ మరియు మార్కెటింగ్ కోసం సబ్సిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనివల్ల రైతులు సేంద్రీయ పద్ధతులకు మారడం సులభం అవుతుంది.

జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయి సేంద్రీయ వ్యవసాయ విధానాలు : నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ భారతదేశంలో సేంద్రీయ సర్టిఫికేషన్ కోసం ప్రమాణాలను నిర్దేశిస్తుంది. దీనిని వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ ఆథారిటీ (APEDA) నిర్వహిస్తుంది, ఇది ధృవీకరణ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చేస్తుంది. అనేక రాష్ట్రాలు రైతులకు అదనపు మద్దతు మరియు ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తూ వారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం అవలంబించేలా చేస్తున్నాయి.

సేంద్రీయ సాగు పద్ధతులు మరియు సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ విధానము

ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన సంస్థల ద్వారా సేంద్రీయ సాగు పద్ధతులను మరియు సేంద్రీయ ఉత్పత్తులను ధృవీకరించడాన్ని సేంద్రీయ ధృవీకరణ అంటారు. వినియోగదారుడి నమ్మకానికి, ఉత్పత్తులకు ప్రీమియం ధర పొందడానికి, ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతులకు సేంద్రీయ ధృవీకరణ ఉపయోగపడుతుంది. పంట వేసినప్పటి నుండి యాజమాన్యంలో వాడే ప్రతి పదార్థాన్ని మరియు పంట ఉత్పత్తులను ప్రతి దశలో (ఉత్పత్తుల నిల్వ ప్రదేశం, ప్రాసెసింగ్, ప్యాకింగ్, రవాణా, లేబుల్ వెయ్యడం మొదలగునవి) గుర్తింపు పొందిన సంస్థల ద్వారా తనిఖీ చేయించి, ఉత్పత్తుల నాణ్యతా ప్రమాణాల పరీక్షలు చేయించి, రాత పూర్వకంగా ఇచ్చే సర్టిఫికేట్‌ను ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ అంటారు.

సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ

నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు అనేక దేశాలు అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఆస్ట్రేలియా, స్విట్జర్లాండు, బ్రెజిల్, అమెరికా వంటి దేశాలు పెద్ద ఎత్తున సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేపడుతున్నాయి. సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గిరాకి వేగంగా పెరుగుతుంది. మనదేశంలో బాసుమతి బియ్యం, ప్రత్తి, చిరుధాన్యాలు, అపరాలు, నూనెగింజలు, తేయాకు, పండ్లు, కూరగాయలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, చెఱకు మొదలైన పంటలను కొంత విస్తీర్ణంలో సేంద్రీయ విధానంలో పండించటం జరుగుతుంది.

సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణకు విస్తృతమైన నియంత్రణలను పాటించి, నియమానుసారంగా పంటలను పండించాల్సి ఉంటుంది. కఠినతరమైన నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు పాటించి ధృవీకరింపబడినప్పుడే వాటిని సేంద్రీయ ఉత్పత్తులుగా గుర్తించి ఎగుమతులను, వాణిజ్యాన్ని అనుమతించటం జరుగుతుంది. భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ 2005 సంవత్సరంలో జాతీయ సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల పధకం (నేషనల్ ప్రోగ్రాం ఫర్ ఆర్గానిక్

ప్రొడక్షన్) ను ప్రవేశపెట్టి సేంద్రీయ ఎగుమతులకు మార్గదర్శకాలు రూపొందించడం, సేంద్రీయ సాగును ప్రోత్సహించడం చేపట్టింది. సేంద్రీయ ధృవీకరణ పత్రాన్ని వ్యక్తిగతంగా కాకుండా, రైతు గ్రూపులకు సంపూర్ణంగా ఇచ్చే విధానాన్ని అమలుచేస్తున్నది.

ప్రస్తుతం మనదేశంలో రెండు రకాలుగా సేంద్రీయ ఉత్పత్తులను గుర్తించటం జరుగుతుంది. ధృవీకరణ వ్యవస్థ "అపెడా" (APEDA) ద్వారా ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందటం, తద్వార ఎగుమతులకు సానుకూలతను పొందటం. రెండవ విధానంలో ప్రాతినిధ్య హామీ పద్ధతిలో ఉత్పత్తి దారులు వారి ఉత్పత్తులను స్వయంగానే ధృవీకరించాలి. అయితే ఇవి ఎగుమతి యోగ్యం కావు, దేశీయంగానే ఉపయోగించాలి. ఇండియాలో దాదాపు 31 సంస్థలు సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు ధృవీకరణ చేస్తున్నాయి, మన రాష్ట్రంతో పాటు ప్రక్క రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఒరిస్సా, తెలంగాణలో ఉన్న సేంద్రీయ ధృవీకరణ సంస్థలు అందిస్తున్న సేవలను సేంద్రీయ రైతులు ఉపయోగించుకోవచ్చును. మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సేంద్రీయ ధృవీకరణ సంస్థ వారు మరియు రైతు సాధికారిక సంస్థ వారు ప్రాతినిధ్య హామి పద్ధతిలో సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు ధృవీకరణ చేస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉన్న కొన్ని సేంద్రీయ ధృవీకరణ సంస్థల చిరునామాలను క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది.

జాతీయ సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల పథకం క్రింద పని చేస్తున్న సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల సర్టిఫికేషన్ సంస్థల వివరాలు :

వేదిక్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీ : మైత్రినగర్, మియానగర్, హైదరాబాద్ – 500 050.

ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ : పొన్నయ్య రాజాపురం, కొయంబత్తూరు –641001, తమిళనాడు.

అదితి ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ : డా॥ రాజ్‌కుమార్ రోడ్, రాజాజి నగర్, ఫస్ట్ బ్లాక్, బెంగుళూరు –560010.

తమిళనాడు ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్, డిపార్ట్‌మెంట్, కోయంబత్తూరు : జి.సి.టి. పోస్ట్, కోయంబత్తూరు – 641013.

APSOPCA (Andhra Pradesh State Organic Products Certification Authority) కింద ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ :

1. APSOPCA స్థాపన (ఫిబ్రవరి 23, 2022) : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, APSSCA డైరెక్టర్, APSSCA ఛైర్‌పర్సన్ మరియు APSSCA డైరెక్టర్ & సభ్య కార్యదర్శి నియంత్రణలో APSOPCA ను ప్రత్యేక విభాగంగా స్థాపించడానికి అనుమతినిచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్వతంత్ర సంస్థగా పనిచేయడానికి APSOPCA ను ప్రత్యేక విభాగంగా నమోదు చేసుకోవడానికి తేది 23.02.2022 న G.O.Ms.No.7 ద్వారా అనుమతి ఇచ్చింది.

2. అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ (మార్చి, 2022) :

- ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 2001 క్రింద స్వతంత్ర సంస్థగా పనిచేయడానికి APSOPCA ని నమోదు చేయటం జరిగింది.

- రిజిస్ట్రేషన్ నెం : 80/2022
- రిజిస్ట్రేషన్ తేది : 28.03.2022
- APSSCA భవనం ప్రాంగణంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

3. గుర్తింపు స్థితి :

- QCI, APSOPCA కి సర్టిఫికేషన్ బాడీగా భారతదేశం అంతటా 18.04.2023 నుండి అమలులోకి వచ్చే Ind G.A.P సర్టిఫికేషన్ పథకం గురించి తాత్కాలిక ఆమోదం మంజూరు చేసింది.
- APEDA, APSOPCA ను దక్షిణ మండలం (ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లక్ష్యద్వీప్ మరియు పుదుచ్చేరి) కోసం పంట ఉత్పత్తి వర్గం కింద ధృవీకరణ సంస్థగా 23.04.2024 గుర్తించింది.

APSOPCA పరిధిలో ఈ క్రిందవి వర్తిస్తాయి.

ఎ. వ్యక్తిగత ధృవీకరణ

బి. గ్రోయర్ గ్రూప్ సర్టిఫికేషన్

సి. ఇన్‌పుట్ ఆమోదం

డి. వైల్డ్ కలెక్షన్

- నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్గానిక్ అండ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పంట ఉత్పత్తి మరియు ప్రాసెసింగ్ & హ్యాండ్లింగ్ వర్గం కోసం 12.11.2024 నుండి 3 సంవత్సరాల కాలానికి పి.జి.ఎస్. – ఇండియా కార్యక్రమం కింద APSOPCA ను ప్రాంతీయ కౌన్సిల్‌గా అధికారం ఇచ్చింది.

4. ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్‌లో APSOPCA పాత్ర :

- ఇది రైతు/ఉత్పత్తిదారు/ఎఫ్.పి.ఓ.లు మొదలైనవి వారికి టారిఫ్‌తో సహా అప్లికేషన్ ప్యాక్ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
- దరఖాస్తు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన పత్రాలు సమీక్షించి ఆపరేటర్‌కు విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది.
- ట్రేస్–నెట్‌లో ఆపరేటర్ నమోదు మరియు తదుపరి ప్రాసెసింగ్ కోసం ఆపరేటర్‌కు లాగిన్ ఐడి ఆధారాలను జారీ చేయడం.
- ఆపరేటర్ & APSOPCA మధ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం.
- ట్రేస్–నెట్‌లో ఆపరేటర్ ద్వారా వివరాలు & ఆర్గానిక్ సిస్టమ్ ప్లాన్ సమర్పణ.
- సమీక్షకుడు ద్వారా వివరాలు & ఆర్గానిక్ సిస్టమ్ ప్లాన్ యొక్క డెస్క్ సమీక్ష.
- రిస్క్ అసెస్‌మెంట్‌తో సహా ఆన్‌సైట్ తనిఖీ.
- రికార్డులు& డాక్యుమెంటేషన్ తనిఖీల సమీక్ష.

- సంబంధిత వ్యక్తుల ఇంటర్వ్యూ.
- ఆన్‌సైట్ కన్ఫర్మిటీ రిపోర్ట్.
- తనిఖీ నివేదిక తయారీ.
- మూల్యాంకనం చేసేవారి ద్వారా, అననుకూల నివేదిక ఏదైనా ఉంటే తనిఖీ నివేదికల మూల్యాంకనం/ సమీక్ష.
- అనుగుణ్యత లేని వాటికి దిద్దుబాటు చర్యలు.
- సర్టిఫికేషన్ కమిటీ ద్వారా ధృవీకరణ నిర్ణయం.
- స్కోప్ సర్టిఫికెట్ జారీ.
- స్టాక్ ముగింపు.
- లావాదేవీ ధృవీకరణ పత్రం జారీ చేయడం ద్వారా సేంద్రీయ వస్తువుల లావాదేవీలకు అవకాశం కలిపించటం.
- వార్షిక ధృవీకరణ పునరుద్ధరణ.
- అదనపు లేదా అప్రకటిత తనిఖీ.

** సేంద్రీయ ధృవీకరణ ఫీజు వివరాలు మరియు ఇతర వివరాలుకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ సంస్థ (APSOPCA), గుంటూరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సేంద్రీయ ధృవీకరణ అమలు :

సం.	జిల్లా	పంటలు	రైతుల సంఖ్య	విస్తీర్ణం (హెక్టార్లు)	దిగుబడి అంచనా (ట.)
1.	శ్రీకాకుళం	వరి, ప్రత్తి, కంది, వేరుశనగ, ప్రొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, జీడిమామిడి & మామిడి	1492	2797.53	13481.81
2.	తూర్పు గోదావరి	వరి	1	0.78	4
3.	పశ్చిమ గోదావరి	వరి	2	1.94	5.6
4.	నెల్లూరు	వరి, మినుము, పెసర, పసుపు	2	4.05	16.43
		మొత్తం	**1497**	**2804.30**	**13507.84**

- నేషనల్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నేషనల్ కో-ఆపరేటివ్ ఆర్గానిక్ లిమిటెడ్‌కి ధృవీకరించబడిన ఉత్పత్తుల మార్కెట్ అనుసంధానం.

వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా ప్రగతి

ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో గత దశాబ్దన్నర కాలం నుండి ముఖ్య పంటలైన వరి, అపరాలు, చిరుధాన్యాలు (రాగి, కొర్ర, సామ), మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, చెఱకు, ప్రత్తి, గోగు మొదలగు పంటలలో సేంద్రీయ సాగు మరియు సహజ సాగు విధానాలపై పరిశోధనలు చేపట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సాగవుతున్న ముఖ్యమైన పంటలకు సేంద్రీయ సాగు సిఫార్సులను అందుబాటులోనికి తీసుకురావడం జరిగింది. వివిధ పంటలలో సేంద్రీయ సాగు ఫలితాలను కనుక చూసినట్లయితే అపరాలు, చిరుధాన్యాలు, వర్షాధారంగా పండించే వేరుశనగ, గోగు వంటి పంటలలో 2 నుండి 3 సంవత్సరాలలో దిగుబడుల స్థిరీకరణ గమనించడం జరిగింది. వరిలో కొన్ని రకాలలో తక్కువ కాలంలోనే మంచి ఫలితాలు గమనించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా స్వర్ణ, పార్థివ, నెల్లూరు సిరి, పుష్యమి, యం.టి.యు. 1121, ఎన్.ఎల్.ఆర్. 40054 వంటి రకాలు సేంద్రీయ సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు గమనించడం జరిగింది. చెఱకు, మొక్కజొన్న వంటి పంటలలో దిగుబడుల స్థిరీకరణకు ఎక్కువ సంవత్సరాలు పట్టింది. చెఱకులో 6 వ సంవత్సరం నుండి దిగుబడుల స్థిరీకరణ గమనించడం జరిగింది.

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు వివిధ పంటలు మరియు పంటల సరళిలో సేంద్రీయ సాగు విధానాలపై విభిన్న వాతావరణ మండలాలలో పరిశోధనలు చేపట్టి సుస్థిర సేంద్రీయ సాగు పద్ధతులను రైతులకు అందుబాటులోనికి తీసుకురావడం జరిగింది.

సేంద్రీయ సాగు పరిశోధనలు చేపట్టిన పంటల వివరాలు :

ధాన్యాలు మరియు చిరు ధాన్యాలు : వరి, మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్ర, సామ (7)

పప్పుదినుసులు : కంది, మినుము, పెసర, రాజ్మా చిక్కుళ్ళు, శనగ, ఉలవ (6)

నూనెగింజలు : వేరుశనగ, నువ్వులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు (3)

వాణిజ్య పంటలు : చెఱకు, ప్రత్తి (2)

నార పంటలు : గోగు (1)

ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, చింతపల్లిలో ఖరీఫ్, 2021 లో "సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్" అనే కేంద్రాన్ని స్థాపించి ఆంధ్ర రాష్ట్రములో సాగవుతున్న ముఖ్య పంటలలో సేంద్రీయ సాగుపై పరిశోధనలు చేపడుతూ, సేంద్రీయ రైతులకు సాంకేతికపరమైన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ సేంద్రీయ సాగు లాభసాటిగా ఉండడానికి పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

ఈ పరిశోధనల ఆధారంగా రైతాంగానికి సేంద్రీయ సాగుకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించటానికి **"వివిధ పంటలలో సేంద్రీయ సాగు విధానాలు"** అనే పుస్తకాన్ని 2022 లో విడుదల చేయటం జరిగింది.

సేంద్రీయ వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తు

సేంద్రీయ వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉంది, పెరుగుతున్న అవగాహన, సాంకేతిక పురోగతులు మరియు ప్రభుత్వ మద్దతు దాని విస్తరణకు మార్గం సుగమం చేస్తున్నాయి. సేంద్రీయ వ్యవసాయం యొక్క భవిష్యత్తు సవాళ్ళను ఎలా పరిష్కరిస్తారనే దానిపై మరియు వ్యవసాయ రంగంలోని వాటాదారుల సమిష్టి ప్రయత్నాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (మృత్తికా శాస్త్రం), ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం,

లాం - 522034, గుంటూరు జిల్లా.

ఫోన్ నెం. : 80083 33985

చెఱకు విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ

ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయ్యే 31 లక్షల టన్నుల చెఱకులో 75 శాతం పంచదార ఉత్పత్తికి, 12 శాతం విత్తనం మరియు తినడానికి, 13 శాతం బెల్లం తయారీకి ఉపయోగించబడుతున్నది. మన రాష్ట్రంలో బెల్లం పరిశ్రమ ఒక పెద్ద గ్రామీణ కుటీర పరిశ్రమగా అభివృద్ధి చెందినది. ఇటీవలి కాలంలో బెల్లంతో తయారు చేసిన తీపి పదార్థాలకు గిరాకీ పెరుగుతున్నది. బెల్లం పంచదార కంటే ఎక్కువ పోషక విలువలు కలిగిన ఆహార పదార్థం. దీనిలో సుక్రోజ్ తో పాటు మాంసకృత్తులు, కాల్షియం, ఇనుము, రాగి వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు, థయామిన్, కెరోటిన్ వంటి విటమిన్లు కూడా ఉంటాయి. బెల్లం వాడకం జీర్ణశక్తిని పెంపొందించుట, రక్తహీనతను తగ్గించుట, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధిని నివారించుటకు దోహద పడుతుంది.

ఇన్ని పోషక మరియు ఔషద గుణములు ఉన్న బెల్లం వాడకాన్ని పెంచినట్లయితే, ఇటు వినియోగదారుడికి, అటు బెల్లం రైతులకు ఎంతో లాభదాయకముగా ఉంటుంది. మారుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితులలో వినియోగదారులు నాణ్యమైన, ఆరోగ్యకరమైన తీపి పదార్థం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. కనుక, బెల్లంను బెల్లం రూపంలో కాకుండా బెల్లం నుండి తయారుచేసే విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించాలి.

నాణ్యమైన బెల్లం తయారీ : బెల్లాన్ని వివిధ సైజులలో తయారు చేయుటకు, 306 గ్రేడ్‌తో తయారు చేసిన స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఫ్రేమ్‌లు లేక చట్రములు ఉపయోగించాలి. ఈ చట్రములు చెక్కతో కూడ తయారు చేసుకోవచ్చు.

భారతదేశంలో బెల్లం నాణ్యత ప్రమాణాలు :

గ్రేడ్ 1 బెల్లంలో 80 శాతం వరకు సుక్రోజు; 10 శాతం వరకు గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోసు; నీటిలో కరగలేని మలినాలు 1.5 శాతం వరకు; 3.5 శాతం వరకు బూడిద; 5 శాతం కన్న తక్కువ మోతాదులో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్; తేమ 5 శాతం మించకూడదు.

గ్రేడ్ 2 బెల్లంలో 70 శాతం వరకు సుక్రోజ్; 20 శాతం వరకు గ్లూకోజ్, ఫక్టోసు; 2.0 శాతం వరకు నీటిలో కరగలేని మలినాలు; 5.0 శాతం వరకు బూడిద; 5 శాతం కన్న తక్కువ మోతాదులో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, తేమ శాతం 7 కన్న తక్కువగా ఉండాలి.

రెండు గ్రేడ్‌లలో బెల్లం పొడిగాను, గట్టిగాను, తగినంత రవ్వ కట్టు ఉండి, లేత బంగారు రంగు కలిగి ఉండాలి. బెల్లం ఉప్పగా కాకుండా, తీపిగా ఉండాలి.

బెల్లం ముక్కలు : బెల్లాన్ని చిన్న ముక్కల రూపంలో (10, 25, 125, 250, 500 గ్రా., ఒక కిలో) తయారు చేసి నీడలో ఆరబెట్టడం వలన, తేమ 4 నుండి 5 శాతం వరకు తగ్గి, పాలిథీన్ సంచుల్లో ప్యాకింగ్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది. పాలిథీన్ సంచులలో ప్యాకింగ్ చేయుట వలన చక్కటి ఆరోగ్యకరమైన, పరిశ్రుభమైన పరిస్థితులలో వినియోగదారులకు కావలసిన పరిమాణంలో బెల్లాన్ని సరఫరా చేయవచ్చు. బెల్లం తయారీలో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారు చేసే పెద్ద దిమ్మలుగా (12 నుండి 15 కిలోలు) కాకుండా రైతులు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా (25 గ్రా., 125 గ్రా., 250 గ్రా., 500 గ్రా., 1000 గ్రా.) తయారు చేయడం వలన సుమారు ఎకరానికి రూ. 20,000/– వరకు అదనంగా లాభం పొందవచ్చు.

బెల్లం బాగా రంగు రావటానికి రైతులు హైడ్రోసు (సోడియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైట్) ను విరివిగా వాడుతున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. ఒక క్వింటాలు బెల్లంలో సల్ఫర్‌డయాక్సైడ్ 5 గ్రాముల కన్నా ఎక్కువ ఉండరాదు. మంచి బెల్లం తయారీకి తడి సున్నం ముద్దతో పాటు నిమ్మ రసం లేదా మునగాకు రసం ఒక లీటరు చెఱకు రసానికి 1 మి.లీ. చొప్పున వాడటం వలన మరిన్ని మలినాలు తెట్టు రూపంలో బయటకు వచ్చి మంచి రంగులో బెల్లం తయారవుతుంది.

పొడి రూపంలో బెల్లం తయారీ విధానం : మన రాష్ట్రంలో బెల్లాన్ని వివిధ రూపాలలోను, పరిమాణములలోను అచ్చులుగా పోసి, తయారు చేసి బెల్లం మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వివిధ పరిమాణం గల కుండలలో (ఒకటి, ఐదు మరియు 10 కిలోల బరువు గల), విశాఖపట్నం జిల్లాలో బక్కెటు రూపంలో (12 నుండి 14 కిలోలు బరువు గల), తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో 8 మరియు 10 సెం.మీ. సైజులలో చతురస్రాకారములో పలుచగా (15 నుండి 20 కిలోలు బరువు గల) మరియు చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక కిలో బరువు గల ఉండలుగా తయారు చేసిన బెల్లం మార్కెట్టుకు వస్తుంది. వివిధ రూపాలలో ఉన్న బెల్లాన్ని ముక్కలుగా చేసి, కిరాణా షాపుల నుండి కావలసిన పరిమాణములో వినియోగదారుడు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాలలో, వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల వలన, వినియోగదారుల స్థాయిలో బెల్లం నిలువ చేయుట కష్టంతో కూడిన పని. బెల్లంలో ఉన్న గ్లూకోజు, ఫ్రక్టోజ్ మరియు కొన్ని రసాయనిక పదార్థాలు (ముఖ్యంగా లవణాలు, ప్రొటీన్లు) వాతావరణంలో తేమను పీల్చుకొని, చివరకు బూజు పట్టడమో, నీరు కారడమో జరిగి నాణ్యత చెడిపోతుంది. ఈ సమస్య వలన బెల్లాన్ని వేరే దేశాలకు ఎగుమతి చేయలేకపోతున్నాము.

ఈ పరిస్థితులను అధిగమించడానికి, బెల్లాన్ని పొడి రూపంలో తయారు చేసి, ఆరబెట్టి, దానిలో తేమను 2 లేక 3 శాతం వరకు తగ్గించి పాలథీన్ సంచులలో నిల్వ చేసినపుడు 1 నుండి 2 సంవత్సరములు ఎటువంటి నాణ్యత చెడిపోకుండా వాడుకోవచ్చును. బెల్లాన్ని పొడి రూపంలో చేసే ప్రక్రియలో ఎటువంటి రసాయనిక పదార్థాలు వినియోగించటానికి అవకాశం ఉండదు. అందువలన పొడి రూపంలో ఉన్న బెల్లాన్ని వేరే దేశాలకు సులభంగా ఎగుమతి చేసుకొనవచ్చును. బెల్లం పొడి చూడటానికి గోధుమ వర్ణంలో పంచదార రేణువులు ఆకారంలో ఉండి ఇంట్లో వాడుటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

బెల్లం పొడిలో పంచదార కంటె ఎక్కువగా పోషకాహారపు విలువలు ఉంటాయి. బెల్లం పొడిలో సుక్రోజు (80–85%), గ్లూకోజు, ప్రక్టోసు (10 నుండి 15 శాతం), మాంసకృత్తులు (0.25%), కొవ్వు పదార్థాలు (0.05%), కాల్షియం (0.4%), మెగ్నీషియం (0.08%), 100 గ్రాముల బెల్లంలో 11 మి.గ్రా. ఇనుము, 8 మి.గ్రా. రాగి, 230 మైక్రో గ్రాములు నికోటిన్ (విటమిన్–ఎ), 20 మైక్రోగ్రాముల విటమిన్–బి, ఒక మైక్రోగ్రాము నికోటిన్ ఏసిడ్ ఉంటాయి. అదే పంచదారలో 99.9 శాతం సుక్రోజు మాత్రమే ఉంటుంది.

బెల్లం పొడి తయారీ : బెల్లం దిమ్మలు తయారీ లాగానే మంచి బెల్లం పొడి (మంచి రవ్వకట్టు లేత బంగారపు రంగు) తయారు చేయడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకటి నాణ్యతగల బెల్లం పొడిని బాగా పక్వతకు వచ్చిన చెఱకు నుండి మాత్రమే తయారుచేయాలి. రెండవది రసం మరిగేటప్పుడు రంగు రావడానికి ఉపయోగించే హైడ్రోసు, వృక్ష సంబంధమైన బెండ మొక్కల గుజ్జు వంటివి కలపకూడదు. బెల్లం తయారీలో మామూలుగా కలిపే సున్నం కొద్దిగా ఎక్కువ పరిమాణంలో కలపాలి.

బెల్లం తయారీకి చెఱకు గానుగాడి రసమును వెంటనే పెనంలో పోసి, రసముకు తగినంతగా సున్నమును రెండు లేక మూడు దఫాలుగా కలిపి మరగబెట్టాలి. రసం మరిగేటప్పుడు తెట్టును సాధ్యమైనంత వరకు పూర్తిగా తీసివేయాలి. రసం బాగా మరిగి పాకం ఉష్ణోగ్రత $120-121^0$ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నపుడు అంటే ముదరపాకం రాగానే, పెనాన్ని పొయ్యి మీద నుంచి తీసి, చల్లారేటట్లు పాకాన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. కొంత చల్లారిన తరువాత సుమారు అయిదు నుండి పది నిముషాలు కదలకుండా ఉంచితే మంచి రవ్వకట్టు ఏర్పడి, నాణ్యమైన బెల్లం పొడి తయారు చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. పాకం గట్టిపడే సమయంలో ఆ పాకాన్ని అల్యూమినియం లేక స్టీలుతో చేసిన ట్రేలలోకి తీసుకొని, చెక్క తెడ్లతో త్వరగా పొడిగా చెయ్యాలి. ఒక టన్ను చెఱకు నుండి 100 కిలోల బెల్లం పొడి తయారు చేయడానికి 10 నుండి 12 మంది మనుషులు తెడ్లతో సుమారు పదిహేను నిమిషాలు పని చేయాల్సి ఉంటుంది.

బెల్లం పొడి తయారు చేసిన వెంటనే దానిలోని తేమ శాతం 10-12 వరకు ఉంటుంది. పొడి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి తేమను 2 నుండి 3 శాతానికి తగ్గించుటకు ఆరుబయట ట్రేలలో లేదా పాలిహౌస్ డ్రైయ్యర్‌లో లేదా ఎలక్ట్రికల్ డ్రైయ్యర్‌లో ఎండబెట్టుకోవాలి. ఆరుబయట ఎండలో పొడిని ఆరబెట్టుటకు, సూర్యరశ్మి బాగా ఉంటే సుమారు 16 నుండి 20 గంటల సమయం పడుతుంది.

బెల్లం పొడిలో ఉన్న 10-12 శాతము తేమను 2 నుండి 3 శాతానికి తగ్గించిన తరువాత, 2 మి.మీ. జల్లెడ లేదా జల్లెడ యంత్రం ద్వారా జల్లించాలి. జల్లించిన పొడిని 400 గేజ్ పాలథీన్ సంచులలో కావలసిన పరిమాణంలో 1,2,4,10 కిలోల ప్యాకెట్లలో ప్యాకింగ్ చేసుకోవచ్చు.

బెల్లాన్ని పొడి రూపంలో అమెరికా, ఫిలిఫిన్స్, కొలంబియా మరియు ఇండోనేషియా దేశాలలో తయారు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. అందువలన మనం కూడా బెల్లం పొడిని తయారు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా బెల్లం పొడి తయారీని గ్రామీణ స్థాయిలో కుటీర పరిశ్రమగా అభివృద్ధి చేయుటకు అవకాశము కలదు. తయారు చేసిన బెల్లం పొడిని పట్టణాలలో ఉన్న డిపార్టుమెంటల్ స్టోర్లలో, కార్పొరేట్ షాపులలో విక్రయించుట ద్వారా బెల్లం రైతులు అధిక లాభం పొందవచ్చు.

వ్యాపార సరళిలో బెల్లపు పాకము తయారీ : చెఱకు రసమును శుద్ధి చేసి, మరగబెట్టగా చిక్కబడిన ద్రవరూపంలో ఉన్న పదార్థమును బెల్లపు పాకము (లిక్విడ్ జాగరీ) అంటారు. దీనిని బెల్లము తయారు చేయునపుడు మధ్య దశలోనే తీసుకొనవచ్చును. బెల్లపు పాకము నాణ్యత, రసములోని రసాయనిక పదార్థములు, రసమును శుద్ధి చేయు పదార్థములు మరియు బెల్లపు పాకము ఉంచు ఉష్ణోగ్రతలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉండును.

బెల్లపు పాకము వాడకము గ్రామీణ ప్రాంతాలలో బెల్లం చేసే రైతులు వరకే పరిమితముగా ఉన్నది. ఈ బెల్లపు పాకమును అట్టులు, ఇడ్లీలు, గారెలు, రొట్టెలు వంటి తినుపదార్థాలతో తీపి పదార్థముగా వాడుకకు ఉపయోగించవచ్చును. మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో అయితే బెల్లపు పాకమును తియ్యటి పదార్థముగా చపాతీలలోను, పూరీలలోను వాడుతూ ఉంటారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా యీ బెల్లపు పాకాన్ని ఇతర పానీయాలు, పండ్లు, స్క్వాష్‌లు మాదిరిగా సీసాలో పెట్టి మార్కెట్టు చేసిన అధిక లాభమును పొందవచ్చు.

బెల్లపు పాకము పోషక విలువలు : బెల్లపు పాకంలో పంచదార కన్నా హెచ్చు పోషకపు విలువలు ఉన్నవి. బెల్లపు పాకంలో 65 శాతము వరకు మొత్తము ఘనపదార్థములు ఉండును. ఈ మొత్తము ఘనపదార్థములలో

60 శాతము పంచదారలు (మాంసకృత్తులు, ఎమినోయాసిడ్స్, ఎకోనిటిక్ యాసిడ్, సిట్రిక్ యాసిడ్), వివిధ లవణములు కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, భాస్వరము, ఇనుము, రాగిలతో బాటు విటమిన్-ఎ, విటమిన్-బి తగినంతగా ఉండును. అంతేకాకుండా బెల్లపు పాకములో ఔషద విలువలు కలవు. బెల్లపు పాకములో ఇన్ని పోషకపు విలువలు ఉన్నవి గనుక అతి తక్కువ ఖర్చుతో పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుటకు అనుకూలముగా ఉండును. పోషకపు విలువతో బెల్లపు పాకము తేనెతో పోటి పడుతుందనుటలో సందేహము లేదు.

బెల్లపు పాకము ఉత్పత్తి : సామాన్యంగా బెల్లం తయారీకి చెఱకు గానుగాడి రసమును వెంటనే పెనంలోకి పోసి రసముకు తగినంత సున్నము కలిపి శుద్ధి చేసిన తరువాత మరగబెట్టుట జరుగుతుంది. రసము మరిగేటప్పుడు తెట్టును సాధ్యమైనంత వరకు తీసి వేయుట జరుగును. తరువాత 150 మి.లీ. ఆర్థోఫాస్పరిక్ యాసిడ్‌ను 1000 లీటర్ల జ్యూస్‌కు కలుపవలెను. అప్పుడు కూడా తెట్టును తీయవలెను. క్రమముగా రసము మరింత చిక్కబడిన తరువాత 106-107 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ($60-65^0$ బ్రిక్స్) వద్ద పెనము నుండి రసమును తీసివెయ్యాలి. సుమారు 600 లీ. రసాన్ని మరగపెట్టడానికి ఒక టన్ను చెఱకు కావలసి ఉంటుంది. ఒక టన్ను చెఱకు నుండి 150-160 కిలోల బెల్లపు పాకము వచ్చును. బెల్లపు పాకమును ఇతర పండ్ల స్క్వాష్‌ల వలె సీసాలో ప్యాక్ చేసి మార్కెట్ చేసిన మరింత ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చును. బెల్లపు పాకం తయారీ మిగతా ఉత్పత్తులతో పోల్చిన తక్కువ శ్రమతో కూడినది.

నిల్వ చేయు పద్ధతులు : బెల్లపు పాకమును 250, 500, 1000 మి.లీ. పరిమాణం గల గాజు సీసాలలో నిల్వ చేయవచ్చును. సీసాలలో నిల్వ చేయుట వలన రవాణాకు సులభంగా ఉండుటయే గాక వినియోగదారునికి ఆకర్షణీయంగా ఉండును.

స్టెరిలైజేషన్ పద్ధతి : శుభ్రం చేసిన సీసాలను మరిగే నీటిలో 15 నిముషాల వరకు స్టెరిలైజ్ చేసిన తరువాత ఆరబెట్టి బెల్లపు పాకమును నింపుటకు సిద్ధముగా చేయవలెను. 20 నుండి 25 లీటర్ల సామర్థ్యము గల ఆవిరి స్టెరిలైజరు సీసాలను త్వరగా స్టెరిలైజు చేయటానికి ఉపయోగించుకోవాలి. శుభ్రము చేసిన గాజు సీసాలను కుక్కర్లలో 10 నిమిషములు ఉంచి వేడి చేసి బయటకు తీయవలెను. ఈ విధముగా స్టెరిలైజు చేయబడి, పొడిగా ఉన్న సీసాలను బెల్లపు పాకము నింపుటకు ఉపయోగించవలెను.

బెల్లపు పాకము నింపిన సీసాలను గాలి చొరబడకుండా యంత్ర సహాయంతో మూతలతో బిగించవలెను. (సీసాల మీద బెల్లపు పాకము వివరాలు, పోషకపు విలువల వివరాలు గల అందమైన లేబుల్‌ను అంటించవలెను). బెల్లపు పాకమును నిల్వ చేయునపుడు నాణ్యత చెడకుండా ఉండుటకు 0.1% నిమ్మ ఉప్పు, 0.1% పొటాషియం మెటాబైసల్ఫేట్‌ను బెల్లపు పాకములో కలుపవలెను.

బెల్లపు పాకమునకు ఆరెంజ్, ద్రాక్ష ఎస్సెన్స్‌లను కలిపి రుచులు పెంచవచ్చును. బెల్లపు పాకమునకు 1:4 నిష్పత్తిలో నీటిని కలిపి 4-5 చుక్కలు ఆరెంజ్ లేదా ద్రాక్ష ఎస్సెన్స్‌లను కలిపిన చక్కటి రుచి గల పానీయమును తయారు చేసుకొనవచ్చును. బెల్లపు పాకము ఆరు నెలలకు పైగా నిల్వ ఉండును. కనుక బెల్లపు పాకము ఒక కుటీర పరిశ్రమగా మంచి లాభదాయకముగా ఉండును. దీనికి ఉన్న ఎక్కువ పోషక విలువల దృష్ట్యా దీని వినియోగం ప్రజలలో పెంచవలసి ఉన్నది.

ఎ) బెల్లంతో విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు : బెల్లంను ఉపయోగించి చాక్లెట్లు, కుకీస్, జెల్లీ, కుల్ఫీ, రసగుల్లా, హల్వా, అల్లం, ఉసిరి, సోంపులతో మౌత్ ఫ్రెష్‌నర్స్ తయారు చేయవచ్చు. ఈ విలువ ఆధారిత బెల్లం ఉత్పత్తులు తయారు చేసి మంచి ప్యాకింగ్‌లో విక్రయించినట్లయితే, లాభం పొందటమే కాకుండా సమాజంలో వినియోగదారునికి మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులు ఇచ్చిన వారు అవుతారు. ఈ మేరకు రైతులకు వివిధ బెల్లం ఉత్పత్తుల తయారీలో పాటించవలసిన సాంకేతిక అంశాలపైన అనకాపల్లి పరిశోధనా కేంద్రం శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు.

బెల్లం చాక్లెట్ తయారీ :

కావలసిన పదార్థాలు :

బెల్లం పొడి –15 గ్రా., చాక్లెట్ పొడి–100 గ్రా., జీడిపప్పు పొడి –10 గ్రా., బాదం పొడి –10 గ్రా., బట్టర్/ నెయ్యి–10 గ్రా.

సాధారణంగా పిల్లలు చాక్లెట్ ఇష్టంగా తింటారు. చాక్లెట్‌లో పంచదారకు బదులుగా బెల్లం పొడి మరియు జీడిపప్పు వేసినట్లయితే పిల్లల ఆరోగ్యానికి మంచిది మరియు బెల్లం వినియోగం పెంచినవారవుతాము. బెల్లం చాక్లెట్లలో బెల్లం, కోకోపొడి ముఖ్యమైన పదార్థాలు. బెల్లం చాక్లెట్ల తయారీలో కోకో పొడిని, బెల్లంను, జీడిపప్పు మరియు బాదం పప్పును ముక్కలుగా కలిపి, చాక్లెట్ అచ్చులలో గట్టిపడే వరకు ఉంచాలి. తరువాత అల్యూమినియం ఫాయిల్‌లో చుట్టి కార్డు బోర్డు సంచులలో ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసిన చాక్లెట్లను ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్ చేసి అమ్మినట్లయితే లాభం పొందవచ్చు.

బెల్లంతో కేకులు :

కావలసిన పదార్థాలు :

బెల్లం పొడి –100 గ్రా., గోధుమ పిండి –100 గ్రా., జీడిపప్పు పొడి –10 గ్రా., బాదం పొడి –10 గ్రా., బట్టర్/ నెయ్యి–10 గ్రా., యాలకుల పొడి–టీ స్పూన్, బేకింగ్ పౌడర్–1/2 టీ స్పూన్

తయారు చేయు విధానం : ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక పాత్రలో బట్టర్‌ని వేసి వేడిచేసి కరిగించాలి. కరిగించిన బట్టర్‌లో బెల్లం పొడి కలుపుకోవాలి. తరువాత గోధుమ పిండిలో బేకింగ్ పౌడర్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బట్టర్, బెల్లం పొడిలో కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ కొద్దికొద్దిగా నీళ్ళు వేస్తూ కాస్త జారుగా వచ్చేటట్లు కలుపుకోవాలి. తరువాత ఈ మిశ్రమాన్ని కేక్‌మౌల్డ్‌లో వేసి మైక్రో ఓవెన్‌లో $160–190^{0}$ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద 20 నిముషాలు పెట్టి బేక్ చేయాలి. తరువాత ఓవెన్ నుంచి తీసిన కేక్‌ను 5 నిముషాలు వరకు చల్లర్చినట్లయితే, మంచి రుచికరమైన కేక్ తయారవుతాయి. ఇలా తయారు చేసిన కేకులను ఆకర్షణీయమైన డబ్బాల్లో పెట్టి విక్రయించవచ్చు.

బెల్లంతో ఓట్స్ – కుకీస్ :

కావలసిన పదార్థాలు :

బెల్లం పొడి –100 గ్రా., గోధుమ పిండి –100 గ్రా., ఓట్స్ –30 గ్రా., బేకింగ్ పౌడర్–1/2 టీ స్పూన్, బట్టర్/ నెయ్యి–60 గ్రా., యాలకుల పొడి–1/2 టీ స్పూన్, పాలు సరిపడినంత

తయారు చేయు విధానం : ముందుగా పైన చెప్పిన మోతాదులో బట్టర్, బెల్లం పొడిని ఓ పాత్రలో తీసుకొని బాగా మెత్తగా కలపాలి. తరువాత గోధుమ పిండిలో బేకింగ్ పౌడరు వేసి మరియు ఓట్స్‌లో సరిపడా పాలు వేసి 5 నిమిషాలు పాటు నానబెట్టాలి. బట్టర్, బెల్లం పొడి కలిపిన మిశ్రమంలో ముందుగా కలిపిన గోధుమ పిండి, బేకింగ్ పౌడర్ మరియు నానబెట్టిన ఓట్స్ అందులో వేసి కలుపుకోవాలి. తరువాత యాలకుల పొడి కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పాలు లేదా నీళ్ళు తగినంత వేసి చపాతి ముద్దలాగా తయారు చేసుకొని డీప్ ఫ్రిజ్‌లో 10 నిమిషాలు పెట్టుకోవాలి. తరువాత ఈ ముద్దను చపాతి కర్రతో ఒత్తుకోవాలి. దీనిని రకరకాల అచ్చులతో మనకు కావాల్సిన ఆకారములలో బిస్కెట్లుగా కోసి, ట్రే లో అమర్చి మైక్రో ఓవెన్‌లో 120^0 సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర 20 నిమిషాలు పాటు బేకింగ్ చేసినట్లయితే మంచి రుచికరమైన బెల్లంతో కూడిన ఓట్స్-కుక్కీస్ తయారవుతాయి.

బెల్లంతో పాస్తా (బెల్లం నూడుల్స్) :

కావలసిన పదార్థాలు :

బెల్లం పొడి – 425 గ్రా., గోధుమ పిండి -350 గ్రా., రాగి పిండి -140 గ్రా., మొక్కజొన్న రవ్వ-210 గ్రా., మైదా పిండి-150 గ్రా., నీరు-120 మి.లీ.

తయారు చేయు విధానం : బెల్లంతో నూడిల్స్ లేక పాస్తా పదార్థాములు తయారు చేయుటకు ఫుడ్ ఎక్స్‌ట్రూడర్ అనే మిషన్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ఈ మిషన్ ఉపయోగించి గంటకు 20-25 కేజీల వరకు పాస్తా పదార్థములను వివిధ ఆకారములో తయారు చేయవచ్చు. ముందుగా ఫుడ్ ఎక్స్‌ట్రూడర్‌ను శుభ్రపరచుకోవాలి. తర్వాత మనకు కావలసిన ఆకారపు (గవ్వలు, పూలు, గొట్టాలు) డై లను మెషిన్‌లో పెట్టి బిగించుకోవాలి. కొలత ప్రకారం తీసుకున్న పదార్థములను పాస్తా మిషన్‌లో మిక్సింగ్ ట్యాంక్‌లో వేసి, పైన చెప్పిన ప్రకారం నీళ్ళు పోసి మిషన్‌ను ఆన్ చేసి 5-10 నిమిషములు మిక్సింగ్ చేయాలి. తర్వాత కటింగ్ బ్లేడ్‌ని ఉపయోగించి మరో 45 నిముషములు మిశ్రమమును మృదువుగా చేసుకోవాలి. తర్వాత మిషనును రన్ చేయడం వల్ల ఎక్స్‌ట్రాక్షన్ మరియు కటింగ్ ప్రక్రియ జరిగి మనకు నచ్చిన ఆకారంలో క్రింది ఉన్న ట్రేలో నూడుల్స్ వస్తాయి. ఈ పదార్థాలను ట్రేలో పల్చగా పరిచి డ్రయ్యర్‌లో 50^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర 5 గంటల పాటు ఆరబెట్టాలి. ఎండబెట్టిన పాస్తాని నీళ్ళలో ఉడికించి తినవచ్చు. ఈ మిషన్‌తో బెల్లం గవ్వలతో పాటు చిన్న చిన్న గవ్వలు, నూడుల్స్ వివిధ తినుబండరాలను కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.

బెల్లంతో చేసిన అల్లం, ఉసిరి ముక్కలు మరియు సోంపు :

కావలసిన పదార్థాలు :

బెల్లం పొడి -200 గ్రా., అల్లం-1 కిలో

తయారు చేయు విధానం : ముందుగా అల్లం లేదా ఉసిరిని శుభ్రముగా కడిగి ముక్కలుగా కోసుకొని ఒక రోజు డ్రైయ్యర్‌లో ఆరబెట్టాలి. అలా చేయడం వల్ల అల్లం/ ఉసిరిలోని తేమ పోయి 1 కిలో గ్రాముకు 300 గ్రాముల వరకు ఎండిన అల్లం వస్తుంది. తర్వాత బెల్లంపొడి తీసుకొని అందులో తగినన్ని నీరు వేసి చిక్కని ద్రవ పదార్థంగా చేసుకోవాలి. డ్రయర్‌లో ఆరబెట్టిన అల్లం లేదా ఉసిరి ముక్కలను, బెల్లం కోటింగ్ యంత్రంలో వేసి తిప్పాలి. తొలి

దశలో ఉష్ణోగ్రత 30^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత మొదలు అయి 70^0 సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత వచ్చే వరకు కోటింగ్ మెషిన్‌ను నడపాలి. తర్వాత చిక్కగా కలుపుకున్న బెల్లంపొడి ద్రావణాన్ని కోటింగ్ ప్యాన్‌లో కొద్దికొద్దిగా అల్లం మీద వేస్తూ ఉండడం వల్ల బెల్లం ద్రావకం అల్లంపై కోటింగ్‌గా వస్తుంది. అదే విధంగా ఈ యంత్రముతో అల్లం, ఉసిరి మరియు సోంపుని కూడా బెల్లంతో కోటింగ్ చేసుకోవచ్చు.

చెఱకు రసంతో చేసిన జెల్లీ :

కావలసిన పదార్థాలు :

చెఱకు రసం మరియు జెలటీన్ / అగార్ జెల్

తయారు చేయు విధానం : ముందుగా పరిపక్వతకు వచ్చిన చెఱకును తీసుకుని క్రషర్ సహాయంతో చెఱకు రసాన్ని తీసుకోవాలి. రసంలో ఉన్న మలినాలను వడపోసి, చెఱకు రసాన్ని శుద్ధి చేయాలి. తరువాత చెఱకు రసాన్ని 100^0 సెంటీ గ్రేడ్ దగ్గర 5 నిమిషాలు పాటు మరిగించాలి. ఇలా మరిగించిన రసానికి తగిన మోతాదులో జెలటీన్ లేదా ఆగార్ కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చల్లబరిచి, మౌల్డ్‌లో వేసుకొని, వాటిని శీతల ఉష్ణోగ్రత వద్ద భద్రపరచుకోవాలి.

బెల్లం మరియు చిరుధాన్యాలతో చేసిన న్యూట్రిబార్ :

కావలసిన పదార్థాలు : కొర్రలు, సామలు, జొన్నలు, వేరుశనగ పప్పు, యాలకల పొడి మరియు బెల్లం.

తయారు చేయు విధానం : ముందుగా కొర్రలు, సామలు, జొన్నలు, వేరుశనగ పప్పు బాగా వేయించుకోవాలి. బెల్లం మరియు యాలకుల పొడి తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న గింజలను పొడి రూపంలోకి మార్చుకొని ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి. వేరుశనగ పప్పును కూడా వేయించుకొని ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి. తరువాత ఒక గిన్నెలో బెల్లం తీసుకొని లేత పాకం వచ్చేలా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా తయారైన పాకంలో మనం ముందుగా చేసుకున్న చిరుధాన్యాల మిశ్రమాన్ని మరియు వేరుశనగ పప్పును వేసి బాగా కలపాలి. తరువాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ట్రేలో వేసి సమానమైన ముక్కలుగా చేసుకొని కొంచెం సేపు చల్లారనివ్వాలి. ఇలా తయారు చేసిన న్యూట్రీబార్లను ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్ చేసి గాలి చొరబడని ప్రదేశంలో భద్రపరుచుకోవాలి.

పొడి రూపంలో చెఱకు రసం :

చెఱకు రసంలో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వలన రసం తీసిన కొద్ది సమయానికే చెడిపోవుట జరుగుతుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి, చెఱకు రసానికి స్థిరీకరించిన మోటారులో డ్రైయింగ్ ఏజెంట్‌ని కలిపి స్ప్రే డ్రైయింగ్ చేసి పొడి రూపంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తయారు చేసిన పొడిని పాకెట్లు లేదా సీసాలలో నిలువ చేసుకొని కావలసిన సమయంలో ఈ పొడిని (20 గ్రా.) నీటిలో (200 మి.లీ.) కలిపి చెఱకు రసాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా పొడి నుండి తయారు చేసిన చెఱకు రసం, తాజా చెఱకు రసం వలె రంగు, రుచి కలిగి ఉంటుంది.

బెల్లంతో కుల్ఫీ :

కావలసిన పదార్థాలు : పాలు – 250 మి.లీ., బెల్లం పొడి – 50 గ్రా., యాలకల పొడి – 3 గ్రా., బాదం – 20 గ్రా., జీడి పప్పు – 10 గ్రా., పిస్తా – 10 గ్రా., వెనిల్లా ఎస్సెన్స్ – 3 గ్రా.

తయారు చేసే విధానం : ముందుగా పాలను చిన్న మంటలో వేడి చేస్తూ సగం పరిమాణం అయ్యే వరకు మరిగించాలి. తరువాత ఆ మరుగుతున్న పాలలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసిన బాదం, జీడి పప్పు, పిస్తాలను మరియు యాలకల పొడి / వెనిల్లా ఎస్సెన్స్‌ను కలపాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తరువాత బెల్లం పొడిని పాలలో పూర్తిగా కరిగేంత వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి. బెల్లం పొడి కలిపిన మిశ్రమాన్ని కుల్ఫీ మౌల్డ్‌లో వేసి, పట్టుకునేందుకు వీలుగా చిన్న పుల్లలను పెట్టి డీప్ ఫ్రీజ్‌లో 8 గంటలు పాటు ఉంచాలి. తయారైన కుల్ఫీలను మౌల్డ్ నుండి తీసి ప్యాకింగ్ చేసుకోవచ్చు.

చెఱకు రసంతో పానీ పూరీ :

కావలసిన పదార్థాలు : రాగి పిండి – 40 గ్రా., కొర్ర రవ్వ – 50 గ్రా., గోధుమ రవ్వ – 50 గ్రా., మైదా – 50 గ్రా., వంట సోడా – 2.5 గ్రా., ఉప్పు – తగినంత, నూనె – తగినంత.

తయారు చేసే విధానం : ముందుగా రాగి పిండి, కొర్ర రవ్వ, గోధుమ రవ్వ, మైదా, వంట సోడా, ఉప్పును తగినంత మోతాదులో తీసుకొని ముద్దలుగా చేసి ఒక గంట పాటు పక్కన ఉంచాలి. బాగా నానిన ముద్దను చిన్న పాటి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఈ ఉండలను చిన్న పూరీలలాగా ఒత్తుకోవాలి. ఈ పూరీలను బాగా కాగిన నూనెలో వేయించి, బాగా పొంగిన పూరీలలో నిమ్మకాయ రసం కలిపిన చెఱకు రసాన్ని పానీలా తీసుకొని తినవచ్చును.

చెఱకు రసంతో జామ్ :

కావలసిన పదార్థాలు : చెఱకు రసం – 400 మి.లీ., పంచదార – 180 గ్రా., బెల్లం – 180 గ్రా., ఆపిల్ – 380 గ్రా., నిమ్మరసం – 5 మి.లీ.

తయారు చేసే విధానం : ముందుగా ఆపిల్ పండ్లను శుభ్రం చేసి తొక్క తీయాలి. శుభ్రపరిచిన పండ్లను ముక్కలుగా చేసి ఉడికించాలి. ఉడికించిన ఆపిల్ ముక్కలను మిక్సీలో వేసి గుజ్జుగా చేయాలి. ఆపిల్ గుజ్జు, చెఱకు రసం, బెల్లం పొడి / పంచదార మిశ్రమాన్ని 100^0 సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉడికించాలి. ఉడికించిన సమయంలో పైన తేలిన తెట్టును తొలగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని జామ్‌లా తయారయ్యే వరకు బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. చివరగా నిమ్మరసం కలిపి స్టవ్‌ను ఆపివేయాలి. ఈ జామ్‌ను చల్లారిన తరువాత బాటిల్స్‌లో నింపి వాడుకోవచ్చు.

బి) బెల్లం తయారీలో చెఱకు నుండి లభ్యమయ్యే ఉప ఉత్పత్తులు :

అ) చెఱకు పిప్పి :

1. 100 టన్నుల చెఱకు నుండి 30 టన్నుల చెఱకు పిప్పి వచ్చును.
2. చెఱకు పిప్పిలో సెల్యులోస్ – 45%, పెంటోసాన్స్–28%, లిగ్నిన్స్–20% మరియు సుక్రోస్–5% ఉండును.
3. బెల్లం తయారీలో ఇంధనముగా వినియోగించవచ్చు.
4. మిగులు చెఱకు పిప్పిని బ్రికెట్స్ లేదా పెల్లెట్స్‌గా చేసి వంట చెఱకుగా వినియోగించవచ్చు.

5. పుట్టగొడుగులు పెంచుటకు ఉపయోగము.
6. నేల కోతను అరికట్టుట, నేలలో తేమను కాపాడుటకు సాయిల్ మల్చ్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.
7. విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగించవచ్చు.
8. కాగితపు పరిశ్రమలో ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించవచ్చు.
9. ఫర్‌ఫ్యూరల్ వంటి రసాయనాల తయారీకి ఉపయోగకరం.
10. కప్పులు, ప్లేటులు తయారు చేయవచ్చు.

ఆ) బెల్లపు తెట్టు :

1. ఒక టన్ను చెఱకు నుండి బెల్లం తయారీలో 35 కిలోల బెల్లపు తెట్టువచ్చును.
2. ఆరబెట్టిన తరువాత సేంద్రియపు ఎరువుగా ఉపయోగించి, నేలలోని తేమను, పోషక పదార్థములను, భూమి భౌతిక స్వభావాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
3. కంపోస్టు ఎరువుల తయారీలో వినియోగించవచ్చు.
4. పందుల పెంపకంలో ఆహారంగా ఉపయోగించవచ్చు.
5. మైనం వంటి విలువైన ఉప ఉత్పత్తి తయారీ.

ఇ) బెల్లపు మడ్డి :

1. ఒక టన్ను చెఱకు నుండి బెల్లం తయారీలో 10 కిలోల బెల్లపు మడ్డి వచ్చును.
2. బెల్లపు మడ్డిలో కార్బోహైడ్రేట్లు 50%, మాంసకృత్తులు 3.5% ఉండును.
3. మొక్కజొన్న (36%), బెల్లపు మడ్డి (40%), యూరియా (2%), లవణాలు మరియు విటమిన్లు (3%) కలిపి పశువులకు మంచి మిశ్రమ దాణాగా ఉపయోగించవచ్చు.
4. లాక్టిక్ యాసిడ్, ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ వంటి రసాయనిక పదార్థాలు బెల్లపు మడ్డిని ఫెర్మంటేషన్ చేయుట ద్వారా తయారు చేయవచ్చు.

సి) చెఱకు రసం – మృదుల పానీయం :

1. తాజాగా తీసిన చెఱకు రసం 90 రోజుల వరకు నాణ్యత చెడకుండా ఉండుటకు 20 కిలోల చెఱకు, 5 నిమ్మ కాయల రసం మరియు 100 గ్రా. అల్లం కలిపి గానుగాడిన తరువాత ఆ రసంను 40^0–50^0 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు వేడి చేసి తెట్టు తీయవలెను. చల్లారిన రసంను వడకట్టి, 1 లీటరుకు 125 మి.గ్రా. సోడియం బెంజోయేట్ వేసి స్టెరిలైజ్ చేసిన గాజు సీసాలలో రసం వేసి, సీలు చేసి, సీసాలను మరల వేడి నీటిలో 80^0 సెంటీగ్రేడ్ వద్ద 10 నిమిషాలు వేడి చేయాలి.
2. ఇలా చేసిన చెఱకు రసం 90 రోజుల వరకు నాణ్యత చెడకుండా ఉండును. ఒక సీసా రూ. 9/– నుండి 10/– ల ధర ఉండును.
3. చెఱకు రసంను వ్యాక్యూమ్ ఎవాపరేటర్ అనే యంత్రం ఉపయోగించి చెఱకు రసంలో ఉన్న నీటిని తీసివేసి, చిక్కగా ఉన్న చెఱకు రసాన్ని గాజు సీసాలో ఉంచి, ఫ్రిజ్‌లో 120 రోజుల వరకు భద్రపరచుకోవచ్చు.

డి) చెఱకు నుండి పొలంలో లభ్యమయ్యే ఉప ఉత్పత్తులు :

అ) చెఱకు చెత్త కాల్చగా వచ్చిన బూడిద :

1. 100 టన్నుల చెఱకు పిప్పి మరియు చెత్త నుండి 300 కిలోల బూడిద వచ్చును.
2. బూడిదలో సిలికాన్ (85-90%), పొటాషియం మరియు సోడియం (5-10%), కాల్షియం (1-2%), భాస్వరం (1.5-2%) మరియు ఇతర సూక్ష్మపోషకాలు ఉండును.
3. పంట పొలాలకు హెక్టారుకు 500 కిలోలు ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చు.
4. గాఱు పరిశ్రమలో ముడి పదార్థముగా ఉపయోగిస్తారు.
5. చెఱకు రసంను శుద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

ఆ) చెఱకు చెత్త :

1. 100 టన్నుల చెఱకు నుండి 10 టన్నుల చెఱకు చెత్త వచ్చును.
2. బెల్లం తయారీలో ఇంధనంగా ఉపయోగము.
3. మిగులు చెఱకు చెత్తను పొలంలో కాల్చే బదులు, చెఱకు చెత్తను కంపోస్టుగా చేసి నేలకు సేంద్రీయ ఎరువుగా వాడుట లాభదాయకం, (యూరియా, సూపర్ ఫాస్ఫేటు, కంపోస్టు, చెఱకు ఎండుటాకుకు కల్చరు కలిపి చల్లుట వలన త్వరగా చివికి సేంద్రీయ పదార్థముగా మారును). కంపోస్టులో సేంద్రీయ కర్బనం 38%, నత్రజని 0.7%, భాస్వరం 0.1%, పొటాషియం 0.2% ఉండును.
4. చెఱకు నాటిన తరువాత నేలపై చెత్తకప్పుట వలన నేలలో తేమ కాపాడబడి, చివికిన చెత్త సేంద్రీయ పదార్థముగా ఉపయోగపడును. (ఎండుటాకుపై యూరియా, సూపర్ ఫాస్ఫేటు, కంపోస్టు కల్చరు కలిపి చల్లుట వలన త్వరగా చివికి సేంద్రీయ పదార్థముగా మారును.

ఇ) చెఱకు మోసులు :

1. 100 టన్నుల చెఱకు నుండి 25-30 టన్నుల మోసులు వచ్చును.
2. వీటిలో ముడి పదార్థము 29%, క్రూడ్ మాంసకృత్తులు 1.6%, జీర్ణమయ్యే మాంసకృత్తులు 0.8%, పోషక పదార్థాలు 0.4%, క్రొవ్వులు 8%, పీచు 2% మరియు కాల్షియం 0.3% ఉండును.
3. చెఱకు మోసులు, బెల్లపు మడ్డి (5-10%), అమ్మోనియా (0.2%) పశువుల దాణాగా ఉపయోగించవచ్చు.
4. చెఱకు మోసులు ఆరబెట్టి, తేమను తీసివేసి పీచు పదార్థముగా, పశువుల దాణాగా ఉపయోగించవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్) & యూనివర్శిటీ హెడ్ (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇంజనీరింగ్),

ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, అనకాపల్లి - 531 001, అనకాపల్లి జిల్లా.

సెల్ : 94419 44640

పాల ఉత్పత్తుల తయారీ మరియు నిల్వ పద్ధతులు

పాలు శ్రేష్ఠమైన బలవర్ధక ఆహారము. ఇందులో అన్ని రకాలైన పోషక విలువలు ఉన్నాయి. కొద్దిగా విటమిన్-సి మరియు ఇనుము తక్కువ. అన్ని వయస్సుల వారు తీసుకోతగ్గ ఉత్తమ ఆహార పదార్ధము. భారతదేశంలోని అధిక శాఖాహార జనాభాకు ఇవి కాల్షియం, విటమిన్లు మరియు ప్రోటీన్లకు కీలకమైన మూలం. పాలను ఉత్పత్తి చేసే జంతువులు – ఆవులు, గేదెలు, మేకలు మరియు గొర్రెలు. పాడి పరిశ్రమ అనేది వ్యవసాయంలో ఒక భాగం. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇది రైతులకు ఆదాయ వనరుగా మరియు మహిళా సాధికారతకు అవకాశంగా పనిచేస్తుంది. పాడి ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, గొర్రెలు నుండి దీర్ఘకాలం పాల ఉత్పత్తి కోసం పశు పోషణ చేసి వాటి నుండి వచ్చే విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేయుట చిన్నతరహ నుండి పెద్ద పరిశ్రమగా పరిగణించబడుతుంది.పాలను ఉత్పత్తి చేయడం, దానిని శుభ్రం చేయడం, పాల పొడి తీయడం, పాలుగా మళ్ళీ మార్చడం, రిటైల్ వాణిజ్యానికి పాలు పంపడం వంటి అనేక దశలు దీనిలో ఉంటాయి.

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాడి పశువుల సంఖ్యను కలిగి ఉంది. సుమారు 300 మిలియన్లకు పైగా బొవైన్‌లతో 2023 లో 231 మిలియన్ టన్నుల పాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ మరియు వినియోగిస్తూ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలోను, మన రాష్ట్రం 5 వ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మన దేశంలో సంవత్సరానికి సగటున 150 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పాలను మరియు దేశ ఆర్థిక పురోగతికి సుమారు 10 శాతం వరకు ఉపయోగపడుతున్నది. భారతదేశంలో అమూల్ సహకార సంస్థ అత్యంత విస్తృతమైనది.

పాలలో పోషక విలువలు నిండుగా ఉన్నవి. కొవ్వు పదార్థాలు 4 శాతం, పిండి పదార్థాలు (కార్బోహైడ్రేట్‌లు) 4.7 శాతం, మాంసకృత్తులు (ప్రోటీనులు) 3.3 శాతం, నీరు 88 శాతం, ఆవు పాలలో 100 గ్రాములకు 69 కేలరీలు, గేదె పాలలో 100 కేలరీలు మరియు మేక పాలలో 66 కేలరీలు శక్తి ఉంటుంది. ఇదే విధంగా పాల ఉత్పత్తుల ద్వారా నిల్వ పదార్థాలను కూడా మనం చిన్న పాటి పెట్టుబడులతో స్థాపించుకోవచ్చు. నిల్వ పద్ధతుల ద్వారా మనం పాలను ఉపయోగించి వివిధ పదార్థాలను చేసుకోవచ్చు. అవి ఏమనగా పాల నుండి కొవ్వు పదార్థం (క్రీమును), వెన్న, మజ్జిగ, నెయ్యి, జున్ను, పన్నీరు, కలాఖండ్, పాలకోవ, ఐస్‌క్రీమ్‌లు మొదలగు వాటిని చేసుకోవచ్చు. పాలను తోడు పెట్టినచో పెరుగు తయారవుతుంది. పెరుగును పలచగా నీటితో బాగా చిలికితే మజ్జిగ, కొద్దిగా చక్కెర కలిపితే లస్సీ తయారవుతాయి. మజ్జిగను చేసే ప్రక్రియలో వెన్న తయారవుతుంది. వెన్నను మరగపెడితే నెయ్యి వస్తుంది. నిల్వ పాల పదార్థాలను ఎలా తయారు చేయాలో మరియు కుటీర పరిశ్రమకు కావలసిన పరికరాలను వివరించడం జరిగినది.

ముందుగా వెన్న తీసిన పాల నుండి నిమ్మ రసం లేదా ముందురోజు పులిసిన మజ్జిగ కలిపి విరగగొట్టి ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత మనము పన్నీరును తయారు చేసుకోవచ్చు. పన్నీరు దక్షిణ ఆసియా వంట విధానంలో అతి సహజమైన తాజా జున్ను. ఇది భారతదేశంలో నుండి పుట్టినది. భారతదేశపు తూర్పు ప్రాంతాలలో దీనిని సాధారణంగా చెన్నా అంటారు. ఇది నిల్వ ఉండే ఆమ్ల భరిత, కరగని పాల జున్ను లేదా వేడి పాలను నిమ్మరసం లేదా ఇతర ఆమ్ల ఆహార పదార్థాలతో విరగగొట్టే పెరుగు జున్ను (పాల విరుగుడు). పన్నీరు తయారీలో ఆహార ఆమ్లాన్ని (సాధారణంగా

నిమ్మరసం, వెనిగర్, సిట్రిక్ ఆమ్లం లేదా పెరుగు) వేడి పాలకి కలిపిన పాలు విరుగును. మస్లిన్ లేదా జున్ను గుడ్డలో ఆరబెట్టి అధికంగా ఉన్న నీరు తొలగించాలి. వడగట్టిన పన్నీరుని మంచి ఆకారం, రూపం రావడానికి గాను చల్లటి నీటిలో 2–3 గంటల పాటు ముంచి ఉంచాలి. తరువాత వీటిని చతురస్రాకారపు ముక్కలుగా కోసుకోవచ్చు. ఒక లీటరు పాలకు గాను మనకు 300 గ్రా. వరకు పన్నీరు వచ్చును. పన్నీరును కూరల్లో, ఇతర వంటకంగా వాడుకోవచ్చును.

పాలకోవా, పాలుతో చేసే స్వచ్ఛమైన మిఠాయి. ఇది మంచి రుచి కలిగిన బలవర్ధకమైన ఆహారం. మనం కుటీర పరిశ్రమకు మార్కెట్‌లో కోవా మేకింగ్ (తయారు చేసే) యంత్రం లభించును. ఒక లీటరు పాలకు 10–15 శాతం పంచదార పోసి చిక్కగా కోవా అయ్యేంత వరకు కడాయిలో కలియబెడుతూ మరగబెట్టాలి. ఉండ పాకం అయ్యాక దింపాలి. వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకొని బిళ్ళలుగా చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనకు కలాఖండ్ స్వీట్ కావాలనుకున్నప్పుడు కోవా చివరి దశలో 0.5–1 శాతం సిట్రిక్ ఆమ్లాన్ని వేసుకొని బాగా కలియతిప్పి కడాయి నుండి వేరు చేయాలి. దీన్ని కూడా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ముక్కలుగా కోసుకోవచ్చును.

వెన్నను క్షీరదాల పాల నుండి తయారు చేయుదురు. ముఖ్యంగా ఆవు, గేదె, మేక పాల నుండి తయారు చేయుదురు. పాల సేకరణ కేంద్రాల వారు పాలను గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వారి సిబ్బంది ద్వారా పాలను స్వీకరిస్తారు. ఇలా సేకరించిన పాలలో ఉన్న వెన్న శాతం ఆధారంగానే పాల ధరను చెల్లించెదరు. పాలలో కొవ్వు 4–8 శాతం వరకు ఉండును. ఇలా సేకరించిన పాలను మొదట 4^0 సెంటీగ్రేడ్ వద్ద శీతలీకరరించి తరువాత యంత్రాలకు పంపిస్తారు. సెంట్రిఫ్యూజ్‌లో ఒక బౌల్ ఉండును. ఇది మోటరు యంత్రం సహాయంతో తిరుగునప్పుడు పాలను బౌల్‌లోకి పంపెదరు. సెంటిఫ్యూగల్ బౌల్‌లో తక్కువ సాంద్రత ఉన్న వెన్న బౌల్ యొక్క కేంద్ర భాగం వైపుకు వెళ్ళును. బౌల్ కేంద్రియ భాగంపైన ఉన్న కవాటం ద్వారా వెన్న వెలువలికి వచ్చును. అలాగే వెన్న తీయబడిన పాలు మరో కవాటం ద్వారా వెలుపలికి వచ్చును. వెన్నను ఒక పాత్రలో నిల్వ చేయుదురు. పాలను పాస్చరైజేషన్ చేసి, శీతలీకరించి పాలను ప్యాకెట్‌లో నింపి సీల్ చేసి విక్రయించెదరు. ఇలా వెన్న తొలగించిన పాలలో 2.2%–3% వరకు కొవ్వు ఉండును. ఇలా తయారైన వెన్న తెల్లగా, మెత్తగా ఉండును. 20–25 శాతం వరకు నీటిని కలిగి ఉండును. వెన్న నుండి నెయ్యిని తయారు చేసి విక్రయించవచ్చును.

ఇలా వివిధ రకాల పాల పదార్థాలను ముఖ్యంగా నిల్వ ఉండు పదార్థాలను మనము కొంచెం పెట్టుబడితోనే కుటీర పరిశ్రమగా ఇంటి వద్దనే స్థాపించుకోవచ్చు. ఇలాంటి పాల పదార్థాలను పాలిథీన్, HDPE, LDPE మరియు ఇథిలీన్ కో పాలిమర్స్ ఉపయోగించి తయారైన ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్‌ను వినియోగించి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో 5^0 సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర నిల్వ ఉంచుకోవచ్చును. అయితే ఈ విధానాల ద్వారా గ్రామ స్థాయిలో మార్కెట్ అనుకూలత బట్టి కొన్ని పాల సంబంధిత విలువ చేకూర్చిన పదార్థాలను తయారు చేసుకొని రైతులు లబ్ధి పొందవచ్చును. వెన్న, నెయ్యి, పన్నీరు మొదలగునవి ముఖ్యమైన విలువ ఆధారిత పాల ఉత్పత్తులు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ఆచార్యులు (ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్) & అసోసియేట్ డీన్,

డా॥ ఎన్.టి.ఆర్. ఆహార శాస్త్ర సాంకేతిక కళాశాల, బాపట్ల – 522 101. సెల్ : 99855 89428

రైతుల పరిజ్ఞాన సాధికారత దిశగా

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యయసాయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క విస్తరణ సేవలు

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధనా ఫలితాలను రైతులకు చేరవేయుటకు విశ్వవిద్యాలయ విస్తరణ విభాగాలైన కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ఏరువాక కేంద్రాలు మరియు వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం కృషి చేస్తున్నాయి. వీటి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రధమ శ్రేణి విస్తరణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం.

కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు : మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 23 కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో 13 కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు [ఆముదాలవలస (శ్రీకాకుళం జిల్లా), రస్తకుంటుబాయి (పార్వతీపురం జిల్లా), కొండెంపూడి (అనకాపల్లి జిల్లా), ఉండి (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా), గరికపాడు (ఎన్.టి.ఆర్. జిల్లా), ఘంటశాల (కృష్ణా జిల్లా), దర్శి (ప్రకాశం జిల్లా), నెల్లూరు (యస్.పి.యస్.ఆర్. నెల్లూరు జిల్లా), కలికిరి (అన్నమయ్య జిల్లా), ఊటుకూరు (వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా), బనవాసి (కర్నూలు జిల్లా), రెడ్డిపల్లి (అనంతపురం జిల్లా), కళ్యాణ దుర్గం (అనంతపురం జిల్లా)] వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్నవి.

ముఖ్య ఉద్దేశ్యాలు :

- రైతు పొలాల్లో ప్రథమ శ్రేణి ప్రదర్శన క్షేత్రాలు నిర్వహించడం
- వివిధ వృత్తుల్లో నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణ నివ్వటం
- క్షేత్ర స్థాయిలో చిరుసంచులు మరియు క్షేత్ర పరిశీలనలు నిర్వహించడం
- రైతులు, మహిళలు మరియు యువకులకు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాలలో తర్ఫీదునివ్వటం, గ్రామాలలోని యువకులు మరియు చదువుకున్న నిరుద్యోగులకు ఆదాయాన్నిచ్చే వివిధ వృత్తులలో శిక్షణనివ్వటం
- అధునాతన సాంకేతిక పద్ధతులను పంట పొలాల్లో ప్రదర్శించడం
- వివిధ పంటల సాగు విధానంపై కరపత్రాలను మరియు వీడియోలను రైతుల ప్రయోజనార్ధం తయారు చేయడం మరియు ప్రదర్శించడం.
- సాంకేతికత ద్వారా వ్యవసాయ విస్తరణ సేవలు అందించడం.
- పై వాటితో పాటు విత్తనోత్పత్తి మరియు వివిధ పంటల నారు మొక్కల ఉత్పత్తిని కూడా చేపట్టి రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాన్ని మరియు నారు మొక్కలను అందజేయడం.

ఏరువాక కేంద్రాలు : 1998 వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ మినహాయించి మిగిలిన 22 జిల్లాలలో ఏరువాక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. వీటిని రైతులకు అందుబాటులో ఉంచే ఆశయంతో జిల్లాలలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ/ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల ప్రాంగణాలలో ఏర్పాటు చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మొత్తం 26 జిల్లాలలో ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ ఏరువాక కేంద్రాలు – పాడేరు (అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా), గాజులరేగ (విజయనగరం జిల్లా), అమలాపురం (డా॥ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా), పెద్దాపురం (కాకినాడ జిల్లా), నరసింహారావు పేట, ఏలూరు (ఏలూరు

జిల్లా), దివాన్ చెరువు, రాజమహేంద్రవరం (తూర్పు గోదావరి జిల్లా), లాం, గుంటూరు (గుంటూరు జిల్లా), రావిపాడు, నరసరావుపేట (పల్నాడు జిల్లా), బాపట్ల (బాపట్ల జిల్లా), చిత్తూరు (చిత్తూరు జిల్లా), ఊటుకూరు, కడప (వై.ఎస్.ఆర్. కడప జిల్లా), కర్నూలు (కర్నూలు జిల్లా), పుట్టపర్తి (శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా) లో పనిచేస్తున్నాయి.

ముఖ్య ఉద్దేశ్యాలు :

- వనరుల ఆధారిత కార్యాచరణ ప్రణాళికలను తయారు చేయుట
- సాంకేతిక పరిజ్ఞానమును క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించుట
- ఇతర శాఖల సమన్వయంతో రోగనిర్ధారిత క్షేత్ర సందర్శనలు
- భాగస్వామ్యులందరి విజ్ఞాన మరియు నైపుణ్య శక్తిని పెంపొందించుట
- వివిధ అభివృద్ధి సంస్థలు మరియు సమాచార వ్యవస్థలను సమన్వయ పరచుకోవడం

ఈ కేంద్రాలు వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ సంస్థ అధికారులు మరియు రైతులతో కలిసికట్టుగా పని చేస్తున్నాయి. ఇలా చేయడం ద్వారా శాస్త్రజ్ఞులు, రైతులు మరియు విస్తరణ అధికారుల మధ్య సత్సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తున్నాయి.

వివిధ పంటలపై తయారు చేసిన లఘుచిత్రాలను రైతుల కోసం ఏరువాక కేంద్రాలలో ప్రదర్శిస్తుంటారు. కిసాన్ మేళాలు నిర్వహించడం, వ్యవసాయాభివృద్ధిలో భాగస్వాములందరికీ ముఖ్యంగా రైతు ఉత్పత్తిదారు సంఘాలకు తర్ఫీదు (శిక్షణ) నివ్వటం, రేడియో, టీ.వి. మరియు పత్రికల ద్వారా దూర విద్యనందించటం కూడా ఈ ఏరువాక కేంద్రాల బాధ్యతే.

వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం : ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం ద్వారా ఆకర్షణీయమైన పటాలతో, తేలికగా అర్థమయ్యే భాషలో పురుగు, రోగ నిర్ధారిత బులెటిన్ లను ముద్రించి రైతులకు తక్కువ ధరకే అందించటం జరుగుతున్నది. ఇలాంటి బులెటిన్‌లు మన రాష్ట్రంలో పండించే అన్ని పంటలపైన ముద్రించటమైనది. ఇవి విస్తరణాధికారులకు, రైతులకు మరియు విద్యార్థులకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి.

రైతుల ప్రశ్నలకు అప్పటికప్పుడు సమాధానాలు అందించే ఉద్దేశ్యంతో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఫార్మర్స్ కాల్ సెంటర్‌ను 2016 వ సంవత్సరంలో గుంటూరు నందు ఏర్పాటు చేశారు. రైతులు ఎక్కడినుంచైనా ఉచితంగా '1800 425 0430' అనే నంబరుకు ఫోన్ చేసి తమ సందేహాలను శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడి తగిన సలహాలు, సూచనలు పొందవచ్చు.

వ్యవసాయ పంచాంగం : వార్షిక **"వ్యవసాయ పంచాంగం"**ను ప్రతి సంవత్సరం ఉగాది పర్వదినాన విడుదల చేయటం జరుగుతున్నది. దీనిలో రాష్ట్రంలో పండించే వివిధ పంటల సాగు, పశువుల యాజమాన్యం మరియు గృహ విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతుల వివరాలను తెలియపరచటం జరుగుతున్నది. రైతు సోదరులు ఈ పుస్తకాన్ని ఒక గ్రంథంగా భావిస్తారు.

వ్యవసాయం మాసపత్రిక : ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ మాస పత్రిక "వ్యవసాయం" ద్వారా రైతులకు ఆ నెలలో చేపట్టవలసిన వ్యవసాయ పనుల గురించి రైతులకు తెలియ పరచటం జరుగుతున్నది.

ది జర్నల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆంగ్రూ : త్రైమాసికం, ఈ జర్నల్ ద్వారా వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన పరిశోధనా ఫలితాలను ప్రచురించటం జరుగుతుంది.

ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వ్యవసాయ సూచనలు మరియు వ్యవసాయ పాఠశాల కార్యక్రమాలకు సాంకేతిక సమాచారాన్ని అందచేయడం జరుగుతున్నది.

దూరదర్శన్ లో ముఖాముఖి కార్యక్రమాలకు నిష్ణాతులను ఎంపిక అనేది కూడా జరుగుతుంది.

శిక్షణ మరియు సందర్శన కార్యక్రమాలు : ఈ కార్యక్రమం ప్రతి నెలా పరిశోధన, విస్తరణ శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల అధికారుల సమన్వయంతో జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆ జిల్లాలోని ప్రస్తుత వ్యవసాయం, వాతావరణ స్థితిగతులను చర్చించి, రాబోయే నెల రోజులకు కార్యాచరణను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. క్షేత్ర సందర్శనను చేపట్టి ప్రస్తుతం పంటలలో ఉన్న చీడపీడలను, సమస్యలను అధికారులకు చూపించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పరిశోధనా – విస్తరణ అనుసంధాన కార్యక్రమముగా ఉపయోగపడుతుంది.

గ్రామ దత్తత కార్యక్రమం : ఒక గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుని ఆ గ్రామంలో రైతుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి కృషి చేయడానికి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం గ్రామ దత్తత కార్యక్రమంను ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని పరిశోధనా స్థానాలు, కళాశాలలు ఒక్కో గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాయి. ముగ్గురు, నలుగురు శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి వారం ఒక రోజున తప్పనిసరిగా గ్రామాన్ని సందర్శించి, పొలాన్ని చూసి రైతులతో ముచ్చటించి తగు సలహాలు ఇస్తారు. మేలైన విత్తనాన్ని ఎంపిక చేసుకోవటం, రైతు స్థాయిలో విత్తనోత్పత్తి, మట్టి మరియు నీటి పరీక్ష, అంతర పంటలు వేసుకోవటం, సేంద్రీయపు ఎరువులు వాడటం, సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం, సమగ్ర సస్యరక్షణ, ప్రదర్శనా క్షేత్రాలు నిర్వహించడం ఈ కార్యక్రమంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు.

కిసాన్ మేళాలు : ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాలు, వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, కళాశాలలు వ్యవసాయ ప్రదర్శన మరియు రైతు సదస్సుల ద్వారా మేలైన అధునాతన యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులను చైతన్యవంతులుగా చేసే ఉద్దేశ్యంతో కిసాన్ మేళాలను ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించ బడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా క్రొత్త వంగడాల విత్తనాన్ని అందుబాటులో ఉంచబడుతున్నది.

వినూత్న విస్తరణ పద్ధతులు

వీలైనంత ఎక్కువ మంది రైతులకు సాంకేతిక సమాచారాన్ని అందిస్తూ, విజ్ఞాన సాధికారత మరియు విస్తరణ సేవలను పెంచే దిశగా ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం వారు ఇటీవల కాలంలో క్రింద వినూత్న విస్తరణ పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టి సత్ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు. వాటి వివరాల గురించి ఈ క్రింద తెలియపరచడమైనది.

నిష్ణాతులైన రైతు శిక్షణాకారులను అభివృద్ధి పరచుట : ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా 2,3 మండలాల నుంచి ఎంపిక చేసిన 15 నుండి 20 మంది రైతులకు, ఎంపిక చేసుకున్న పంటలో, ఒక పంట కాలంలో వివిధ ముఖ్యమైన పంట దశలలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మొదటిసారి వచ్చిన 15–20 మంది రైతులు మాత్రమే ప్రతి పంట దశలో ఇచ్చేటువంటి శిక్షణకు హాజరు కావలసి ఉంటుంది. ఈ శిక్షణ పంట సమయాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.

సృజనాత్మక రైతుల అనుసంధానం : ప్రతి జిల్లా స్థాయిలో గుర్తించిన సృజనాత్మక రైతు అనుసంధాన సమన్వయకర్త తన అనుభవాలను మరో 30 మంది ఇతర రైతులతో పంచుకోవడం జరుగుతుంది. (తన గ్రామంలోని 10 మందికి, తన మండలంలోని 10 మందికి, తన జిల్లాలోని 10 మందికి). సమన్వయకర్తలకు కావలసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏరువాక మరియు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల శాస్త్రవేత్తలు అందిస్తుంటారు.

వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రతి గ్రామానికి : వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ సేవలు రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలోని రైతులకు తెలియజేసే ఉద్దేశ్యంతో ఏరువాక కేంద్రాలు మరియు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి జిల్లాలో గ్రామ సర్పంచ్‌లు మరియు అభ్యుదయ రైతులతో సమావేశమై వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ కార్యక్రమాలు, ఆయా ప్రాంతాలలో పండిస్తున్న పంటలలో రైతులు పాటించవలసిన కీలకమైన వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు గ్రామ గ్రంధాలయానికి వ్యవసాయ పంచాంగం మరియు ప్రతి నెల వ్యవసాయం మాసపత్రికను అందించడం జరుగుచున్నది.

ఫార్మ్ సైన్స్ క్లబ్స్ : గిరిజన ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని త్వరితగతిన తీసుకుపోవడం

గిరిజన యువత అనుసంధాన కార్యక్రమం : గిరిజన యువ రైతులను శాస్త్రవేత్తలతో అనుసంధానం చేయటం. 15 రోజులకొకసారి శిక్షణ, అవగాహనా సదస్సులు, విజ్ఞాన యాత్రలు.

ప్రభుత్వ – ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం : రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వారితో కలిసి.....

- **జిల్లాలు :** ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 26 జిల్లాలు
- **కార్యక్రమాలు :** నాలెడ్జ్ ఆన్ వీల్స్, డయల్ అవుట్, సిటీ కేబుల్‌లో ఫోన్ ఇన్ మరియు శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా రైతులకు సేవలందిస్తున్నాము.

ఇతర కార్యక్రమాలు

ప్రకృతి వ్యవసాయం : దీనిలో భాగంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు జీవామృతం, బీజామృతం మరియు సేంద్రీయ పద్ధతి ద్వారా పురుగులు మరియు తెగుళ్ళ యాజమాన్యం గురించి రైతులకు క్షేత్ర ప్రదర్శన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.

నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు స్వయం ఉపాధి : ఈ కార్యక్రమాన్ని నెల్లూరు మరియు ఊటుకూరు కె.వి.కె.లు అమలు పరుస్తున్నాయి. గ్రామీణ యువతకు మరియు మహిళలకు చిరుధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలకు విలువలు జోడించడం, నర్సరీ మొక్కల పెంపకం, పుట్టగొడుగుల పెంపకం, వర్మీ కంపోస్టు ఎరువును తయారు చేయడం, కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కే పరికరంలో నైపుణ్యం మొదలగు వాటిలో వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు పెంపొందిస్తున్నాము.

గిరిజన ఉప ప్రణాళిక : ఈ పథకాన్ని ఆమదాలవలస, రస్తకుంటుబాయి, కొండెంపూడి, దర్శి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు అమలు పరుస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో గిరిజన రైతులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంతో పాటు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పరికరాలను ఎంపిక చేయబడిన గిరిజన రైతులకు అందచేస్తున్నారు.

ఆర్య : గ్రామీణ యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించే ధ్యేయంగా "ఆర్య" కార్యక్రమం కె.వి.కె. నెల్లూరు మరియు కె.వి.కె. ఊటుకూరులో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పథకంలో గ్రామీణ యువతకు వానపాముల ఎరువు తయారీ, పుట్టగొడుగుల పెంపకం, నారు మొక్కల పెంపకం, విలువాధారిత వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల తయారీ మొదలగు వాటిపై శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి ఆ యూనిట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవసరమైన ఆర్థిక సహకారం అందచేస్తున్నారు.

షెడ్యూల్ కులాల ఉపప్రణాళిక : కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ద్వారా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఈ పథకంలో ఆంగ్రూ, షెడ్యూల్ కులాల రైతులను గుర్తించి వారికి అవసరమైన శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వెనుకబడిన షెడ్యూల్ కులాల రైతులకు చేయూతనిచ్చేందుకు చిన్న తరహా వ్యవసాయాధారిత వ్యాపారాలను చేసుకునేందుకు అవసరమైన వసతులను కల్పించడం జరుగుతుంది.

జాతీయ వాతావరణ అనుకూలిత వ్యవసాయ సాంకేతికత విధానాలు (నిక్రా) : ఈ పథకం ఆముదాలవలస మరియు రెడ్డిపల్లి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో ఈ కార్యక్రమం అమలు పరుస్తున్నారు. వాతావరణ స్థితిస్థాపకతకు అనువైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని క్షేత్ర ప్రదర్శనలు మరియు శిక్షణ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులకు అందిస్తున్నారు.

అనుబంధ శాఖలతో విస్తరణ కార్యక్రమాలు :

- మార్కెట్ కమిటీ స్థాయి చర్చలు
- ఆత్మా వారి సహకారంతో ప్రదర్శనా క్షేత్రాలు
- శిక్షణ మరియు సందర్శన సమావేశాలు
- మండల పరిశోధనా మరియు విస్తరణ సలహా మండలి సమావేశాలు
- ప్రాధమిక రంగ మిషన్
- సేంద్రీయ వ్యవసాయం / ప్రకృతి వ్యవసాయం
- నాబార్డ్–రైతు క్లబ్బులు
- ఆర్.కె.వి.వై. (రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన)
- ఎస్.సి. & ఎస్.పి.
- మీడియా ల్యాబ్ ఆసియా – కిసాన్ సారథి
- నేల ఆరోగ్య పత్రాలు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వపు విస్తరణ కార్యక్రమాలలో భాగస్వామ్యం :

పొలం బడి : ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమమైనటువంటి "పొలం బడి" లో పాల్గొంటూ, రైతులకవసరమైన నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు.

రైతు సేవా కేంద్రాలు (ఆర్.యస్.కె.) : ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు, అనుబంధ శాఖల అధికారులతో కలిసి రైతు సేవా కేంద్రాలలోని గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకులు శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామీణ అవగాహన కృషి అనుభవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి రైతు సేవా కేంద్రానికి ఒక బి.యస్సీ (వ్యవసాయం) విద్యార్థిని అనుసంధానం చేసి 30 రోజుల పాటు (3 విద్యార్థులు 90 రోజుల పాటు) ఆర్.యస్.కె. ల పనితనంను మరియు రైతులకు అందించే సేవలను విశ్లేషిస్తున్నారు.

విపత్తు యాజమాన్యం : విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు విపత్తు సమయాల్లో వరదలు, తుఫాను మరియు విపరీత, కరువు, గాలుల వల్ల నష్టపోయిన రైతుల పొలాలను సందర్శించి పంట నష్టాన్ని తగ్గించే పద్ధతులను వార్తా పత్రికలు, టెలివిజన్, రేడియో, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ఇలాంటి విస్తరణ సేవలను రైతులందరూ ఉపయోగించుకొని, పెట్టుబడులను తగ్గించుకొని, నాణ్యమైన అధిక ఉత్పత్తులను పొందుతూ లాభసాటి వ్యవసాయం దిశగా పయనించాలని ఆశిస్తున్నాం.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

విస్తరణ సంచాలకులు, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం; సెల్ : 98490 98532;
యూనివర్శిటి హెడ్ (వ్యవసాయ విస్తరణ), వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం, నెల్లూరు, సెల్ : 99633 97795;
ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ), సెల్ : 90005 27524 మరియు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (కీటక శాస్త్రం);
సెల్ : 99896 25239, O/o విస్తరణ సంచాలకులు, లాం, గుంటూరు.

సాంకేతికతల ద్వారా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విస్తరణ సేవలు

వ్యవసాయ రంగంలో భారతదేశం సాధించిన పురోభివృద్ధిలో సాంకేతిక సాధనాల ద్వారా విస్తరణ పాత్ర ఎంతగానో ఉంది. రైతులకు సరైన సమయంలో శాస్త్ర విజ్ఞానం మరియు ఆధునిక సమాచారం అందించగలిగితే పంట దిగుబడి పెరిగి వ్యవసాయం లాభధాయకం అవుతుంది. అంతేకాకుండా, మన దేశం 'డిజిటల్ ఇండియా' ద్వారా సమాచార సాంకేతికత మరియు ఐ.టి. రంగంలో ఎంతో పురోభివృద్ధి సాధిస్తూ ఉన్నది. అందువలన, రైతులకు డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా ఎన్నో రకాలైనటువంటి మెరుగైన సేవలు అందించగలుగుతున్నాము. సాంప్రదాయ ఎలక్ట్రానిక్ విస్తరణ మాధ్యమాలైనటువంటి రేడియో మరియు దూరదర్శన్ రైతులకు అవసరమైన సమచారసేవలు అందజేయడంలో ఎంతగానో దోహదపడ్డాయి. అలాగే ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ మరియు డిజిటల్ మాధ్యమాలైనటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్లు, రైతు కాల్‌సెంటర్‌లు, మొబైల్ ఆప్‌లు, ఇ.వి.ఆర్.ఎస్. వాయిస్ మెసేజ్‌లు, అంతర్జాల వెబ్‌సైట్‌లు మరియు లఘు చిత్రాలు రైతులకు త్వరితగతిన సమాచారం అందజేయడంలో వివిధ రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి.

1. రేడియో మాధ్యమం ద్వారా వ్యవసాయ సమాచారం :

గ్రామీణ మరియు వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో ఆల్ ఇండియా రేడియో (AIR) ప్రముఖ పాత్ర వహించింది. భారత ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రజలను ఉత్తేజపరచడంలో రేడియో లేదా ఆకాశవాణి పాత్రని గుర్తించి అన్ని ప్రాంతీయ భాషలలో సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడం కొరకు అన్ని రాష్ట్రాలలో ఆకాశవాణి కేంద్రాలను స్థాపించింది. అంతేకాకుండా రైతులకు ప్రత్యేకంగా 'కిసాన్ వాణి' కార్యక్రమం ద్వారా తగు సలహాలు మరియు సూచనలు అందించడంలో ఎంతో సఫలీకృతం అయింది. ఈ మాధ్యమం ద్వారా విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు రైతాంగానికి సమయోచిత ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవసాయ సమచారాన్ని అవసరానుగుణంగా తెలియజేస్తున్నారు.

ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రోజు వారీ వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు

సం.	కార్యక్రమం పేరు	ప్రసార సమయం (నిమిషాలు)	ప్రసారం అయ్యే రోజు
1.	పొలం పనులు	ఉ. 6:35-6:45	ప్రతిరోజు
2.	పసిడి పంటలు	సా. 6.00-7.00	సోమవారం - శుక్రవారం
3.	వ్యవసాయ సూచనలు	సా. 6:50-7:00	ప్రతిరోజు
4.	పల్లె సీమలు	సా. 6:30-6:50	సోమ, గురు, శని
5.	పంట సీమలు	సా. 7:15-7-45	సోమవారం మినహా ప్రతిరోజు
6.	వ్యవసాయ పాఠశాల	సా. 7:15-7:45	సోమవారం

పై రేడియో కార్యక్రమాలు ఆల్ ఇండియా రేడియో వారి "న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్" యాప్ ద్వారా కూడా ఆలకించవచ్చు.

2. టెలివిజన్ మాధ్యమం ద్వారా వ్యవసాయ సమాచారం :

గ్రామీణ ప్రజలకు వ్యవసాయం, విద్య, వార్తలు, కుటుంబ సంక్షేమం, వయోజన విద్య, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, పశుపోషణ మరియు ఉద్యాన పంటలు వంటి అంశాలపై పరిజ్ఞానం పెంపుదలకు మరియు సాంకేతిక సమాచారం చేరవేయడం కోసం దూరదర్శన్ ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపడుతూ ఉంది. అప్పట్లో దూరదర్శన్‌లో పాడిపంటలు పేరిట రైతులకు సలహాలు, సూచనలు అందజేసేవారు. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రైతుల సందేహాలు నివృత్తి చేయడం కోసం ముఖాముఖి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పలు టీ.వి. ఛానళ్లలో అన్నదాత, జై-కిసాన్, రైతే రాజు, పాడిపంట, పల్లె చేను, నేలతల్లి మరియు సాగుబడి లాంటి అనేక వ్యవసాయ సంబంధిత కార్యక్రమాలు ప్రసారమవుతూ రైతులకు సాంకేతిక సమాచారం అందించడం ఎంతగానో దోహదపడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, లాభదాయక పంటలు, రైతుల విజయగాధలు మరియు వారి అనుభవాలను ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తూ రైతులను చైతన్యపరుస్తూ ఉన్నాయి.

రైతులతో ముఖాముఖి (టీవి చానళ్ళ ద్వారా)

వివిధ పంటలు, వ్యవసాయ సాంకేతికత పరిజ్ఞానంపై దూరదర్శన్ వారి సప్తగిరి ఛానల్ లోని 'పసిడి పంటలు' కార్యక్రమం ద్వారా రైతులు ఫోన్ ద్వారా అడిగిన ప్రశ్నలకు శాస్త్రవేత్తలు సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. అలాగే, వివిధ టి.వి. ఛానెల్స్ ద్వారా కూడా శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు.

వివిధ తెలుగు చానళ్ళ-వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు :

సం.	టీ.వీ. ఛానెల్	కార్యక్రమం	ప్రసార సమయం	ప్రసారమయ్యే రోజు
1.	దూరదర్శన్ (సప్తగిరి)	పసిడి పంటలు	ఉ. 5.30 నుండి 6.00 గం. సా. 6.00 నుండి 7.00 గం.	మంగళవారం – శనివారం సోమవారం – శుక్రవారం
2.	ఈ టీవి తెలుగు	అన్నదాత	ఉ॥ 6.30 నుండి 7.00 గం.	ప్రతిరోజు
3.	సి.వి.ఆర్. న్యూస్	రైతే రాజు	ఉ॥ 6.30 నుండి 7.00 గం.	ప్రతిరోజు
4.	ఈ టీవి-ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ	అన్నదాత	సా॥ 6.30 నుండి 7.00 గం.	ప్రతిరోజు
5.	హెచ్.ఎం.టి.వి	నేలతల్లి	ఉ. 6.30 నుండి 6.55 గం. సా. 6.30 నుండి 7.00 గం.	సోమవారం-శుక్రవారం

3. రైతుల కొరకు టోల్ ఫ్రీ కాల్ సెంటర్లు : పంటల యాజమాన్యం, అంతర పంటలు, సస్యరక్షణ చర్యలు, నేరుగా విత్తే వరి సాగు, చీడపీడల నివారణ, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూసార పరీక్షలు, సేంద్రీయ వ్యవసాయం, గ్రామీణ విత్తనోత్పత్తి, జీవరసాయన ఎరువుల తయారీ, చీడపీడల నివారణ, వాతావరణ సమాచారం, భూసార పరీక్షలు, సేంద్రీయ వ్యవసాయం, గ్రామీణ విత్తనోత్పత్తి పధకం, జీవరసాయనిక ఎరువుల తయారీ, అలాగే

మత్స్య, ఉద్యాన, పట్టు, పాడి పరిశ్రమల సమాచారం వంటి ఎన్నో విషయాలపై సందేహాలను కాల్‌సెంటర్‌లకు ఫోన్ చేసి శాస్త్రవేత్తల నుండి సలహాలను పొందవచ్చు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వ్యవసాయశాఖ నూతనంగా సమీకృత కాల్ సెంటర్ (Integrated Call Centre) ను కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కేంద్రంలో వ్యవసాయ, ఉద్యాన మరియు పశువైద్య విశ్వ విద్యాలయాల శాస్త్రవేత్తలతో పాటు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ శాఖల అధికారులు అందుబాటులో ఉండి సలహాలు అందిస్తారు.

క్ర.సం.	కాల్ సెంటర్ పేరు	టోల్ ఫ్రీ నెంబరు
1.	**ఫార్మర్స్ కాల్ సెంటర్ (ANGRAU), గుంటూరు**	**1800 425 0430**
2.	కిసాన్ కాల్ సెంటర్ (భారత ప్రభుత్వం)	1800 180 1551
3.	ఉద్యాన శాఖ	1800 425 2960
4.	మత్స్య శాఖ	1800 425 1188
5.	**సమీకృత కాల్ సెంటర్ (Integrated Call Centre)**	**155251**

రైతుల ప్రశ్నలకు అప్పటికప్పుడు సమాధానాలు అందించే ఉద్దేశ్యంతో, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఫార్మర్స్ కాల్ సెంటర్‌ను గుంటూరులో ఏర్పాటు చేశారు. శాస్త్రవేత్తలు స్వయంగా రైతుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తారు. రైతులు ఎక్కడినుంచైనా ఉచితంగా **'1800 425 0430'** అనే నెంబరుకు ఫోన్ చేసి తమ సందేహాలను శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడి తగిన సలహాలు, సూచనలు పొందవచ్చు.

4. స్మార్ట్ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు :

భారత ప్రభుత్వం వారి కిసాన్ సారథి :

"కిసాన్ సారథి" అనేది వ్యవసాయం మరియు రైతులకు సంబంధించిన సమాచారం మరియు సేవలను అందించడానికి "భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన వెబ్‌సైట్ / యాప్". వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాలు మరియు సేవలను పొందేందుకు రైతులకు ఒకే వేదికను అందించడం వెబ్‌సైట్ / యాప్ లక్ష్యం. వెబ్‌సైట్ / యాప్ ద్వారా రైతులు పంటల భీమా, సబ్సిడీలు, వాతావరణ అప్‌డేట్‌లు, మార్కెట్ ధరలు మరియు ఇతర సంభంధిత అంశాలపై సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. వెబ్‌సైట్ రైతులకు శిక్షణ మరియు మార్గదర్శక సూత్రాలతో పాటు వ్యవసాయ సంబంధిత సంస్థలు మరియు నిపుణుల డైరెక్టరీని కూడా అందిస్తుంది. **ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోని కె.వి.కె.లు మరియు ఏరువాక కేంద్రాలు ఈ యాప్‌లో రైతులను నమోదు చేసుకున్నాయి.** రైతులు ఉచితంగా ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. రైతుల ప్రశ్నలు కె.వి.కె. శాస్త్రవేత్తలకు ఫోన్ కాల్స్ రూపంలో కిసాన్ సారథి మాధ్యమంగా చేరవేయబడి, రైతులకు జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. అలాగే, రైతులకు వారి మొబైల్ ఫోన్‌ల ద్వారా తరచూ వాయిస్ మెసేజ్‌లు అందజేయబడతాయి. రైతులు 'కిసాన్ సారథి' యాప్‌లో స్వయంగా కూడా రిజిష్టర్ చేసుకోవచ్చు.

5.వ్యవసాయ సమాచార కియోస్క్ : భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి వారి ఆర్థిక సహకారంతో ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో 2015 వ సంవత్సరంలో కియోస్క్‌లను ప్రారంభించారు. ఈ కియోస్క్‌ల ద్వారా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తలు అందుబాటులో లేని సమయంలో కూడా వారికి కావలసిన వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ సమాచారాన్ని పొందే విధంగా రూపకల్పన చేయడమైనది. కియోస్క్‌ల ద్వారా రైతులకు కావలసిన సమాచారాన్ని సంక్షిప్త సమాచార రూపంలో, శబ్ద సమాచార రూపంలో మరియు విడియోల రూపంలో కూడా పొందవచ్చు. కియోస్క్‌లతో పంటల సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను విడియోల రూపంలో పొందుపరచడమైనది. వీటితో పాటు జిల్లాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా క్రోడికరించి ఉంచారు.

6. ఆంగ్రూ ఫామ్ రేడియో : ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో మొట్టమొదటి సారిగా "ఫామ్ రేడియో.ఇన్ " ని 2018 వ సంవత్సరములో అంతర్జాలం ఆధారంగా (ఇంటర్నెట్) ఏర్పాటు చేశారు. ఆన్‌లైన్‌లో వివిధ పంటల వ్యవసాయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరియు అనుబంధ సమాచారాలను శబ్ద రూపంలో రికార్డు చేసి రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడమైనది. (URL : https://farmradio.in)

7. పంటలపై లఘు చిత్రాలు : ఆరుతడి విధానంలో వరి సాగు, యాంత్రీకరణ ద్వారా వరిసాగు మరియు వెద పద్ధతిలో వరి సాగులో సఫలీకృతులైన రైతుల విజయగాధలను వివిధ పంటలలో సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులను, వ్యవసాయంలో డ్రోన్‌ల వినియోగంను, ఎలక్ట్రానిక్ వింగ్, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు విడియోల రూపంలో పొందుపరచి, ఆంగ్రూ యూట్యూబ్ చానల్ లో రైతులకు అందుబాటులో ఉంచారు.

8. విశ్వవిద్యాలయం వారి మొబైల్ యాప్స్

ఆంగ్రూ –ఎ.ఎస్.ఆర్. యాప్ :

ఈ అప్లికేషన్‌ను ఏరువాక కేంద్రం, పాడేరు వారు 2025 వ సంవత్సరంలో అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో వరి, చెరకు, అపరాలు(మినుము, పెసలు, కందులు), ప్రత్తి, మొక్కజొన్న, చిరుధాన్యాలు(జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్ర, సామ) మరియు నూనె గింజ పంటల (ఆముదము, వేరుశనగ, కుసుమలు, నువ్వులు, ప్రొద్దుతిరుగుడు) యాజమాన్య పద్ధతుల (అనుకూలమైన నేలలు, పొలం తయారీ, రకాలు, విత్తన మోతాదు, విత్తనశుద్ధి, ఎరువుల యాజమాన్యం, నీటి యాజమాన్యం, కలుపు నివారణ, చీడపీడల యాజమాన్యం, దిగుబడి వివరాలు మొదలగునవి) గురించి తెలుగు భాషలో రైతులకు సులువుగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉన్నాయి. ఈ సమాచారం ఆంగ్లములో కూడా అందుబాటులో ఉంది. మరింత సమాచారానికి ఆంగ్రూ రైతుల కాల్ సెంటర్ నెం (**1800 425 0430**) కూడా ఇవ్వడం జరిగింది.

కృషి విజ్ఞాన్ యాప్ :

ఈ అప్లికేషన్ ను కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, ఆమదాలవలస, శ్రీకాకుళం వారు అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో రైతులకు, విస్తరణ అధికారులకు సులువుగా అర్థమయ్యే విధంగా తెలుగు భాషలో వివిధ పంటల (వరి, మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర మరియు కొబ్బరి) యాజమాన్య పద్ధతులను (విత్తనం ఎంపిక, విత్తనశుద్ధి, రకాలు–వాటి గుణగణాలు, ఎరువుల యాజమాన్యం, అంతర కృషి, పురుగులు, తెగుళ్ళు, నూతన సాంకేతికత పద్ధతులు) విపులంగా

వివరించడంతో పాటుగా వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి. తద్వారా పొలంలోని చీడ పీడలను గుర్తించి సరైన నివారణ చర్యలను సకాలంలో చేపట్టవచ్చు.

అంతేకాకుండా, పొలం గణాంకాల ద్వారా సాగు విస్తీర్ణం, పంటను బట్టి ఎంత దూరంలో నాటితే ఎన్ని మొక్కలు పడతాయో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. రైతు క్షేత్ర స్థాయిలోని సందేహాలను వెనువెంటనే శాస్త్రవేత్తలతో సంభాషించి నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆచార్య ఎన్. జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మరియు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు (ఉద్యానవనం, చేపల పెంపకం మరియు వాతావరణం) నిర్వహిస్తున్న కాల్ సెంటర్ల టోల్ ఫ్రీ ఫోన్ నంబర్లను ఈ యాప్ లో అనుసంధానం చేయబడి ఉన్నాయి. విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోని పరిశోధన, ఏరువాక, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల చిరునామాలు మరియు వరి పంటలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు (శ్రీ వరి సాగు పద్ధతి, డ్రమ్ సీడరు పద్ధతిలో విత్తుట, వరిలో సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులు, వరిలో తెగుళ్ళ యాజమాన్యం) మరియు కొబ్బరి పంటలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులకు (రకాల వివరాలు, యాజమాన్య పద్ధతులు, కొబ్బరి పొట్టు కంపోస్టింగ్, కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కు యంత్రం) సంబంధించిన వీడియోలు యూట్యూబ్‌కి లింక్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు 41,000 పైబడి డౌన్‌లోడ్ నమోదయ్యాయి.

వ్యవసాయ వాతావరణం యాప్ : ఈ అప్లికేషన్‌ను ఎ.ఐ.సి.ఆర్.పి.ఎ.ఎమ్., అనంతపురం వారు రూపొందించారు. ఈ యాప్ ద్వారా వాతావరణ సమాచారాన్ని అన్ని జిల్లాల వారు పొందవచ్చు. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు 2000 పైబడి డౌన్‌లోడ్స్ నమోదయ్యాయి.

9. ప్రింట్ మీడియం ద్వారా 'వ్యవసాయ సూచనలు' :

రైతులకు సమాచారం అందించడంలో వార్తాపత్రికలు మరియు దిన పత్రికలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి. పలు పత్రికలు కేవలం వ్యవసాయం వాటి అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు, సూచనలు మరియు సలహాలతో రైతులకు మరింత చేరువైనాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి వ్యవసాయం, పాడిపంటలు, సేద్యఫలం, రైతు నేస్తం, అగ్రిక్లినిక్, రైతు వాణి, రైతు లోకం, స్వర్ణ సేద్యం, చైతన్య సేద్యం, ఏరువాక మరియు కృషి జాగరణ్ ఇందులో ముఖ్యమైనవి. అన్ని దినపత్రికలలోనూ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారానికి ప్రత్యేక పేజీలను కేటాయిస్తున్నారు.

10. సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా విస్తరణ : (Extension Through Social Media)

ఈ మధ్యకాలంలో బాగా విస్తృమవుతున్న సాంఘిక ప్రసార మాధ్యమాలను (Social Media) విస్తృతంగా ఉపయోగించుకొని సాంకేతిక అంశాలను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడంలో కూడా ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చాలా ముందుంది. వీటిలో ప్రధానమైనవి.

- **బ్లాగర్**
- **యూట్యూబ్ ఛానల్**
- **సామాజిక మాధ్యమాల గ్రూపులు**

బ్లాగర్ : ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తరుపున ఎలక్ట్రానిక్ వింగ్ వారు ఒక బ్లాగర్ (www.angrauew.blogspot.in) ను ఆచార్యఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ ఉపకులపతి 13 అక్టోబరు 2017 తేదీన ప్రారంభించారు. అంతేకాక సోమవారం ఆల్ ఇండియా రేడియో వ్యవసాయ పాఠశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొని యూనివర్శిటీ శాస్త్రవేత్తలు మరియు అంశంపై సమాచారం, సప్తగిరి ఛానల్‌లో పసిడి పంటల ప్రత్యక్ష కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొనే తేది మరియు అంశంపై కూడా సమాచారం పొందుపరచడం జరుగుతుంది.

యూట్యూబ్ ఛానల్ : వ్యవసాయం విశ్వవిద్యాలయం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అభివృద్ధి చేసిన వివిధ వీడియోలను వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము యూట్యూబ్ ఛానల్ (ఆంగ్రూ, లాం, గుంటూరు) లో పొందుపరచడం జరిగింది. దీనిని కూడా ఆచార్య ఎన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి గారు 13 అక్టోబరు 2017న ప్రారంభించారు. (URL : www.youtube.com/@angrau_ap/videos) లేదా ANGRAU, YouTube Channel లేదా ANGRAU, Guntur అని యూట్యూబ్‌లో టైపు చేయవచ్చు. ఈ ఛానల్‌లో వివిధ పంటలపై విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వీడియో రూపంలో అందించడంతో పాటు, వివిధ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ కార్యక్రమాలను కూడా అందులో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. ఈ ఛానల్‌కి సుమారు 8000 మంది సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు 100 కి పైగా వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేయటం జరిగినది.

టెలిగ్రామ్ ఆప్ గ్రూపులు : ఈ మధ్య వ్యవసాయ సమాచార వ్యాప్తికి వివిధ సంస్థలు 'టెలిగ్రామ్' ఆప్ గ్రూపులు కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.

వాట్సప్ గ్రూపులు : వివిధ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల మరియు ఏరువాక కేంద్రాలు కూడా పంటల వారీగా, ప్రాంతాల వారిగా రైతులతో వాట్సప్ గ్రూపులు తయారు చేసి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీ చేస్తున్నారు.

11. ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం :

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విస్తరణ కేంద్రాలు 'రిలయెన్స్ ఫౌండేషన్' వారితో కలిసి సంయుక్తంగా నాలెడ్జ్ ఆన్ వీల్స్, డయల్ అవుట్, సిటీ కేబుల్‌లో ఫోన్-ఇన్-లైవ్ మరియు వివిధ శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా రైతులకు సేవలందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాలో రైతులకు సేవలను అందిస్తున్నారు.

12. పోర్టల్స్ మరియు వెబ్ సైట్‌లు :

సెల్ ఫోన్‌ల వినియోగం ద్వారానే కాకుండా వివిధ సంస్థలు పోర్టల్స్ మరియు వెబ్ సైట్‌ల ద్వారా రైతులకు తగిన సమాచారాన్ని అందచేయడానికి కృషి చేస్తున్నాయి.

www. icar.org.in	www. angrau.ac.in
www.apagrisnet.gov.in	www. farmer.gov.in
www. kisansarathi.in	www. agropedia.iitk.ac.in

www.enam.gov.in	www.tnau.ac.in
www.rkmp.co.in.	www.apeda.gov.in
www.kvk.icar.gov.in	www.mkisan.gov.in

13. రైతు సేవా కేంద్రాలతో అనుసంధానం :

విశ్వవిద్యాలయం యొక్క కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ఏరువాక కేంద్రాలు, వివిధ రైతు సేవా కేంద్రాలలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల ఉద్యోగులను వాట్సప్ మరియు టెలిగ్రాం అప్స్ ద్వారా గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. ఈ ఉద్యోగులతో తరచుగా వివిధ పంటలలో సమస్యలపై నివారణా చర్యలు, వాతావరణ, పంటల ధరలు మొదలగు వాటిపై సమాచారాన్ని ఈ గ్రూపులతో పంచుకోవడం జరుగుతుంది.

ఆర్.ఎస్.కె. – డిజిటల్ కియోస్క్ :

రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి రైతు సేవా కేంద్రం (ఆర్.ఎస్.కె.) లో ఒక డిజిటల్ కియోస్క్ ఏర్పాటు చేయబడింది. దీని ద్వారా చిట్ట చివర ఉన్న గ్రామ రైతులకు కూడా వ్యవసాయ సమాచారం సులువుగా చేరుతుంది. ఈ కియోస్క్ ద్వారా రైతులకు మార్కెట్ ధరలు, వాతావరణ ముందస్తు సమాచారం, వ్యవసాయ సమాచారం, ఇ–మ్యాగ్‌జైన్, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో ఉన్న పథకాల సమాచారం, పరీక్ష చేసే ల్యాబ్‌ల సమాచారం అందజేయబడుతుంది. వీటితో పాటు ఈ కియోస్క్ ద్వారా రైతులు తమకు కావలసిన ముడిపదార్థాల ఇండెంట్స్ కూడా తెలియజేయవచ్చు.

పాడిపంటలు ఛానెల్ : వ్యవసాయ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ పాడిపంటలు ఛానెల్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా వ్యవసాయ సమాచారం మరియు వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ శాఖలలో ఉన్న వివిధ సంక్షేమ పథకాల సమాచారం ఆర్.ఎస్.కె.లో ఉన్న స్మార్ట్ టి.వి. ల ద్వారా రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయబడుతుంది. రైతుల అభిప్రాయాలను సేకరించి వాటి ప్రకారం కూడా పాడిపంటలు ఛానెల్‌లో ప్రచారం చేసే కార్యక్రమాలను ప్రణాళిక చేపట్టడం జరుగుతుంది. విశ్వవిద్యాలయం యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఛానెల్ ద్వారా రైతులకు అప్పటి పరిస్థితులకు తగిన విధంగా పంటలలో అవసరమైన వ్యవసాయ సమాచారాన్ని అందజేస్తుంటారు. ఈ పాడిపంటలు ఛానెల్ ద్వారా ప్రతి రోజు ఉదయం 11.00 గం. కి మరియు సాయంత్రం 4:00 గం. కి సమాచారం ప్రసారం చేయబడుతుంది.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా :

ప్రధాన వ్యవసాయ సమాచార అధికారి, వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం,
శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ), ఎన్.ఇ.పి. కోఆర్డినేటర్, పరిపాలనా భవనం, లాం మరియు
శాస్త్రవేత్త (వ్యవసాయ విస్తరణ), వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం, లాం, గుంటూరు.
ఫోన్ నెం : 95538 43809, 93944 50766, 94910 69037

సామాజిక విజ్ఞానం

ఆహారం - ఆరోగ్యం

మన ఆరోగ్యం మనం తినే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన సమతుల ఆహారం తీసుకుంటే మన శరీరం పెరుగుదలే కాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తి మరియు మానసిక పెరుగుదల కూడా బాగుంటాయి. మన ఆహారంలో తగినంత పోషక విలువలు లేనట్లయితే పోషక ఆహార లోపం వలన వచ్చే చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. రక్త హీనత, హార్మోను సమస్యలు, మధుమేహం, గుండె జబ్బు, స్థూలకాయం వంటివి పోషకాహార లోపంతో ముడిపడి ఉంటాయి.

ఆహారం ద్వారా మనకు లభించే పోషకాలు ఏమనగా పిండి పదార్థాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు, నీరు మరియు పీచు పదార్థము. పోషకాహారం అనగా శరీరానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలన్నీ తగు మోతాదులో అందించే ఆహారం అని అర్థం. ఆహారంలో పోషక పదార్థాలు తగు పాళ్ళల్లో లేనప్పుడు మనం అనారోగ్యానికి గురవుతాము. పెరుగుతున్న జనాభా, ఆధునీకరణ, ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి, వీటి వలన మన ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఆహారంలో సాంప్రదాయపు పద్ధతులను మానుకొని, మార్కెట్‌లో వచ్చే కొత్త ఆహార పదార్థాలను సరైన అవగాహన లేకుండా కొని తినటం వలన ఎన్నో దీర్ఘకాలిక రోగాలకు గురవుతున్నాము.

ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వారి జాతీయ పోషణ సంస్థ (యన్.ఐ.యన్.) వారు కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు. ఈ ఆహార మార్గదర్శకాలు మనం చేసే పనిని బట్టి, లింగభేదమును బట్టి ప్రత్యేక దశలో వున్న గర్భిణీ స్త్రీ, బాలింతలు, పిల్లలు, యుక్తవయస్కులు తగిన పరిమాణంలో ఆహారం తీసుకొనుటకు సహాయపడతాయి.

తృణధాన్యాలు, చిరు ధాన్యాలు, పప్పు దినుసులు, పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేప, నూనె, ఇతర క్రొవ్వు పదార్థాలు, నూనె గింజలు అని వివిధ రకాలుగా ఆహార పదార్థాలు విభజించబడ్డాయి. ఆహారంలో వైవిధ్యం కోసం పైన తెలిపిన వాటిలో కనీసం ఐదు రకాలు ప్రతిరోజు తినడానికి ఎంపిక చేసుకోవాలి. అలా చేస్తే అన్నీ పోషకాలు మన శరీరానికి అందుతాయి. చిరుధాన్యాలు మనకు కావలసిన కాల్షియం, ఇనుము, పీచు పదార్థాలను విసృతంగా అందిస్తాయి. తాజాగా వున్న పాలు, కూరగాయలు తినడం ద్వారా క్యాన్సర్ వంటి రోగాలను రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చును. ఆకు కూరలలో వున్న విటమిన్లు మరియు ఖనిజ లవణాలు మెరిసే శరీరాన్ని, చక్కని కంటి చూపుని, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఇస్తాయి.

గర్భిణీ స్త్రీ మరియు బాలింతలకు అదనపు ఆహారం అవసరం. తృణధాన్యాలు, మొలకెత్తిన పప్పు గింజలు, పాలు, ఆకు కూరలు, గుడ్లు తినడం ద్వారా కావలసిన శక్తి, ఫోలిక్ ఆమ్లం, ఇనుము, పీచు పదార్థం లభిస్తాయి. సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం వలన గర్భిణీ స్త్రీలలో వచ్చే మధుమేహం, మలబద్ధకం, టాక్సిమియా, వంటి సమస్యలను అరికట్టవచ్చు.

పెరిగే పిల్లలకు కాల్షియం, ఇనుము, అదనపు శక్తి అవసరం. వీటి కొరకు పాలు, పెరుగు, పండ్లు, నూనె గింజలు తినే అలవాటు చేసుకోవాలి. యుక్త వయసులో వున్న పిల్లలు చిరుతిండ్లు తినడానికి ఇష్టపడతారు. చదువులో వున్న ఒత్తిడి వలన తినటానికి తగిన సమయం కేటాయించలేక పోతారు. ఇంటి బయట దొరికే చిరు తిండ్లు తినే అలవాటు వలన టైఫాయిడ్, విరేచనాలు ఇతర జీర్ణకోశ సంబంధిత వ్యాధులకు గురయ్యే అవకాశం వుంటుంది.

చిన్న పిల్లల పోషక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే మన దేశంలో రెండు రకాల స్థాయిలు కనిపిస్తాయి. ఒకవైపు కావలసిన పోషక ఆహారం అందక శక్తిహీనంగా వయసుకు తగిన ఎదుగుదల లేకుండా వున్న పిల్లలు కనిపిస్తారు. మరోవైపు పోషకాలు లేని ఆహారం (జంక్‌ఫుడ్) తినుట ఎక్కువై శరీర వ్యాయామం లేక స్థూల కాయంతో బాధపడే పిల్లలను చూస్తూ ఉంటాము. వీటిని అరికట్టాలంటే సమతుల ఆహారం పట్ల పిల్లలకి, తల్లులకు అవగాహన కల్పించాలి.

పట్టిక - 1 వివిధ వయస్సుల వారికి ఒక రోజుకు కావలసిన సమతులాహారం (గ్రాముల్లో)

వరుస సంఖ్య	ఆహార పదార్థాలు	పసి పిల్లలు (6-12) నెలలు	చిన్నపిల్లలు							16-18 సం॥లు		పురుషులు			స్త్రీలు		
			1-3 సం॥	4-6 సం॥	7-9 సం॥	10-12 సం॥లు		13-16 సం॥లు		బాలికలు	బాలురు	తేలిక పని	సాధారణ పని	బరువు పని	తేలిక పని	సాధారణ పని	బరువు పని
						బాలికల	బాలురు	బాలికలు	బాలురు								
1.	ధాన్యాలు మరియు చిరు ధాన్యాలు (గ్రా.)	15	60	120	180	240	300	330	420	330	450	375	400	450	330	490	600
2.	పప్పుధాన్యాలు (గ్రా.)	7.5	30	30	60	60	60	60	75	75	90	60	80	90	75	90	120
3.	పాలు మరియు పదార్థాలు (మి.లీ.)		500	500	500	500	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300	300
4.	దుంపకూరలు(గ్రా.)	50	50	100	100	100	100	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200
5.	ఆకుకూరలు (గ్రా.)	25	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	ఇతర కూరగాయలు (గ్రా.)	25	50	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7.	పండ్లు (గ్రా.)	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	చక్కెర లేక బెల్లం (గ్రా.)	10	15	20	20	30	30	25	20	25	30	20	40	40	30	45	55
9.	నూనె.క్రొవ్వు పదార్థాలు (గ్రా.)	20	25	25	30	35	35	40	45	35	50	25	30	30	25	30	40

మూలం : జాతీయ పోషకాహారం సంస్థ (2011)

పైన తెలుపబడిన ఆహార మార్గదర్శకాలను విరివిగా అందరికీ అందిస్తే మంచి ఆహారపు అలవాట్లను పాటించి వ్యక్తిగత, కుటుంబ, దేశ పురోగతికి దోహదపడతారు.

తేలిక పనులు : ఇంటి పనులు, యంత్రాలతో చేయు వ్యవసాయ పనులు, పోస్టుమాన్, టీచరు, టైలరు, గృహిణిలు, ఉద్యోగస్తులు వంట పనులు చేసేవారు.

సాధారణ పనులు : వ్యవసాయ కూలీలు, బుట్టలు అల్లేవారు, మత్స్యకారులు, తాపీ మేస్త్రులు మొదలగు పనులు చేసేవారు. **బరువు పనులు :** రాళ్ళు కొట్టేవారు, గనులలో పనిచేసే వారు.

భారతీయులకు సిఫార్సు చేసిన పోషకాల పట్టిక :

సమూహం	వివరాలు	బరువు (kg)	శక్తి (Kcal/d)	ప్రోటీన్ (g/d)	కొవ్వు (g/d)	కాల్షియం (mg/d)	ఐరన్ (mg/d)	విటమిన్ ఎ		థయామిన్ (mg/d)	రిబోఫ్లావిన్ (mg/d)	నియాసిన్ (mg/d)	పెరిడాక్సిన్ (mg/d)	ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం (mg/d)	ఆహార ఫోలేట్ (mg/d)	విటమిన్ బి 12 (mg/d)	మెగ్నీషియం (mg/d)	జింక్ (mg/d)
								రెటినోల్	కెరోటిన్									
పురుషులు	తేలిక పని	60	2320	60	25	600	17	600	4800	1.2	1.4	16	2	40	200	1	340	12
	సాధారణ పని		2730		30					1.4	1.6	18						
	బరువు పని		3490		40					1.7	2.1	21						
స్త్రీలు	తేలిక పని	55	1900	55	20	600	21	600	4800	1	1.1	12	2	40	200	1	310	10
	సాధారణ పని		2230		25					1.1	1.3	14						
	బరువు పని		2850		30					1.4	1.7	16						
	గర్భిణి		+350	+23	30	1200	35	800	6400	+0.2	+0.3	+2	2.5	60	500	1.2		12
	బాలింత																	
	0-6 నెలలు		+600	+19	30	1200	21	950	7600	+0.3	+0.4	+4	-	80	300	1.5		
	6-12 నెలలు		+520	+13	30					+0.2	+0.3	+3	2.5					
పసి పిల్లలు	0-6 నెలలు	5.4	92 *	1.16 **	-	500	46 ***	350	-	0.2	0.3	710 ***	0.1	25	25	0.2	30	-
	6-12 నెలలు	8.4	80 *	1.69**	19		5		2800	0.3	0.4	650 ***	0.4				45	-
చిన్న పిల్లలు	1-3 సం॥	12.9	1060	16.7	27	600	9	400	3200	0.5	0.6	8	0.9	40	80	0.2-1	50	5
	4-6 సం॥	18	1350	20.1	25		13			0.7	0.8	11	0.9		100		70	7
	7-9 సం॥	25.1	1690	29.5	30		16	600	4800	0.8	1	13	1.6		120		100	8
బాలురు	10-12 సం॥	34.3	2190	39.9	35	800	21	600	4800	1.1	1.3	15	1.6	40	140	0.2-1	120	9
బాలికలు	10-12 సం॥	35	2010	40.4	35		27			1	1.2	13					160	9
బాలురు	13-15 సం॥	47.6	2750	54.3	45		32			1.4	1.6	16	2		150		165	11
బాలికలు	13-15 సం॥	46.6	2330	51.9	40		27			1.2	1.4	14					210	11
బాలురు	16-17 సం॥	55.4	3020	61.5	50		28			1.5	1.8	17			200		195	12
బాలికలు	16-17 సం॥	52.1	2440	55.5	35		26			1	1.2	14					235	12

మూలం : ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, 2010 * KCal/kg/d **g/kg/d ***mg/kg/d

ఆహార పదార్థాల్లోని పోషక విలువలు – వాటిలోపం వలన కలిగే నష్టాలు

పోషక పదార్థం	ఉపయోగాలు	లభ్యమయ్యే ఆహార పదార్థాలు	లోపలక్షణాలు
పిండి పదార్థం	శక్తి జనకం	ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, చెక్కర, బెల్లం, దుంపకూరలు	బరువు తగ్గుట, నీరసం
మాంస కృత్తులు	శరీర నిర్మాణానికి, పెరుగుదలకు,	పప్పులు, నూనె గింజలు, మాంసం, గ్రుడ్లు, చేపలు, పాలు, పెరుగు	బరువు తగ్గుట, పెరుగుదల తగ్గుట, కండరాలు కరగటం, శరీరంలో నీరు పట్టడం, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గటం
క్రొవ్వు పదార్థాలు	శక్తిని అత్యధికంగా అందిస్తాయి. చర్మ మృదుత్వం	వివిధ నూనెలు, నెయ్యి, వెన్న	బరువు తగ్గుట, గరుకు చర్మం
<u>విటమిన్లు</u> 1) విటమిన్ 'ఎ'	మంచి కంటి చూపు, చర్మ మృదుత్వం, శరీర పెరుగుదల, రోగ నిరోధక శక్తి	నెయ్యి, పాలు, పెరుగు, గ్రుడ్డు లో పచ్చసొన, కాలేయం, ఆకు కూరలు, బొప్పాయి, మామిడి, కమలా, క్యారెట్	రేచికటి, కంటిచూపులోపం, గ్రుడ్డి తనం, తరచు అనారోగ్యం, గరుకు చర్మం నరాల బలహీనత
2) 'బి' కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు	నరాల బలానికి, జీర్ణకోశ ఆరోగ్యానికి	ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, పాలు పాలపదార్థాలు, పప్పులు, ఆకు కూరలు, చిక్కుళ్లు, మాంసం, గింజ ధాన్యాలు	పెదవుల చివరలు పగులుట, నోటిపూత, ఆకలి తగ్గుట, రక్తహీనత
3) విటమిన్ 'సి'	పళ్ళ చిగుళ్ళకు, ఎముకల పుష్టికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి	జామ, నిమ్మ, నారింజ, బత్తాయి, ఉసిరి,మొలకెత్తిన పప్పుదినుసులు	పళ్ల చిగుర్లు ఉబ్బి రక్తం కారడం చర్మపు పుండ్లు, ఆకలి తగ్గుట
4) విటమిన్ 'డి'	ఎముకలు నిర్మాణానికి, మరియు గట్టి దనానికి	పాలు, కాలేయం, సూర్యరశ్మి	రికెట్స్ వ్యాధి, ఎముకల బలహీనత, పెరుగుదల తగ్గుట
<u>ఖనిజ లవణాలు</u> 1) కాల్షియం	ఎముకలు, పళ్ళ ఆరోగ్యానికి	పాలు, చేపలు, ముడిపప్పులు, రాగులు, ఆకుకూరలు	పెరుగుదల తగ్గటం, ఎముకల గట్టిదనం తగ్గటం, ఎముకల గుల్ల బారటం, విరగటం.
2) ఇనుము	రక్తపుష్టికి	మాంసం, కాలేయం, గ్రుడ్లు, సజ్జలు, రాగులు, ఆకుకూరలు, దంపుడు అటుకులు, ఖర్జూరం, ఎండు ద్రాక్ష, సపోట	రక్తహీనత, పనిచేయలేనని నిస్సత్తువ, అబార్షన్లు
పీచు పదార్థం	రక్తంలోని కొలెస్ట్రాల్ చక్కెరల నియంత్రణ, జీర్ణకోశ ఆరోగ్యం మరియు క్యాన్సర్ రాకుండా	ముడి ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, ముడి పప్పులు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు	మలబద్ధకం, క్యాన్సర్‌కు దారితీయగల ప్రమాదం

చంటి పిల్లలకు అనుబంధ ఆహారం :

సంవత్సరంలోపు పిల్లలకు తల్లిపాలను మించిన ఆహారం వేరేలేదు. కాని 3–4 నెలల తరువాత బిడ్డలో పెరుగుదల అధికంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆరు నెలల తరువాత తల్లిపాలు మాత్రమే పోషకావసరాలు సమకూర్చలేవు. ఆరుమాసాల నుండి పిల్లలకు తల్లిపాలతోపాటు టమోటా, కమలా, బత్తాయి వంటి పండ్ల రసాలు ఇవ్వాలి. అలాగే ఉడికించిన కాయగూరల నుండి రసాలు, పప్పుతేట, గంజి వంటి ద్రవపదార్థాలు త్రాగించటం వలన జలుబు మొదలైనవి రాకుండా నివారించగల విటమినులు, ఇనుము వంటి ఖనిజలవణాలు లభ్యమవుతాయి. ఆరుమాసాల నుండి పండ్లరసాలతో పాటు మెత్తగా ఉడికించిన ధాన్యాలను, పప్పులను, చిక్కటి గంజిని, ఉడికించిన కూరగాయలను మరియు అరటి, బొప్పాయి, ఆపిల్, మామిడి వంటి పండ్లను గుజ్జుగా చేసి తినిపించాలి. గుడ్డులోని పచ్చసొన కూడ చంటి పిల్లలకు పెట్టవచ్చు.

ఆరు–ఏడు నెలల పిల్లలకు ధాన్యం, పప్పు, చక్కెర కలిపి చేసిన మిశ్రమ అనుబంధ ఆహారాన్నివ్వాలి. అనుబంధ ఆహారం మిశ్రమ తయారీకి గోధుమ, బియ్యం మరియు చిరుధాన్యాలను వాడవచ్చు. నానబెట్టి, మూటకట్టి మొలకతెప్పించి, ఆరబెట్టి విసిరిన ధాన్యాల పొడిలో పోషక విలువలు అధికంగా ఉంటాయి. అనుబంధ ఆహార మిశ్రమాన్ని ఇంట్లో చేయటానికి కావలసినవి: పొడిచేసిన పెసరపప్పు/ పుట్నాలపప్పు, 1/2 వంతు వేయించి పొట్టుతీసి పొడిచేసిన వేరుశనగపప్పు, 2 వంతులు పొడిచేసిన చక్కర లేదా బెల్లం, ఉప్పు సరిపడినంత.

9–10 నెలల నుండి మెత్తగా ఉడికించిన కిచిడీ, నానబెట్టిన రొట్టె, అటుకులు, ఇడ్లీ, ఉడికించిన చేప లేక మాంసం మొదలైనవి తాలింపు, కారం వాడకుండా తయారు చేసి తినిపించాలి. 11 నుండి 12 నెలల్లో పెద్దలు తీసుకునే ఆహారాన్ని, కొంచెం మెత్తగా కారం, మసాలాలు వంటివి లేకుండా పెట్టాలి. అన్ని రకాల ఆహారపదార్థాలను పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి.

వ్యాధి నివారణలో ఆహారం ప్రాముఖ్యత : వ్యాధి సమయంలో ఆహారంలో మార్పు అవసరమా ?

ఆరోగ్యానికి మూలసూత్రం ఆహారం. ఆరోగ్యవంతుల జీర్ణకోశం, వారి శరీరావయవాలు మంచి స్థితిలో ఉండటం వలన, వారు ప్రతిరోజు తినే ఆహారాన్ని జీర్ణించుకోగలరు. కాని ఏదైనా అనారోగ్య పరిస్థితిననుసరించి ముఖ్యంగా జ్వరం, విరోచనాలు, మధుమేహం లాంటివి వున్నప్పుడు శరీర స్థితి, అవయవాల పరిస్థితి కొంత మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. అంతే కాకుండా వ్యాధి పరిస్థితిని బట్టి శరీరానికి కావలసిన పోషక పదార్థాల పరిమాణంలో కొంత మార్పు వుంటుంది. ఒక్కోరకమైన వ్యాధికి ఒక్కొక్కరకమైన ఆహారాన్ని మనం ఇవ్వవలసి వుంటుంది. సాధారణంగా రోగి పరిస్థితిని బట్టి ఆహారంలో మార్పు చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సాధారణంగా వ్యాధిగ్రస్తుల ఆహారంలో ఇచ్చే పదార్థాల మార్పుతోపాటు వాటి పరిమాణం, రూపంలో కూడా మనం మార్పు చేస్తాం. వ్యాధి ఏమైనప్పటికి వ్యాధి నివారణలో కేవలం డాక్టర్లు ఇచ్చే మందులే కాక ఆహారం కూడా ప్రముఖపాత్ర వహిస్తుంది.

రోగికి ఆహారాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలను గమనించాలి : 1. వ్యాధిగ్రస్తుని శరీర పరిస్థితి, రోగ లక్షణాలు, 2. రోగికి ఇచ్చే పోషక పదార్థాలు పరిమాణం, 3. రోగి జీర్ణశక్తి, 4. రోగి ఆహార ఇష్టాఇష్టాలు

వివిధ వ్యాధుల సమయంలో ఆహారంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

విరోచనాలు – ఆహారం

విరోచనాలు అనేవి ఎన్నో కారణాల వలన చిన్నపిల్లలోనే కాకుండా పెద్ద వారిలో కూడా వస్తాయి. ఈ విరోచనాల విషయంలో మనం వెంటనే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే శరీరంలోని నీరు నష్టపోయి ప్రాణాపాయం జరిగేందుకు అవకాశం వుంది.

ఆహారం విషయంలో రోగిని పస్తులు ఉంచరాదు. శరీరంలో నీరు నష్టపోకుండా పలుచని ద్రవాలను గంట గంటకోసారి లేదా విరోచనం అయిన వెంటనే ఉప్పు, చక్కెరతో ద్రవాన్ని తయారుచేసి ఇవ్వాలి. ఈ ద్రవాన్ని జీవరక్షక ద్రవం లేదా ఓ.ఆర్.యస్ అంటాం. ఇది ఎలా తయారు చెయ్యాలి అంటే.

కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు – 200 మి.లీ; చక్కెర – అరచేయి మొత్తం / గుప్పెడు; ఉప్పు – చిటికెడు కావాలి.

ఈ ద్రవం ఇస్తూ డాక్టరు గారి సలహా మేరకు మందులు వాడాలి. వీటితో పాటు రోగి పరిస్థితి మెరుగుపరిచేందుకు, పండ్లరసాలు, కొబ్బరి నీళ్ళు, పలుచని మజ్జిగ, పలుచగా కాసిన జావ సమపాళ్ళలో నీళ్ళు కలిపి ఇవ్వాలి. మరీ చల్లగాను, మరి వేడిగాను వున్న పానీయాలను ఇవ్వరాదు. కూల్‌డ్రింక్సు అస్సలు ఇవ్వకూడదు. విరోచనాలు తగ్గు ముఖం పట్టాక తరువాత రోగి పరిస్థితిని మెరుగుపరచి మామూలు పరిస్థితికి తెచ్చేందుకు ఆహారంలో మార్పులు చేయవలసి వుంటుంది.

- పీచు పదార్థాలు, గింజలు, మసాలా దినుసులు లేకుండా కారం లేని తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని కొద్ది రోజులు రోగికి ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా మెత్తగా ఉడికించిన కూరగాయలు అన్నం ఇవ్వడం మంచిది. క్రొవ్వు పదార్థాలు అరిగించుకొనే శక్తి ఉండదు కాబట్టి వేపుడుకూరలు, నూనె వస్తువులు ఇవ్వకుండా ఉంటే మంచిది. శాఖాహారులు పప్పుదినుసులు, పాలు మరియు మజ్జిగ విరివిగా వాడాలి.

జ్వరం

- జ్వరం వచ్చినప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగి జీవనక్రియ అతి వేగంగా జరగడం వలన పోషకపదార్థాల అవసరం పెరుగుతుంది. తదనుగుణంగా మనం ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తపడాలి.
- జ్వరంతో బాధపడేవారి ఆహారంలో మనం కొన్ని మార్పులు చేయాలి. జ్వరం తీవ్రంగా వున్నప్పుడు డాక్టరు గారి సలహా మేరకు మందులతో పాటు సరియైన ద్రవ పదార్థాలను ఇస్తూ ఉండాలి. ద్రవ పదార్థాలను కూడా తక్కువ పరిమాణంలో రెండు, మూడు గంటల కొకసారి ఇస్తూ వుండాలి.
- రోజు మొత్తంలో ఓ లీటరు పాలు లేదా పాలతోపాటు ఇతర ద్రవాహారం అంటే జావ, పలుచటి పళ్ళ రసాలు, కూరగాయల రసం, ఎముకల సూప్ మసాలా లేకుండా ఇవ్వవచ్చు. దుంపలను మెత్తగా ఉడికించి ఇవ్వవచ్చు. పై చెక్కు తీయని కాయగూరలు ఇవ్వకూడదు. పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా వున్న కూరగాయలు తీసుకోరాదు.
- జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిన తరువాత, రెండు మూడు రోజుల వరకు కారం, మసాలా లేని ఆహారం ఇవ్వాలి. ఆహారంతో ధాన్యాలు, చక్కెర, దుంపలు, పండ్లు, మాంసకృత్తులు అధికంగా వున్న పప్పుదినుసులు, పాలు, గుడ్లు, మెత్తగా ఉడికించిన కైమా మొ॥గు విరివిగా వాడాలి.

అల్సరు

- కొంత మంది పొట్టలో నులుముతున్నట్లు నొప్పి, మంటతోను బాధపడుతూ ఉంటారు. ఈ నొప్పితో పాటు కండరాలు బిగపట్టడం, గుండెల్లో మంట, వాంతులు, విరోచనాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ నొప్పి సాధారణ

భోజనానికి ముందుగాని, భోజనం తరువాత కాని వస్తూ ఉంటుంది. దీనిని అల్సరు లేదా కడుపులో పుండు అంటాం. ఇది అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రమాదంగా మారవచ్చు.

- అల్సరు సాధారణంగా ఒక బాక్టీరియా వలన వస్తున్నట్లు కనుక్కోవడం జరిగింది. డాక్టరు గారి సలహాతోపాటు ఆహారం విషయంలో నియమాలు పాటించడం వలన అల్సర్లు త్వరగా తగ్గుతాయి. అల్సర్లు తగ్గాలంటే శారీరక, మానసిక విశ్రాంతి అవసరం. మత్తు పానీయాలు, పొగాకు వాడకం పూర్తిగా మానివేయాలి.

ఈ అల్సరు తగ్గాలంటే ఆహారం విషయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- ముఖ్యంగా కాఫీ, టీ, బాగా కారం, మసాలా వున్న వంటకాలు, ఎక్కువ నూనెలతో చేసిన పదార్థాలు, వేపుడు కూరలు, ఊరగాయలు, పచ్చళ్ళు, మానివేయాలి. ఈ అల్సర్లు తగ్గిన తరువాత కూడా ప్రతి ఒక్కరు తమకు ఏ ఆహారం తింటే సమస్య నెమ్మళించినట్లు ఉంటుందో ఆ ఆహారం తీసుకోవడం అవసరం. మరీ వేడిగా మరీ చల్లగా వున్న ఆహారం తీసుకోరాదు. తినదలుచుకున్న ఆహారాన్ని రోజంతటిలో కొంచెం, కొంచెంగా తీసుకోవాలి. అధికమొత్తంలో నీరు, పీచు పదార్థాలు, అరటిపళ్ళు తీసుకోవాలి. కూల్‌డ్రింక్స్ మానివేయాలి. ఎక్కువ సమయం కడుపు ఖాళీగా ఉంచరాదు, మానసిక విశ్రాంతి, సరియైన నిద్ర కూడా అల్సర్లు తగ్గించేందుకు దోహదం చేస్తాయి.

మలబద్ధకం

- మనలో నూటికి 10–15% వ్యక్తులు మలబద్ధకంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. వారానికి నాలుగు రోజులు లేదా ఐదు రోజులు మల విసర్జన జరిగితే దాని గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు, అంతకన్నా తక్కువసార్లు కనుక మల విసర్జన జరిగితే లేదా అది కూడా సమస్యాత్మకంగా లేదా కష్టంగా జరిగితే దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు.
- మలబద్ధకం నివారణ కోసం మనం తప్పనిసరిగా నియమాలు పాటించాలి. ముందుగా మనం తీసుకొనే ఆహారం సమతులాహారం అయిఉండాలి. మల విసర్జన ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి అయ్యేలా ప్రయత్నించాలి నీళ్ళు చాలా ఎక్కువగా తాగాలి. ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీరు తాగాలి. ఇక ఆహారం విషయంలోకి వస్తే ఎక్కువ పీచు వున్న కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వాడాలి. క్రొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా వున్న వేపుళ్ళు, పలావు, మాంసాహారం మానివేసి తేలికగా, జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. పండ్లరసాలకు బదులుగా పండ్లను తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి మొలకెత్తించిన గింజలు, పచ్చికూరగాయలు, అరటిపండు వంటివి తినాలి.

మధుమేహం

- మనం తీసుకొనే ఏ ఆహారం అయినా శరీరంలోనికి పోయిన తరువాత అధిక మొత్తం 'గ్లూకోజ్'గా మారి మన శరీరంలో వివిధ పనులకు ఇంధనం అవుతుంది. పొట్ట వెనుక మనకు పాంక్రియాస్ అనే గ్రంధి వుండి, ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్‌ను ఉత్పత్తి చేసి గ్లూకోజ్‌ను శరీర కణజాలంలోనికి పంపుతూ, గ్లూకోజ్ వివిధ పనులకు ఉపయోగపడేలా చేస్తుంది.
- కాని ఈ ఇన్సులిన్ తక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి అయినపుడు, అస్సలు ఉత్పత్తి లేకపోయినపుడు, తయారైన ఇన్సులిన్ ఉపయోగపడనపుడు, మనం తీసుకున్న ఆహారం గ్లూకోజ్ రూపంలోనే రక్తంలో ఉండటం వలన మనకు మధుమేహ వ్యాధి వస్తుంది.

ఎక్కువ బరువు కోల్పోవడం, త్వరగా అలసిపోవడం, గాయాలు, పుండ్లు త్వరగా మానకపోవడం, అరికాలి మంటలు ఈ లక్షణాలు అనిపించినపుడు మనం రక్త పరీక్ష, మూత్ర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతుని రక్తంలో చక్కెర శాతం 80–100 మి.గ్రా./డి.ఎల్ వుంటుంది. (ఏమీ తినకుండా పరగడుపున) భోజనము చేసిన తరువాత 110–180 మి.గ్రా./డి.ఎల్. కాని మధుమేహవ్యాధి గ్రస్తులలో 180–250 మి.గ్రా./డి.ఎల్ వరకు పెరుగుతుంది.

మధుమేహ వ్యాధిని చాలా చక్కగా అదుపులో ఉంచవచ్చు. ఆహారం వ్యాయామం, మందులు ఈ వ్యాధిని అదుపులో వుంచుతాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆహార నియమాలు పాటించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనాఉంది.

ఆహారం సమతుల ఆహారంగా ఉండాలి. ఆహారంలో క్రొవ్వు పదార్థాలను, ధాన్యపు పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తూ, పీచు పదార్థం మోతాదు పెంచాలి. క్రొవ్వు పదార్థాలైన వెన్న, నెయ్యి, మీగడలను పూర్తిగా తగ్గించాలి, నూనెలు ముఖ్యంగా డాల్డా, కొబ్బరి నూనె వాడకం మానివేయాలి. దాని బదులు వేరుశనగనూనె, కుసుమనూనె, ప్రొద్దుతిరుగుడు నూనెను వాడవచ్చు. ఈ నూనెలను కూడా రోజు మొత్తానికి ఒక మనిషికి సగటున 4,5 టీస్పూనులు అంటే 20–25 గ్రాముల వరకు వాడవచ్చు. క్రొవ్వు శాతం ఎక్కువగా వుండు పాలను వాడకూడదు.

పప్పుధాన్యాలను సుమారు 80–100 గ్రా. చొప్పున ప్రతిరోజు వాడవచ్చు. ముఖ్యంగా పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే దుంపకూరలైన బంగాళదుంపలు, చేమ, కందలాంటివి వాడకూడదు. పండ్లు వాడకంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. సీతాఫలం, సపోట, అరటి, యాపిల్ మరియు మామిడి పళ్ళను తగ్గించాలి / మానివేయాలి. ప్రతిరోజు మంచి విటమిన్ 'సి' కోసం ఇతర విటమిన్‌లు ఖనిజలవణాల కోసం, ఆకుకూరలు, దుంపకూర కాకుండా క్యారెట్, బీట్‌రూట్, వంకాయ, పొట్లకాయ, సొరకాయ, దొండ వంటి కూరగాయలు, జామ, ఉసిరి, బొప్పాయి, కమల, బత్తాయి పండ్లు వాడవచ్చు. అంతే కాకుండా మూడు పూటలా అన్నమే కాకుండా, ఒక పూట తప్పనిసరిగా గోధుమలు, రాగులు, జొన్నలు, సజ్జల వాడకం మంచిది.

తొక్క తీయని ధాన్యపు గింజలు ముఖ్యంగా పప్పుధాన్యాలు, పైన చెప్పిన పండ్లు విరివిగా వాడాలి. వీటిలో పీచు అధికంగా వుంటుంది. ఆహారంలో పీచు ఎక్కువగా ఉండటం వలన జీర్ణమయ్యే సమయం ఎక్కువై గ్లూకోజ్ నెమ్మదిగా రక్తంలోనికి వస్తుంది.

ఆహారాన్ని తగ్గించటం అంటే సమతులాహారం, ముఖ్యంగా ఎక్కువగా కాయగూరలు, ఆకుకూరలు, వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.

రక్తంలో ఎక్కువ మొత్తం గ్లూకోజ్‌ని ఆకస్మికంగా పెంచే ఆహారం అయిన చక్కెర, తీపి వస్తువులు, మిఠాయిలు, శీతల పానీయాలు, పండ్లరసాలు, నిల్వవుంచిన పండ్లరసాలు, కేకులు, ఐస్‌క్రీములు తీసుకోరాదు.

మధుమేహం అదుపులో ఉంచుకోకపోతే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండ జబ్బులు, నరాల జబ్బులు, ముఖ్యంగా కంటి చూపు కోల్పోవడం జరిగేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువ.

డాక్టరు సలహాతో, మందుల వాడకంతో పాటు ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ మధుమేహ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు. ఉపవాసం లేదా ఆహారం పూర్తిగా మానివేయరాదు. దీని వలన రక్తంలో గ్లూకోజ్ శాతం చాలా తగ్గే ప్రమాదం వుంటుంది. మత్తు పానీయాలు, పొగత్రాగడం చేయకూడదు. సరియైన ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ వ్యాయామంతో ఈ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

కాలేయం సంబంధిత జబ్బులు

ప్రతి వ్యక్తి శరీరంలో కాలేయం చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ఇది శరీరంలో ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులు నిర్వహిస్తూ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కాలేయానికి సంబంధించిన జబ్బులలో జాండీస్/ పచ్చకామెర్లు ముఖ్యమైనది.

కాలేయంలోని కణజాలం దెబ్బతిన్నప్పుడు 'బైలురుబిన్' శాతం ఎక్కువై పచ్చకామెర్లు వస్తాయి. దీనికి కారణం, ఎక్కువగా రక్తకణాల విచ్ఛిన్నత, కాలేయ కణజాలం దెబ్బతినడం అంతే కాకుండా ఒక విధమైన వైరస్ మూలంగా కూడా ఈ జాండీస్ వస్తుంది. ఈ వైరస్‌లు రెండు రకాలు. ఒకటి హెపటైటిస్–ఎ, రెండు హెపటైటిస్–బి.

హెపటైటిస్–ఎ మన శరీరంలోనికి మల విసర్జన తరువాత సరిగా చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోకపోవడం వలన, బట్టబయలు వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తి మల విసర్జన చేసినచో ఆ మలం త్రాగేనీరులో కలవటం వలన / ఆహారంలో ఏదో రూపంలో కలవటం వలన వస్తుంది. హెపటైటిస్–బి రోగి వాడిన ఇంజెక్షన్ సూదులు వాడటం, రక్త సంబంధితంగా అనగా రోగి రక్తం ఎవరికైన తెలియక ఎక్కించినట్లు అయితే దాని ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. దీనియొక్క లక్షణాలను గమనిస్తే ఆకలి మందగించి, జ్వరం, తలనొప్పి, ఎక్కువగా / త్వరగా బరువు కోల్పోవడం, పొట్టనొప్పి వుంటాయి, కొందరిలో వాంతులు కూడా వుంటాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు 4–8 వారాల వరకు ఉండి అశ్రద్ధ చేసినట్లు అయితే ఇది సిర్రోసిస్ ఆఫ్ లివర్‌గా రూపాంతరం చెందుతుంది.

ఈ జాండిస్ / పచ్చకామెర్లు వచ్చిన వారి ఆహారంలో చేయవలసిన మార్పులు, మొదటలో ఎక్కువ శక్తినిచ్చే పానీయాలు అంటే గ్లూకోజు నీళ్ళు, కొబ్బరినీళ్ళు తరువాత తేలికగా జీర్ణం అయ్యే జావలు, బ్రెడ్, వెన్న తీసిన పాలు (స్కిమ్‌డ్ మిల్క్), ఉడికించిన బంగాళదుంప, చిలకడదుంపలు, పండ్లరసాలు, చెరుకురసం, బెల్లంపానకం, వెన్నతీసిన మజ్జిగ లాంటివి ఇస్తూ క్రమంగా మసాలాలు లేని ఉడికించిన గుడ్లు తెల్లసొన, ఉడికించిన పప్పు, అన్నం, మెత్తటి చపాతీ, ఉడికించిన కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఇవ్వవచ్చు.

ఎక్కువగా జీర్ణాశయాన్ని కదిలించే కాఫీ/ టీలు, మద్యం మానివేయాలి. మిఠాయిలు, నూనెలో వేయించిన, మసాలాలు, వెన్నతీయని పాలు, నెయ్యి, నూనె, మాంసం, చేప, కోడి కొంత కాలం వరకు మానివేయాలి.

గుండె జబ్బులు

గుండెజబ్బులు వ్యక్తి వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరికైనా, అర్ధాంతరంగా రావచ్చు. గుండెజబ్బులలో ఎన్నో రకాలు వున్నాయి. అవి కవాటాలకు సంబంధించినవి అవ్వొచ్చు. గుండెపొరలకు / రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనులకు సంబంధించినవి అవ్వొచ్చు. సాధారణ గుండెజబ్బులు మధ్య వయస్సు పురుషులకు, రుతుక్రమం ఆగిన స్త్రీలలో, ఎక్కువ పొగ త్రాగేవారిలో, మద్యం సేవించేవారిలో, ఊబకాయం వున్నవారిలో, ఎక్కువ ఒత్తిడితో పనిచేసే వారిలో, వ్యాయామం చేయకుండా జీవనశైలిలో మందగొండిగా వుంటున్న వారిలో ఎక్కువగా వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఆహారంలోను జీవనశైలిలో ఈ గుండె జబ్బులు రాకుండా / వచ్చిన తరువాత తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.

తక్కువ పిండి పదార్థాలు, తక్కువగా నూనె సంబంధిత పదార్థాలు మరి ముఖ్యంగా జంతు సంబంధిత నూనె పదార్థాలు అయిన వెన్న, నెయ్యి, వాడే నూనెలు కాకుండా ఎక్కువగా పాలీ అన్ శాట్చురేటెడ్ ఫ్యాటీయాసిడ్‌లు వున్న నూనెలు అయిన కుసుమ నూనె, అవనూనె, నువ్వుల నూనె, సోయానూనె, ప్రొద్దుతిరుగుడు నూనె వాడాలి.

రోజు మొత్తంలో 25/30 గ్రా నూనె మాత్రమే వాడాలి. ఎక్కువగా పీచు వున్న ఆహార పదార్థాలు అయిన, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు (గోరుచిక్కుడు), మొలకెత్తించిన గింజలు, పొట్టుతీయని గింజ ధాన్యాలు, పండ్లు వాడాలి. గుడ్లలో పచ్చసొన తీసి, క్రొవ్వులేని కోడిమాంసం, చేపలు వాడవచ్చు. ఉప్పువాడకం, నిల్వ పచ్చళ్ళ వాడకం మానివేసి, పొగత్రాగడం, మద్యం త్రాగటం సంపూర్తిగా మానివేయాలి. ఎక్కువగా పండ్లు, నీరు, పండ్లరసాలు వాడాలి. మలబద్ధకం రాకుండా చూసుకోవాలి.

క్రమబద్ధమైన జీవనం, సరియైన వ్యాయామం, సమతులాహారం, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటూ, యోగా / ధ్యానం లాంటివి చేస్తూ ఆహారం విషయంలో సరియైన వేళలు పాటిస్తూ, వైద్యసలహాతో ఈ వ్యాధులన్నింటిని అధిగమించవచ్చు.

పోషక విలువలు నష్టపోకుండా ఆహారం తయారీలో మెళకువలు

- కూరగాయలను తీసుకురాగానే చల్లటి ప్రదేశంలో గానీ, రిఫ్రిజిరేటర్‌లోగానీ నిలువ చేయండి లేదా వెంటనే వండండి. తాజా కూరగాయలను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద లేదా వేడి వాతావరణంలో ఉంచడం వల్ల విటమిన్లు నశిస్తాయి.
- తొక్క తీయక ముందే కూరగాయలను కడగాలి. కొన్ని కూరగాయలు ఉదా. బంగాళాదుంపలు, కందగడ్డ వంటి కూరగాయల తొక్కపై మురికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక వాటిని తొక్క తీసిన తరువాత కూడా కడగవచ్చు.
- కూరగాయల తొక్కల కిందనే విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కనుక, కూరగాయల తొక్కలు తీసేటప్పుడు తొక్కను వీలైనంత పలుచగా తీయాలి.
- కూరగాయలు కోస్తున్నప్పుడు, కూరగాయలను చాలా పెద్ద ముక్కలుగా గానీ, చాలా చిన్న ముక్కలుగా గానీ కోయకూడదు. పెద్ద ముక్కలు ఉడికేందుకు చాలా సమయం పడ్తుంది. కనుక పోషక విలువలు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. చిన్న ముక్కల వలన ఉపరితల విస్తీర్ణం ఎక్కువవుతుంది కాబట్టి ఉడికే ప్రక్రియలో ఖనిజాలు, విటమిన్లు నశిస్తాయి.
- కోసిన కూరగాయ ముక్కలను నీటిలో ఎప్పుడూ నానబెట్టకూడదు. కూరగాయలు నల్లబడకుండా నీటిలో వేసినప్పుడు, వీలైనంత తక్కువ నీటిలో వేయాలి.
- కూరగాయలను వీలైనంత తక్కువ నీటిలో, వీలైనంత తక్కువ సేపు ఉడికించాలి. ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో ఉడికేందుకు తక్కువ సమయం పడ్తుంది. కూరగాయలను వండేటప్పుడు మూత పెట్టాలి. దానివల్ల ఆక్సిడేషన్ వలన పోషక విలువలు నశించవు.
- కూరగాయలను (ఏ ఇతర వంటకాన్నైనా) వండిన వెంటనే తినడం మంచిది. వేడిగా ఉంచడం, తిరిగి వేడి చేయడం వలన విటమిన్లు నశిస్తాయి. వాసన పోతుంది.
- బంగాళాదుంపలు, కందగడ్డ, చిలగడదుంప వంటి కూరగాయలను తొక్కతోనే ఉడికించాలి. ఉడికిస్తున్నప్పుడు తొక్క చిట్లినట్లయితే ఎక్కువ సేపు ఉడికించకూడదు. దానివల్ల విటమిన్లు నశించవచ్చు.
- ఆకు కూరలను బాగా కడిగిన తరువాతే కోయాలి. కోసిన తరువాత ఆకు కూరలను కడగకూడదు.

ముల్లంగి, క్యారట్, బీట్‌రూట్, నోల్‌కోల్, కాలిఫ్లవర్ కూరగాయలకుండే ఆకులను పారవేయకూడదు. వాటిలో అనేక పోషక పదార్థాలుంటాయి. భుజియా, పప్పు, చపాతీల వంటి వాటి తయారీలో ఈ ఆకులను వాడవచ్చు. సలాడ్ మాదిరిగా వాటిని తినవచ్చు.

- టమాటాలు, దోసకాయలు, ముల్లంగి, క్యారట్లు, ఉల్లిపాయలు మొదలైన కూరగాయలను పచ్చిగా సలాడ్ మాదిరిగా తినాలి. ఈ కూరగాయల సలాడ్‌ను రోజు తినే భోజనంలో చేర్చాలి. పచ్చి కూరగాయలలో పోషక పదార్థాలు, విటమిన్లు అధికంగా ఉంటాయి. అయితే పచ్చి కూరగాయలను తినేందుకు ముందుగా వాటిని శుభ్రమైన నీటిలో బాగా కడగాలి. నీటిలో బాగా కడగడం వలన వాటికి గల మురికిపోవడంతో పాటు ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది.
- వంటసోడాను వాడకండి. వంటసోడా వాడడంవలన 'బి' గ్రూపు విటమిన్లు నశిస్తాయి.
- చింతపండు, నిమ్మ రసం, టమాటాలను ఆకు కూరలు ఇతర కూరగాయలతోపాటు వండడం వలన విటమిన్లు నశించవు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహ ఆచార్యులు (సామాజిక విజ్ఞాన శాస్త్రం), డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్.ఎస్.&ఎన్.టి.
సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, లాం, గుంటూరు.

సెల్ నెం. 99899 93506

ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీని గుర్తించుట

మానవ జీవితం యొక్క ప్రాథమిక అవసరం అహారం. మనిషి రోజువారీ అవసరాలలో, ఆహారం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.

నిత్యావసర వస్తువులలో అనవసర పదార్థాలను కలిపి చలామణి చేయాలన్న ఆశ, అంతేకాకుండా అక్రమ ధనార్జన చేయాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ప్రజల అజ్ఞానాన్ని, అజాగ్రత్తను ఆసరాగా తీసుకొని, కొంత మంది మానవ మనుగడకు అవసరమైన ఆహారపదార్థాలలో హానికరమైన పదార్థాలను కలుపుతున్నారు. ఆహార కల్తీ విపణిలో ఏ వస్తువుకు డిమాండ్ ఉంటుందో, ఏ వస్తువుకు ధర ఎక్కువగా ఉంటుందో, ఆ వస్తువు కల్తీ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ. కల్తీ ఆహారం తీసుకొనుటవలన జరిగే నష్టాలను గురించి పూర్తిగా తెలియకపోవడం వలన ఈ కల్తీ అనే విషయాన్ని గురించి తీవ్రంగా పట్టించుకొనుట లేదు. కల్తీ ఆహారం వల్ల దీర్ఘకాలంలో మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు వంటి అనారోగ్య సమస్యలు సంభవించడమే కాకుండా, జీర్ణకోశ సమస్యలు, కాన్సర్ వంటి ప్రమాదకర జబ్బులకు దారి తీస్తుంది.

కల్తీ అంటే ఏమిటి ?

ఆహార పదార్థాల్లో తక్కువరకం పదార్థాలను కలపడం (లేదా) కొన్ని విలువైన పదార్థాలను తీసివేయడాన్ని కల్తీ అంటారు.

మన దేశంలో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను 2006 లో ఏర్పరచిన భారత ఆహారభద్రత, ప్రమాణాల చట్టం, నిర్దేశిస్తుంది. ఈ చట్టం ద్వారా భారత ఆహారభద్రత, ప్రమాణాల అధారిటీ, ఢీల్లీలో ఏర్పాటైనది. మన దేశ ఆహార ప్రమాణాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సమానంగా పెంచడం దీని లక్ష్యం.

ఆహార పదార్థాలలో కల్తీ కారణంగా ఎన్నో దుష్పరిణామాలు సంభవిస్తాయి. ఒక్కొసారి మనుషుల ప్రాణాలు కూడా పోయే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. కడుపు నొప్పి, పక్షవాతం, కాలేయవ్యాధులు, డయేరియా, రక్తపోటు, వంటి వ్యాధులెన్నో కల్తీ పదార్థాలు తినటం వల్ల రావచ్చును.

ఆహార పదార్థాలలో కల్తీని కనుగొను విధానాలు :

కల్తీని గుర్తించుటకు చిన్న పరీక్షా విధానాలు, రసాయన పరీక్షలు మరియు ప్రయోగశాలలోను కనుగొనవచ్చును. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో ఆహారపదార్థాలు పరీక్షవిధానము విపులంగా విశదీకరించడమైనది.

1. ఆహార ధాన్యాలు మరియు వాటి ఉత్పత్తులు :-

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
1. గోధుమలు, బియ్యం, మొక్కజొన్నలు, జొన్నలు, సజ్జలు, శనగలు, బార్లీ మొదలైనవి.	దుమ్ము, రాళ్ళు, పొట్టు, పాడైన ధాన్యం, పురుగులు, ఎలుకల జుట్టు, మలం	ఉదర వ్యాధి, కాలేయం పాడైపోవుట, క్యాన్సర్ మొదలగునవి	వీటిని పరీక్షగా చూడటం ద్వారా గుర్తించవచ్చును
	ఎర్గాట్ బూజు	ఉదరవ్యాధి, కాలేయం పాడైపోవుట, క్యాన్సర్	ముదురు నీలం (లేదా) నలుపు రంగులో పాడవైన గింజలు కనబడితే అవి ఎర్గాట్ బూజు గింజలని పసిగట్టవచ్చును. అంతేకాకుండా వాటిని 20% ఉప్పు ద్రావణం కలిపిన గ్లాసు నీళ్ళలో వేస్తే ఎర్గాట్ బూజు గింజలు పైకి తేలుతాయి.
2. కంది పప్పు	కేసరి పప్పు	పక్షవాతము	కొంచెం కందిపప్పును ఒక పరీక్షానాళికలో తీసుకొని 50 మి.లీ. సజల హైడ్రోక్లోరికామ్లమును వేసి కలిపి 10 ని.లు సేపు ఉంచండి. పరీక్ష నాళికలో ఎరుపు రంగు కనిపించినట్లైతే కేసరిపప్పు కల్తీ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
3. పప్పు పదార్థములు	మిఠాయి రంగు (లేదా) మెటానిల్ ఎల్లో (లేదా) లెడ్‌క్రోమేట్	క్యాన్సర్, మూర్ఛవ్యాధి	ఒక పరీక్ష నాళికలో కొంచెము పప్పును తీసుకొని దానిలో కొంచెము నీరు కొంచెము సజల హైడ్రోక్లోరికామ్లము కలపండి.ఎరుపు రంగు కనిపించినట్లైతే మెటనిల్ ఎల్లోతో లేదా లెడ్ క్రోమేట్‌తో కల్తీ జరిగిందని తెలుస్తుంది.
4. గోధుమ పిండి, మైదా, రవ్వ	ఇసుక, ధూళి, పురుగులు	ఉదర వ్యాధి, కాలేయం పాడైపోవుట, క్యాన్సర్ వ్యాధి	కొంచెం పిండిని 10 మి.లీ. కార్బన్‌టెట్రా క్లోరైడ్‌లో కలపండి. కొంతసేపటికి పరీక్ష నాళిక అడుగు భాగంలో ఇసుక, ధూళి చేరుతుంది.
	తవుడు		ఒక గ్లాసులో కొంచెం గోధుమపిండిని వేయండి. పిండిలో తవుడు ఉన్నట్లైతే అది పాత్రలోని నీటి పై భాగంలో తేలుతుంది.
	చాక్‌పొడి	రక్తహీనత	ఒక పరీక్ష నాళికలో కొంచెం గోధుమపిండిని వేయండి. పిండిలో కొంచెం గాఢ హైడ్రో క్లోరికామ్లమును కలపండి. పిండిలో చాక్ పొడి ఉన్నట్లైతే పాత్రలో పొంగు కనిపిస్తుంది.

5. శనగ పిండి	కేసరి పిండి	పక్షవాతము కుష్ఠు వ్యాధి	ఒక పరీక్ష నాళికలో కొంచెము శనగపిండిని తీసుకొని 50 మి.లీ. సజల హైడ్రోక్లోరికామ్లము కలిపి 15 ని. లు వేడి చేయండి. గులాబి రంగు నుండి ఎరుపు రంగు పరీక్ష నాళికలో కనిపించినట్లైతే కల్తీ జరిగిందని చెప్పవచ్చు.
6. బొంబాయి రవ్వ	ఇనుపరజను	చిన్న ప్రేగులు దెబ్బ తినును.	రవ్వలో అయస్కాంతము ఉంచినట్లైతే ఇనుపరజను దానికి అతుక్కుంటుంది.

2. నూనెలు మరియు క్రొవ్వు పదార్థాలు :-

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
వంట నూనె	ఆర్జిమోనిన్	ఉబ్బస రోగవ్యాధి, గ్లకోమా, హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు	పరీక్ష చేయదలచిన పదార్థమునకు గాఢ నత్రికామ్లమును వేసి బాగా కలపండి. ఆమ్ల ద్రావణంలో వ్యాధులు, బెరిబెరి వ్యాధులు ఎరుపు ఇటుకరాయి రంగు కనిపించినట్లైతే తీసుకున్న నూనెలో కల్తీ ఉందని తెలుస్తుంది.
	మినరల్ నూనె (లేదా) ఖనిజ నూనె	కాలేయ వ్యాధులు క్యాన్సర్	ఒక పరీక్షనాళికలో ఒక స్పూన్ నూనె తీసుకొని 2 మి.లీ. నైట్రోజన్ ఆల్కహాలిక్ పొటాష్‌ను కలపాలి. మరిగే నీరులో పరీక్షనాళికను ముంచి 15 ని.లు ఉంచాలి. శుభ్రం అయిన తరువాత 10 మి.లీ. మరిగిన నీరు కలపాలి. ఏదైనా జిడ్డు కనపడితే ఖనిజ నూనె కలిపినట్లు తెలుస్తుంది.
కొబ్బరి నూనె	ఆముదం	వంటకు వాడితే వాంతులు విరేచనాలు, ఫిట్స్, శరీరంలో నీరు చేరుట	ఒక పరీక్షానాళికలో 1 మి.లీ. నూనె తీసుకొని 10 మి.లీ. ఎసిడిఫైడ్ పెట్రోలియం ఈథర్‌ను వేసి బాగుగా కలిపి ఒక చుక్క గాఢ సల్ఫ్యూరి కామ్లముతో తయారు చేయబడిన అమ్మోనియం మాలిబ్డేటు ద్రావణంను వేయండి. వెంటనే పరీక్ష నాళిక అడుగుభాగం నుండి మబ్బుతెర కనపడినట్లైతే కొబ్బరి నూనె ఆముదంతో కల్తీ చేయబడినదని తెలుస్తుంది లేదా కొబ్బరి నూనె ఫ్రీజరులో ఉంచినట్లైతే కల్తీ లేని కొబ్బరి నూనె అయితే గడ్డకడుతుంది. నూనెతో కల్తీ అయితే గడ్డ కట్టదు.
నెయ్యి	బంగాళదుంప, చిలగడదుంప, గుజ్జు	అజీర్తి, కాలేయ మరియు హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు	ఒక అర టీ స్పూన్‌తో నెయ్యిని గాజు పాత్రలో వేసి 2-3 చుక్కలు అయోడిన్ వేసిన యెడల నీలిరంగు వచ్చినచో అవి దుంపల గుజ్జుతో కల్తీ అయిన నెయ్యి అని గుర్తించాలి.

3. పాలు మరియు పాల పదార్థాలు :-

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
పాలు	కలుషితమైన నీరు	వికారంగా ఉండడం కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు అపాన వాయువు ఏర్పడటం	ఒక చుక్క పాలు మెరిసే జారుగా ఉన్న స్థలంలో వేస్తే ఆ చుక్క పాలు ఆగిపోవచ్చు. (లేదా) నెమ్మదిగా జారటం వలన అక్కడ తెల్లని గుర్తు పడవచ్చు. కల్తీ పాలు వెంటనే జారిపోతాయి.
	నీరు కలపటం, క్రొవ్వు పదార్థాలు	పోషక విలువలు తగ్గును	లాక్టో మీటరుతో పాల సాంద్రతను పరీక్షించినప్పుడు మామూలు పాలలో అయితే విలువలు 1,030 లాక్టో మీటర్‌తో పాలను పరీక్ష చేసినప్పుడు వాటిలో కొవ్వు పదార్థాలతో కూడిన పాల విలువ 1,030 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది.
	పిండి పదార్థాలు కలపటం	విరేచనాలు, అపాన వాయువు ఏర్పడడం	పరీక్షానాళికలో కొన్ని పాలు తీసుకొని దానిని వేడి చేసి చల్లార్చి రెండు మూడు చుక్కలు అయోడిన్ ను కలిపితే వెంటనే నీలి రంగు వచ్చినట్లైతే పిండి పదార్థంతో కల్తీ అయినట్లు తెలుస్తుంది.
	యూరియా	మూత్రం ద్వారంలో దురద	పరీక్ష నాళికలో ఒక స్పూను పాలు తీసుకొని రెండు చుక్కలు మోతైమాల్ నీలి ద్రావణం వేసిన యూరియా కలిపిన పాలు పది నిముషములు తర్వాత నీలి రంగులోకి మారును. యూరియేస్ స్ట్రిప్స్‌తో కూడ ఈ పరీక్ష చేయవచ్చు. యూరియేస్ స్ట్రిప్స్ పై ఒక స్పూన్ పాలు వేస్తే నీలం రంగులోకి మారిన కల్తీ ఉందని తెలుస్తుంది.
	బట్టల సోడా, డిటెర్జెంట్ పౌడర్	చర్మ వ్యాధులు, శ్వాసకోసం దెబ్బ తినటం, ప్రేగులకు కూడ హాని చేస్తుంది.	ఒక పరీక్ష నాళికలో స్పూన్ పాలు తీసుకొని బ్రోమోక్రిసాల్ నీలి ద్రావణం వేయాలి. 10 ని. తర్వాత కల్తీ పాలు ముదురు నీలి రంగుకు మారును.

4. పంచదార, బెల్లం, తేనె :

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
పంచదార	సుద్ద ముక్కపొడి	ఉదర వ్యాధులు	ఒక గ్లాసు నీటిలో పంచదారను కరిగించి కదపకుండా ఉంచితే సుద్దముక్క పొడిలో కల్తీ అయితే సుద్దముక్క పొడి గ్లాసులో క్రిందికి చేరుతుంది.
	ఇసుక, రాళ్ళు	చిన్న ప్రేగులకు హాని కలుగును.	కొంచెం పంచదారను ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేయండి. పంచదార నీటిలో కరిగిపోతుంది. కానీ, ఇసుక, రాళ్ళు నీటిలో కరగకుండా అడుగుకి చేరతాయి.
బెల్లం	మిఠాయి రంగు లేదా మెటానిల్ ఎల్లో	మగవారిలో టెస్టిస్ దెబ్బ తినును.	కొంచెం బెల్లం తీసుకొని దానికి ఒక మి.లీ. హైడ్రోక్లోరిక్లామమును కలపండి. లేత ఎరుపు (పింక్) రంగు కనిపించినట్లైయితే దానిలో మెటానిల్ ఎల్లో కల్తీ ఉన్నదని తెలుస్తుంది.
తేనె	పంచదార, బెల్లం పాకం	ధన నష్టం నిల్వ ఉండదు.	కొంచెం దూదిని తేనెలో ముంచి ఆ దూదిని అగ్గిపుల్లతో కాలిస్తే కల్తీ లేని తేనె బాగా మండుతుంది. కల్తీ ఉన్నట్లైతే దానిలో ఉన్న నీరు దూదిని కాలనివ్వదు. చిటపట శబ్దం వచ్చును.

5. మసాలా ద్రవ్యములు :

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
ముడి మసాలా ద్రవ్యములు	దుమ్ము, పొట్టు, పురుగులు, పాడైన విత్తనాలు ఎలుక మలం	ఉదరవ్యాధి, కాలేయం, క్యాన్సర్	వీటిని పరీక్షగా చూడటం ద్వారా గుర్తించవచ్చు.
మిరియాలు	బొప్పాయి గింజలు		ఒక గాజు బీకరులో కొంచెము మిరియాలు తీసుకొని దానిలో కొంచెం కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ వేయండి. మిరియాలు బీకరు అడుగునకు బొప్పాయి గింజలు నీటిపై భాగమునకు తేలుతాయి
లవంగాలు	తేలిక లవంగాలు వాల్‌టైల్ ఆయిల్	మంచి లవంగాలు కంటే ఘాటు తక్కువ ఉంటుంది. పోషక విలువలు తగ్గును.	ఒక బీకరు నీటిలో కొన్ని లవంగాలు వేయాలి. మంచి లవంగాలు బీకరులో క్రిందికి చేరును. తేలిక లవంగాలు పైకి తేలును.
ఆవాలు	ఆర్జిమోను గింజలు	ఉబ్బసరోగవ్యాధి, కంటి చూపు పోవుట, గుండె సమస్యలు	ఆవాలు గుండ్రంగా నున్నగా ఉంటాయి. ఆర్జిమోను గింజలు ధాన్యములా పొడుగ్గా, బరకగా ఉంటాయి. వీటిని బూతద్దము ఉపయోగించి గుర్తించవచ్చు. ఆవాలని నేలపై ఒత్తితే పసుపుగా లోపల కనపడతాయి. ఆర్జిమోన్ గింజలు ఒత్తితే తెల్లగా ఉంటాయి.

పసుపు	మెటానిల్ ఎల్లో	క్యాన్సర్ సంబంధిత వ్యాధులు	నీళ్ళలో వేస్తే నీటికి పసుపు రంగు వస్తే కల్తీ అయినదని తెలుస్తుంది. కొద్దిగా పసుపు పొడిని తీసుకొని కొద్దిగా గాఢ హైడ్రోక్లోరికామ్లము ను కలపండి. ఊదారంగు కనిపించి ఆ రంగుకు నీళ్ళు కలిపిన తరువాత కూడా ఉన్నట్లైతే ఆ పసుపు పొడిలో మెటానిల్ ఎల్లో కల్తీ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
	జొన్న పిండి, గోధుమ పిండి, కర్ర పెండలం పిండి, బియ్యపు పిండి.		కొద్దిగా పసుపు పొడిని మైక్రోస్కోప్‌లో పరీక్షించి చూస్తే తెల్లగా కనిపిస్తే అది కల్తీ అయినట్లు తెలుస్తుంది.
పసుపు, కారం, మసాలా పొడి (కర్రీ పౌడర్)	కృత్రిమ రంగులు	రక్తహీనత, అంధత్వము, మూర్ఛలు క్యాన్సర్ సంబంధిత వ్యాధులు	కొంచెం పొడిని తీసుకొని ఈథర్‌లో వేసి కడిగి 13 ఎన్. సల్ఫ్యూరికామ్లమును కలపండి. ఎరుపు రంగు ఇచ్చిన పదార్థంలో కృత్రిమ రంగు కలిపారని తెలుస్తుంది. కొంచెము నీరు కలిపిన తరువాత కూడా రంగు పోకుండా నిలిచి ఉన్నట్లైతే కృత్రిమ రంగు కలిపారని తెలుస్తుంది.
కారం లేదా మిరప పొడి	ఇటుక పొడి, ఇసుక, దూళి	చిన్న ప్రేగులకు హాని కలుగును	ఒక బీకరులో క్లోరోఫామ్, కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ తీసుకొని దానికి కొంచెం మిరపపొడిని కలపండి. ఇటుక పొడి, దూళి ఉన్నట్లైతే బీకరు అడుగు భాగమునకు వచ్చి చేరుతాయి
కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు మొదలగునవి	మెత్తటి తవుడు, రంపపు పొట్టు	ధన నష్టం, ఉదర సంబంధిత అనారోగ్యం	కొద్దిగా పొడిని నీటిలో వేయండి. తవుడు మరియు రంపపు పొట్టు నీటిపై తేలుతాయి.
ధనియాల పొడి	గుర్రపు లద్ది, పేడ	ధన నష్టం, అనారోగ్యం	కొద్దిగా ధనియాల పొడిని నీళ్ళలో వేయండి. గుర్రపు లద్ది, పేడ నీటిలో తేలుతాయి.
ఇంగువ	జిగురు, మట్టి, రాళ్ళు	ఆహారవాహిక దెబ్బ తింటుంది. మూత్ర పిండాలలో రాళ్ళు ఏర్పడును	ఇంగువను నీటిలో కలిపినప్పుడు అది కల్తీ లేనిది అయితే కనుక నీటిలో కరిగి నీటిని రంగులోకి మారుస్తుంది. కొంచెం ఇంగువను పొడి చేసి నీటిలో వేయండి మట్టి, రాళ్ళు నీటి అడుగు భాగాన చేరుతాయి.
కుంకుమ పువ్వు	మొక్కజొన్న కండె దారాలకు రంగు వేసి కలుపుట.	క్యాన్సర్	నిజమైన కుంకుమ పువ్వు తొందరగా తునగదు. కొంచెం కుంకుమ పువ్వు ను నీటిలో వేస్తే నిజమైనది నీటిలో ఉన్నంత వరకు రంగును ఇస్తూనే ఉంటుంది.
పెద్ద యాలుకలు	చిన్న యాలుకలు, టాల్కం పౌడర్		పెద్ద యాలుకలను వేరు చేయాలి. పెద్ద యాలుకలు గింజపై ముడత లేకుండా నునుపుగా ఉంటాయి. చిన్న యాలుకల గింజ పై చిన్న పగుళ్ళు, ముడతలు ఉంటాయి. యాలుకలను రుద్దినప్పుడు చేతులకు పొడరు అంటితే కనుక యాలుకలలో ఉన్న నూనె తీసినట్లు తెలుస్తుంది.

ఇతర పదార్థాలు

పదార్థం పేరు	కల్తీ పదార్థం	వ్యాధులు (లేక) కలుగు నష్టాలు	కల్తీని కనుగొను పద్ధతి
ఉప్పు	తెల్ల రాళ్ళు, ఇసుక	ఎపెండిసైటిస్ ప్రేగులకు హాని	చిన్న స్పూన్ ఉప్పు తీసుకొని ఒక పరీక్ష నాళికలో వేసి కొంచెం నీరు పోసి బాగా కలపండి. నీరు తెల్లగా మారితే ఉప్పులో కల్తీ ఉన్నదని తెలుస్తుంది. నీటిలో కరగని ఇసుక క్రింది భాగమునకు చేరుతుంది.
అయోడైజ్డ్ ఉప్పు	మామూలు ఉప్పు	గాయిటర్ వ్యాధి	ఒక చిన్న బంగాళా దుంప ముక్క కోసి దానికి ఉప్పు పట్టించాలి. ఒక నిమిషం ఆగి రెండు చుక్కలు నిమ్మ రసం వేయాలి. అయోడైజ్డ్ ఉప్పు అయితే నీలి రంగుకు మారుతుంది. మామూలు ఉప్పు అయితే రంగు మారదు.
తేయాకులు (టీ ఆకులు)	రంగు కలిపిన వాడిన టీ పొడి	క్యాన్సర్ మరియు ఇతర వ్యాధులు మీద రంగు కనిపిస్తుంది.	ఆకులను తడిగా ఉన్న బ్లాటింగ్ కాగితం మీద తీసుకోవాలి. టీ ఆకు కల్తీ అయినట్లైతే వెంటనే కాగితం
టీ పొడి	ఇనుప రజను	ఆహారవాహిక దెబ్బ తింటుంది.	కొద్దిగా టీ పొడిని కాగితంపై పోసి చిన్న అయస్కాంతమును దానిపై అటు ఇటు తిప్పినా ఇనుప రజను దానికి ఆకర్షించి అతుక్కుంటుంది. దానిని బట్టి టీ పొడి కల్తీ అయినదని చెప్పవచ్చు.
కాఫీ పొడి	చికోరి	పోషక విలువలు తగ్గును	కొంత కాఫీ పొడిని చల్లటి నీటిలో వేసినపుడు కాఫీ పొడి నీటిలో తేలుతుంది. అదే చికోరి కలిపినట్లైతే నీటి అడుగు భాగానికి చేరుతుంది మరియు నీటిని ఎరుపు రంగులోకి మార్చుతుంది.
	పిండి పదార్థం (లేదా) వేయించిన బ్రెడ్ పొడి		ఒక పరీక్ష నాళికలో కొంచెం కాఫీ పొడిని తీసుకొని నీరు కలిపి వేడి చేయాలి. ఇంకొక పరీక్ష నాళికలో చిటికెడు పొటాషియం పర్మాంగనేటు రెండు చుక్కలు హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, టించర్ అయోడిన్ ద్రావణంను కలపాలి. నీలం రంగు వస్తే కాఫీ పొడిలో కల్తీ అయినదని తెలుస్తుంది.
చింత గింజల పొడి మరియు కర్జూరపు గింజల పొడి			సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం ఒక పరీక్ష నాళికలో తీసుకొని కొంచెం కాఫీ పొడి కలపాలి. ఎరుపు రంగు వచ్చినచో చింత గింజల పొడిలో కల్తీ అయినదని గుర్తించవచ్చును.
వక్కపొడి	రంగు, శాకరిన్, ఇసుక	ఉదర సంబంధిత వ్యాధులు	రంగు కలిపిన వక్కపొడిని నీళ్ళలో వేస్తే నీళ్ళ రంగు మారుతుంది. శాకరిన్ కలిపిన వక్కపొడి ఎక్కువగా తియ్యగా ఉంటుంది. ఇసుక కలిపిన వక్కపొడికి 10 మి.లీ. కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ను కలిపి 10 నిమిషాలు బాగా కలపాలి. 10 నిమిషాల తరువాత పరీక్ష నాళిక అడుగు భాగాన ఇసుక, దుమ్ము, మట్టి కనిపిస్తాయి.
సగ్గు బియ్యం	ఇసుక, టాల్కం పౌడర్		సగ్గు బియ్యం కాల్చాలి. కల్తీ లేని సగ్గు బియ్యం అయితే కాల్చినప్పుడు ఉబ్బి ఏమి బూడిదను మిగల్చదు. కల్తీ అయినట్లు అయితే ఇసుక నోటిలో గరగరలాడుతుంది.

కాబట్టి పై పరీక్షా విధానాన్ని ఉపయోగించి ఆహార పదార్థాల కల్తీని గుర్తించి, వాటిని అరికట్టి, నాణ్యతా ప్రమాణాలు ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహ ఆచార్యులు, డిపార్ట్‌మెంట్ ఎఫ్.ఎస్.ఎన్.&ఎన్.టి., సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.

ఫోన్ నెం. 0863- 2235106, సెల్ నెం. 99899 93506

వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుండి ఇంధనం తయారీ

పంటనుంచి ఫలసాయాన్ని తీసుకున్న తరువాత మిగిలిపోయే వృక్ష సంబంధిత కట్టెలు, చెట్టుకొమ్మలు, ఆకులు, కంకులు మరియు ఆహార తయారీ పరిశ్రమల నుంచి కలప సంబంధిత పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలను 'బయోమాస్' అంటారు. ఈ పంట వ్యర్థాలు మరియు ప్రకృతి నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను బయోమాస్ బ్రికెట్‌లుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి సాధారణంగా బయట మనకు ఉచితంగా లభిస్తాయి లేదా తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. భారతదేశం వంటి సహజ వృక్షజాలాన్ని విస్తృత శ్రేణిలో కలిగి ఉన్న దేశంలో అపరిమితంగా సహజ వనరుల యొక్క సేంద్రీయ వ్యర్థాలను శక్తి వనరులుగా పున:రోత్పత్తి చేయవచ్చు. ఈ బ్రికెట్‌లు ప్రకృతిలోని పదార్థాలు – సెల్యులోజ్, లిగ్నిన్ మరియు బూడిదతో తయారు చేయబడతాయి. పంట కోతల కాలంలో రైతులు వాడేసిన లేదా ఎండిపోయిన, కాల్చడానికి మిగిలిన సహజ వ్యర్థాలను బ్రికెట్ తయారీకి ఉపయోగించవచ్చు.

వృక్ష, వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలు తిరిగి ఇంధన ఉత్పత్తికి ఉపయోగించడానికి అనువైన కర్బన మరియు జీవ సంబంధిత సేంద్రీయ పదార్థాలు. ఇవి రసాయన రూపంలో శక్తిని నిగూఢంగా కలిగిన పునరుత్పాదక సేంద్రీయ పదార్థాలను ఉపయోగించి బ్రికెట్లను తయారు చేయవచ్చు. ఈ వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి ఎక్కువ ఉష్ణ శక్తి గల ఇంధనాన్ని తయారు చేసే ఒక ప్రక్రియను బ్రికెటింగ్ అంటారు.

బ్రికెట్ యొక్క ప్రయోజనాలు :

- బ్రికెట్‌లు బొగ్గు కంటే తక్కువ ధరతోపాటు అధిక ఉష్ణ విలువను కలిగి ఉంటాయి మరియు తక్కువ తేమ, అధిక సాంద్రత కలిగి ఉంటాయి.
- వంట చెఱకుగా వాడినప్పుడు వెలువడే పొగ వలన స్త్రీలు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు, కంటి సంబంధిత వ్యాధులకు గురి అవుతారు. అందుకోసం ప్రత్యామ్నాయంగా బ్రికెట్ వాడవచ్చు.
- బ్రికెట్‌లో సల్ఫర్, బూడిద లేకపోవటం వలన వీటిని పర్యావరణహితమైనదిగా గుర్తించవచ్చు.
- బ్రికెట్‌లు వాసన మరియు స్థిరమైన మంటతో తక్కువ పొగను కలిగి ఉంటాయి.
- నిల్వ మరియు రవాణాలో సౌలభ్యం, బొగ్గుకు ప్రత్యామ్నాయంగా బయోమాస్ బ్రికెట్లను శక్తి వనరులుగా పరిగణించడానికి ప్రధాన కారణాలు.

బ్రికెటింగ్ టెక్నాలజి :

బయోమాస్ అవి లభ్యమయ్యే రూపంలోనే లేదా కార్బనైజ్ చేసి బ్రికెటింగ్ టెక్నాలజీలో బయోమాస్‌ను ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి చేసి బ్రికెట్లను తయారుచేయడం, మధ్యస్థ ఒత్తిడికి గురిచేసి తాపన పరికరంతో బ్రికెట్లను తయారు చేయడం లేదా తక్కువ వత్తిడితో బైండర్‌ను ఉపయోగించి బ్రికెట్లను తయారు చేయడం జరుగుతుంది.

ముఖ్యమైన, అధిక ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రికెటింగ్ టెక్నాలజీలు

1. పిస్టన్ ప్రెస్ లేదా రామ్ మరియు డై టెక్నాలజి

2. స్క్రూ ప్రెస్ టెక్నాలజి

పిస్టన్ ప్రెస్ లేదా రామ్ మరియు డై టెక్నాలజిని ఉపయోగించే బ్రికెటింగ్ మెషిన్‌లో బయోమాస్‌ను ఒక డై లోకి పంచ్ చేసి ఎక్కువ వత్తిడితో రామ్ సహాయంతో అణచడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం వలన బయోమాస్ కాంపాక్ట్ కాబడి బ్రికెట్టుగా తయారవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ సమర్ధవంతమైనది, ఖర్చు కూడా అనువుగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో 22 శాతం వరకు తేమ గల బయోమాస్ నుంచి బ్రికెట్లు తయారు చేయవచ్చు.

స్క్రూ ప్రెస్ టెక్నాలజీలో తిరుగుతూ ఉండే ఒక బారెల్ ద్వారా పంపిస్తూ వత్తిడికి లోను చేయడం జరుగుతుంది. దీని వలన బయోమాస్‌లో ఉండే లిగ్‌నిన్ ద్రవ పదార్ధంగా మారి బైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. స్క్రూ ప్రెస్ బ్రికెటింగ్ యంత్రములో తాపన పరికరం అమర్చితే బ్రికెట్ పై పొర కార్బనైజ్ చేయబడుతుంది.

బ్రికెటింగ్ ప్రక్రియ

బ్రికెటింగ్ ప్రక్రియలో 1. ముడిపదార్ధాల సేకరణ 2. ముడిపదార్ధాలను బ్రికెట్ల తయారీకి సిద్ధపరచుట 3. సాంద్రీకరణతో బ్రికెట్లను తయారుచేయుట 4. తయారు చేసిన బ్రికెట్లను చల్లబరిచి, ప్యాకింగ్ చేసి విక్రయించడం

1. బ్రికెటింగ్‌కు వాడే ముడిపదార్ధాలను ముందుగా సేకరించాలి.
2. సేకరించిన ముడిపదార్ధాలను బాగా ఎండబెట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయాలి.
3. ఇలా చేసిన ముడిపదార్ధంలో బైండర్‌ను కలిపి బ్రికెటింగ్ మెషీను ద్వారా బ్రికెట్లుగా తయారు చేయవచ్చు.

బయోమాస్‌ను కార్బనైజ్ చేసి బ్రికెట్లుగా తయారు చేయాలంటే బట్టి అవసరమవుతుంది.

1. ఈ ప్రక్రియలో ముందుగా బయోమాస్‌ను బాగా ఆరబెట్టాలి.
2. ఆరిన బయోమాస్‌ను బట్టీలో గాలి తగలకుండా మండించాలి.
3. కార్బనైజ్ కాబడిన బయోమాస్‌ను యంత్రాల సహాయంతో మెత్తని పొడిగా చేసి దానికి బైండర్‌ను కలపాలి.
4. ఇలా కలిపిన బయోమాస్‌ను బ్రికెటింగ్ యంత్రం ద్వారా బ్రికెట్లుగా తయారుచేసి ఎండబెట్టి ప్యాకింగ్ చేసి విక్రయించవచ్చు.
5. బయోమాస్ బ్రికెటింగ్‌ను చిన్న పరిశ్రమగా నెలకొల్పవచ్చు. ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టలేని వారు కుటీర పరిశ్రమగా కూడా నెలకొల్పవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహ ఆచార్యులు, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఆర్.ఎమ్. & సి.ఎస్., సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల,
గుంటూరు - 522 034, ఫోన్ నెం. 94907 19823

చిరుధాన్యాలు – విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు

చిరుధాన్యాలలో అత్యంత విలువైన పోషకాలతో పాటు ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నందున వీటిని పోషక ఘనులుగా పరిగణిస్తాము. మారుతున్న నేటి జీవన శైలి కారణంగా సంభవిస్తున్న అనేక ధీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నియంత్రణకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. మన ఆహారపు అలవాట్లను క్రమబద్ధీకరించుకోవడంలో భాగంగా చిరుధాన్యాలను ప్రజల ఆహారంలోనికి తీసుకురావలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.

చిరుధాన్యాలలో అనేక విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవచ్చు. అటుకులు, పిండి, మురుకులు, లడ్డూలు, బిస్కెట్లు, కేకులు, పాప్‌కార్న్ మొదలగునవి.

చిరుధాన్యాలతో విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు :

1. **పొట్టు తీసిన చిరుధాన్యాల పిండి:** మురుకులు, చెగోడీలు, లడ్డు, దోశ, ఇడ్లీ లాంటి పదార్థాలతో పాటు రొట్టెలు/ చపాతీల తయారీలో వాడవచ్చు.

2. **చిరుధాన్యాల రవ్వ :** ఉప్మా, కిచిడీ, కేసరి, పలావుల తయారీలో వాడవచ్చు.

3. **వేయించిన చిరుధాన్యాలు :** (పాప్స్)
   చిరు తిండిగా, మసాలా పాప్, చక్కెర పాప్స్ తయారీలో వాడవచ్చు.

4. **చిరుధాన్యాలు అటుకులు :** ఓట్స్, కార్న్ ఫ్లాక్స్ బదులుగా ఉదయాన్నే తినే అల్పాహారంగా వాడవచ్చు.

5. **మొలకెత్తిన చిరుధాన్యాల పిండి :** దీనితో జావలాగా పిల్లల ఆహారం వాడకంలో, జీర్ణకోశ వ్యాధిగ్రస్తులు, చక్కెరవ్యాధి గ్రస్తులు, గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ళు వాడకోవచ్చు.

6. **పాస్తా, నూడల్స్, సేమ్యా :** చిరుధాన్యాల పిండితో పాస్తా, నూడల్స్ లాంటి ఎక్స్‌ట్రూడెడ్ పదార్థాలను తయారు చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా మైదాతో చేసిన నూడిల్స్ కన్నా చిరుధాన్యాలతో చేసిన నూడిల్స్ చాలా పోషక విలువలు కలిగినవి. మన ఆహార సాంకేతిక శాస్త్రజ్ఞులు పాస్తా, నూడిల్స్, సేమ్యా చేసే పద్ధతులు కనుగొన్నారు.


7. వివిధ ధాన్యాలతో సమీకృత పోషక పిండి : ఈ పిండితో అన్ని రకాల రొట్టెలు, ఇడ్లీ, దోశలతోపాటు బిస్కెట్లు, కేక్, బ్రెడ్ వంటి బేకరీ ఉత్పత్తులు సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఇలా ఎన్నో రకాల రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన వంటలను, చిరుధాన్యాల వాడకం ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. చిరుధాన్యాలతో వివిధ ఆహార ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం ఒక చిన్న పరిశ్రమలాగా పెట్టుకోవడం వలన రైతు సోదరీమణుల సాంఘిక, ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడటంతోపాటు, పోషక విలువలు, వైవిధ్యం కలిగిన చిరుధాన్యాలు మన ఆహారంలో మమైకం అవుతుంది.

ఉదా॥ చిరుధాన్యాల అటుకులు తయారీ పరిశ్రమ

చిరుధాన్యాలతో అటుకులు


చిరుధాన్యాల అటుకులు పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన అల్పాహారము. చిరుధాన్యాల అటుకుల తయారీ విధానం



చిరుధాన్యాల అటుకుల పరిశ్రమకు అయ్యే ఖర్చు :

1.	భవనం మరియు ఇతర సివిల్ పనులు	–	రూ. 4.50 లక్షలు
2.	యంత్ర పరికరాలు	–	రూ. 10.50 లక్షలు
3.	పూర్వ ఉత్పత్తి వ్యయాలు	–	రూ. 2.50 లక్షలు
4.	ఇతర స్థితి వ్యయాలు	–	రూ. 1.50 లక్షలు
5.	వర్కింగ్ కాపిటల్ మార్జిన్	–	రూ. 1.50 లక్షలు
		మొత్తము –	**రూ. 20.50 లక్షలు**


చిరుధాన్యాలతో న్యూట్రీబార్స్ (యనర్జీ బార్స్) :



చిరుధాన్యాల న్యూట్రీబార్స్‌కు అయ్యే ఖర్చు :

1.	భవనం మరియు ఇతర సివిల్ పనులు	–	రూ. 2.00 లక్షలు
2.	యంత్ర పరికరాలు	–	రూ. 4.00 లక్షలు
3.	పూర్వ ఉత్పత్తి వ్యయాలు	–	రూ. 1.50 లక్షలు
4.	ఇతర స్థితి వ్యయాలు	–	రూ. 1.50 లక్షలు
5.	వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మార్జిన్	–	రూ. 1.50 లక్షలు
		మొత్తము –	**రూ. 10.50 లక్షలు**

రాగి మాల్ట్



రాగి మాల్ట్ పరిశ్రమకు అయ్యే ఖర్చు :


1.	భవనం మరియు ఇతర సివిల్ పనులు	–	రూ. 2.00 లక్షలు
2.	యంత్ర పరికరాలు	–	రూ. 3.00 లక్షలు
3.	పూర్వ ఉత్పత్తి వ్యయాలు	–	రూ. 1.50 లక్షలు
4.	ఇతర స్థితి వ్యయాలు	–	రూ. 0.80 లక్షలు
5.	వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మార్జిన్	–	రూ. 0.80 లక్షలు
		మొత్తము –	**రూ. 8.10 లక్షలు**

మిశ్రమ పిండి

కావలసిన పదార్థాలు :

గోధుమలు	:	తెల్ల జొన్నలు	:	కొర్రలు	:	సోయాచిక్కుడు
1		1		1		0.5

తయారీ విధానం :



మిశ్రమ పిండి పరిశ్రమకు అయ్యే ఖర్చు :

1.	భవనం మరియు ఇతర సివిలు పనులు	–	రూ. 3.00 లక్షలు
2.	యంత్ర పరికరాలు	–	రూ. 6.00 లక్షలు
3.	పూర్వ ఉత్పత్తి వ్యయాలు	–	రూ. 1.50 లక్షలు
4.	ఇతర స్థితి వ్యయాలు	–	రూ. 0.80 లక్షలు
5.	వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మార్జిన్	–	రూ. 0.80 లక్షలు

		మొత్తము –	**రూ. 12.10 లక్షలు**

సోయా చిక్కుడు – విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు :

సోయాపాలు – తయారు చేయు పద్ధతి

సోయా చిక్కుడు నుంచి నూనె తయారు చేయటం, ఆ నూనెను వంటలలో వాడటం తెలిసిన విషయమే. సోయా చిక్కుడు గింజలలో ఇంచుమించు పాలతో సమానంగా వుండే సోయాపాలను తయారు చేయటం కొద్దిమందికే తెలుసు.

సోయా చిక్కుడు అత్యధిక మాంసకృత్తులు కలిగిన పప్పు ధాన్యం, సోయాలోని నూనె పదార్థాలు మన శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. ప్రతి రోజు సుమారుగా 25 గ్రా.ల సోయా చిక్కుడు ఆహారంలో తీసుకోగలిగితే గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు సన్నగిల్లుతుందని (యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) వారి పరిశోధనలలో రుజువు అయింది. మన దేశంలో శాఖాహారులు ఎక్కువగా ఉండటం వలన, సోయా చిక్కుడు నుండి తయారు చేసే వివిధ ఆహార పదార్థాలు వాడకం ఎంతగానో మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తోంది. ఒక వంతు సోయా పిండికి, 2 వంతుల గోధుమ పిండిలో కలిపి ఈ మిశ్రమ పిండిని చపాతీలు, పూరీల తయారీలో వాడటం వలన పూరీ, చపాతీల పోషక విలువలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సోయాతో తయారు చేసిన మీల్ మేకరు గానీ, సోయా గ్రిట్స్ గానీ తరుచూ కూరలగా వాడటం వలన శాఖాహారం తినే వారికి ఎక్కువగా మాంసకృత్తులు, ఖనిజ లవణాలు లభిస్తాయి. సోయా పాలతో పనీర్ తయారు చేసి వాడితే ఈ పనీర్ పాలతో చేసిన పనీర్‌కు ఇంచుమించు సరిసాటిగా ఉంటుంది.

సోయా చిక్కుడును నీటిలో నానపెట్టి మెత్తగా రుబ్బి వడకట్టగా సోయాపాలు తయారు అవుతాయి. ఈ సోయాపాలలో మాంసకృత్తులు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొందరు పసి వారికి మాములు గేదె, ఆవు పాలలో ఉండే లాక్టోస్ అనే చక్కెర పదార్థం సరిపడదు. అందువల్ల లాక్టోస్ ఇన్‌టాలరెన్స్ వస్తుంది. అలాంటి వారికి సోయాపాలు "దేవుడు ప్రసాదించిన వరం" గా మనం చెప్పవచ్చు. సోయాపాలలో ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటంటే ఈ సోయా పాలు సులభంగా జీర్ణం అవ్వడమే కాకుండా పోషక విలువలను గమనిస్తే గేదె, ఆవు పాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనికి వస్తాయి. ధరలో కూడా గేదె, ఆవు పాలతో పోలిస్తే తక్కువ.


సోయాపాల తయారీ :

సోయా చిక్కుడును తీసుకుని శుభ్రపరిచి 6–7 గంటల సేపు నీటిలో నానబెట్టాలి. తరువాత శుభ్రంగా కడిగి వడకట్టి వేడినీటితో మెత్తగా రుబ్బాలి. వెట్ గ్రైండర్‌లో రుబ్బినట్లయితే మూత ఉంచి, గాలి తగలకుండా రుబ్బాలి. ఈ రుబ్బిన పిండి మెత్తగా కాటుకలాగా ఉండాలి. దీన్ని సోయాస్లర్రీ అంటారు. ఈ సోయస్లర్రీకి 1 కిలోకి 10 లీటర్ల దాకా వేడి నీరు పోసి 20 నిమిషాలు దాకా ఉడికించాలి.

ఉడికిన ఈ స్లర్రీని వడకట్టడం ద్వారా సోయా పాలు తయారు అవుతాయి. వడకట్టగా మిగిలిన ఈ పిప్పిని ఒకారా అంటారు. ఈ సోయాపాలలో 7–8 శాతం ఘన పదార్థాలు కలిగి ఉంటుంది. దీనికి 3–4 శాతం చక్కెర, 0.003 శాతం ఉప్పుని కలుపడం ద్వారా పాల రుచి పెరగడంతో పాటు టోన్డు పాలలా తయారు అవుతాయి. ఒకారాతో కూడా వివిధ పోషకాహార ఉత్పత్తులను తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఈ పాలను మామూలు పాల లాగా వాడుకోవచ్చు. పెరుగు, పనీర్‌లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. సోయాపాలను మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలి. అంటే, ఒక గ్రైండరు / మిక్సీ, గ్యాస్ పొయ్యి, వంట పాత్రలు, మస్లిన్ గుడ్డ అవసరం కాగా, చిన్న తరహా పరిశ్రమగా నడిపేందుకు గంటకు 30 లీటర్ల సోయాపాలు

సోయాపప్పు / పిండి తయారు చేసే విధానము



చేయు యంత్ర సామాగ్రిని యస్.యస్.పి. ఫరీదాబాదు (హర్యానా) వారు, యస్.పి.యు., సెంటర్, సి.ఐ.ఎ.ఇ. భోపాల్ వారు మార్కెటు చేస్తున్నారు. ఈ యంత్ర సామాగ్రి రూ. 2.50 నుండి 3.50 లక్షల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ సామాగ్రిలో స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్‌తో తయారైన గ్రైండరుతో పాటు కుక్కరు, స్టీమ్ జనరేటరు (ఆవిరి యంత్రం) కలిపి ఉంటాయి. ఇది ప్రతి గంటకు 30 లీటర్ల సోయాపాలు తయారు చేస్తుంది. దీనికి 4 కిలోల సోయా చిక్కుడు అవసరం అవుతుంది. 15 లీటర్ల పాలతో 30 లీటర్ల సువాసన కలిగిన పాలను (ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్) తయారు చేయవచ్చు.

ఈ యంత్ర నిర్మాణం, పని చేయు విధానం గమనిస్తే, గ్రైండర్ కమ్ కుక్కరులోకి నీటి ఆవిరి యంత్రం నుంచి ఆవిరి వచ్చునట్లుగా ఒక వైపు కలిపి ఉంటుంది. ఆవిరి సూటిగా గ్రైండరు లోకి పంపడం వలన ఆక్సిజన్ లేని వాతావరణం కల్పించబడి మంచి నాణ్యత పాలు తయారు చేసేందుకు దోహదపడుతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన సోయాపప్పును, వేడినీటికి గరాటు ద్వారా గ్రైండరులో వేస్తారు ఈ గ్రైండరు కమ్ కుక్కరుకు మోటారు ఉండడం వలన 20 నిమిషాలు రుబ్బిన తరువాత స్లర్రీ తయారు అవుతుంది. ఈ స్లర్రిని మస్లిన్ గుడ్డ ద్వారా వడకట్టడం వలన సోయాపాలు తయారు అవుతాయి. ఈ సోయాపాలు ఆరోగ్యానికి, ఆరోగ్యం. ఆదాయానికి ఆదాయం సమకూర్చగలవు.

సోయా పప్పుతో వంటకాలు :

సొయా దోసె – మినపప్పు – 1 కప్పు, సోయా పప్పు – కప్పు, బియ్యము – 4 కప్పులు

మినపప్పు కంటే సోయా పప్పును మూడు గంటల ముందు నానబెట్టాలి. నానిన బియ్యము, పప్పులను రుబ్బి ఒక రాత్రి పులియబెట్టి దోసెలు వేసికోవచ్చును. ఇలాగే సగము పాళ్ళు సోయాపప్పు సగం మినపప్పు వాడి ఇడ్లీ, వడ చేయవచ్చు. పెనరట్టులో కూడా సగము పాళ్ళు సోయాపప్పు వాడి సోయా అట్టు చేయవచ్చును.

కందిపప్పు, పెసరపప్పుతో చేసే పప్పుకూర, సాంబారు లాంటి వంటకాలు సోయాపప్పుతో చేసికోవచ్చు. సోయా పచ్చడి చేసికునేప్పుడు కంది పప్పులానే, సోయాపప్పు గింజలను వేయించి వాడాలి. చుడువా చేసేప్పుడు నానబెట్టిన సోయాపప్పును నూనెలో వేయించి వాడాలి. ఈ వంటకాలు ఎంతో రుచిగా వుంటాయి. పుష్టికరం కూడా.

సోయా పిండితో వంటకాలు :

రొట్టెలు : గోధుమ లేక జొన్నపిండి –3 కప్పులు, సోయాపిండి – 1 కప్పు

మనము ఇంటిలో శనగపిండితో చేసుకునే పకోడి, కారప్పూస, బూంది, బర్ఫీ, లడ్డులాంటి వంటకాలు సోయాపిండితో చేసికోవచ్చును. సోయాపిండిలో క్రొవ్వుశాతము ఎక్కువ కాబట్టి ఈ వంటకాలు ఎక్కువ నూనెను గూడా పీల్చవు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహా ఆచార్యులు, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్.ఎస్. & ఎన్.టి.,
సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, లాం, గుంటూరు.
ఫోన్ నెం. 0863- 2235106, సెల్ నెం. 80089 87132

పండ్లు – నిల్వ చేయు పద్ధతులు

వేసవి కాలం వచ్చిందంటే మనమందరం ఆలోచించేది ఎండలు ఎట్లా ఉంటాయో అవి తట్టుకోవడానికి మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎండాకాలంలో మనం స్వేదం రూపంలో కోల్పోయిన లవణములను మరియు నీటిని భర్తీ చేసేందుకు ఘనాహార పదార్థాలకంటే నీటిని ఎక్కువగా తీసుకొంటాం. వేసవీ కాలంలో ఎక్కువ నీరు త్రాగినప్పటికి మన శరీరము లవణములను కోల్పోవటం వలన మనము దాహార్తిని తీర్చుకోలేము. అయితే కొన్ని పండ్లు తినడం వలన మనము దాహార్తిని తీర్చుకోవచ్చును.

వేసవిలో ఆరోగ్య పరిరక్షణ – పండ్ల ప్రాముఖ్యత :

పండ్లు రక్షక ఆహారాలుగా పని చేస్తాయి. ఎన్నో జీవక్రియలకు, రక్తం, ఎముకలు, పళ్ళు మొదలైన అవయవాలను తయారు చేయడానికి మన శరీరానికి విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు అవసరం. మనం తీసుకునే ఆహారంలో అధిక భాగం విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు పండ్ల నుండే లభిస్తాయి. ఎండాకాలంలో సాధారణంగా లభించే కొన్ని ముఖ్యమైన పండ్లు – అవి మనకు అందించే పోషక విలువలను గురించి తెలుసుకుందాం.

ద్రాక్ష : ద్రాక్ష పండ్లు ఎక్కువ తేమ కలిగి వేసవి కాలంలో తినడానికి బాగా అనువుగా ఉంటాయి. జ్యూస్, ఫ్రూట్ సలాడ్‌లలోకి వీటిని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. జాములు, జెల్లీలు, షర్బతులు ఇలా వివిధ రూపాలలో భద్రపరచటానికి వీలుండే ద్రాక్ష పండ్లు ఔషధ గుణాల్ని కూడా కలిగి వుంటాయి. ద్రాక్ష పండ్లు అధిక క్యాలరీలను కలిగి ఎక్కువ మోతాదుల్లో విటమిన్లను అందజేస్తాయి.

వంద గ్రాముల ద్రాక్ష పండ్ల నుంచి లభించే పోషకాలు : తేమ –82.2 గ్రా., పిండి పదార్థాలు –13.1 గ్రా., ప్రోటీన్లు –0.6 గ్రా., పీచు పదార్థాలు (ఫైబర్) – 2.8 గ్రా., క్రొవ్వు (ఫ్యాట్)–0.4 గ్రా., విటమిన్ 'సి' –1.0 మి.గ్రా., కాల్షియం –20 మి.గ్రా., ఫాస్ఫరస్ –23 మి.గ్రా., ఐరన్–0.5 మి.గ్రా., కెరోటిన్ –3 మైక్రో గ్రాములు, కెలోరీలు (శక్తి)–58 కిలో కేలరీలు.

ద్రాక్ష పండ్లు మనకు కలిగే అనేక వ్యాధులకు ఔషధంగా పని చేస్తున్నాయి. ద్రాక్ష పండ్లు చేసే మేలు గురించి తెలుసుకుందాం.

1. ద్రాక్ష పండ్లు గుండె జబ్బుల గల వారికి శ్రేష్టమైనవి. గుండె నొప్పి, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, గుండె పెద్దదైన వారికి ద్రాక్షరసం మేలు చేస్తుంది.
2. మూత్ర పిండాలలోనూ, మూత్రాశయంలోనూ ఏర్పడిన రాళ్ళను కరిగించడానికి ద్రాక్షరసం ఉపయోగ పడుతుంది. మూత్రం సాఫీగా రావడానికి ఉపకరిస్తుంది.
3. ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుని ఋక్తాయాసంతో బాధపడేవారికి ద్రాక్ష ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
4. జ్వరంతో బాధపడేవారు ద్రాక్ష పండ్లు తీసుకుంటే జ్వరం తగ్గుతుంది.
5. ద్రాక్ష బాగా రక్తాన్ని పట్టిస్తుంది. పిల్లలకు మలబద్ధకం, ఆకలి లేకపోవడం తదితర వ్యాధులను దూరం చేస్తుంది.

6. దంత వ్యాధులకు ద్రాక్ష పండ్లు బాగా పని చేస్తాయి.
7. పండ్లు గట్టి పరచడానికి, పిప్పిపళ్ళు, పయేరియా వంటి వ్యాధుల్ని నివారిస్తుంది.
8. జీర్ణశక్తి లోపాన్ని ద్రాక్ష నివారిస్తుంది.
9. టైఫాయిడ్, దీర్ఘ రోగంతో బాధపడేవారికి ద్రాక్షరసం నీరసాన్ని పోగొట్టి మంచి శక్తినిస్తుంది.
10. తలనొప్పితో బాధపడేవారు భరించలేని మైగ్రేన్ తలనొప్పికి గురైన వారికి ద్రాక్ష పండ్లు తింటే బాధల నుండి విముక్తులవుతారు.

ఇన్ని ఔషధ గుణాలు కలిగిన ద్రాక్ష పండ్లు పిల్లలు, పెద్దలు క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అందుకోసమే జ్వరం వచ్చినా, గుండె జబ్బులు చేసినా వైద్యులు ద్రాక్ష పళ్ళు తినమని ద్రాక్ష రసాన్ని సేవించమని సలహా ఇస్తుంటారు.

మామిడి : మామిడి పండ్లను ముఖ్యంగా స్క్వాష్‌లు, జామ్స్, జెల్లీస్, తాండ్ర మొదలగు పదార్థాల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంకా పండని పచ్చి మామిడి కాయలను పచ్చళ్ళు పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. వేసవి కాలంలో లభించే ఈ పండులో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలం. చిన్న పిల్లలు, శిశువులతో సహా అన్ని వయస్సుల వారు దీనిని తినవచ్చు. వేసవి కాలంలో సంవృద్ధిగా లభించే ఈ పండ్లను సరైన మోతాదులో తినడం వలన విటమిన్ 'ఎ' కాలేయంలో నిలువ చేయబడి ఏడాది పొడవునా శరీరానికి కావలసిన విటమిన్ 'ఎ' అవసరం తీరుతుంది.

మామిడి పండు గుజ్జు బాగా కలిగి మధ్యలో విత్తనాన్ని కలిగి వుంటుంది. ఈ గింజ తినడానికి పనికి రాదు. 100 గ్రాముల మామిడి గుజ్జు నుండి లభించే పోషకాలు : తేమ–81 గ్రా., ప్రోటీన్లు –0.6 గ్రా., క్రొవ్వు –0.4 గ్రా., పీచు పదార్థం – 0.7 గ్రా., పిండి పదార్థములు –16.9 గ్రా., శక్తి (క్యాలరీలు) –74 కిలో క్యాలరీలు, కాల్షియం –14 మి.గ్రా., ఫాస్ఫరస్–16 మి.గ్రా., ఇనుము – 1.3 మి.గ్రా., కెరోటీన్– 2743 మైక్రో గ్రా., విటమిన్ 'సి'–16 మి.గ్రా., మినరల్స్ – 0.4 మి.గ్రా.

మామిడి పంటలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ రూపంలో ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన కళ్ళు, చర్మం, పిల్లల ఎదుగుదలకు విటమిన్ 'ఎ' చాలా అవసరం. మామిడి పండ్లలో ఉండే బీటా కెరోటిన్ రక్త నాళాల్లో క్రొవ్వు పేరకుండా నివారిస్తుందనీ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్‌ల బారి నుండి రక్షిస్తుందని ఇటీవల పరిశోధనా ఫలితాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

పుచ్చకాయ లేదా పుచ్చ పండు : వేసవి కాలం మొదలు అవుతుందనగా మనకు బాగా కన్పించేది పుచ్చకాయే. ఇది తీగపంట. ఎక్కువ శాతం నీటిని కలిగి వుంటుంది. దీనిలో తక్కువ క్యాలరీలు, ఎక్కువ శాతం విటమిన్ 'సి' ఉండుటయే గాక దాహాన్ని తీర్చే గుణం కలిగి ఉంటుంది. ఇది అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతాలలో బాగా పెరుగుతుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకొనలేవు. మన రాష్ట్రంలో చాలా ప్రాంతాలలో ప్రాముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతాలలో ఈ పంటను బాగా పండిస్తున్నారు. దీనిని పండించడానికి ఎక్కువ ఖర్చు చేయనవసరంలేదు. ఏ మందులు వాడకుండా ఎక్కువ నీటి అవసరం లేకుండా పెరిగే పంట పుచ్చ పంట.

పుచ్చకాయ మంచి గట్టి కండను కలిగి వుండడమే కాకుండా చాలా ఎక్కువ శాతం నీటిని కలిగి వుంటుంది. కనుక ఏ వయస్సు వారైనా ఈ పండును విరివిగా తీసుకొనవచ్చు. వేసవిలో ఎండలు అధికంగా వుండడం వలన ఎన్ని నీళ్ళు తాగినా దాహం తీరదు. అటువంటి సమయంలో కొన్ని పుచ్చకాయ ముక్కలను తిన్నట్లయితే దాహార్తిని తొందరగా తీర్చుకొనవచ్చు. తక్కువ కేలరీలు అధిక విటమిన్‌లు, ఖనిజ లవణములు కలిగి వుండే పుచ్చపండులో వుండే పోషక విలువలను గమనిద్దాం.

100 గ్రాముల పుచ్చపండు అందించు పోషక విలువలు : తేమ – 95.8 గ్రా., ప్రోటీన్లు – 0.2 గ్రా., క్రొవ్వు – 0.2 గ్రా., పీచు పదార్ధం–0.2 గ్రా., పిండి పదార్ధములు–3.3 గ్రా., శక్తి (కెలోరీలు)–16 కిలో కెలోరీలు, కాల్షియం –11 మి.గ్రా., ఫాస్ఫరస్ – 12 మి.గ్రా., ఇనుము – 7.9 మి.గ్రా., విటమిన్ 'సి'–1 మి.గ్రా., మినరల్స్ –0.3 మి.గ్రా.

ఖర్బూజ లేదా దోసపండు : ఖర్బూజ పండు గుజ్జులో 94 శాతం నీరు, 5 శాతము చక్కెర వుంటాయి. ఈ పండ్లలో కండ కాకుండా వుండే చిన్న విత్తనాల నుండి నూనెను తీస్తారు. ఖర్బూజ పండును ఎక్కువగా జ్యూస్‌లు, స్క్వాష్‌లు తయారు చేయడానికి వాడతారు. చాలా మంది వట్టి పండ్ల గుజ్జులో పంచదార వేసుకొని తింటారు. ఇలా తినడం వలన వేసవీ కాలంలో బాగా చలువ చేస్తుంది. ఇంటి బయటి ఎండ ప్రభావం శరీరం పై ఎక్కువ పడకుండా కాపాడుతుంది.

పుచ్చపండు, ఖర్బూజ పండు రెండూ వేసవిలో విరివిగా లభించేవే. వీటిలో ఎక్కువ శాతం నీరు వుండడం, కెలోరీలు తక్కువగా వుండుట వలన బాగా లావుగా వుండేవారు, గుండె జబ్బులు, మధుమేహ వ్యాధి వున్నవారు కూడా వీటిని తినవచ్చు. ఎండా కాలంలో శరీరానికి నీటి అవసరం ఎక్కువ కాబట్టి ఇలాంటి పండ్లు తినడం వలన మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొనవచ్చును. ఇన్ని మేలులు కలిగి వున్న ఖర్బూజ పండులో వుండే పోషక విలువలను గమనిద్దాం.

100 గ్రాముల ఖర్బూజ పండులో ఉండే పోషక విలువలు : తేమ – 95.2 గ్రా., ప్రోటీన్లు –0.3 గ్రా., క్రొవ్వు –0.2 గ్రా., పీచు పదార్ధం–0.4 గ్రా., పిండి పదార్ధములు –3.5 గ్రా., శక్తి (క్యాలరీలు)– 17 కిలో క్యాలరీలు, కాల్షియం – 32 మి.గ్రా., ఫాస్ఫరస్ – 14 మి.గ్రా., ఇనుము –1.4 మి.గ్రా., విటమిన్ 'సి' –26 మి.గ్రా., మినరల్స్ –0.4 మి.గ్రా.

ఖర్బూజ పండులో కాల్షియం ఎక్కువగా వుంటుంది. ఖర్బూజ బాగా చలువ చేయడమే కాక అధిక లవణాలను కలిగి వుంటుంది. కాబట్టి దీనిని ఎండాకాలంలో అధికంగా తీసుకుంటే మంచిది.

పండ్లు – నిల్వ చేయు పద్ధతులు :

మన దేశంలో పండ్లు, కూరగాయల ఉత్పత్తిలో ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ చాలా వరకు వీటిని సరియైన పద్ధతులలో నిల్వ చేసుకొనే విధానాలు తెలియక 60 శాతం పైగా పండ్లు, కూరగాయలు వృధా అవుచున్నవి. ఈ వృధాను నివారించుటకు సరియైన పద్ధతులు అవలంభించి పండ్లు, కూరగాయలను నిల్వ చేయటం అవసరం. వీటిని నిల్వ చేయటం ద్వారా సరియైన పోషకాలు లభ్యమవుతాయి.

I. పండ్లతో జామ్ తయారీ :

1. పండ్ల ఎంపిక : పండ్లు మంచి రంగు, రుచి, వాసన కలిగి మెత్తబడనివిగ వుండాలి. పండ్లను ముందుగా ఎక్కువ నీటిలో కడగాలి. వాటిపై కాడగాని, తొడిమగాని వుంటే తీసివేయాలి. దెబ్బతగిలిన లేదా పాడయిన భాగాన్ని కాని తీసివేయాలి.

2. పండ్లను జామ్ తయారీలో ఉపయోగించుట : పండ్లపై తొక్కను తీసివేయాలి. లోపలి గింజలుగాని, విత్తనాలు గాని, టెంకలుగాని వున్నచో తీసివేయాలి. పండ్లు ఒకవేళ బాగా గట్టిగ వున్న యెడల వాటిని కొద్ది నీటిలో ఉడికించాలి ఇలా చేయడం వల్ల పండ్లు మెత్తబడుతుంది.

3. చక్కెర కొలతలు : పండ్లు పుల్లగ వుంటే చక్కెర, పండ్ల గుజ్జుకు 1:1 నిష్పత్తిలో తూచి తీసుకోవాలి. పండ్లు తియ్యగ వుంటే ఒక కేజి పండ్లు గుజ్జుకు 3/4 కేజి చక్కెర తూకము ప్రకారము తీసుకోవాలి.

4. నిమ్మ ఉప్పు : నిమ్మ ఉప్పును ఒక కేజి పండ్ల గుజ్జుకు 5 గ్రాముల నుండి 10 గ్రాముల వరకు పండ్ల రుచిని బట్టి తీసుకోవాలి.

నిలువ చేయుటకు కావలసిన పదార్థాలు : పొటాషియం మెటా బై సల్ఫైటు దీనిని జ్యూస్, స్క్వాష్ తయారీలలో వాడుకోవచ్చు, తయారయిన జ్యూస్ సీసాలలో వేసేముందు దీనిని కలపాలి. తర్వాత సీసాలలో వేసి సీల్ చేయాలి. రంగులేని పండ్ల జ్యూస్‌లకు ఇది వాడవచ్చు.

సోడియం బెన్‌జోయేటు : దీనిని రంగు కలిగిన పండ్లకు వాడతారు. దీనిని 700 మిల్లీ గ్రాములు ఒక కేజి తయారయిన జామ్ లేదా జెల్లికి కలపాలి. ఈ ప్రిజర్వేటివ్‌లను కలిపేముందు ముందుగా కొద్దిగా జామ్‌గాని పండ్ల రసాలను గాని స్పూనులో తీసుకొని దానికి ప్రిజర్వేటివ్‌లను కలిపి మిగిలిన పదార్థాలకు కలపాలి.

జామ్ తయారీలో తీసుకొనవలసిన మెళుకువలు :

పదార్థాలను మిశ్రమం చేయుట : పండ్ల గుజ్జును, చక్కెరను బాగా కలిపి అరగంట లేదా గంటసేపు వుంచాలి. దీని వల్ల చక్కెర పండ్ల రసంలో కలుస్తుంది.

పదార్థాలను ఉడికించుట : పండ్ల గుజ్జు, చెక్కెర మిశ్రమాన్ని నెమ్మదిగ ఉడికించాలి ఉడికేటప్పుడు కలుపుతూ గరిటెతో మెదుపుతూ వుండాలి. మిశ్రమము 105.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉడికించాలి.

షీట్ పరీక్ష : (జామ్ తయారయినది లేనిది తెలుసుకొనుటకు స్పూన్‌తో ఉడుకుతున్న మిశ్రమాన్ని తీసుకొని కొద్దిగ చల్లబడ్డాక మిశ్రమమును వంచితే కొద్దిగా పొరలు పొరలుగా పడుతుంది. దీనినే 'షీట్ పరీక్ష' అని అంటారు.

తయారయిన జామ్‌ను సీసాలలో నింపుట : జామ్ వేడిగా ఉన్నప్పుడే ముందుగ నీటిలో మరిగించి, ఆరబెట్టి, పొడిగా వుంచుకున్న సీసాలలోకి పోయాలి. సీసాలు తడిగ వుండకూడదు. వేడి జామ్‌ను సీసాలలో వేసేటపుడు చెక్క పీటపైగాని, బల్లపైగాని సీసాను వుంచి పోసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే సీసా పగిలిపోదు. సీసా మూతలు కూడా జామ్ వేడిగా వున్నప్పుడే వుంచాలి.

నిలువ చేయుట : మూతలు వుంచిన జామ్ సీసాలను బోర్లించి 5 నిమిషాలు వుంచాలి. దీనితో మూతకూడా స్టెరిలైజు అవుతుంది తర్వాత సీసా చల్లబడ్డాక చల్లని పొడి ప్రదేశములో నిలువచేయాలి.

మిశ్రమ ఫలాల జామ్ (మిక్స్‌డ్ ఫ్రూట్ జామ్)

మిశ్రమ ఫలాల జామ్ తయారీకి కనీసం రెండు రకాల పండ్లను తీసుకొనవలెను. తీసుకొనే పండ్లలో ఆపిల్, బొప్పాయి, మరియు జామ పండ్లు ఎక్కువగాను అరటి, సపోటా, అనాస మొదలగునవి తక్కువ గాను ఉండేటట్లు తీసుకొనవలెను. పచ్చివి మరియు మరీ పండిన పండ్లు పనికిరావు.

కావలసిన పదార్థాలు మరియు కొలతలు : మిశ్రమ ఫలాల గుజ్జు – 1 కిలో; పంచదార – 1 కిలో; నిమ్మఉప్పు – 8–10 గ్రాములు (1.5–2 తలగొట్టిన చెంచాలు); రాజ్బెర్రీ రెడ్ కలర్ – చిటికెడు; మిక్స్‌డ్ ఫ్రూట్ ఎసన్సు – 1/2 టీ చెంచా; ఎస్.బి. పొడి – 1/2 గ్రాము (చిటికెడు); తయారయ్యే జామ్ బరువు – 1.5 కిలో; తయారీ ఖర్చు – 1 కిలోకి సుమారు రూ. 200/–.

తయారు చేయు విధానము : పండ్లను కడిగి, అవసరమనిపిస్తే చెక్కు తీసి, గింజలను తొలగించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి తగుమాత్రం నీళ్ళలో ముక్కలు బాగా మెత్త బడునంతవరకు ఉడికించి, కొద్దిగా చల్లారనిచ్చి మిక్సీలో వేసి మెత్తటి గుజ్జుగా చేసి కొలుచుకొనవలెను. కొలత ప్రకారం పంచదారను పండ్ల గుజ్జులో కలిపి ఉడికించవలెను. జామ్ ఓ మోస్తరుగా చిక్కబడిన తరువాత నిమ్మ ఉప్పు కలిపి జామ్ తయారు అయ్యేంత వరకు ఉడికించవలెను.

వేడి జామ్‌ను గాజు సీసాలలో నింపేటప్పుడు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు : 1. సీసాలలో ఏ మాత్రం తేమ ఉండకూడదు, 2. గాజు సీసాలను చెక్క బల్ల / రెండు మూడు మడతలు వేసిన దుప్పటి మీద వుంచి వేడి జామ్‌ను పొయ్యవలెను.

II. పండ్లతో స్వాష్‌ల తయారీ :

పండ్ల ఎంపిక : పండ్లను ఎన్నిక చేసేముందు తాజాగా బాగా పండిన పండ్లను ఎంపిక చేయాలి. ముందుగ పండ్లను ఎక్కువ నీటిలో కడగాలి. తర్వాత పండ్లను చేతితో బాగా మెదపాలి, పండ్ల గుజ్జును కొద్దిగా మందపాటి గుడ్డలో కట్టి రసం పిండాలి. గుడ్డలో మిగిలిన పండ్ల గుజ్జును మరి రెండుసార్లు అవసరమైతే వేడిచేసి కొద్దిగ నీరు వేసి రసం తీసి వుంచుకోవాలి. మొత్తం రసం ఒక గిన్నెలోనికి తీసుకోవాలి. చెక్కర తీగపాకం వచ్చేంతవరకు వేడిచేయాలి.

లేత పాకం గుర్తించటానికి చిట్కాలు : ఒక సాసర్లో కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని అరచెంచా పాకం తీసి సాసర్ నీళ్ళలో వేయాలి, అది నీళ్ళలో విడిపోకుండా అలాగే ముద్దలా వుండిపోతుంది. అదే పాకం తయారు అయినట్లు గుర్తు. ఒక వేళ పాకం నీళ్ళలో విడిపోయినట్లయితే, అది పాకం కానట్లు.

పాకాన్ని దించి చల్లబడిన తర్వాత పిండి వుంచుకున్న రసాన్ని కలపాలి. వేడినీళ్లలో ముంచి తీసి ఆరబెట్టిన సీసాల్లో నింపుకుని నిలువచేయాలి. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచటానికి పొటాషియం మెటాబైసల్ఫేటు లేదా సోడియం బెంజోయేట్ అనే రసాయనాన్ని ఒక కేజీకు 2 గ్రాముల చొప్పున కలుపుకోవాలి.

ద్రాక్ష స్క్వాష్ : కావలసిన పదార్థాలు మరియు కొలతలు : ద్రాక్ష గుజ్జు – 1 లీటరు (నలుపు లేదా ఆకుపచ్చ ద్రాక్ష); పంచదార – 2 కిలోలు; నీళ్ళు – 1 లీటరు; నిమ్మ ఉప్పు – 30 – 35 గ్రా.; ద్రాక్ష ఎసెన్స్ – 4 టీ చంచాలు / స్పూన్స్; రాజ్బెర్రీ రెడ్ కలర్ – చిటికెడు; ఎస్.బి.పొడి – 3 గ్రా.; తయారయ్యే స్క్వాష్ – 3 1/4 లీటర్లు;

తయారు చేయు విధానము : ద్రాక్షను కడిగి, కాడలను తీసివేసి, మెత్తగా పిసికి నీళ్ళు కలుపకుండా కుక్కర్ లేదా గిన్నెలో 6–7 నిమిషాలు ఉడికించి స్ట్రెయినరులో వేసి గుజ్జు తీయవలెను. ద్రాక్ష గుజ్జును కొలుచుకొని ఒక ప్రక్కన ఉంచవలెను. రసం కొలతలను బట్టి కావలసిన నీళ్ళను ఒక గిన్నెలో తీసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టవలెను. నీళ్ళు మసిలేటప్పుడు కొలత ప్రకారం పంచదార కలుపవలెను. పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తరువాత నిమ్మ ఉప్పును కలిపి, పలుచటి గుడ్డ ద్వారా వడగట్టి చల్లార్చవలెను. పూర్తిగా చల్లారిన పాకంలో ద్రాక్షరసం, రంగు, ఎసన్స్ మరియు ఎస్.బి. పొడిని కలిపి శుభ్రమైన సీసాలలో నింపవలెను.

III. పండ్లతో సాస్ / కెచప్ తయారీ :

టమాట కెచప్ / సాస్ : కావలసిన పదార్థాలు మరియు కొలతలు : బాగా పండిన టమాటాలు – 5 కిలోలు; పెద ఉల్లి (రుబ్బినవి) – 250 గ్రా.; వెల్లుల్లి (రుబ్బినవి) – 25 గ్రా.; అల్లం (రుబ్బినవి) – 25 గ్రా.; ఉప్పు – 20–25 గ్రా.; కారం – 4–7 గ్రా.; పంచదార – 150 గ్రా.; గరం మసాల పొడి – 3 గ్రా.; వైట్ వెనిగరు – 100 మి.లీ.; ఎస్.బి. పొడి – 3 1/4 గ్రా.; సీసాలు – 1.

తయారు చేయు విధానము : టమాటాలను కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోయవలెను. పెద్ద ఉల్లి, అల్లం, వెల్లుల్లిని విడివిడిగా మెత్తగా రుబ్బి టమాటా ముక్కలలో కలిపి కుక్కర్ లేదా సాధారణ గిన్నెలో నీళ్ళు కలుపకుండా ఉడికించి స్ట్రెయినరులో వేసి తిప్పి టమాటా గుజ్జును తీయవలెను. గుజ్జును కొలుచుకొని, కొలత ప్రకారం కారం మరియు గరం మసాలా పొడిని ఒక గుడ్డలో మూటకట్టి టమాటా గుజ్జులో వేయవలెను. మొత్తం పంచదారలో మూడవ వంతున టమాటా గుజ్జులో కలిపి తిరిగి చిక్కబడునంత వరకు ఉడికించవలెను. గుజ్జు సుమారు సగం అయిన తరువాత మిగిలిన పంచదార మరియు వెనిగర్‌ను కలిపి ఉడికించవలెను. గరం మసాలా మూటను బయటకు తీసి కెచప్‌లోకి గట్టిగా పిండవలెను. ఉప్పు కలిపి మరికొద్ది సేపు ఉడికించి ఎస్.బి. పొడిని కలిపిన వెంటనే తగు జాగ్రత్తలతో సన్న మూతి గల గాజు సీసాలతో ఏ మాత్రం ఖాళీ వదలకుండా నింపి మూతలను గట్టిగా బిగించవలెను.

IV. పండ్లతో టాఫీ : ఆపిల్, బొప్పాయి, జామ మరియు మామిడి పండ్లతో టాఫీ తయారు చేసుకొనవచ్చును.

కావలసిన పదార్థాలు మరియు కొలతలు : మిశ్రమ ఫలాల గుజ్జు – 1 కిలో; పంచదార – 500 గ్రా.; గ్లూకోజ్ – 100 గ్రా.; మిల్క్ మైడ్ లేక స్కిం మిల్క్ పౌడర్ – 150 మి.లీ; డాల్డా – 150 గ్రా.; బటర్ పేపరు – 1 లేదా 2 షీట్లు; తయారయ్యే టాఫీ – 1.25 కిలో; తయారీ ఖర్చు 1 కిలోకి సుమారు రూ. 250/–.

తయారు చేయు విధానం : జామ్‌లో వివరించిన విధంగా పండ్ల నుండి గుజ్జు తీసి, కొలిచి వుంచుకొనవలెను. పంచదారలో గ్లూకోజును కలిపి, ఆ మిశ్రమాన్ని పండ్ల గుజ్జులో కలిపి ఉడికించవలెను. టాఫీ ఉడికేటప్పుడు డాల్డాను కొద్దికొద్దిగా కలుపుతూ ఉండవలెను. టాఫీ ఓ మోస్తరుగా చిక్కబడిన తరువాత మిల్క్‌మైడ్‌ను లేక నీళ్ళతో కరిగించిన స్కిం మిల్క్ పౌడరును కలిపి టాఫీ తయారయ్యేటంత వరకు ఉడికించి, డాల్డా రాసి వుంచిన ట్రేలో సుమారు 1/2 సెం.మీ ఎత్తు వరకు పోసి, చదునుగా చేసి, చల్లారిన తరువాత ముక్కలుగా కోసి, బటర్ పేపర్‌తో ప్యాక్ చేసుకొనవలెను.


సూచన : టాఫీ తయారయినదీ లేనిదీ తెలుసుకొనడానికి కొంచెం టాఫీని నీళ్ళలో వేసి చూడవలెను. అది గట్టి ఉండలాగా ఏర్పడినట్లయితే టాఫీ తయారయినట్లుగా గుర్తించవలెను.

V. పండ్లతో డిహైడ్రేషన్ ఉత్పత్తులు :

పండ్లలో నీటి తొలగింపును డిహైడ్రేషన్ అంటారు. పండ్లలో నీరు శాతం లేకపోవడం వలన పండ్లు ఎక్కువ నెలలు నిల్వ ఉంటాయి. ఈ పద్ధతి అన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలతో చేసుకొనవచ్చును. సాధారణంగా మనం పండ్లను ఎండపెడతాం. ఇలా ఎండపెట్టె ముందు మనం పండ్లను బ్లాంచింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్లాంచింగ్ మూలంగా పండ్లు రంగు మారవు. మంచి వాసన, రుచి కూడా ఉంటాయి. ఆమ్లా, జామ, పైన్‌ఆపిల్, ఆపిల్, టమాటా, క్యారెట్, అల్లం, వెల్లుల్లి మొదలగు వాటిని డీహైడ్రేషన్ చేయవచ్చు.

బ్లాంచింగ్ చేసే పద్ధతి : ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్ళు పోసి మరగనివ్వాలి. మరిగే నీటిలో శుభ్రం చేసిన పండ్లను వేసి ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచి నీరు వంచేయాలి. తరువాత చల్లటి నీటిలో పండ్లను వేసి వడకట్టాలి. ఇలా బ్లాంచింగ్ చేసిన పండ్లను ఎండబెట్టడం లేదా యంత్రం సహాయంతో ఆరబెట్టడం చేయవచ్చు. ఇలా ఎండిన పండ్లను మనం తినవచ్చు.

ఆమ్లా డీహైడ్రేషన్ :



ఆకుకూరలతో – మన ఆరోగ్యం :

మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆరోగ్య అవసరాలలో ఆకుకూరలు చేసే అద్భుతాలెన్నో. శరీరానికి కావాల్సిన అనేక రకాల ఖనిజ లవణాలను, విటమిన్లను అందిస్తుంది. ఆకుకూరలు నిత్యం తినడం వల్ల వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచడం, చర్మ రక్షణకు, కంటి సమస్యలకు, రక్తహీనతకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆకుకూరలు మన ఆహారాన్ని రుచికరంగా చేస్తాయి. ఆకుకూరలు వండుకునే ముందు ఖచ్చితంగా ఒకటికి రెండు సార్లు కడగడం మంచిది. ఎందుకంటే వాటిలో చేరే చిన్న చిన్న పురుగులు, దుమ్ము, ధూళి మన ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించవచ్చు. అవసరమైతే ఆకు కూరలు కడిగేటప్పుడు పొటాషియం పర్మాంగనేట్‌తో శుభ్రం చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి.

మనకు మార్కెట్‌లో చాలా ఆకుకూరలు దొరుకుతాయి. కొన్ని సీజన్లను బట్టి దొరుకుతాయి. కాబట్టి ఏ సీజన్‌లో దొరికే ఆకుకూరను, ఆ సీజన్‌లో తినాలి. సాధారణంగా మనకు అందుబాటులో ఉండే ఆకుకూరలు బచ్చలికూర, పాలకూర, తోటకూర, గోంగూర, కొత్తిమీర, పుదీనా. బచ్చలికూరను ఎక్కువగా వేసవిలో తీసుకోవాలి. ఎండాకాలంలో ఎంత ఎక్కువగా బచ్చలికూరను తింటే అంత మంచిది. వేసవిలో శరీరంలో వచ్చే వేడిని బచ్చలి కూర తగ్గిస్తుంది. శరీరాన్ని చల్ల బరుస్తుంది. అందుకే బచ్చలికూరను వేసవిలో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి.

అన్ని ఆకుకూరల్లో రారాజు పాలకూర, మన అందరం ఇష్టపడే ఆకుకూర, పాలకూర వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శరీరంలో వచ్చే ఎన్నో సమస్యలకు పాలకూర చెక్ పెడుతుంది. కఫం, పిత్తం, వాతాన్ని తగ్గించే గుణం పాలకూరలో ఉంది. తోటకూరలో యాంటిఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల పలు రకాల క్యాన్సర్ కారకాలు నాశనం అవుతాయి. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. గోంగూర గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గోంగూరలో ఉండే పోషకాలు రక్తహీనతను తగ్గిస్తాయి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనాను ప్రతికూరలో వేసుకుంటాం. కరివేపాకు కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. షుగర్ వ్యాధిని కంట్రోల్‌లో ఉంచేందుకు కూడా తోడ్పడుతుంది. కొత్తిమీర జీర్ణ సమస్యలను, ఆస్తమాను తగ్గిస్తుంది. రక్తాన్ని శుద్ధి చేయాలంటే పుదీనాను తినాల్సిందే. ప్రతి ఆకుకూరకు ప్రత్యేకత ఉంది. కావున మీ రోజూవారి ఆహారంలో ఆకుకూరను తినుట మంచిది.

ఆకుకూరలు – నిల్వ చేయు పద్ధతులు

ఆకు కూరలలో మన శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన విటమినులు, ఖనిజలవణాలు సమృద్ధిగా వున్నాయి. ఎక్కువ మొత్తాలలో ఇనుము, కాల్షియం ఉన్నాయి. ఇనుము మూలంగా రక్తాభివృద్ధి జరుగుతుంది. కాల్షియం ఎముకల గట్టితనానికి, పంటి ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం, కంటి ఆరోగ్యానికి, చర్మ రక్షణకు అవసరమైన విటమిన్ 'ఎ', వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగించే విటమిన్ 'సి'. వీటితో పాటు 'బి' విటమిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, రైబోఫ్లెవిన్ కూడా సమృద్ధిగా వున్నాయి. ఆకు కూరలలో ఎక్కువ పీచు పదార్ధం వుంటుంది. ఈ పీచు పదార్ధం వలన మలబద్ధకం అరికట్టవచ్చు. మధుమేహ వ్యాధి గ్రస్తులకు, రక్తంలో ఎక్కువ కొలెస్ట్రాలు వుండే వారికి కూడా ఈ పీచు పదార్ధం అవసరం.

ఆకు కూరలతో పొడులు :

మనం సాధారణంగా ఆకు కూరలను తాజాగానే తింటుంటాము. కానీ ఆకు కూరలను పొడుల రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా పొడులు చేయడం వల్ల చాలా లాభాలు వున్నాయి.

1. ఈ పొడులను సంవత్సరం పొడవునా వాడుకోవచ్చు. 2. సమయం ఆదా అవుతుంది.

3. వివిధ రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. 4. వైవిధ్యం వుంటుంది.

ఈ పొడుల వాడటం వలన ఆకు కూరలలో లభించే పోషకాలన్నింటిని తగు మోతాదులో పొందవచ్చు.


ఏదైనా ఆకు కూరను పొడి చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా మనం ఆకు కూరను ఎండపెడతాం. ఇలా ఎండపెట్టే ముందుగా మనం ఆకు కూరలను బ్లాంచింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్లాంచింగ్ మూలంగా ఆకు కూరల రంగు మారదు. మంచి వాసన, రుచి కూడా వుంటాయి.

బ్లాంచింగ్ చేసే పద్ధతి : ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్ళుపోసి మరగనివ్వాలి. మరిగే నీటిలో శుభ్రం చేసిన ఆకు కూరలను వేసి ఒక నిమిషం వుంచి నీరు వంచేయాలి. తరువాత చల్లటి నీటితో ఆకు కూరలను వేసి వడకట్టాలి. ఇలా బ్లాంచింగ్ చేసిన ఆకు కూరలను మంచి ఎండలో ఎండపెట్టాలి. ఎండిన ఆకు కూరలతో వివిధ రకాల పొడులు, కారాలు తయారు చేసుకోవచ్చు.

ఆకు కూరల పొడుల తయారీకి వాడదగిన ఆకులు :

1) కరివేపాకు 2) పుదీనా 3) తోటకూర 4) గోంగూర 5) మునగ.

ఆకు కూరల పొడులు తయారు చేసే విధానం :



ప్యాకింగ్ చేయుట

ఆకు కూరల పొడుల తయారీ పరిశ్రమకు అయ్యే ఖర్చు :

1.	భవనం మరియు ఇతర సివిలు పనులు	–	రూ. 4.00 లక్షలు
2.	యంత్ర పరికరాలు	–	రూ. 5.00 లక్షలు
3.	పూర్వ ఉత్పత్తి వ్యయాలు	–	రూ. 0.50 లక్షలు
4.	ఇతర స్థితి వ్యయాలు	–	రూ. 1.00 లక్షలు
5.	వర్కింగ్ కాపిటల్ మార్జిన్	–	రూ. 1.00 లక్షలు
	మొత్తము	**–**	**రూ. 11.5 లక్షలు**

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహా ఆచార్యులు (ఉద్యాన శాస్త్రం), సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు.

ఫోన్ నెం. : 78930 70555

పిల్లలలో పరిపూర్ణ అభివృద్ధి కొరకు పాజిటివ్ పేరెంటింగ్

ప్రపంచంలో అన్నింటికన్నా గొప్ప విద్య, అన్ని కళలలోనూ గొప్ప కళ "పిల్లల పెంపకం". ఈ నాటి ఆధునిక సమాజంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలను పెంచే విధానాలలో చాలా మార్పులు మనం గమనిస్తున్నాము. గతంలో కంటే వర్తమాన సమాజంలో 'తరాల మధ్య అంతరం' అనూహ్యంగా పెరిగింది. తల్లిదండ్రుల ప్రపంచం, పిల్లల ప్రపంచం వేర్వేరుగా ఎదుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రాచుర్యం పొందిన మరియు మానసిక వైద్యులు, సైక్రియాట్రిస్ట్‌లు తరచూ చెపుతున్న మాట "పాజిటివ్ పేరెంటింగ్" అనగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలను అర్థం చేసుకొని, సానుకూల దృక్పథంతో, సమర్థవంతంగా పిల్లలను పెంచడం.

భావితరం నిస్తేజం కాకుండా ఉండాలంటే పిల్లల పెంపకంలో అమ్మ–నాన్నలు బహు పాత్ర పోషణ చేయడం అనివార్యం. పిల్లల సంరక్షణ, పోషణలో తల్లిదండ్రులకు అంకితభావం ఉండాలి. వారిలో గ్రహణశక్తి పెంపుదలకు తగిన ఉత్ప్రేరణ కలిగించాలి. పోషకాహారం అందించాలి. మంచి – చెడు విడమర్చి అర్థమయ్యేలా వివరిస్తూ సున్నిత విమర్శకులుగా ఉండాలి. సామాజిక దృష్టిని అలవరచాలి. వారికి సరియైన మార్గదర్శకత్వం వహించాలి. పిల్లలతో ఆడుతూ, పాడుతూ శ్రేయోభిలాషిగా, స్నేహితులుగా మెలగాలి.

పిల్లలను పెంచడం ఒక అందమైన పూల మొక్కను పెంచడం లాంటిది. పిల్లల పెంపకంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లలను అతిగా గారాబం చేయకూడదు. అలాగని బొత్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. అనవసరంగా దండించకూడదు. అలాగని అలుసిచ్చి తల్లిదండ్రులు చులకన కాకూడదు. క్రమశిక్షణ పేరుతో మరీ కఠినంగా ఉండడం ఎంత మంచిది కాదో, మరీ పట్టించుకోకుండా ఉండడం కూడా మంచిది కాదు. అందుకే పిల్లల పెంపకం కత్తి మీద సాములాంటిది.

సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలను పెంచే విధానాన్ని బట్టి వారిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. పిల్లలను పెంచే విధానాన్ని బట్టి వారి శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది.

పిల్లలను క్రమశిక్షణతో పెంచే విధానాలు పరిణామాలు

1. నియంత్రణతో కూడిన స్వతంత్ర పద్ధతిలో పిల్లలను పెంచడం

తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన	పరిణామాలు
1. అధిక డిమాండ్	1. ఉన్నత విద్యా విజయం
2. అధిక ప్రతిస్పందన	2. ఆత్మగౌరవం పెంపొందుతుంది
3. మార్గదర్శకత, స్వతంత్ర్యం	3. సామాజిక నైపుణ్యం పెంపొందుతుంది.
4. క్రమశిక్షణ, ఆప్యాయత	4. మెరుగైన మానసిక ఆరోగ్యం

2. అధిక నియంత్రణ, కఠిన పద్ధతిలో పిల్లలను పెంచడం

తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన	పరిణామాలు
1. అధిక డిమాండ్ నియంత్రణ	1. అసంతృప్తి
2. తక్కువ ప్రతిస్పందన	2. తక్కువ ఆత్మగౌరవం
3. గుడ్డి విధేయత	3. మానసిక సమస్యలు
4. కఠినమైన నియమాలు	4. విద్య విషయంలో వెనకబడటం
5. క్రమశిక్షణ మరియు శిక్షలు	5. స్వతంత్రత లేకపోవడం

3. నియంత్రణ, నియమాలు లేకుండా పిల్లలను పెంచటం

తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన	పరిణామాలు
1. తక్కువ డిమాండ్	1. స్వీయ నియంత్రణ లేకపోవడం
2. అధిక ప్రతిస్పందన	2. సామాజిక, జీవన నైపుణ్యాలు లేకపోవడం
3. తక్కువ నియమాలు	3. నియమాలను పాటించరు, సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది

4. నిర్లక్ష్య పద్ధతిలో పిల్లలను పెంచడం

తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన	పరిణామాలు
1. తక్కువ ప్రతిస్పందన	1. సరైన మార్గదర్శకత్వం లోపిస్తుంది.
2. నియమాలు ఉండవు	2. మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు
3. తక్కువ డిమాండ్	3. మాదక ద్రవ్యాలు / మత్తు పదార్థాలకు బానిసవుతారు
	4. భావోద్వేగ స్వీయ నియంత్రణ లోపిస్తుంది.

పుట్టినప్పటి నుండి మొదటి రెండు సంవత్సరాలు పిల్లలలో శారీరక, మేధోభివృద్ధి, మానసిక, సామాజిక భావోద్వేగాభివృద్ధి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఈ వయస్సులో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు కనుక, తల్లిదండ్రులు వారి సంపూర్ణ అభివృద్ధికి అవసరమైన అన్ని వసతులు కల్పించాలి. పిల్లలు స్వేచ్ఛగా ఆడుకుంటూ పరిసరాలను గమనిస్తూ వివిధ అంశాలను నేర్చుకొంటారు. తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని, ప్రతి విషయం, ప్రతి వస్తువు తమకు తెలిసిరావాలని తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. (అందుకే ఈ వయస్సు పిల్లలున్న ఇంటి పరిసరాలు, వాతావరణం ఉత్ప్రేరణ కలిగించే విధంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి.)

కాబట్టి వారిలో ఆలోచనా అభివృద్ధిని పెంచే ఆట వస్తువులు తల్లిదండ్రులు అందుబాటులో ఉంచాలి. ఈ కీలక దశలో పిల్లల శారీరక, మానసిక పెరుగుదలకు సంబంధించిన అన్ని ప్రోత్సాహిక చర్యలనూ తల్లిదండ్రులు చేపట్టాలి. ఈ వయస్సులో పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల నుంచి అందిన ప్రేమానురాగాలు, సహాయ సహకారాలే భవిష్యత్తులో ఉత్తమ వ్యక్తులుగా రూపొందించడానికి దోహదపడతాయి.

సరియైన పద్ధతిలో పెరిగిన పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో మమతాను బంధాలు ధృఢంగా కలిగి పెద్దయిన తరువాత ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిన మంచి పౌరులుగా మెలుగుతారు.

ఈ మధ్యకాలంలో మనం తరచూ గమనిస్తున్న విషయం విపరీతమైన సెల్‌ఫోన్ వాడకం. తలిదండ్రులు మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు చేస్తున్నారు. పిల్లలను తినిపించడానికి, నిద్రపుచ్చడానికి, ఆడుకోవడానికి మొబైల్ ఫోన్‌ను ఇస్తున్నారు. ఇది చాలా అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. చిన్న వయస్సు నుండి సెల్‌ఫోన్‌కు బానిసై, వ్యసనంగా తయారవుతున్నారు. వీటి వల్ల కంటి చూపు మందగించడం, మనోవికాసాభివృద్ధి, శారీరక, భాషాభివృద్ధి, సాంఘీక, భావోద్వేగాభివృద్ధి వయస్సుకు తగ్గట్టు జరుగక ఎన్నో ప్రవర్తనా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు తరచూ మొబైల్ ఫోన్ ఇచ్చి వారి పాత్రను, బాధ్యతను విస్మరిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ తల్లిదండ్రులకు ఎన్నిటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాదు. పేరెంట్స్‌కి పిల్లలకి ఒకరి పట్ల ఒకరికి నమ్మకం, స్నేహం ఉంటే పిల్లలు ఏ విషయాలకు కూడా భయపడరు. ఏ సమస్య వచ్చినా తల్లిదండ్రులతో పంచుకుంటారు. అందుకని తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టంలా తయారవ్వాలి. కొంచెం ఓపిక, సానుభూతి, సరియైన ప్రయత్నం ఉంటే పిల్లలతో ఇటువంటి అనుబంధాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లల మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచే పది సూత్రాలు :

1. సమయం వెచ్చించండి : ప్రతి తల్లి, తండ్రి నుండి పిల్లలు కోరేది ఖరీదైన బహుమతులు కాదు. వారు వెచ్చించే సమయమే పిల్లలకు అతి ఖరీదైన బహుమతి. ఎన్ని పనులున్నా, ఎంత బిజీగా ఉన్నా పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా సమయాన్ని కేటాయించాలి. పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడం, కబుర్లు చెప్పడం, కళ్ళలోకి చూస్తూ మాట్లాడటం వంటివి తరచూ చేయాలి. పిల్లలతో 'ఎంత' సమయం గడిపామన్నది ముఖ్యం కాదు కానీ, 'ఎలా' గడిపామన్నది ముఖ్యం.

2. పిల్లలు చెప్పేది వినండి : తల్లిదండ్రులు మంచి శ్రోతలుగా మారాలి. పిల్లలు చెప్పే విషయాలన్నింటినీ ఓపికగా, శ్రద్ధగా వినాలి. వారి భావాలను, ఆలోచనలను, స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరిచే అవకాశాలను కల్పించండి. పొరపాట్లు చేస్తున్నారను కొంటే సరిగ్గా గైడ్ చేయాలి. మార్గనిర్దేశం చేయాలి.

3. అభిరుచులు పంచుకోండి : పిల్లల అభిరుచులను గుర్తించి, గౌరవించండి. వారికి డాన్స్, పెయింటింగ్ వంటివి ఇష్టమైతే గమనించి, వారు మెరుగుపరుచుకొనేలా ప్రోత్సహించాలి.

4. రోల్‌మోడల్ : పిల్లలు ఎప్పుడైనా మనం చెప్పిన దానికన్నా, మనల్ని చూసి నేర్చుకొనేదే ఎక్కువ. అందుకే పిల్లలు ఎలా ఉండాలని మనము ఆశిస్తున్నామో ముందు తల్లిదండ్రులు అలా మెలగాలి. ఇతరుల పట్ల దయతో, సానుభూతితో పాజిటివ్‌గా ప్రవర్తిస్తే పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకొంటారు.

5. క్రమశిక్షణ – స్వేచ్ఛ : పిల్లలతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనే అభిప్రాయంతో క్రమశిక్షణను మరిచిపోకూడదు. క్రమశిక్షణకి, స్వేచ్ఛకి సమతుల్యత ఉండాలి. అతి క్రమశిక్షణ, మితిమీరిన స్వేచ్ఛ రెండూ అనర్థదాయకం. స్వేచ్ఛకు పరిమితులు ఉంచాలి. డిసిప్లిన్‌ని ఒక శిక్ష లాగా కాక, ఒక పాఠంలా నేర్పాలి. తమ తప్పుల నుండి నేర్చుకొనేలా వారిని తయారు చేయాలి.

6. నమ్మకం పోగొట్టుకోవద్దు : పిల్లలకు మీ పట్ల ఉన్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదు. వాళ్ళకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ / మాట ఎప్పుడూ నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏ అనుసంధానికైనా నమ్మకమే గట్టి పునాది.

7. స్వతంత్రను ప్రోత్సహించండి : స్వతంత్రంగా ఉండాలని పిల్లలు చేసే ప్రయత్నాలకు తల్లిదండ్రులు సహకరించాలి. స్వంతంగా కొన్ని పనులు చేయాడాన్ని ప్రోత్సహించాలి. దీని వల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడమే కాక వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం జరుగుతుంది.

8. సానుకూల వాతావరణంలో పెంచండి : పిల్లలలో మొదటి రెండు సంవత్సరాలు మానసిక, శారీరక అభివృద్ధి, వికాసంలో చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రేమ పూరిత వాతావరణంలో పెరుగుదల చాలా ముఖ్యం. పసితనంలో ఎక్కువ అనాదరణ, కోపం, ఆవేశం వంటివి ఎదుర్కొన్న పిల్లలు ఎదుగుతున్న కొద్ది నెగెటివ్ ఫీలింగ్స్‌ను పెంచుకొంటారు. భావోద్వేగ నియంత్రణ వారిలో లోపిస్తుంది. పసిపిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు తల్లులు వెంటనే స్పందించినట్లయితే పిల్లలకు భద్రతా భావం, ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది.

9. విలువలను నేర్పించండి : అన్ని విషయాలతో పాటు పిల్లలకు 'విలువలు' నేర్పించవలసిన అవసరమూ ఉంది. పిల్లల ముందే ఇంట్లోని పెద్దలు అసభ్యంగా మాట్లాడటం, అబద్ధాలాడటం, కఠినంగా ప్రవర్తించడం వంటివి చేస్తుంటే పిల్లలకూ అవే అలవాటవుతాయి. ఇరుగు, పొరుగు వారితో సఖ్యంగా ఉండటం, సహాయ పడటం, పేదలు, పనివారి పట్ల దయ, జాలి, సానుభూతి చూపడం వంటి సామాజిక విలువలను ప్రత్యక్షంగా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు పాటిస్తూ వారికి నేర్పించాలి. పిల్లల ముందు పెద్దలు పొగత్రాగడం, మాదక ద్రవ్యాలు సేవించడం, అబద్ధాలు చెప్పడం, బూతు పదాలు వాడటం వంటి పనులు చేయరాదు.

10. మొబైల్ ఫోన్ / ట్యాబ్‌ల వాడకాన్ని నియంత్రించండి : మితిమీరిన మొబైల్ ఫోన్లు / ట్యాబ్‌ల వినియోగం పిల్లల అభివృద్ధి మరియు మానసిక ఆరోగ్యం మీద తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. విపరీతమైన ప్రవర్తన, హింసతో కూడుకున్న వీడియో గేమ్స్‌ని పిల్లలు ఆడటం వల్ల పిల్లలలో హింసా ప్రవృత్తి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. వారి మెదడులో భావావేశాలను అదుపు చేసే విభాగం మందగించి, చురుకుగా పనిచేయరు. శరీరానికి తగినంత వ్యాయామం లభించదు. పిల్లలలో సున్నితత్వం, సానుభూతి తగ్గి, ఎగ్రెసివ్‌గా తయారవుతారు. పిల్లలు నేర్చుకొన్న సామాజిక విలువలకు భిన్నంగా ఉన్న ప్రవర్తనను టీవీ సీరియల్స్‌లో చూసినప్పుడు వారిలో 'మానసిక సందిగ్ధావస్థ' (కాగ్నిటివ్ డిసొనెన్స్) తలెత్తుతుంది. మానసిక సంఘర్షణను లేవనెత్తి వారి మానసిక ప్రశాంతతను అల్లకల్లోలం చేస్తుంది. క్రైంస్టోరీస్, హార్రర్ సినిమాలు, భయానక హింసాప్రవృత్తి సినిమాలు చూడటం వల్ల తీవ్ర వత్తిడికి లోనవుతారు. మానసికంగా వికృత ధోరణికి, దుర్భల వ్యక్తిత్వానికి అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు చెపుతున్నాయి.

ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా ఫిల్టర్ యాక్సెస్‌ను పొందాలి. ఐ.ఎస్.పి. సాఫ్ట్‌వేర్ లాంటివి పెట్టించాలి. దీని వల్ల పిల్లలు చూడరాని సైట్లను, ఆప్‌లను కట్టడి చేయవచ్చు. పిల్లలను సున్నితంగా గమనిస్తూ వారి ఛాటింగ్, స్నేహితుల గురించి తెలుసుకుంటూ పిల్లలు ప్రక్క దోవ పట్టకుండా తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలు ఎన్నో విషయాలను ప్రత్యేక్షంగా, పరోక్షంగా నేర్చుకొంటారు. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో, ప్రేమానురాగాలు, ఆప్యాయతలతో పెరిగే పిల్లలలో మనోనిబ్బరం, ఆత్మస్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన సామాజిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని భవిష్యత్తులో ఏ రంగంలోనైనా రాణిస్తారు. కాబట్టి పిల్లలలో పరిపూర్ణ అభివృద్ధికి తోడ్పడే ఈ 'పాజిటివ్ పేరెంటింగ్' విధానాలు నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలను సక్రమంగా పెంచడానికి తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

ఆచార్యులు, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హెచ్.డి.ఎఫ్.ఎస్., సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల,

లాం, గుంటూరు - 522 034. ఫోన్ నెం : 89190 89155

పోషకాహార పెరటి తోటల పెంపకం

కూరగాయలను పెరటిలో పండించడం ఒక కళ. మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషక విలువల దృష్ట్యా కూరగాయలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. కూరగాయల్లో మనకు కావాల్సిన ఖనిజ లవణములు, విటమిన్లు సమృద్ధిగా లభ్యమవుతాయి. వీటిని విరివిగా ఉపయోగించడం వల్ల, రోగ నిరోధక శక్తి కూడా వృద్ధి చెందుతుంది.

పెరట్లో కూరగాయలు పండించడం వల్ల సొంత డబ్బులు పెట్టి కాయగూరలు కొనే అవసరం తగ్గుతుంది. దీంతో డబ్బుకూడా ఆదా అవుతుంది. అంతే కాకుండా పెరటిలోని కూరగాయలు బయట కొన్న కూరగాయల కన్నా ఎక్కువ తాజాగా ఉంటాయి. వీటితో క్రిమిసంహారక మందుల వాడకం కూడా తక్కువ ఉంటుంది.

ప్రతి కుటుంబం వారి ఇంటి చుట్టూవున్న స్థలంలో కూరగాయలు, పండ్లు సంవత్సరం పొడవునా పండించి వాడుకుంటే తాజా కూరగాయలతో పాటు మానసిక, శారీరిక ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు.

కుండీలలో కూరగాయల పెంపకము : పెరడు లేనివారు మొక్కలను కుండీలలో కూడా పెంచవచ్చు. ఈ కుండీలను బాల్కనిలో, వరండాల్లో మిద్దెలపైన కూడా ఉంచి మొక్కలను పెంచవచ్చు. ఇసుక, మట్టి, పశువుల ఎరువు కలిపిన మిశ్రమముతో కుండీలను నింపాలి. అధిక తేమ బయటికి వెళ్ళేందుకు వీలుగా ప్రతి కుండీకి అడుగున బెజ్జాలుండాలి. ఇవి పూడిపోకుండా పెంకు ముక్కలు బెజ్జంపైన పేర్చాలి. మిరప, టమాట, ధనియాలు, బెండ మొదలగు కూరగాయలను కుండీలలో పెంచవచ్చును.కుండీలను ఒక పంట తర్వాత కుండీలోని మట్టినంతా బయటకు తీసి అందులో వేర్లు లేకుండా శుభ్రం చేసి కొన్ని రోజులు ఎండలో ఉంచాలి. తర్వాత ఈ మట్టిలో ఏదైనా జీవన ఎరువు, వర్మికంపోస్టు సగం కలిపి మళ్ళీ కుండీలో నింపి మొక్కలు వెయ్యవచ్చు. కుండీలలో పెంచే మొక్కలపై మనం మరింత శ్రద్ధ చూపాలి. సరైన సమయంలో కాలాన్ని బట్టి, మొక్క పొడవుని బట్టి మరియు పంటని బట్టి నీటి తడులిస్తూ ఉండాలి. ఏదేమైనా కుండీలలో మొక్కలు పెంచడం అనేది ఒక మంచి అలవాటుగా మలచుకోవచ్చు. పట్టణాల్లో పెరడు సాధ్యం కాని వారికి ఈ కుండీలలో కూరగాయలు సాగు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

పెరటి తోటలలో పండ్ల మొక్కలు పెంచవలసిన ఆవశ్యకత : కూరగాయలతో పాటు మన చట్టూ కొన్ని పండ్ల మొక్కలను నాటుకున్నట్లయితే అవి మనకి ఎన్నో పోషక విలువలు కలిగిన పండ్లను ఇస్తాయి. ఉదాహరణకు జామ, నిమ్మ, బొప్పాయి, సీతాఫలం, దానిమ్మ, సపోటా, కొబ్బరి, ఉసిరి వంటి మొక్కలను నాటుకొనుట మంచిది. ఒక్కసారి నాటిన తర్వాత అవి నిత్యం మనకు ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఉంటాయి. పండ్లు మన శరీర ఆరోగ్యానికి కావలసిన విటమిన్ల ఖనిజ లవణాలు, ఆమ్లాలు, జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడే ఎంజైములు, పీచు పదార్థం మరియు శక్తిని అందిస్తాయి. విటమిన్ల లోపం వల్ల సాధారణంగా కన్పించే రక్తహీనత, రేచీకటి, నోటిపూత, కీళ్లనొప్పులు, చిగుళ్ళ వాపు మరియు రక్తం కారుట వంటి రుగ్మతలను అరికట్టవచ్చును. అంతేకాక సీతాఫలం, జామ, బొప్పాయి వంటి పండ్లు అధిక మోతాదులో ప్రోటీన్లను కలిగి ఉండి మన శరీర పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. అదేవిధంగా నిమ్మజాతి పండ్లు, జామ, సీతాఫలం, సపోట మొదలైనవి శరీరంలో ఎముకల బలానికి అవసరమైన కాల్షియంను అందిస్తాయి. అంతేకాక మన జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరిగి ఆకలి కలగడానికి దోహదపడే ఆమ్లాలను అందిస్తాయి.

బొప్పాయి నుండి అధిక మోతాదులో 'ఎ' విటమిన్ లభించడమే కాక జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడే ఎంజైములు కూడా లభిస్తాయి.

పాఠశాలలో పెరటి తోటల ఆవశ్యకత : పాఠశాలకు వెళ్ళే పిల్లల్లో అధిక శాతం పిల్లలు సరియైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల పోషకాహార లోపానికి గురి అవుతున్నారు. పిల్లలు సాధారణంగా పేదరికము, పాఠశాల వాతావరణానికి అలవాటు పడకపోవుట వంటి కారణాల వల్ల భోజనము సరిగా తీసుకోరు. పోషకాహారంపై జరిగిన సర్వేల ప్రకారం పాఠశాల పిల్లల్లో క్యాలరీలు, ప్రొటీన్లు , విటమిన్ 'ఎ', రైబోఫ్లేవిన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ మరియు ఇనుము లోపాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి. 50 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్లో రక్తహీనత కన్పిస్తుంది. అందువల్ల వారి పెరుగుదల, చదువుపై శ్రద్ధ, విషయాన్ని గ్రహించే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. పోషకాహార లోపంతో బాధపడే పిల్లలు శారీరకంగా మరియు మానసికంగా అభివృద్ధి చెందలేరు. అందువలన పాఠశాలలో పెరటి తోటలను పెంచవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. మధ్యాహ్న భోజన పధకమనేది పిల్లల ఆరోగ్యము మరియు పౌష్టికతను మెరుగుపరచుటలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. పాఠశాలలో పెరటి తోటలను పెంచడం వల్ల తాజా కూరగాయలు లభించుటయే కాక పిల్లల్లో ఇది ఒక మంచి అలవాటుగా మారుతుంది. పెరటి తోటల్లో కూరగాయలు పెంచడం వారిలో పని సంస్కృతిని, పని విలువ, ఖాళీ సమయాన్ని వినియోగించుకునే కాలక్షేపంగా ఉండుటయేకాక వారిలో పనిపట్ల శ్రద్ధ చిన్నతనం నుండే మొక్కల పెంపకంపై ఆసక్తి వెలువడుతుంది.

పెరటి తోటలో ఔషధ మొక్కలను పెంచవలసిన ఆవశ్యకత : ప్రస్తుత వైద్య విధానంలో అల్లోపతి విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత జనాభా పెరుగుదల దృష్ట్యా ఆరోగ్య పరిరక్షణకు గాను సాంప్రదాయ, దేశీయ వైవిధ్యమైన హోమియో, ఆయుర్వేదం మీద ప్రజలు మక్కువ చూపుతున్నారు. మనదేశంలో పెరిగే 15 వేల నుండి 18 వేల మొక్కలలో 8 వేల మొక్కలు ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన అశ్వగంధ, నేల ఉసిరి, కలబంద, దుంపరాష్ట్ర, పొడపత్రి, నేలవేము, లక్ష్మీతులసి, కృష్ణతులసి, అడ్డసరము, వాము ఆకు, సరస్వతి ఆకు మొదలగునవి పెరటి తోటలలో కూరగాయలతో పాటుగా పెంచవచ్చు.

ఏడాది పొడవునా ఉండే ప్లాట్ : ములగకాడ, అరటి, బొప్పాయి, కరివేపాకు, కర్రపెండలం. ఏడాది పొడవునా ఏదో ఒక పంట పండుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని నిరాటంకంగా పండుతూనే ఉంటాయి. కొన్ని ఏడాదికి రెండు కాపులనిస్తాయి. వీటిని ఒకే ప్లాటులో పండించడం మంచిది.

పెరటి తోటల పెంపకం :

కూరగాయలు : మన నిత్య జీవితంలో కూరగాయలు ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. ముఖ్యంగా శాఖాహారులకు పోషక పదార్థాలతో కూడిన ఆహారం సమకూరేది కేవలం కాయగూరల ద్వారానే అనడంలో అతిశయోక్తి కాదు పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం ఒక సమతుల్యమైన ఆహారాన్ని అందుకోవాలంటే, పెద్దవారికి రోజుకు కనీసం 85 గ్రా. పండ్లు, 300 గ్రా కూరగాయలు అవసరం కానీ, మన దేశంలో ప్రస్తుతం కాయగూరల ఉత్పత్తి అవుతున్నదాని ప్రకారం చూస్తే, రోజుకు సగటున ఒకరికి కేవలం 120 గ్రా. కూరగాయలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పెరటిలో మొక్కల పెంపకం : మనకోసం మనం, ఇంట్లోనే కాయగూరలను, ఉత్పత్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనాఉంది. సామాన్యంగా గ్రామంలో ఇంటి వెనక పెరటి తోటలు ఉంటాయి. కాని ఎంత మందికి కూరగాయలు కావాలి? వాటిని పెంచేందుకు ఎంత సమయం కేటాయించాలి ? అనే విషయాలపై పెరటి తోటల యొక్క పరిమాణం ఆధారపడి ఉంటుంది. పెరటి తోట, సాధ్యమైనంత వరకు దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉండటం మేలు, పొడవుగా, సన్నగా ఉన్న మళ్ళలో విత్తనాలు వేయడానికి, నార్లు నాటుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

వంటింటి దగ్గర : వంట గదికి దగ్గరగా పెరటి తోటను పెంచటం వలన వంటింటి నీటి వ్యర్థాలను మొక్కలకు అందుబాటులో ఉంచవచ్చు. దీని ద్వారా నీటి సద్వినియోగం జరుగుతుంది.

భూమిని సిద్ధం చేయడం : ముందుగా ఒక పార తీసుకొని 30–40 సెం.మీ, లోతుగా భూమిని తవ్వుకోవాలి. రాళ్ళ పొదలు, ముళ్ళు వగైరాలు తొలగించాలి. 100 కిలోల మంచి పొలం నుండి తెచ్చుకున్న సేంద్రియ ఎరువులు లేదా వర్మి కంపోస్టు ఎరువును వేసి మట్టిలో కలపాలి. గట్లు కట్టి, అవసరాన్ని బట్టి మధ్యన 45 సెం.మీ. నుంచి 65 సెం.మీ. ఎడం ఉండేలా చూడాలి. నేల చదునుగా కూడా ఉండొచ్చు.

విత్తు చల్లడం, చెట్లు నాటడం :

- నేరుగా విత్తడం వల్ల వచ్చే బెండ, పందిరి చిక్కుడు, అలసందలు, వంటి కూరగాయలు గట్లుగా ఏర్పరిచిన స్థలాల్లో ఒక వైపు 30 సెం.మీ ఎడంతో విత్తవచ్చు.
- ఎక్కువ దిగుబడి, ఏడాది పొడవునా నిరంతరం కాయగూరల సరఫరాయే కిచెన్ గార్డెన్ ప్రధాన లక్ష్యం. కొన్ని చిట్కాలను వాడి ఈ లక్ష్యాన్ని సులభంగా సాధించవచ్చు.
- ఏడాది పొడవునా నిరంతరం పెరిగే చెట్లను తోటకు వెనుక భాగంలో పెంచాలి. దీనివల్ల వాటి నీడ మిగిలిన మొక్కలపై పడి వాటికి ఎండ తగలకుండాపోయే ప్రమాదాన్ని నివారించవచ్చు. అలాగే మిగిలిన కాయగూర మొక్కలకు కావలసిన పోషకాహారాలను ఇవి లాగేసుకోకుండా కూడా ఉంటుంది.

కూరగాయలను పెంచటంలో పాటించవలసిన వివిధ పద్ధతులు :

- నారుతో పెంచదగ్గ టమాటా, వంకాయ, మిరప వంటి విత్తనాలను ముందుగా నేలలో గీతలు గీసి విత్తుకోవాలి. అలా వేసాక వాటిపై మట్టి వేసి దాని పై 250 గ్రా. వేప పిండిని కలిపితే, చీమలు విత్తనాలను తినకుండా ఉంటాయి. నాటిన 30 రోజుల తర్వాత టమాటో మరియు 40 నుంచి 45 రోజులకు వంకాయ, మిరప, మొక్కలను తీసి దూరం దూరంగా నాటాలి. నాటిన మొక్కలకు మొదట నీటిని పెట్టాలి. ఆ తర్వాత మొక్కలకు మొదట రెండు రోజులకొకసారి, ఆ తర్వాత 4 రోజులకొకసారి మాత్రమే నీళ్లు పోయాలి.
- నేరుగా విత్తడం వలన వచ్చే బెండ, పందిరి చిక్కుడు, అలసందలు వంటి కూరగాయలను గట్లుగా ఏర్పరిచిన స్థలంలో ఒక వైపు 30 సెం.మీ. దూరంలో విత్తాలి.
- తోటకూరను నాటే ముందు విత్తనాలకు మట్టిని ఉదాహరణకు (5 భాగాల మట్టికి 1 భాగం విత్తనాలను) కలిపి నేలలో వెదజల్లాల్సి ఉంటుంది.
- తక్కువ వ్యవధిలో పెరిగే కొత్తిమీర, పాలకూర, బచ్చలికూర, పుదీనా వంటి మొక్కలను తోటకూర ఇరుప్రక్కల మరియు నడక దారిలో వేసుకోవచ్చు.

వర్మికంపోస్టు వినియోగము :

కూరగాయల మొక్కల్లో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచేందుకు వర్మికంపోస్టు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మొక్కలు లేక పంటపై క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం తగ్గించడానికి వర్మికంపోస్టు తప్పనిసరిగా వాడాలి.

వంగ, బెండ, మిరప మొదలగు కూరగాయలు మొక్కలకు ఒక్కొక్కదానికి 75 నుండి 100 గ్రా. వర్మికంపోస్టును మొక్కనాటే ముందు వేసి ఆ పై మొక్క నాటితే మంచి దిగుబడిని పొందవచ్చు. ఆకు కూరలు పెంచుకునేటప్పుడు చదరపు మీటరు మడికి మూడు కేజిల చొప్పున వర్మికంపోస్టు వేసి ఆరోగ్యవంతమైన ఆకుకూరలు తక్కువ కాలంలో పొందవచ్చు. సస్యరక్షణ కొరకు పురుగు మందులను వాడుటకు బదులుగా వేపగింజల ద్రావణాన్ని ఐదు శాతం పిచికారి చెయ్యాలి. పెరటి తోటను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన పురుగులు, తెగుళ్ళ తాకిడిని కొంత వరకు నివారించవచ్చు. శుభ్రం చేయగా వచ్చిన చెత్త, ఆకులు, కొమ్మలు మొదలగు వాటన్నింటినీ కంపోస్టు గుంటలో వేస్తే బాగా కుళ్లి ఎరువుగా తయారువుతుంది. పెరటితోటలో పనిచేయడానికి ఉపయోగించే చిన్న చిన్న పనిముట్లను దగ్గర ఉంచుకుంటే పనిచేయడం సులువుగా ఉంటుంది.

పెరటి తోట పంటల పథకం : పెరటి తోట పథకం ప్రకారం వేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. పెంచే పైరులు, ప్రతీ పంటకు వాడే రకాలు, పంటల వరుస క్రమం మొదలగు విషయాలను స్పష్టంగా ఈ పథకంలో వేసుకోవాలి. తోటల నుంచి నిరంతరం కూరగాయల సరఫరా జరిగేటట్టుగాను, ఇంటిలో నిలువ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే తప్ప ఏ కూరగాయలు మిగిలిపోకుండా చూడాలి.మన వాతావరణ పరిస్థితులను అనుసరించి, ఐదుగురు సభ్యులున్న చిన్న కుటుంబానికి కావల్సిన కూరగాయలను సుమారు ఐదు సెంట్ల దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా ఉన్న ఆవరణలో పెంచుకోవచ్చు.

పంటల తీరు : భారతీయ పరిస్థితులలో ఏడాది పొడవునా ఏఏ మొక్కలు ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకోవాలో కింద **(పటం 1)** సూచనప్రాయంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది.

పెరటి తోట ఉపయోగాలు : • మన ఇంటిదగ్గర ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని ఉపయోగించుకొని, మన ఇంటి పనులకు ఉపయోగించిన నీరు వృధా పోనివ్వక పెరటితోటకు మళ్ళించి కూరగాయలను పండించడం ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. • క్రిమి సంహారక మందుల అవశేషాలు లేని మంచి పోషక విలువలు కలిగి యున్న రుచికరమైన తాజా కూరగాయలను మన పెరటి తోట నుండి పొందవచ్చు. • ధరలు విపరీతముగా పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఇలా కూరగాయలు పెరటితోటలో పండించుకోవడం వలన ఖర్చు బాగా తగ్గించుకొనవచ్చును. మరియు మిగులు కూరగాయలను అమ్మడం ద్వారా అధిక ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు. • కుటుంబ సభ్యులందరూ కలసి పెరటితోటలో పని చేయడం ద్వారా వ్యాయామము, మానసిక ఉల్లాసము పని ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పిల్లల మధ్య సహకార భావనను పెంపొందించి మంచి అలవాట్లను నేర్పించినట్లుంటుంది. • ఖాళీ సమయాన్ని ఎంతో ఉపయోగకరమైన పనితో సద్వినియోగించడం జరుగుతుంది. • ఇంటి దగ్గర మనమే పండించుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆకుకూరగాయల వినియోగం పెరుగుతుంది. తద్వారా రక్తహీనతను అరికట్టవచ్చు.

పటం 1 : ప్రణాళికా పద్ధతిలో కాయగూరల పెంపకం

ప్లాటు.నెం	కాయగూర మొక్క పేరు	సీజను
01.	టమాటా, ఉల్లి, ముల్లంగి బీన్సు బెండ (ఒక్రా)	జూన్ – సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ – నవంబర్ డిసెంబర్ – ఫిబ్రవరి మార్చి – మే
02.	వంకాయ బీన్సు టమాటా తోటకూర	జూన్ – సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ – నవంబర్ జూన్ – సెప్టెంబర్ మే
03.	మిరప, ముల్లంగి అలసందలు ఉల్లి	జూన్ – సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ – ఫిబ్రవరి మార్చి – మే
04.	బెండ, ముల్లంగి క్యాబేజి గోరు చిక్కుడు	జూన్ – ఆగస్టు సెప్టెంబర్ – డిసెంబర్ జనవరి – మార్చి
05.	ఉల్లి బీట్‌రూట్ టమాటా ఉల్లి	జూన్ – ఆగస్టు సెప్టెంబర్ – నవంబర్ డిసెంబర్ – మార్చి ఏప్రిల్ – మే
06.	గోరు చిక్కుడు వంకాయ, బీట్‌రూట్	జూన్ – సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ – జనవరి
07.	ఉల్లి క్యారెట్ గుమ్మడి పొదచిక్కుడు	జూన్ – సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ – డిసెంబర్ జనవరి – మే
08.	లబ్ – లబ్ (పొద) ఉల్లి బెండ కొత్తిమీర	జూన్ – ఆగస్టు సెప్టెంబర్ – డిసెంబర్ జూన్ – మార్చి ఏప్రిల్ – మే

సూక్ష్మపోషక లోపాల్ని అధిగమించి మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు. • కూరగాయలను రోజూ ఆహారంలో తీసుకోవడం వలన అవి మనం తీసుకున్న ఆహారము జీర్ణమగుటలో సహాయపడటమే కాకుండా ఆకలిని కూడా కలుగజేస్తాయి. పెరటి తోటకి సూర్య రశ్మి బాగా తగలాలి. • తీగజాతి కూరగాయలు పెంచడం వల్ల తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ దిగుబడి మరియు ఆదాయం పొందవచ్చు.

నాటు వేసే పద్ధతి మరియు నారు పోయడం :

• విత్తన పరిమాణం చిన్నగా ఉండే వంగ, టమాట, మిరప వంటి పంటల్లో నారును తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి.

• తీగజాతి కూరగాయలు అయిన కాకర, బీర, చిక్కుడు మరియు విత్తన పరిమాణం పెద్దగా గల మిగతా కూరగాయల పంటలైన బెండ, మునగ వంటి వాటిని నేరుగా విత్తుకోవచ్చు. ఆకు కూరలైన తోటకూర, పాలకూర వంటి వాటిని నారుమడిలో వేసి తరువాత కొద్ది రోజులకు కోత కోయవచ్చు.

కూరగాయలు	వరుసల మధ్య దూరం	మొక్కల మధ్య దూరం
టమాట	60 సెం॥	45 సెం॥
వంగ	60 సెం॥	60 సెం॥
బెండ	60 సెం॥	30 సెం॥
బీర	2.5 మీటర్లు	90 సెం॥
కాకర	2.5 మీటర్లు	90 సెం॥
దోస	1.5 మీటర్లు	75 సెం॥
ఆనప	3 మీటర్లు	90 సెం॥
చిక్కుడు	2.5 మీటర్లు	2 మీటర్లు
తోటకూర	20 సెం॥	20 సెం॥
గోంగూర	30 సెం॥	10 సెం॥
మునగ	2.5 మీటర్లు	2.5 మీటర్లు
బొప్పాయి	1.8 మీటర్లు	1.8 మీటర్లు

• తీగజాతి కూరగాయలను నారుమడి నుండి ప్రధాన పొలంలోకి మార్చవలసిన అవసరంలేదు. నారుమొక్కలు లేదా విత్తనాలకు ప్రధాన మడులలో దిగువ తెలియచేసిన దూరాలలో వేయటం ద్వారా అధిక దిగుబడిని పొందవచ్చు. తీగజాతి కూరగాయలను పందిళ్ళు వేసిగాని, తీగలపై పాకించడం ద్వారా అధిక దిగుబడి మరియు మంచి నాణ్యతను పొందవచ్చు.

పెరటితోట పెంపకంను ప్రతీ కుటుంబం చేపట్టవచ్చును. ఇంటి ఆవరణలో తోటను పెంచటం వలన అందం, ఆహ్లాదం మరియు ఆరోగ్యం కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. పెరటితోట పెంపకం వలన కూరగాయల ఖర్చును ఆదా చేసుకోవచ్చు మరియు పురుగు మందులు లేని కూరగాయలను పండించి ఇంటి కొరకు ఉపయోగించవచ్చు.

పెరటి తోట రకాలు :

1. పెద్దవి :- కనీసం 50 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగి ఉండి కూరగాయలతో పాటు కొన్ని పండ్ల మొక్కలు పెంచవచ్చు. ఉదా:- బొప్పాయి, జామ, నిమ్మ, ఉసిరి, మామిడి మొదలగునవి.

2. మధ్యస్థం :-కనీసం 50-200 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగి ఉండాలి. టమాట, వంగ, మిరప, మెంతులు, కాకర, దోస, బీన్స్, పాలకూర, ముల్లంగి, క్యాబేజీ, గోరుచిక్కుడు మొదలగునవి.

3. చిన్నవి :- కనీసం 150 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగిన భూమిలో ఆకుకూరలు మరియు 2 రకాల కూరగాయల పెంపకం చేపట్టవచ్చు.

పెరటితోట పెంపకంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :- తక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటను పెంచటం వలన ప్రత్యేకంగా అన్ని అంశాలపై శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. • ముందుగా నేలను శుభ్రపరచి పశువుల పెంటవేసి ఆ తరువాత పాదులు చేసుకుని వర్మీ కంపోస్టును వారం రోజుల ముందు కలపాలి. • విత్తనాలు/ నారు నాటుకోవడం మరియు నాటేటప్పుడు దూరం పాటించటం అవసరం. • నాటిన వెంటనే నీరు పెట్టాలి. • ఎప్పటికప్పుడు కలుపును తీయాలి. • ఎండాకాలంలో మూడు రోజులకు ఒకమారు నీరు పెట్టాలి. శీతాకాలంలో అయితే 1 వారం / 2 వారాలకు ఒకసారి పెట్టవచ్చు. • టమాట మడిలో కర్రలు పాతి నిటారుగా పెంచడం ద్వారా అధిక నాణ్యత మరియు ఎక్కువ కాలం నిలువ సామర్థ్యం గల పండ్లను పొందవచ్చు.

పౌష్టికాహార పెరటితోట నమూనా పటం :

తీగజాతి కూరగాయలు అనగా పొట్ల, కాకర, దొండ		బహువార్షిక మరియు ఏక వార్షిక చెట్లు మామిడి, జామ, ఉసిరి, బొప్పాయి, అరటి, మునగ మొదలగునవి
	బెండ	గోరు చిక్కుడు
	వంగ	టమాట
	మిరప	క్యాబేజి
	చిక్కుడు	దోస/ఆనప
	ఆకుకూరలు	క్యారెట్

- ఎత్తైన మొక్కలు ఉత్తరం వైపు పెంచుకోవడం వలన చెట్ల నీడ మిగతా మొక్కలపై ప్రసరించదు. గాలి కూడా తూర్పు నుండి పడమరకి వీయడం వలన గాలి, సూర్యరశ్మికి అడ్డు లేకుండా ఉంటుంది.
- మిరప, టమాట, వంగ వేసిన చోట పప్పుజాతి (చిక్కుళ్ళు, బఠాణీ) పంటలతో పంట మార్పిడి చేసుకోవాలి.
- ఇటువంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వలన తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ దిగుబడి పొంది, ఇంటిల్లి పాదికి ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలు పండించడమే కాకుండా అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

అసోసియేట్ డీన్, సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, గుంటూరు - 522 034

ఫోన్ నెం. 0863- 2235106, సెల్ నెం. 83310 24686

కుటీర పరిశ్రమలు – మహిళా సాధికారతకు సోపానం

స్త్రీలు కుటుంబ వ్యవస్థకు కేంద్ర బిందువు వంటి వారు. మన దేశ మొదటి ప్రధాన మంత్రి నెహ్రూ ఏమన్నారంటే "ఏ దేశం యొక్క పరిస్థితినైనా అంచనా వేయాలంటే ముందుగా ఆ దేశంలోని మహిళల పరిస్థితులను అంచనా వేయవలసిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని అన్నారు". అందువలన మహిళల సామాజిక, సాంఘీక, ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి వారిని స్వయం ఉపాధి బాటలో నడిపించవలసిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. మహిళలు తక్కువ పెట్టుబడితో స్థాపించి నిర్వహించగలిగే కుటీర పరిశ్రమలను చేపట్టే విధంగా వారికి తగిన ప్రోత్సాహం మరియు సహకారం అందించాలి. ఈ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని భారత ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను రూపొందించి అమలు చేస్తూ ఉంది.

కుటీర పరిశ్రమ అనేది ఒక చిన్న స్థాయి ఉత్పత్తుల తయారీ వ్యాపారం.

అయితే ముందుగా కుటీర పరిశ్రమలు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

కుటీర పరిశ్రమలు అనగా తక్కువ పెట్టుబడితో కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో ఇంటిలోని ప్రతి స్త్రీ విజయవంతంగా నిర్వహించగలిగే పరిశ్రమలు లేదా తక్కువ పెట్టుబడితో ముగ్గురు లేదా నలుగురు కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో నిర్వహించుకోగలిగే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు.

ఈ కుటీర పరిశ్రమలను ముఖ్యంగా మనం 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి

1. వ్యవసాయ ఆధారిత – కుటీర పరిశ్రమలు (ఫామ్) : ఉదా : లాభదాయకమైన వాణిజ్య పంటల పెంపకం, ఉద్యానవన పంటల పెంపకం, పాడి పరిశ్రమ, కోళ్ళ పరిశ్రమ లేదా పౌల్ట్రీ, గొర్రెలు, మేకల పెంపకం తదితరమైనవి.

2. వ్యవసాయేతర పరిశ్రమలు (నాన్ ఫామ్) : ఉదా : అగరుబత్తి తయారీ, కొవ్వొత్తుల తయారీ, ఫినాయిల్, డిటర్జెంట్ మొదలగునవి.

3. వాణిజ్య సంబంధిత కుటీర పరిశ్రమలు (ట్రేడ్) : ఉదా : కిరాణా షాపులు, జిరాక్స్ సెంటర్లు, ఫాన్సీ స్టోర్ల వంటివి. ఇలా కుటీర పరిశ్రమలను 3 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. మహిళలు, తమ తమ నైపుణ్యాలు మరియు శక్తి సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా సరైన కుటీర పరిశ్రమలను ఎంచుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

కుటీర పరిశ్రమల వలన లాభాలు : • మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా అడుగు వెయ్యడానికి తోడ్పడుతాయి. • మహిళలు సాధికారతను సాధించవచ్చు. • కుటుంబ సాంఘీక మరియు ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. • పిల్లల సంపూర్ణ వికాసానికి కావలసిన ఆర్థిక సమీకరణకు ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

అందువలన గాంధీజీ కుటీర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా ఇవి దేశాభివృద్ధికి పట్టుకొమ్మలు అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా గాంధీజీ సేవా గ్రామ్ స్థాపించి కుటీర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శ్రీనికేతన్‌ను పశ్చిమ బెంగాల్‌లో స్థాపించి కుటీర పరిశ్రమలను గురుదేవులుగా ప్రోత్సహించడం జరిగింది.

కుటీర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించే సంస్థలు ముఖ్యంగా మహిళల ఆసక్తి, అనుభవం, నైపుణ్యతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికి ఆయా రంగాలలో శిక్షణ మరియు సహాయ సహకారాలు అందించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఉదా : రైతు మహిళలను వ్యవసాయ ఆధారిత కుటీర పరిశ్రమలను చేపట్టే విధంగా ప్రోత్సహిస్తే, వారికి ఆ రంగంలో వారికి ఉన్న అనుభవానికి శిక్షణ మరియు ఆర్థిక సహకారం తోడై, వారు విజయ పథంలో పయనించడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగంలో లేని మహిళలకు అగరుబత్తి మరియు కొవ్వొత్తుల తయారీ వంటి వ్యవసాయేతర కుటీర పరిశ్రమలలో శిక్షణను ఇచ్చినట్లయితే వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పరుచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వారమవుతాము. విద్యావంతులైన స్త్రీలు మరియు యువతులకు వాణిజ్య సంబంధిత కుటీర పరిశ్రమలు చేపట్టే దిశగా ప్రోత్సహించవచ్చు. గొర్రెల పెంపకం, పట్టు పరిశ్రమ,

వర్మి కంపోస్టు తయారీ, ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వాడే ఫార్ములేషన్స్ తయారీ, కోళ్ళ పెంపకం, పాడి పరిశ్రమ, పుట్ట గొడుగుల పెంపకం, తేనెటీగల పెంపకాలను మహిళలు లాభదాయకంగా తక్కువ పెట్టుబడితో చేపట్టదగిన వ్యవసాయ ఆధారిత కుటీర పరిశ్రమలను ఐ.సి.ఏ.ఆర్. సంస్థ వారు పేర్కొనడం జరిగింది. అందువలన మహిళా రైతులు ఈ పరిశ్రమలు చేపట్టదలచినట్లైతే ప్రతి జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ వారి యొక్క రైతు శిక్షణ సంస్థ (ఎఫ్.టి.సి.) లో శిక్షణను పొందవచ్చు. వ్యవసాయ శాఖ వారు కాకుండా వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలైనటు వంటి ఉద్యానవన శాఖ, మత్స్య శాఖ మొదలగు శాఖల శిక్షణా కేంద్రాలలో ఆయా శాఖలకు సంబంధించిన శిక్షణలను ఉచితంగా పొందడమే కాకుండా ఆర్థిక సహాయాన్ని మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా పొందవచ్చు. అదేవిధంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంకు అనుసంధానమైన కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ఏరువాక కేంద్రాలు, ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానాల ద్వారా కూడా మహిళా రైతులు ఈ సాంకేతిక శిక్షణలను పొందవచ్చు. రాష్ట్ర స్థాయిలోని "నైపుణ్య శిక్షణా సంస్థలు" మహిళల సాధికారతకు ఎన్నో శిక్షణలు ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి తగిన క్షేత్ర సందర్శనలను కూడా నిర్వహిస్తున్నాయి. అందువలన మహిళలు ఈ శిక్షణా సంస్థలను గురించి తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

వ్యవసాయేతర కుటీర పరిశ్రమల కోసం చేపట్టదగ్గ ప్రోత్సాహన్ని మహిళలకు జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ, ట్రైనింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్ మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్.ఆర్.డి. యొక్క జన శిక్షణా సంస్థాన్, నెహ్రూ యువ కేంద్రాలు నుండి గాని, బ్యాంకులు నిర్వహిస్తున్న శిక్షణా సంస్థలు ఉదా : యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ నుండి తగిన శిక్షణలను పొందడమే కాక ఋణ సౌకర్యంను కూడా పొందవచ్చు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఖాధీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పోరేషన్, ఖాధీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డ్ నుండి బట్టల అమ్మకము – హస్తకళలు, గృహలంకరణ మరియు గృహోపకరణ వస్తువుల తయారీపై ప్రత్యేక శిక్షణలను అందుకోవచ్చు. జాతీయ స్థాయిలో ఖాధీ మహా విద్యాలయ, రూరల్ గ్రాంట్స్ ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ మరియు ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాశ్ యోజన; వంటి సంస్థలు గ్రామీణ మహిళలకు ఎన్నో రకాలైన లాభదాయకమైన కుటీర పరిశ్రమలపై ఉచిత శిక్షణలను అందిస్తున్నారు. ఈ శిక్షణలు, సహకారం మరియు పథకాలను గురించి అవగాహన పెంచుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

అదేవిధంగా వాణిజ్య రంగంలో కుటీర పరిశ్రమలైనటువంటి కిరాణా షాపు యాజమాన్యం, జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వహణ సంస్థలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది. జిల్లా స్థాయిలో డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పోరేషన్‌ల ద్వారా కుట్లు, అల్లికలు, మెకానిక్, రిపేరింగ్, డ్రైవింగ్ వంటి వాటిలో మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తారు. చిన్న పరిశ్రమల అభివృద్ధి సంస్థ వ్యవస్థాపక నాణ్యత కలిగిన వ్యక్తులను గుర్తించడం, వారిని ప్రేరేపించడం మరియు నిర్మాణాత్మక శిక్షణా కోర్సు ద్వారా వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం, తద్వారా వివిధ ఏజెన్సీల నుండి లభించే సహాయంతో, వారు చిన్న తరహా పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి వీలు కల్పిస్తారు.

ఇక ప్రభుత్వ పథకాల విషయానికి వస్తే గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ అమలు చేస్తున్న నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం, స్టార్ట్ అప్ కార్యక్రమం, మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాలు ముఖ్యమైనవి. అందువలన స్త్రీలకు కుటీర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తున్న మంత్రిత్వ శాఖల సంస్థలు మరియు పథకాలను గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకొని మహిళా సాధికారిత దిశగా పయనించాలని ఆశిస్తున్నాం.

మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా :

సహ ఆచార్యులు, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఇ.ఇ. & సి.ఎమ్., సామాజిక విజ్ఞాన కళాశాల, లాం, గుంటూరు.

సెల్ నెం. 94941 92229

STATEMENT ABOUT THE OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER VYAVASAYA PANCHANGAM

From IV (SEE RULE 8)

Place of Publication	Guntur
Periodicity of Publication	Annual (Once in a Year)
Printer's name	V. Krishnaiah
Nationality	INDIAN
Address	Prajasakti Printers & Publishers Pvt. Ltd. D.No. 14-439/51, Prakash Nagar, Krishna Nagar (P), Tadepalli (M), Guntur - 522 502
Publisher's Name	Dr. G. Sivanarayana
Address	Director of Extension Administrative Office Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Lam, Guntur-522 034 Andhra Pradesh
Editor's Name	Dr. O. Sarada
Nationality	INDIAN
Address	Principal Agricultural Information Officer, Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Lam, Guntur- 522 034
Name and address of the individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one percent of the total capital	Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Administrative Office, Lam, Guntur- 522 034 Andhra Pradesh.

I, Dr. G. Sivanarayana, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

Sd/- **Dr. G. Sivanarayana**

Signature of the Publisher

To

చిరునామా :

ప్రధాన వ్యవసాయ సమాచార అధికారి,
వ్యవసాయ సమాచార మరియు ప్రసార కేంద్రం,
ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం,
వసంత బిల్డింగ్, ఐ.ఎ.బి. బిల్డింగ్ ప్రక్కన,
లాం, గుంటూరు - 522 034, ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఫోన్ : 91005 00223
ఈ-మెయిల్ : paio@angrau.ac.in

క
త్తి
రిం
పు
ము

From :

_____

_____

_____

_____

గమనిక : 'వ్యవసాయ పంచాంగం' ప్రచురణలో పొందుపర్చబడిన వివిధ అంశాలపై మీ సూచనలను, సలహాలను ఈ కాగితపు వెనుక వైపు వ్రాసి, పై చిరునామాకు పంపగలరు.